




EPB/B 54285/B VOL.3

N XIV

18/V

557 //

Col. J. S.







# SVMMA PLANTARVM

QVÆ HACTENVS INNOTVERVNT

METHODO LINNÆANA

PER GENERA ET SPECIES

DIGESTA ILLVSTRATA DESCRIPTA

A FVLGENTIO VITMAN

AN. VALLUMBROS.

IN R. MEDIOL. LYC. PVBL. BOTANICES PROF.

ET PVR. ACAD. SOC.

TOMVS III.



MEDIOLANI. MDCCLXXXIX.

---

TYPIS IMPER. MONAST. S. AMBROSII MAJORIS.  
SVPERIORVM PERMISSV.



# CLASSIS X.

## DECANDRIA.



## MONOGYNIA.

\* *Fl. polypetali, irregulares.*

614. *Sophora*. **C**al. brevis, campanulat. 5-dent. superne gibbus. Cor. papilionac. vexill. sensim latiore, adscend. lateribus reflexis: alis longitud. vexill. appendiculat. Legum. long. nodosum, torulis remotis. Sem. subrotun.
615. *Anagyris*. *Carina longissima*. Cal. 5-dent. supremo pari profundius diviso. Cor. papilionac. vexill. brevi, recto, obcord. alæ planæ, breves. Legum. magnum, obtusum, teretiusc. Sem. reniform.
616. *Cercis*. Cal. 5-dent. inferne gibbus. Cor. papilionac. vexill. subalis posito, brevi, subrotundo: alæ fursumflexæ: carina 2-pet. Legum. acuminat. compressum, membranac. Sem. reniform.
617. *Bauhinia*. Cal. 5-fid. hinc reclinatus, deciduus. Petal. patula, oblonga, unguicul. undulata, superior. magis distante; omnia calyc. inserta. Legum. *Fol. 2-fid. ut caprarum pedes.*
618. *Hymenæa*. Cal. subæqual. 5-part. Petal. 5. subæqual. erecto-patula. Styl. intortus. Legum. magnum, oblong. lignosum, 1-locul. repletum pulpa farinac. *Duo folior. paria, coniuncta, quæ nocte dum dormiunt, adproximantur, unde nomen.*
621. *Poinciana*. Cal. 5-phyll. laxis, deciduus, segmento infimo longiore. Petal. 5. subrotun. concava, summo ma. crenato. Stam. longa, omnia fœcunda. Legum. longum, compressum, polysperm. dissepiment. transversis.
622. *Myroxy-* Cal. campanulat. Cor. petalo summo ma. Germ. lon. cor. longius. Legum. 1-sperm.
619. *Parkinsonia*. Cal. 5-fid. patens. Petal. 5. patent. ovata, infim. reniform. Styl. nullus. Legum. longum, teres, tortuosum, moniliform. A ij

623. *Casalpinia*. Cal. 5-fid. lacin. infima maiore. Petal. 5. infimo pulchriore. Legum. rhombeum, 1-locul. 2-valv. Sem. rhombæa.
630. *Toluifera*. Cal. campanulat. 5-dent. Petal. 5. infimo ma. obcordato. Nectar. 4 linear. Styl. nullus.
620. *Cassia*. Cal. 5-phyll. laxis, concavus, coloratus. Petal. 5. distantia, patula, infer. ma. Anth. superne 3. steriles; infimæ 3. rostratæ. Legum.
624. *Guilandina*. Cal. 1-phyll. hypocraterif. Pet. minima, 5. subæqual. calyc. collo inserta. Legum. rhombeum, ventricoso-compressum. Sem. ossea, dilepimentis transversis interstincta.
628. *Didamnus*. Cal. parvulus. 5-phyll. lacin. oblong. acumin. Petal. 5. patula: 2. sursum flexa; 2. lateral. obliqua: unicum deflexum. Filam. 7-10. deorsum inclinata, punctis glandulosis adspersa. Caps. 5. coalitæ, cornutæ. Sem. arillata, nitida.

\* *Fl. polypetali, æquales.*

626. *Cynometra*. Cal. 4-phyll. fol. oppositis ma. Anth. apice 2-fid. Legum. lunatum, carnosum, 1-sperm. Fdl. geminata.
632. *Prosopis*. Cal. hemispheric. 4-dentat. Stigm. simpl. Legum. inflatum, polysperm.
635. *Adenantha*. Cal. minimus, 5-dent. Petal. 5. oblonga. Antheris apice exteriore glandulæ globosæ adfixæ. Legum. longum, compressum, membranac.
631. *Hamatoxylon*. Cal. 5-part. Petal. 5. ovata. Pistil. stigm. emarginatum. Caps. lanceol. 1-locul. 2-valv. valvis navicular.
636. *Trichilia*. Cal. parvus, tubulosus, 5-dent. Petal. 5. patent. Nectar. cylindricum, ore antheras gerens. Caps. 3-locul. 3-valv. subrot. Sem. 3. baccata.
637. *Turraea*. Cal. minimus, campanulat. 5-dent. Petal. 5. longa, patent. linear. Nectar. cylindric. ore anth. gerens. Caps. subrotund. 5-coeca. Sem. bina.
640. *Melia*. Cal. parvus, 5-dent. Petal. 5. longa, angusta. Nectar. tubulos. multidentatum ore anth. gerens. Drupa globosa, nucleo 5-locul.
638. *Swietenia*. Cal. minimus, 5-fid. Petal. 5. obovata, patent. concava. Nectar. cylindric. ore anth. gerens.



Receptacul. magnum, 5-angul. Caps. lignosa, 5-valv. basi dehiscens, 5-locul. Sem. imbricata, compressa, alata.

639. *Ekebergia*. Cal. 4-part. Pet. 4. Nectar. sertiforme, cingens germen. Bacca 5-sperm. Sem. oblong.
625. *Guajacum*. Cal. 5-fid. lacin. 2. exterior. minor. Petal. 5. inæqual. concava, calyci inserta. Caps. angulata, carnosæ, 5-5-locul.
629. *Ruta*. Cal. parvus, 4 part. Petal. ovat. concava. Germen punctis 10. melliferis. Caps. subrotunda, semi 4--5--fid 5--locul. polysperma. Quinta pars numeri in quibusdam excluditur.
644. *Tribulus*. Cal. 5-part. Petal. 5. patentia, æqualia, oblong. obtusa. Styl. o. Caps. 5. gibbæ, spinosæ, polysper. congestæ.
643. *Eragrostis*. Cal. parvus, 5-phyll. Petal. 5. cordata, unguibus calyci insertis. Caps. 5-locul. 10-valv. acumin. locul. 1-sperm.
641. *Zygophyllum*. Cal. 5-phyll. segment. erectis, concavis. Petal. 5. emarginata. Nectar. squamæ 10. baseos flam. Caps. 5-locul. varia, polysperm. Datur species, quæ  $\frac{1}{2}$  partem numeri excludit.
642. *Quassia*. Cal. breviss. 5-phyll. Petal. 5. elongata, lanceol. Nectar. 5 phyll. Caps. 5. distantes, 2-valv. 1-sperm. receptaculo carnosæ adnæ.
645. *Thryallis*. Cal. 5-part. segment. erectis, lanceol. Petal. 5. subrotunda, patent. Caps. 3-coeca, obtusa.
646. *Limonia*. Cal. minimus, 5-part. Petal. 5. æqual. patentia. Bacca subglobosa, 3-locul. 3-sperm.
650. *Heisteria*. Cal. 5 fid. Petal. 5. Drupa infidens calyc. colorato, grandifacto.
651. *Quisqualis*. Cal. longiss. filiform. ore 5-fid patulo. Petal. 5. oblong. obtusa, patent. Drupa 5-angular. sicca. Nux subrotun.
647. *Monotropa*. Cal. 4-phyll. deciduus. Petal. 4. duabus appendicibus aucta. Caps. oblon. 4-locul. 4-valv. Sem. scrobiform. Fl. in spica squamosa: supremi fl. solent esse 5-pet. & flam. 10. cum cal. 5-phyll. Habitus Orobanche aphyllus.
662. *Clethra*. Cal. erectus, 5 part. Petal. 5. oblonga, extrorsum latiora. Stigm. 3-fid. Caps. subrotund. 3-locul. 3-valv.
663. *Pyrola*. Cal. campanul. 5-part. Petal. 5. rotundata, concava. Anth. sursum bicorn. Caps. rotunda, 5-locul. polysper.

655. *Ledum*. Cal. parvus, 5-fid. Cor. 5-part. plana, lacin. ovat. concavis. Caps. rotunda, 5-locul. basi dehiscens.
648. *Dionæa*. Cal. erectus, 5-phyll. segment. oblon. acutis, persistentibus. Petal. 5. oblong. obtusa, concava. Stigm. fimbriatum. Caps. 1-locul. gibba, polysperm. Sem. baseos capsul.
634. *Murraya*. Cal. 5-part. segment. erectis, linear. remotis. Cor. campanul. Petal. 5. lanceol. apice parulo. Nectar. breve, campanulat. margine cingens germen. Bacca subpulposa, 1-sperm.
633. *Chalcas*. Cal. 5-part. Cor. campanul. petal. unguiculat. Stigm. capitato-verrucosum. Bacca 2-sperm.
653. *Melastoma*. Cal. campanulat. 5-fid. Pet. 5. subrotund. calyci inserta. Anth. refractæ. Bacca 2-3-5-locul. calyc. coronata, varia.
649. *Jussiaea*. Cal. 4-5-part. superus. Petal. 4-5. parent. Caps. infera, oblong. 4-5-locul. angul. dehiscens. Sem. numerosa, minuta.
- \* *Rhexia Acisanthera*.  
 \* *Gerania* \* *Conocarpus racemosa*.  
 \* *Lythrum fruticans*.  
 \* *Jacquinia racemosa*.
- \*\*\* Fl. monopet. æquales.
627. *Codon*. Cal. 10-part. Cor. campanul. 10-fid. Caps. polysperm.
657. *Andromeda*. Cal. conicus. Cor. ovata, ore 5-fid. reflexo. Caps. subrotund. 5-locul. 5-gon.
656. *Rhododendron*. Cal. parvus, 5-part. Cor. subinfundibulif. lacin. obtusis. Stam. declinata. Caps. subrotund. 5-locul. 5-valv. polysperm.
654. *Kalmia*. Cal. 5-part. Cor. hypocraterif. limbo subtus 5-corni. Caps. globosa, 5-locul.
658. *Epigæa*. Cal. exter. 3-phyll. interior. 5-phyll. Cor. hypocraterifor. lacin. ovat. tubo intus hirsuto. Caps. globosa, 5-locul.
659. *Gualtheria*. Cal. exter. 2-phyll. interior. 5-fid. Cor. ovata. Nectar. mucronibus 10. Caps. 5-locul. vestita calyc. inter. baccato.
660. *Arbutus*. Cal. parvus, 5-part. Cor. globosa, 5-fid. basi pellucida. Bacca 5-locul. polysperm. Differt a *Vaccinio fructu supero*.
664. *Styrax*. Cal. inferus, brevis, 5-dent. Cor. infundibulif. 5-part. Drupa subrotund. 2-sperm. 1-locul.

661. *Inocarpus*. Cal. 2-fid. Cor. infundibulif. Stam. duplici serie. Drupa 1-sperm.

\* *Vaccinia nonnulla*.

\*\*\*\* *Fl. apetalis, seu incompletis*.

652. *Dais*. Involuc. 4-phyll. sessili-multiflorum; foliol. erectis, scariosis. Cor. involuero longior; tubo filiform. 4-5-fid. lacin. lanceol. obtusis. Bacca 1-sperm.

665. *Samyda*. Cal. 5-part. coloratus. Cor. o. Nectar. 10-fid. cingens germen. Caps. subrotund. baccata, 3-4-5-valv. 1-locul. Sem. nidulantia.

667. *Bucida*. Cal. ventricos. 5 dent. superus. Cor. o. Bacca ovata, sicca, coronata, 1-sperm. *Aufinis Rhizophora*.

666. *Copaifera*. Cal. o. Petal. 4. patentiss. Legum. ovar. Sem. 1. arillo baccato.

\* *Stellera Chamæjasme*.

## DIGYNIA.

676. *Scleranthus*. Cal. superus, tubulos. 5-fid. collo coarctatus, segment. acutis, margine coloratis. Cor. o. Sem. 2. calyc. inclusa; hinc convexa, inde plana, sub apice mucronata.

671. *Trianthema*. Cal. interne coloratus, lacin. æqual. obtusis. Cor. o. Stam. 5-10. Germen. retusum. Caps. circumscissa.

672. *Chrysosplenium*. Cal. superus, 4-5-fid. coloratus. Cor. o. Stam. 8-10. Caps. 2-rostris, 1-locul. polysper.

668. *Royena*. Cal. ventricos. 5-dent. Cor. 1-pet. limb. revolut. Caps. 4-sulc. 4-valv. 4-sperm. 1-locul. Nuc. 4. oblong.

669. *Hydrangea*. Cal. superus, parvus, 5-fid. persist. Petal. 5. subrot. Caps. subrot. didyma, 2-rostris, circumscissa, 2-loc.

673. *Saxifraga*. Cal. 5-part. persistens. Petal. 5. plana, basi angusta. Caps. 2-rostris, 1-2-locul. polysper.

674. *Tiarella*. Cal. corollifer. 5-part. Petal. 5. ovat. integra, calyci inserta. Caps. oblong. 1-locul. 2-valv. valvul. altera maiore.

675. *Mitella*. Cal. corollifer. campanulat. 5-fid. Petal. 5. calyc. inserta, pinnatifid. Caps. subrotund. forma mitræ Episcopalis. 1-locul. 2-valv. valvul. æqualibus.



670. *Cunonia*. Cal. 5-phyll. segment. ovatis. Petal. 5. obtusa, expansa. Styli fl. longiores. Caps. acumin. 2-locul. polysperm.
677. *Gypsophila*. Cal. campanulat. angulat. 5-part. Petal. 5. sessil. ovata, obtusa, expansa. Caps. globosa, 1-locul.
678. *Saponaria*. Cal. tubulos. 5-dent. basi nudus, persistens. Petal. 5. obtusa, unguibus angustis, angulatis. Caps. oblon. 1-locul. polysperm.
679. *Dianthus*. Cal. tubulos. 5-dent. coriac. basi squamis 4. Petal. 5. unguicul. crenata, æqualia. Capsul. cylindrica, 1-locul. apice dehiscens, polysperma.
- \* *Trianthema decandra*.

## TRIGYNIA.

683. *Arenaria*. Cal. 5-phyll. patens. Petal. 5. integra, obtusa, patent. Caps. 1-locul. polysperm. *Differs a Stellaria petal. integris*.
682. *Stellaria*. Cal. 5-phyll. patens. Petal. 5. 2-part. patentia. Caps. 1-locul. polysperm. *Differt ab Arenaria petalis 2-fid.*
680. *Cucubulus*. Cal. inflatus. Petal. 5. 2-fid. fauce nuda, expansa, unguiculata. Caps. acumin. plerumq. 3-locul. *Differt a Silene cor. absque corona nectarica*.
681. *Silene*. Cal. 5-dent. Petal. 5. unguicul. plana, sæpe 2-fid. coronata ad faucem. Caps. 3-locul. polysperm.
684. *Cherleria*. Cal. 5-phyll. segment. oblong. Squamæ 5. 2-fid. petaloideæ. Anth. alternæ, steriles. Caps. 3-locul. 3-valv. 3-sperm.
685. *Deutzia*. Cal. 1-phyll. Filam. 3. cuspidata. Caps. 3-locul.
686. *Garidella*. Cal. parvus. 5-phyll. petaloideus. Pet. 5. nectarifera, 2-lab. 2-fid. Caps. 3. connexæ, polysperm. *Nigellæ adfinis*.
691. *Erythroxylon*. Cal. parvus, turbinatus, 5-fid. Petal. basi squama instructa. Stam. basi connexa. Drupa ovata, 1-locul. 1-sperma. Nux 3-loba.
687. *Malpighia*. Cal. parvus, 5-phyll. basi extus glandulosus. Petal. 5. magna, subrotun. unguicul. Bacca magna, globosa, 1-locul. 3-sperm.
688. *Bannisteria*. Cal. parvus, 5-part. basi extus glandulosus. Petal. 5. subrotun. unguicul. magna, patula. Sem. 3. membranac-alata.



689. *Hirza*. Cal. minimus, 5-phyll. Petal. 5. subrotund. unguicul. Caps. 3-alata, 3-locul. 2-sperm.
690. *Triopteris*. Cal. parvulus, erectus, 5-part. lacin. basi connexis. Petal. nulla, sed feminum alæ. Caps. 3. 2-alatæ, alis acutis, 1-sperm.
- \* *Tamarix germanica*.

## TETRAGYNIA.

- \* *Lychnis alpina*.

## PENTAGYNIA.

694. *Cotyledon*. Cal. 5--fid. Cor. 1--petal. tubulosa, 4--5--fid. lacinis revolutis. Squamæ nectariferæ 5. ad basin germinis. Caps. 5. Fol. carnosæ, succulenta.
695. *Sedum*. Cal. 5--fid. aut 5--phyll. segment. acutis. Pet. 5. lanceol. æqualia Squamæ nectariferæ 5. ad basin germinis. Caps. 5. compress. Fol. succulenta.
696. *Penthorum*. Cal. 5--10--fid. Petal. nulla ad 5. linearia. Caps. 5-cuspid. 5-locul. *Differt a Sedo absentia Nectar.*
697. *Bergia*. Cal. 5 part. patens, lacin. lanceol. Petal. 5. oblon. patula, longitudine calyc. Caps. subglobosa, mucronat. 5-torulosa, 5-locul. 5-valv. valvul. petaloideis, horizontaliter dehiscens. Sem. plurima.
704. *Spergula*. Cal. 5-phyll. lacin. concavis. Petal. 5. integra, concava. Caps. ovata, 1-locul. 5-valv. *Differt a Cerastio petal. integris.*
703. *Cerastium*. Cal. 5-phyll. patens. Petal. 5. æqual. magis, minusve incisa. Caps. 1-locul. apice dehiscens. *Habitus Alfines.*
701. *Agrostemma*. Cal. tubulos. 5-dent. 5-angulat. vel 10-striat. coriaceus. Pet. 5. unguicul. expansa, obtusa, indivisa. Caps. oblong. 1-locul.
702. *Lychnis*. Cal. tubulos. membranac. 5-dent. lævis. Petal. 5. unguicul. sub 2--fid. Caps. oblon. 3. plerumq. 5-locul.
700. *Oxalis*. Cal. parvus, campanifor. acute 5--fid. Cor. 5-pet. unguibus primum distinctis, dein conglutatis. Fruct. 5-gon. fœtus ex 5. coniunctis loculis, 1-sper. per maturitatem dissiliens.

693. *Spondias*. Cal. parvus, 1-phyll. 5-dentat. colorat. Petal. 5. lanceol. conniventia. Drupa magna, oblong. Nucleo 5-locul.
692. *Averrhoa*. Cal. erect. 5-phyll. Petal. 5. superne patentia. Pomum 5-gon. 5-locul. Sem. angulata.
699. *Griecum*. Cal. profunde 5-fid. acutus, patens. Petal. 5. magna, obovata, basi attenuata, patentia. Filam. persistent. Styli nulli. Pericar. 5-sperm.
698. *Suriana*. Cal. 5-phyll. lacin. acuminat. Petal. 5. oblon. patentia. Styli lateral. filiform. Sem. 5. nuda, subrotunda.
705. *Forsko-hlea*. Cal. 5-phyll. cor. longior. Petal. 10. spathulata. Sem. 5. nuda, lana involuta.
- \* *Adoxa*. \* *Gerania*.
- \* *Coriaria*. \* *Drosera lusitanica*.

## DECAGYNIA.

706. *Neurada*. Cal. parvus, 5-part. Petal. 5. Caps. infera, depressa, aculeat. 10-locul. 10-cocca.
707. *Phytolacca*. Cal. 0. Petal. 5-calycina, lacin. subrotun. apice inflexis, expansis, persistentibus. Stam. 8-10. Bacca supera, depressa 8-10-locul. 10-sperm.

## MONOGYNIA.

614. SOPHORA. Cal. 5-dent. superne gibbus. Cor. papilionac. alis longitudine vexilli. Legum.
1. *alopecuri-des*. S. fol. pinnat. foliol. numerosis, oblong. villosis: caul. herbac. *Syst. veg. ed. 14.*  
*Ervum* &c. *Dill. elth. 136.*  
*Glycyrrhiza* &c. *Buxb. cent. 3. tab. 46.*  
*In Oriente 24.*  
 Radix late repens. Caul. pl. cubital., & ultra, toti foliosi, striati, superne ramosi, virentes. Fol. impari-pinnat. 10-iuga, & ultra. Foliol. oblong. supra fature virid. subtus albidiora, sericeis pilis adspersa. Fl. terminal. spicati, oblique surrecti. Calyx cor. concolor. Cor. ex herbaceo-dilute flavido-albicans, odora. Legum. sesqui-2-unc. compressum, nodosum,

ad sem. turgidum, primum argenteum, dein virescens.

2. *tomentosa*. S. fol. pinnat. foliol. numerosis, subrotund. tomentosis. *Syst. veg. ed.* 14.

Cólutea &c. *Herm. Lugd. tab.* 171.

*In Zeylona* h.

Planta tota tomentosa. Fol. alterna. Foliol. 8-9-iuga. Racemus terminalis.

3. *occidentalis*. S. fol. pinnat. foliol. numerosis, subrotund. *Syst. veg. ed.* 14. *Trew. chret. tab.* 59.

Galega &c. *Brown. Jam. tab.* 31. f. 1.

Corallodendron &c. *Plum. ic.* 101.

Arbori &c. *Sloan. Jam. hist. 2. tab.* 107. f. 3.

*In America* h.

*An var. prioris?* Petal. lutea.

4. *capensis*. S. fol. pinnat. foliol. numerosis, lanceolat. subtus tomentosis: caul. fruticoso. *Syst. veg. ed.* 14.

*Ad cap. b. Spei* h.

Frutex tenellus pubesc. adultior spontaneus nudus, facie *Amorphæ*. Fol. alterna, impari-pinn. Foliol. 11-iuga, æqual. integerr. supra nitida. Racem. terminal. Fl. albi, recurvati. Filam. quasi villis intertexta. Legum. oblong. compressum, tomentosum. Sem. 3-6. durissima.

5. *japonica*. S. fol. pinnat. foliol. pl. ovatis, glabris: caul. arboreo. *Syst. veg. ed.* 14.

*In Japonia* h.

Arb. ramis purpurasc. Fol. *Robinia Caragana*, sparsa, impari-pinn. Foliol. 7-11. subopposita, brevissime petiol. pollicar. integerr. patentia, subtus glauca, utrimq. lævia, tenuia; inferioribus paulo min. Racemi parvi. Fl. albi, magnitudine *Indigoferæ*. Legum. subcarnosum, simpl. vel biarticulatum.

6. *heptaphylla*. S. fol. pinnat: foliol. septenis, glabris. *Syst. veg. ed.* 14.

Anticholerica. *Rumph. amb. 4. tab.* 22.

Fruticulus &c. *Pluk. amal. tab.* 451. f. 10.

*In India* h.

Planta altitudine *Ligustri*. Fol. alterna. Foliol. petiol. ovat-obl. acutiusc. reinota. Racem. terminal. longus, nudus. Fl. lutei. Legum. 6-9-pollic. nodosum, lanuginosum, griseum.

7. *tetraptera*. S. fol. pinnat: foliol. numerosis, obovatis, emarginat. legumin. 4-gonis, angulis membranac.  
*Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*

*In nova Zeelandia*  $\bar{h}$ .

Arbuse. glabra. Foliol. parva, fere cuneiform.  
 Flos magnus, luteus. Legum. compressum.

8. *genistoides*. S. fol. ternatis, sessilibus: foliol. linearibus.  
*Syst. veg. ed. 14.*

*Genista* &c. *Pluk. phyt. 413. f. 3.*

*Ad cap. b. Spei*  $\bar{h}$ .

Caul. arborescens. Fol. frequentia, alterna, glabra. Foliol. pollic. & ultra. Fl. axillar. magni, alterni, peduncul. phœnic. Cor. carina utrimq. cornuta, ut *Indigofera*.

9. *australis*. S. fol. ternatis, subsessil. glabris; stipulis ensiformibus: (caule sæpius decumb.). *Syst. veg. ed. 14.*

*In Carolina*  $\bar{u}$ .

Caul. herbaceus. Fol. cuneat-oblong. glabra, viridi-flavescent.

10. *tinctoria*. S. fol. ternatis, subsessil. foliol. obovat. glabris: stipul. minutis. *Syst. veg. ed. 14.*

*Ad cap. b. Spei*?

Caul. ramosiss. Foliol. breviss. petiol. exsiccatione nigra. Racemi paucifl.

11. *alba*. S. fol. ternatis, petiol. t. foliol. elliptic. glabris: stipul. brevibus, subulatis. *Syst. veg. ed. 14. Murray. Gott. 1779. vol. 1. tab. 6.*

*Anonis* &c. *Martin. cent. tab. 44.*

*In Carolina*  $\bar{h}$ .

Caul. 2-ped. oblique ascendens, subglaucus, a basi dichotom. levis, atro-purpur. Rami axillar. patentiss. Fol. (*Laburni*) subaxillar. sesquipollic. modice petiol. elliptica, macronata, plana, glaberr. glauca, impari ma. Racem. ped. distichus, pendulus, bracteat. Fl. magnitudine *Laburni*. Cal. ventricosus. Cor. alba, vel satur. purpur. vexillum cor. brevius. Legum. sesquipollic. erectum, ventricosum, nodosum, rugosum.

12. *lupinoides*. S. fol. ternatis, petiolat. foliol. ovalibus, pilosis.  
*Syst. veg. ed. 14.*

*In Camtschatea*.

Caul. lævis, striatus, Foliol. sessil. integerr. subæqual. Stipul. oppositæ, magnitudine fol. sessil.



- ensiform. Spica terminal. erecta, simplex. Fl. subseffil. lutei. Bract. ovatae, sub singulo fl.
13. *biflora*. S. fol. simplic. obovat. subtomentosis; pedunc. sub-2-fl. *Syst. veg. ed. 14.*  
*Crotalaria* &c. *Pluk. alm. tab. 185. f. 2.*  
*Genista* &c. *Seb. mus. 2. tab. 99. f. 3.*  
*Myrto-genista* &c. *Breyn. cent. tab. 29.*  
*S. myrtillifolia*. *Retz. Obs. fasc. 1.*  
*In Æthiopia* h.  
 Caul. arboresc. ramosus, ramis tomentos. Fol. sparsa, alterna, pollic. petiol. orbiculat-ovat. integerr. patent. cinerea, 10-lineas longa, 4. lata. Stipula subulata ad latus petioli, tomentosa. Pedunc. ex ultimis axill. quandoq. 1-fl. Fl. magni, rubro-carnei, carina pallidiore.  
*Var. fol. ma. aut min. suborbicul. aut ovalibus; tomentos, aut glabris.*
- 
- hayanensis*. S. fol. impari-pin. foliol. numerosis, oblung-ovat. emarginat. villosis. *Jacq. amer. tab. 173. f. 1. ed. pict. tab. 261. f. 62.*  
*In Havanæ fruticosus* h.  
 Frutex erectus, 4-ped. ramis junioribus fol. & pedunc. villosiss. Foliol. pollic. sub-10-iuga, petiol. obtusa, lateribus reflexis. Racemus terminal. erectus, pedal. simpl. Fl. erecti, vix odori. Cor. flava. Legum. longum, acuminatum.
- buxifolia*. S. fol. simplic. ovalibus supra glabris, subtus sericeis: pedunc. 1-fl. calycibus basi intrusis, tomentos, colorat. *Retz. Obs. fasc. 1 p. 35.*  
*Habitat* . . . . .  
 Caul. suffruticul. laxus, teres, foliosus, tomentosus, ramis brevibus, patent. magis tomentos. Fol. sparsa, breviss. petiol. 6. lin. longa, 3. lata, obtusiusc. integerr. carnosae, carinata. Tenera autem, praesertim margine, & subtus rufo-tomentosa, nitentia. Stipul. 2. filiform. Fl. ex apice ramorum axill. solitar. Cal. campanulat. extus hirsuto-rufus, intus hirsuto-albus. Cor purpur. alis pallidioribus.
- biflora*. S. fol. simplic. ovatis, subtomentosis: pedunc. 2-fl. calyc. basi intrusis, tomentos, coloratis. *Retz. Obs. fasc. 1.*  
*Habitas* . . . . .

*Diffinēda a reliquis fol. fig. ovata, non obovata, neque obtusa. Vexillum non maximum; nec color ruber.*

Caul. fruticosus, teres, foliosus, flavus ramis teretibus, tomentosis. Fol. sparsa, breviter petiol. 11. lineas longa, 6. lata, acumine reflexo, integerr. glabra, coriacea, supra sulcata, subtus carina elevata instructa. Stipul. ad utrumq. petioli latus, subulata, tomentosa. Fl. in ultimis folior. axillis. Cal. campanulat. gibbus, strigis longis crispis, flavo-rubent. oblitus, unde cor. videtur. Cor. magna, pallide flava, striis purpur. picta.

*calyptrata.* S. fol. simplic. subovatis, pubescentibus: pedunc. 1-fl: calyc. tomentosis; fl. calyptra decidua. Retz. Obs. fasc. 1.

Crotalaria &c. Hort. Cliff. 357. 3.

*Habitat* . . . . .

Caul. fruticosus, ramis strictis, obsolete angulat. foliosis, tomentosis, ramulosis. Fol. sparsa, petiol. teneriora obovata, longa 22. lin. lata 12-13. acuta, integerr. raro acumine parvo reflexo instructa, utrimq. creberrime venosa, supra scabra, subtus villosa, non autem mollia, aut sericea. Venæ subtus, & costa, cinereo-tomentosæ. Stipul. 2. subulatæ, caducæ. Fl. axill. peduncul. solitarii. Rudimentum fl. tegitur calyptra globosa, villosa, ad genu pedunculorum adnata. Cal. villosus. Cor. maximæ generis, purpur.

615. ANAGY. Vexillum, alæq. carina breviores in cor. papilionac. Legum. magnum, teretiuscul. Sem. reniform.

*Y. fatida.*

A. Syst. veg. ed. 14. Clus. hist. 1. p. 93.

*In Italia, Sicilia, Hispaniæ montibus, ad rupes &c.* Suffrutex. Fol. alterna, petiolat. ternata. Foliol. sessil. oblong. acumin. integerr. supra virid. subtus albicant. odore gravi, & tetro. Pedunc. axillar. multifl. fl. binis-ternis-quadernis, oblongis. Cal. 4-fid. glaucus, & veluti argenteus. Vexill. aureum; cætera petal. pallidiora.

616. CERCIS. Cal. 5-dentat. inferne gibbus. Cor. papilionac. vexillo sub alis posito, subrotundo: alæ sursum flexæ: carina 2-petal. Legum. oblong. compressum, membranac. Sem. reniform.

1. *Siliquastrum*. C. fol. cordat. orbicul. glabris. *Syst. veg. ed. 14.*  
Arbor Judæ. *Dod. pempt. Bauh. hist. p. 1717.*  
*In Hispania, Liguria &c. in Sylvis, & ad rupes h.*  
Arbor. Fol. alterna, petiol. integerr. nervosa,  
subtus albescent. Fl. axill. peduncul. nigris in-  
nixa, multifl. Petal. & legum. purpur.
2. *canadensis*. C. fol. cordat. pubescentibus. *Syst. veg. ed. 14.*  
*In Virginia h.*  
Arb. 30-ped. ramosa, cortice cinereo. Fol. cre-  
bra, inordinata, petiol. supra obscure virid.  
subtus albicant. Oleæform. Fl. in apice ramo-  
rum, albi. Legum. rufa.
617. BAUHI- Cal. 5-fid. deciduus. Petal. oblong. unguiculata,  
NIA. patula, calyci inserta; superiore magis dis-  
tante. Legum. *Folia bifida.*
1. *scandens*. B. caul. cirrhifero. *Syst. veg. ed. 14. Aubl. Guian.*  
*tab. 145.*  
Folium linguæ. *Rumph. amb. 5. tab. 1.*  
Naga-mu-valli. *Hort. mal. 8. tab. 29.*  
*In Malabar, Amboina, Cumana h.*  
Super arbores adscendit. Fol. petiol. duobus  
cuspidibus angustis 2-loba, supra fusca, niten-  
tia, subtus dilutiora. Fl. primum albid, dein  
flavescent. Legum. pedal. ex nigro-fusca.
2. *aculeata*. B. caul. aculeato. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. am. tab.*  
*177. f. 2. ed. picta tab. 26. f. 31. Hort. Clif.*  
*tab. 14. Plum. ic. 44. f. 1.*  
*In America calidiore h.*  
Frutex orgyal. trunco, & ramis valde aculeat.  
Fol. alterna, subrotun., apice 2-loba, lobis  
subrotun. obtusis, 9-nervia. Fl. magni, can-  
didi, odore lævi, & ingrato.
3. *divaricata*. B. fol. ovatis; lobis divaricat. *Syst. veg. ed. 14.*  
*Plum. ic. 44. f. 2.*  
*b. B. fol. ovat-cordat. &c. Mill. dict. tab. 61.*  
*In America h.*  
Caul. lignosi. Acul. 2. minimi, vix manifesti,  
ad exortum ramorum. Fol. alterna, semibi-  
loba, lobis ovat-acum. Racemi erecti. Legum.  
6-7. oblong. nutantia, 4-sperm.
4. *ungulata*. B. fol. ovatis; lobis paralellis. *Syst. veg. ed. 14.*  
*In America h.*  
Fol. longiora, 9-nervia. Cal. longiss. striatus,  
griseus. Petal. subulata, Legum. longiss. pen-  
dula.



5. *variegata*. B. fol. cordat. lobis coadunatis, obtusis. *Syst. veg. ed. 14.*

Arbor &c. *Mont. in Zann. tab. 20.*

Chouanna-mandaru. *Hort. mal. 1. tab. 32.*

*In Malabariae, Maderæ arenosis* h.

Arbor. Fol. crassa. Cor. magna patens. Petal. ovata, acuta, rosea, luteo-purpureoq. col. variegata, odora. Legum. 7-8-pollic. recta, compressa, glabra.

6. *purpurea*. B. fol. subcord. 2-part. rotundatis, subtus tomentosis. *Syst. veg. ed. 14. Hort. mal. 1. tab. 33.*

*In India arenosis* h.

Omnium maior. Fol. ad basin nonnihil clausa. Petal. distant. lanceol. patent. purpuro-rubund. Legum. omnium longiss. recta, compressa, glabra.

7. *tomentosa*. B. fol. cordat. lobis semiorbiculat. tomentosis. *Syst. veg. ed. 14. Burm. Zeyl. tab. 18.*

Mandaru &c. *Pluk. alm. tab. 44. f. 6.*

Charfchena-pou. *Hort. mal. 1. tab. 35.*

*In India* h.

Arb. 2-orgyal. Fol. priore min. Cor. campanul. Petal. albo-flavescent. quorum surrectius, & angustius ad unguem inignitum est macula purpuro-rubundo-obscura. Legum. longiss.

8. *acuminata*. B. fol. ovatis; lobis acuminat. semi-ovat. *Syst. veg. ed. 14.*

Velutta-mandaru. *Hort. mal. 1. tab. 34.*

*In Indiis* h.

Frutex orgyal. Fol. fere semibifid. lobis parum deliscentibus, margine interiore non recto, sed parum convexo. Racemi laxi. Cal. villosus, griseus. Cor. campanul. Petal. ovata, obtusa, alba, inodora. Legum. cæteris min. plana, compressa, stylo brevi terminata, glabra, 3-4-sperm.

*Outimouta*. B. caul. cirrhifero: fol. cordifor. 2-part. subtus aureis. *Aubl. Guian.*

*In Guiana* h.

Frutex ramis scandent. tortuosis, nodosis, varie inflexis, capreolat. Fol. ampla, alterna, 2-part. usque ad petiolum, supra glabra, virent. splendent. reticulata, petiolis longis rubent. Stipul.

2. exi-



2. exiguæ. Fl. axillar. racemosi. Legum. oblong. compressa, ferrugin. Sem. 2-3. subovat. compressa, nitida.

*Differt a B. scandente fol. amplioribus, minus rigidis, & subtus croceis.*

*inermis.*

B. fol. lobis ovalibus, divergent. leguminibus compressis, tomentosis, testaceis. *Forsk. Æg.*

*In Arabia 24.*

Fol. subrotunda. Seta parva inter lobos e rachi continuata. Spinæ nullæ. Petiol. apice incrassati. Legum. 2-pollic. linear. digito angustiora, apice falcata, pedicello pollic. coniugato, in ramorum apice.

*glabra.*

B. fol. subrotund-cordat. glabris; lobis semiorbicular. ramul. cirrhosis. *Jacq. amer. tab. 173. f. 3. ed. picta tab. 260. f. 32.*

*In Carthagenæ sylvis h.*

Altitudo humana. Frutex scandens. Rami longiff. ramulosi. Fol. fig. & magnitudine B. tomentosa, lobis stipula intermedia instructis. Pedunc. terminal. multifid. Cor. erecto-patens, e flavescenti-virid., intus purpur. punctis variegata.

618. HYME- Cal. 5. part. Petal. 5. subæqual. Styl. intortus.  
NÆA. Legum. repletum pulpa farinacea.

1. Courbaril. H. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. am. ed. picta tab. 264. f. 95.*

*Ceretia &c. Pluk. alm. tab. 82. f. 2.*

*Itaiba. Pif. Bras. 123.*

*In Amer. meridion. h.*

Arbor. trunco cum punctulis ex albo-flavescent. Fol. 2-3. opposita, parva, oblonga, lævia, subtus venosa. Legum. compressum, col. hepatici, carne subincarnata.

*Elicitur Gutumi Elimi.*

619. PARKIN- Cal. 5-fid. Petal. 5. ovata, infimo reniformi.  
SONIA. Styl. nullus. Legum. moniliform.

1. aculeata. P. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. amer. tab. 80. ed. 2. picta tab. 119. Walth. hort. 6. tab. 13.*

*In Amer. calidiore h.*

Arb. 12-ped. ramosa. Aculei subaxill. solitar. subulati, subrecurvi. Fol. impari-pinn. Foliol. multi-iuga, exigua, oblong. nitida. Racemi axill. & terminal. simpl. sub-10-fl. Petal. flava, super. maculis coccineis variegata, suaveolent. Legum. fusco-lutea. Sem. 1-6. nitida.

*Tom. III.*

B

620. CASSIA, Cal. 5-phyll. Petal. 5. Anth. supernæ 3. steriles; infimæ 3. rostratæ. Legum.

\* *Senna*,

1. *diphylla*, C. fol. conjugatis; stipulis cordato-lanceol. *Syst. veg. ed. 14.*

*In India* ☉.

Frutex caul. tereti. Fol. semiorbicul. obtusa, striata. Stipul. totos ramos obregentes.

2. *bacillaris*. C. fol. biugis, ovatis, obliquis, glandula obtula inter infima: racemis axillar. pedunculat. legum. longo, tereti. *Syst. veg. ed. 14. Lin. suppl.*

*In Surinamo* h.

Frutex 12-ped. glaberr. Fol. alterna, petiol. Foliol. latere inferior. obliqua; inferiora exquisite ovata, superiora magis elongata. Stipul. nullæ. Racemi solitar. erecti, paucifl. Fl. medio-cr. aurantiaci. Legum. omnino C. *Fistula*.

3. *Absus*, C. fol. biugis, obovaris; glandulis 2. subulatis inter infima. *Syst. veg. ed. 14.*  
*Senna* &c. *Burm. Zeyl. tab. 97. Pluk. alm. tab. 60. f. 1.*

*In India, Ægypto* ☉.

*Planta pilosa*. Caul. tenuis, striatus. Racem. axill. paucifl. Petal. aureo-sanguin. Legum. planum, hispidum.

4. *viminea*, C. fol. biugis, ovat-oblong. acumin. glandula oblonga inter infima; spinis subpetiolaribus obsoletis, 3-dent. *Syst. veg. ed. 14.*

*In Jamaica* h.

Foliol. super. ma. Petiolus desinit in setam breviss. filiform. Sub petiolo squamæ 3-dent. Racem. axillar. laxi. Legum. brevia, compressa.

5. *Togera*, C. fol. triugis; glandula petiolari: stipul. cordat. acum. ciliat. *Syst. veg. ed. 14. Hort. Mal. 2. tab. 52?*

*In India* h.

Fruticul. procumb. etiam 4-ped. ramis filiform. Petiol. breviss. Fol. 4. semiorbicul. venosa, villosa, quorum 2. exter. ma. Stipul. cordatæ, seu cordat-lanceol. margine pilosæ. Legum. 7-pollic.

6. *Tora*, C. fol. triugis, obovat., exterioribus ma: glandula subulata inter inferiora. *Syst. veg. ed. 14. Mill. tab. 82. Dill. elth. tab. 63. f. 73.*

*b. C. humilis* &c. *Plum. sp. tab. 76. f. 2.*

*In India* ☉.

Caul. erectus, 2-3-ped. ramosus, minus lignosus, subscaber, a cicatricibus fol. nodosus. Rami patentiss. Foliol. mucrone molli, venosa, inferior. breviora, obtusiora. Stipul. linear. acumin. pilosæ. Glandulæ apice fuscae inter singula paria 2. inferiora; non vero inter extremum par sitæ. Fl. axillar. rariores, plerumq. gemini. Cor. lutea. Legum. teretia, sinuosa, reflexa, quandoq. angusta, erecta. Sem. irregular. acumin. sinuosa.

7, *bicapsularis*, C. fol. (plerumq.) triiugis, obovat. glabris; interioribus brevioribus, rotundior. glandula interiecta globosa. *Syst. veg. ed. 14. Mer. Sur. tab. 32. Plum. sp. tab. 76. f. 1.*

*In India* ☿.

Altitudo 2-orgial. Planta glaberr. Fl. axillar. spicati. Legum. 2-capsul. iuniora linear. seu teretia, & inflexa; adulta compressa, ad sem. torosa. Bract. ventricosæ, subimbric. Sem. subrotund. hilo prominente, & umbilico nigro.

8, *emarginata*, C. fol. triiugis, ovatis, rotundat. emarginatis, æqual. *Syst. veg. ed. 14. Sloan. Jam. hist. 2. tab. 180. f. 1. 2. 3. 4.*

*In Caribæis* ☿.

Caul. pl. 5-6-ped. apice ramosi, dilute fusci. Foliol. opposita, luteo-virid. odore ingrato. Fl. terminal. flavi, Legum. sesquiunc. & ultra, dilute fusca.

9, *obtusifolia*, C. fol. triiugis, ovatis, obtusiuscul. *Syst. veg. ed. 14. Mont. in Zann. tab. 47. Dill. elth. tab. 62. f. 72. Sloan. Jam. hist. 2. tab. 180. f. 5.?*

*Gallinaria* &c. *Rumph. 5. tab. 97. f. 2.*

*In Cuba* ☉.

Caul. pedat. & ultra, ramosus, asper. Fol. glauca, *Sennæ italicæ* simil. Odor gravis. Fl. parvi, nutantes, lutei.

10, *falcata*, C. fol. quadriiugis, ovat-lanceolat. retrofalcatis; glandula baseos petiolor, *Syst. veg. ed. 14.*

*In America* ☉.

Finnae gradatim sesquimaiores; unde extimæ maximæ,



11. *longifiliqua*. C. fol. quadriugis: foliol. extrimis lanceol. glandula subulata infra infima, interq. extima. Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.  
In America h.  
Caul. erectus, teretiuscul. obtuse fulcatus. Foliol. ovato-oblong. extima gradatim longiora, glaberr. subius dilutiora. Stipul. breves, linear. Legum. breve, 4-gon. hirtum.
12. *occidentalis*. C. fol. (inferioribus triugis: mediis 4-5-iugis; superior. 6-iugis) ovato-lanceol. margine scabris; exterior. ma: glandula baseos petiolor. Syst. veg. ed. 14.  
Senna &c. Comm. hort. 1. tab. 26.  
In Jamaica ☉.  
Caul. sesquiped. punctis vagis scaber, exaratus deorsum a singulo petiolo sulcis 2. Fol. foetida. Racem terminal. Fl. lutei, absque macula. Legum. erecta, angusta, compressa, 1-capsl. 2-valv. omnib. articulata. Sem. fusca, nitida. Glandula purpur.
13. *planifiliqua*. C. fol. quinqueiugis, ovato-lanc. (vel obtusis) glabris, venosis glandula baseos petiolor. Syst. veg. ed. 14. Lum. sp. tab. 77.  
In Amer. calidior.
14. *Fistula*. C. fol. quinqueiugis, ovato-acumin. glabris; petiol. eglandulat. Syst. veg. ed. 14. Black. tab. 381. Comm. hort. 1. tab. 110. Rumph. amb. 2. tab. 21.  
Conna. Hort. mal. 1. tab. 21.  
In India, Ægypto h.  
Planta orgyalis. Fol. impari-pinn. Foliol. basi æqual. Stipulæ vix manifestæ. Fl. racemi vix spitham. Cor. irregular. Petal. oblongo-rotund. subcisp. flava. Legum. longum, 2-spitham. teres, loculis transversis, ac parallelis; pulpa subdulci.
15. *atomaria*. C. fol. quinqueiugis, ovatis, subtomentos. petiolis teretibus, eglandulat. Syst. veg. ed. 14.  
In America h.  
Caul. orgyal. cinereus, ramosiss. Ramuli, & petiol. vix manifeste pubescent. Petiol. atomis subferrugin. adpersi, non canalicul. Foliol. infer. mi. obtusiora, subemargin. margine interiore baseos non minore. Stipul. subulata.



16. *pilosa*. C. fol. quinqueiugis, eglandulatis, stipul. fenicordatis, acumin. caul. stricto piloso. *Syst. veg. ed. 14.*

*In Jamaica*  $\bar{h}$ .

Caul. erectiuscul. fruticulos. ramis erectis, undiq. valde pilosis. Fol. glabra. Supul. ciliatæ. Pedunc. gemini, erecti, læves, 1-fl. Fl. pentandri. Legum. oblong. compressa.

17. *Senna*. C. fol. feiugis, subovatis, petiolar. eglandulatis. *Syst. veg. ed. 14. Berm. ind. tab. 53. f. 2.*

b. *Senna Alexandrina* &c. *Morif. hi. 3. f. 2. tab. 24. f. 2. var. seu sp. diversa fol. acutis.*

c. *Senna Italica* &c. *Dod. pempt. 361. var. seu sp. diversa fol. obtusis, crassioribus, & pingatioribus.*

*In Ægypto*  $\odot$ .

Caul. cubit. Stipul. patentes. Petioluli luteo-colorati, absque glandulis. Fl. lutei. Legum. ovali-oblong. falcata. Pinnul. subæqual.

18. *biflora*. C. fol. feiugis, oblongiuscul. glabris; inferioribus minor. glandula subulata inter infima; pedicellis bifloris. *Syst. veg. ed. 14. Plum. ic. 78. f. 1.*

*In America*  $\bar{h}$ .

Planta arborea, ramosa, glabra. Foliol. ovat-acumin. venis paralell. Racemi axill. Fl. gemini, grandes. Petal. lutea. Legum. plana, quasi articulata, glabra. Sem. ovata, obliqua, reniform.

19. *ruscifolia*. C. fol. feiugis: foliol. lanceol. acut. glabris: glandula supra basin costæ: fl. racemosis. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. misc. V. 3.*

*Habitat* . . . . .

20. *hirsuta*. C. fol. feiugis, late ovat. acuminat. lanatis. *Syst. veg. ed. 14.*

*In America* .

Odor *Apii* virosus. Fol. ampliora. Legum. oblong.

21. *multiglandulosa*. C. fol. feiugis, subtus, & ad oras villosis, obtusis: glandula inter omnia foliolor. paria. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. misc. V. 3.*

*Habitat* . . . . .

22. *tomentosa*. C. fol. 6-8-iugis: foliol. linear. basi oblique rotundat. supra hirtis: panicul. axillaribus: legumin. villosis. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*

*In Amer. meridien.*  $\bar{h}$ .

Arb. ramis flexuosis, villosis. Fol. petiol. Foliol. integerr. subtus alba, seu lutea, tomentosi. Petiol. tomentosi. Stipul. semilunar. tomentosæ, deciduæ. Panic. axill. in apice caulis, solitar. Fl. magnitudine mediocri, lutei. Legum. recta, compressa.

13. *Serpens*. C. fol. septemiugis: fl. pentandris: caulibus prostratis, herbaceis, filiform. *Syst. veg. ed. 14. In Jamaica* ☉.

Caul. glabri, raro ad basin ramosi. Foliol. oblong. angustata, striata. Stipul. subulatæ. Pedunc. axill. solitar. horizontal. nudi. Legum. erecta, rhombico-oblong. ad angulum rectum cum pedunc. posita.

24. *ligustrina*. C. fol. subseptemiugis, foliol. lanceol. extimis minoribus: glandula baseos petiolor. *Syst. veg. ed. 14. Dill. elth. tab. 259. f. 338. Mart. cent. tab. 20.*

*In Virginia, Bahama* ☿.

Altitudo humana. Planta tota ramosa. Foliol. quandoq. 6-8-iuga, supra glabra, subtus, & margine pilosa. Fl. terminal. primum congesti, dein laxè dispositi, lutei. Legum. primum tenuia, & incurva, dein rectiora, plana, & compressa. *Fol. & fl. odore subfætido.*

25. *alata*. C. fol. suboctoiugis, foliol. ovali-oblong: inferior. minoribus; petiolis eglandulat. Stipul. patulis. *Syst. veg. ed. 14.*

*Faba dulcis. Merian. surin. tab. 58.*

*Herpetica. Rumph. amb. 7. tab. 18.*

*In Amer. calidiore* ☿.

Caul. 11-ped. crassus, herbaceus tamen lævis, inferne cinereus. Fol. magna. Foliol. 16-20. obtusa, breviter petiol. glabra, flavescent. nitida. Petiol. flavescent. valde canalicul. ut fere marginati. Stipul. 2. femicord. Glandul. fol. nullæ, sed setæ breviss. 2. distantes.

26. *marilandica*. C. fol. suboctoiugis, ovat-oblong: æqualibus: glandula baseos petiolor. *Syst. veg. ed. 14. Dill. elth. tab. 260. f. 339. Mart. cent. tab. 21.*

*In Virginia, Marilandia* ☿.

Caul. pl. 3-cubit. & ultra, striati, glabri, ramis oblique surrectis. Fol. sicuti & caulis, adpersa pilis raris, supra sature-glaucovirent. subtus albo-glaucoscent. Fl. e folior. summis alis,

primum penduli; dein suberecti. Cal. reflexus, luteus. Cor. sulphur. Legum. hirsutum.

27. *tenuissima*. C. fol. novemiugis; foliol. oblong. glandula subulata inter infimā; Syst. veg. ed. 14.

In Havana h.

Legum. tenuissimā.

28. *sophora*. C. fol. decemiugis; foliol. lanceol. glandula bifida oblong. Syst. veg. ed. 14. Mont. in Zenn. tab. 155.

Senna &c. Burm. Zeyl. tab. 98.

Gallinaria &c. Rumph. amb. 5. tab. 97. f. 1.

Ponnain-Tongerā: Hort. mal. 2. tab. 52.

In India umbrosis h.

Planta odore jæido. Foliol. breviter petiol. glabra, margine subciliato; infimā min. Racem. axill. parvi. Cor. albido-flavesce. venis fuscis. Legum. teres, æquale, lateribus convexis.

29. *bracteata*. C. fol. decemiugis; foliol. oblong. obrutis, eglandulat. racemis elongat. bracteis ovatis, tumidis, imbricatis; legum. 4-angul. compresso. Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.

In Surinamo:

Fol. plusquam pedal. Foliol. palmaria, subtus mollia, cana; petioli compressi. Racemus maximus, ex fl. dense congestis. Bract. magnæ, ante explicationem fl. caducæ. Petal. lutea.

30. *auriculata*. C. fol. duodecim-jugis; obtusis; mucronatis; glandulis pl. subulatis; stipul. reniform. barbatis. Syst. veg. ed. 14.

Senna &c. Pluk. alm. tab. 314. f. 4.

In India:

Foliol. petiol. setula terminata, glabra. Stipul. latæ, amplexicaul. Corymb. 3-4-5-fl. Petal. fulva, seu carneo-crocea.

31. *javanica*. C. fol. duodecim-jugis; foliol. oblong. obtusis, glabris; glandula nulla. Syst. veg. ed. 14. Comm. horts 1. tab. 111.

In Indiis:

Fol. maximā, utrimq. holosericea. Petal. carneā. Legum. 2-pedal. crassitie brachii tenuioris.

32. *grandis*. C. fol. vigintiugis; foliol. subholoseric. eglandulat. Syst. veg. ed. 14. Linn. Suppl.

Arbor &c. Breyn. cent. tab. 14.

In Surinamo h.

Arbor robusta, ramis subtilissime holoseric. For.



liol. oblong. obtusa, æqualis latitudinis. Legum. sesquiped. 3. digitos lata, acumin. compressiusc.

\*\* *Chamæcristæ foliol. numerosis.*

33. *Chamæcrista*. C. fol. multiugis; glandula petiolari pedicellata: stipul. ensiformibus. *Syst. veg. ed. 14. Comm. hort. 1. tab. 37.*  
*In Jamaica, Barbados, Virginia* ☉.  
 Caul. 1-2-ped. pilis breviss. pubescens. Fol. alterna. Foliol. sessil. opposita. Pedicellus spatio supra petiolum egrediens. Fl. axill. solitar. parvi, lutei. Petal. 2. super. macula purpur. Anth. rubræ.
34. *glandulosa*. C. fol. multiugis: foliol. multiglandulat. stipul. subulat. *Syst. veg. ed. 14.*  
*Chamæcrista* &c. *Breyn. cent. tab. 24.*  
*In Jamaica.*  
 Caul. suffruticosi, ramis nudiuscul. Foliol. lanceol. petiolo, inter singula paria, glandula pedicellata notato. Pedunc. axill. gemini, 1-fl. Fl. parvi, hexandri, anth. 2. longiss. Petal. lutea. Legum. angusta, compressa, nigra.
35. *Mimoides*. C. fol. multiugis; foliol. linear. glandula baseos petioli obsoleta: stipul. setaceis. *Syst. veg. ed. 14.*  
*In Zeylona.*  
 Caul. 2-ped. erectus, simpl. Stipul. lanceol. seta terminatæ. Pedunc. axill. 2-1-fl. Cor. lutea, patula. Legum. linear.
36. *flexuosa*. C. fol. multiugis: stipul. dimidiat-cordat. *Syst. veg. ed. 14.*  
*Chamæcrista* &c. *Breyn. cent. tab. 23.*  
*In Brasilia* ☉.  
 Caul. flexuosi, 4-gon. rubent. Fol. alterna, palmat. Foliol. parva, opposita, trinervia. Fl. parvi, axillar. solitar. Petal. rubra. Legum. angusta, nigra.
37. *nichtitans*. C. fol. multiugis: caul. erectiusculo: fl. pentandris. *Syst. veg. ed. 14. Hort. Cliff. tab. 36.*  
*Senna* &c. *Pluk. alm. tab. 314. f. 3. phyt. tab. 314. f. 5.*  
*Ancœna* &c. *Rumph. 6. tab. 61. f. 1.*  
*In Virginia* ☉.  
 Caul. 2-ped. & ultra, lignosus, ramosus. Pinnæ 12-14-iugæ, linear. Stipul. acuta. Glandula



- petioli pedicellata, & fusca. Pedunc. sæpius 3-part. 3-fl. spatio supra alas enati. Fl. parvi. Petal. super. clausa; infimum quadruplo maius, lutea. Legum. tenuiss. plana, fusco-nigricant.
38. *procumbens*. C. fol. multiugis; foliol. eglandulat. caul. procumb. *Syst. veg. ed. 14. Comm. petrop. tab. II. In Indiis, Virginie apricis siccis* ☉. Caul. herbaceus. Fl. parvi. Legum. angustum, planum.
- 
- Apoucouita*. C. arborescens; fol. amplis, 2-3-ugis. *Aubl. Guian. tab. 146. In Caribæis* h. Arb. 8-ped. superne ramosa, ramis sparsis. Fol. alterna, pinnata. Foliol. super. mai. sessil. ovat-oblon. acumin. integerr. glabra, costa subalata. Stipul. 2. ad basin costæ foliosæ. Fl. axill. corymbosi. Petal. flava, venis rubris variegata.
- Marimari*. C. fol. quinquieugis; foliol. ovat-cumin. pedunc. 2-fl. legum. compressis, transversim sulcatis. *Aubl. Guian. Plum. am. tab. 78. In Caribæis*.
- lanceolata*. C. fol. quinquieugis; foliol. lanceolat. æqualibus. *Forsk. Æg. In Arabia*. *Differt a C. Ligustrina, quod fol. non 7-iuga, & extimo ma. inferioribus*. Foliol. pollic. breviter petiol. Pedunc. racem. terminal. longi, pallide flavi. Legum. linear. incurva, compressa, villosa.
- sunsub*. C. fol. triugis; foliol. obovat. ciliatis, exterior. ma. *Forsk. Æg. In Arabia*. *Differt a C. Thora fol. multo ma: infima sunt pollic. super. sesquipollic.*
- Afchrek*. C. *Forsk. Æg. In Arabia*. Fol. 4-5-iuga. Foliol. ovat-oblon. obtusa cum acumine, glabra. Legum. plana.
- surattensis*. C. fol. octo-iugis: foliol. ovat-oblon. obtusis, emarginat. inferior. minoribus: glandula ad basin binorum fol. pedicellata. *Burm. Ind. Senna surattensis. Garzin in herbar. Habitat* . . . . . Caul. herbac. Stipul. 2. ad petiol. exortum, lineari-lanceol. Fol. magnitudine inter C. Sen-

nam, & Thoram. Pedunc. axillar. bracteis  
cordat-acumin. Pedicel. 1-fl. Cor. magna, au-  
rantiaca.

621. POIN- Cal. 5-phyll. Petal. 5. summo ma. Stam. longa;  
CIANA. omnia foecunda. Legum.

1. *biuga*. P. aculeis solitar. foliol. emarginatis. *Syst. veg.*  
*ed. 14. Mont. in Zann. tab. 141.*

Crista pavonis. *Rump. amb. 4. tab. 20.*

*In Indiis h.*

Arb. quandoq. 20-ped. cortice nigricante. Aculei  
axill. subulati. Fol. biuga. Foliol. plus, mi-  
nus obcordata, saepe difformia. Pedunc. mul-  
tist. Fl. flavi, inodori, sequenti min.

2. *pulcherrima*. P. aculeis geminis. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. amers*  
*ed. 2. picta tab. 120.*

Frutex &c. *Breyn. cent. tab. 22.*

Flos pavonis. *Mer. Sirin. tab. 45?*

Tsietti mandaru. *Hort. mal. 6. tab. 1.*

*In Indiis h.*

Frutex sub-10-ped. aculeatus in senectute. Fols  
2-pinnae spitham. purpur. Foliol. 8-10-12-14  
opposita, sessil. obverse ovata. Petiol. comm.  
glandula una ad basin, & alia ad supremum  
par: partial. supra basin mucronibus duobus.  
Fl. speciosi, e croceo, & coccin. variegati,  
vel tantum crocei, odore nauseoso, per alios  
suavi, racemosi, sub 50. Legum. Pisiform. ex  
purpureo-castan. sature col.

*Tinctura est camenagoga ex herb. manip. 3. &*  
*sem. 20. Dosis unc. una.*

3. *elata*. P. caul. inermi. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. amers*  
*tab. 175. f. 36. ed. picta tab. 260. f. 33.*

Siliqua &c. *Breyn. cent. f. 5.*

*In Curacao, Carthagenæ h.*

Arb. inermis fol. 2-pinn. Foliol. sub 15. sextuplo  
min. priorib. magis oblonga, non emarginata,  
utrimq. glabra. Corymb. brevior. Fl. magni. Cal.  
coriaceus, 5-fid. Cor. flava. Filam. basi villosa,  
atro-purpur. Anth. flavæ. Germ. tomentosum.

622. MYRO- Cal. campanulat. Petal. 5. summo ma. Germ.  
XYLON. cor. longius. Legum. 1-sperm.

1. *peruifetum*. M. *Syst. veg. ed. 14. Lin Suppl. Herm. Mexic.*  
*p. 51. cum fig. satis bona.*

*In calidiss. Provinc. terræ firmæ Am. merid. h.*

Arb. pulcherrima, valde resinosa. Fol. alterna,

abrupte pinn. Foliol. 2-iuga, subopposita, petiolat. ovat-lanc. apice producto, obtuso, emarginato; integra, venosa, glaberr. costa subtus elevata, pubesc. Petiol. comm. teres, pubescens. Racemi axill. erecti, secundi, fl. sparsis, bracteati. Cal. viridi-canescens. Legum. viride. Folior. substantia plena punctis linearibus, translucentibus, resinosis, ut fol. Citri.

*Ex hac arbore eruitur Balsamum peruanum.*

623. CÆSAL. Cal. 5-fid. lacin. infima ma. Petal. 5. infimo PINIA. pulchriore. Legum.

1. *vesicaria*. C. caul. aculeato: foliol. obcordat. subrotund. Syst. veg. ed. 14.

Senna &c. Sloan. Jam. hist. 2. tab. 181. f. 2. 3. *bona*.

*In Jamaica* h.

Arb. 15-ped. caudice parum incurvo, cortice albicante. Rami curvi, aculeati. Fol. decomposita, inæqual. alata. Foliola distantia, semiuncial. sature virid. Fl. terminal. spicati. Cor. sature flava. Legum. unc. longa, plana, nigra.

2. *sappan*. C. caul. aculeato; foliol. oblong. inæquilateralibus, emarginatis. Syst. veg. ed. 14. Rumph. amb. 4. tab. 21.

Tiam-pangam. Hort. mal. 6. tab. 2.

*In Indiis* h.

Arb. Fol. alterna, duplicato-abrupte-pinn. Acul. sparsi, breves, recurvi. Foliol. adproximata, obtusa. Cor. lutea.

3. *Crista*. C. caul. arboreo; foliol. subovat. integris: fl. pentandris. Syst. veg. ed. 14. Plum. gen. tab. 68.

*In Jamaica, & Japonia* h.

Arb. orgyal. spinis multis, brevibus. Rami purpur. Fol. duplicato-pinn. Foliol. utrimq. 4. venosa, subsessil. obtusiss. unguicul. æquilatera. Fl. spicati, terminal. cernui, albid. Legum. acuminat. planum, glabrum, polysperm.

624. GUILAN. Cal. 1-phyll. hypocraterifor. Petal. calyc. collo DINA. inserta, subæqual. Legum.

1. *Bonduc*. G. aculeata; pinnis ovatis; foliol. aculeis solitar. Syst. veg. ed. 14. Mont. in Zann. tab. 35.

Acacia &c. Pluk. alm. tab. 2. f. 2.

Frutex &c. Rumph. amb. 5. tab. 48.

*In Indiis* h.



Rami lignosi, solidi, glabri. Fol. duplicato-pinn.  
Foliol. ovata, absque acumine seraceo, glabra,  
in singulo petiol. 3-iuga, remota. Racemi  
laxi. Cor. flava. Legum. ampla, compressa,  
breviter aculeata. Sem. dura, ciner.

2. *Bonduccella*. G. aculeata; pinnis oblong-ovat. foliol. aculeis  
geminis. *Syst. veg. ed. 14.*

Crista pavonis &c. *Breyn. Prod. 3. app. tab. 28.*

Globuli. *Rumph. amb. 5. tab. 4). f. 1.*

Caretti. *Hort. mal. 2. tab. 22.*

*Glycirrhiza aculeata. Forsk. Æg. Vahl.*

*In Indiis* h.

Rami subvillosi, medulla fungosa. Fol. duplica-  
to-pinn. Foliol. ovalia, seta terminata. Fl.  
racemosi. Cal. tomentosus. Cor. parva, lutea.  
Legum. lata, echinata. Sem. cinerea.

3. *Nuga*. G. caul. inermi; fol. petiolo primario subtus  
aculeis geminis. *Syst. veg. ed. 14. Rumph. amb.*  
*5. tab. 50.*

*In Amboina* h.

Frutex. Fol. 2-pinn. Foliol. opposita, breviter  
petiol. ovat-acumin. Fl. racemosi, lutei. Le-  
gum. breve, planum, latum, ex fusco-nigri-  
cans, læve, incurvum.

4. *Moringa*. G. inerm. fol. subbipinnat. foliol. inferioribus  
ternatis. *Syst. veg. ed. 14. Burm. Zeyl. tab. 75.*  
*Morungu. Hort. mal. 6. tab. 11. Rumph. amb.*  
*1. tab. 74. 75.*

*Balanus. Black. tab. 386.*

*In America, Zeylona, Ægypto* h.

Arb. 5. homines alta, ramosa, cortice nigricante,  
Fol. triplicat-pinn. Foliol. obverse-ovat. inte-  
gerr. non crassa, nuda, virid. Petal. lanceol.  
basi angusta, reflexa, alba. Legum. longum,  
triquetrum, 3-valv. læve. Sem. remota, al-  
terna, triquetra.

5. *dioica*. G. inermis; fol. 2-pinnat. basi, apiceq. simplici-  
ter pinnatis. *Syst. eg. ed. 14.*

*Bonduc &c. Duham. arb. 1. tab. 103.*

*In Canada* h.

Fol. alterna, breviter petiol. ovata.

625. *GUIA-* Cal. 5-fid. inæqual. Petal. 5. calyc. inserta. Caps.  
*CUM.* angulata, 3-5 locul.

1. *officinale*. G. foliol. biugis, obtusis. *Syst. veg. ed. 14. Pluk.*  
*alm. 180. tab. 35. f. 4.*



*Pruno* &c. *Sloan. Jam. Hist.* 2. tab. 222. f. 3.  
4. 5. 6.

*Arbor* &c. *Seb. thes.* 1. tab. 53. f. 2. *Black.*  
tab. 350. n. 1. 2.

*b. G. jamaicense* &c. *Pluk. alm. tab.* 35. f. 3.

*In Hispaniola, Jamaica* h.

*Arb. Fol. Pruni folior. minusculorum æmula,*  
*pinnata, longe petiol. crassa, glabra, pulchre*  
*virid. validis nervulis, & pallidis ornata. Pe-*  
*dunc. pl. axillar. Petal. alba, vel cœrulea.*  
*Capf. exigua, 3-gona.*

2. *sanctum.* *G. foliol. multiugis, obtusis. Syst. veg. ed.* 14.  
*Comm. hort.* 1. tab. 88.

*Jasminum* &c. *Pluk. alm. tab.* 94. f. 4.

*Lignum* &c. *Black. tab.* 350. f. 3. 4.

*In Amer. Insula s. Joannis de Porto Ricco* h.

*Frutex 2-ped. undiq. ramosus. Fol. pinnata,*  
*plerumq. 4-iuga. Foliol. opposita, rigida, ni-*  
*tentia, supra atro-virid. Cor. fimbriata, cœrul.*

3. *asfrum.* *G. foliol. multiugis, acutis. Syst. veg. ed.* 14.  
*Acacia* &c. *Walth. hort.* 2. tab. 2.

*In Æthiopia, China* h.

*Arb. ramis rigidis. Fol. alterna, pinn. 8-iuga.*  
*Petiol. comm. articul. membranac. canalicu-*  
*latus. Foliol. opposita, ovat-oblong. mucro-*  
*nata, integerr. glabra, rigidula, perennia,*  
*basi interiore lævissime abbreviata. Stipul. ra-*  
*mis adpressæ, subulatæ, minimæ. Fl. cocci-*  
*nei.*

626. CYNO- *Cal. 4-phyll. Anth. apice 2-fid. Legum. carno-*  
METRA. *sum, lunatum, 1-sperm. Fol. geminata.*

1. *cauliflora.* *C. trunco florifero. Syst. veg. ed.* 14.

*Cynomorium. Rumph. amb.* 1. tab. 62.

*In India* h.

*Arb. magnitudine Mali Limoniæ; trunco contor-*  
*to, nodoso, cortice nigricante. Fol. gemina-*  
*ta, breviter petiol. 5-6-pollic. sesquipollic. la-*  
*ta, elliptica, firma, glabra, pallide virent.*  
*Petal. externa reflexa, rubentia; cætera 5.*  
*erecta. Legum. 3. pollic. longum.*

2. *ramiflora.* *C. ramis floriferis. Syst. veg. ed.* 14.

*Cynomorium* &c. *Rumph. amb.* 1. tab. 63.

*Iripa. Hort. mal.* 4. tab. 31.

*In India* u.

*Arb. 60-ped. caudice nigricante, intus rubicun-*

do. Fol. geminata, alterna, breviter petiol. oblong-rotund. densa, glabra, supra atro-virent. subtus dilutiora, nervosa. Fl. exigui, candidi, apicibus rubicund. Fruct. oblong. rotundus, compressus, inæqualis.

627. CODON. Cal. 10-part. Cor. campanulata, 10-fida. Caps. polysperm.

1. *Royenii*, C. Syst. veg. ed. 14.

Habitat . . .

Caul. herbaceus, cubit. firmus, teres, ramis adfurgent. Fol. alterna, petiol. cordat-ovat. acumin. subrepanda, indivisa, subcoriac. glabra, supra avenia. Fl. supra-axillar. solitar. peduncul. facie cor. *Atropæ Belladonnæ*, albidis, extus notati striis 10. purpurascens. *Herba tota adspersa striis*.

628. DICTAMNUS. Cal. 5-phyll. Cor. 5-petal, subpapilionac. uno petalo descendente. Filam. 7-10. deorsum inclinata, punctis glandulosis adspersa. Caps. 5. margine interiore coalitæ, superne dehiscentes, cornutæ, polysperm. Sem. nitida, calyptra involuta.

1. *albus*, D. fol. pinnat. caul. simplici. Syst. veg. ed. 14. Jacq. Austr. 5. tab. 428. Black. tab. 75. Ludw. ed. tab. 10.

Fraxinella. Riv. pempt. irreg. tab. 132.

Dictamnno bianco. Mauth.

In Germania, Gallia, Italia, collibus, & pascuis alpinis 24.

Odor naturalis *Rutæ communis*.

Caul. cubit. erectus, ramis angulosis, adscendent.

Fol. alterna, plerumq. impari-pinn. Foliol. sub 5-iug. impari ma. subcordato, ovat-lanceol. dura, viscida, leviter ferrata, nitida, supra atro-virent. subtus dilutiora. Fl. terminal. racemosi: pedunc. & calyc. viscidis, subpurpur. Peral. magna, patentiss. ex albo-purpurasc. odore Hirci. Caps. asperæ, pallide fuscæ, oblong. apice truncato, compressæ.

2. *capensis*. D. fol. simplicibus: caul. ramoso. Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.

Ad cap. b. Spei 24.

Simil. priori. Fol. alterna. Racemus ut in priore.

629. RUTA. Cal. 4-fid. Petala concava. Receptac. punctis melliferis 10. cinctum, Caps. subrotunda, 4-

locul. Fl. corymbosi, & corymbi flos medius unam partem numeri in fructificat. addit; & stamina 10. gerit.

1. *graveolens*, R. fol. decompositis; fl. lateralibus, 4-fid. *Syst. veg. ed. 14. Black. tab. 7. Ludw. ed. tab. 1. Moris. hist. 3. f. 5. tab. 14. f. 3. Duham. ic. 61.*

*In Europæ &c. sterilibus 24.*

Caul. fruticosus, cubit. & ultra. Foliol. subcartosa, punctata, glabra, glauca. Fl. corymbosi. Flos primarius 5-fid. reliqui 4-fid. Paniculæ rami primi 2-part., reliqui fl. alterni. Petal. e luteo-virid. *Odor vehemens.*

2. *chalepensis*, R. fol. supradecompositis: petal. ciliatis. *Syst. veg. ed. 14. Moris. hist. 3. f. 5. tab. 35. f. 8.*

*In Arabia h.*

*Simil. priori.* Primi fl. 5-fidi; reliqui 4-fid. Caulis altior. Petal. margine ciliata, Capsulæ lobi acuti, quandoq. obtusi.

3. *pinnata*, R. fol. pinnatis, 3-iugis: foliol. lanceol. impari serrato: petal. planis, subcrenulat. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*

*In rupibus circa Puerto de la Oratova.*

Fol. impar subovatum.

4. *patavina*, R. fol. ternatis, sessilibus. *Syst. veg. ed. 14. Pseudo-ruta &c. Mich. gen. tab. 19.*

*Habitat prope Patavium.*

Petal. plana, integra, lutea.

5. *linifolia*, R. fol. lanceol. indivisis. *Syst. veg. ed. 14. Bocc. mus. 2. tab. 73. Barr. ic. 1186.*

*b. Ruta &c. Buxb. cent. 2. tab. 28. f. 1. 2.*

*In Hispania, & Media 24.*

Fol. alterna, sessil. Paniculæ rami laterales 2-fid. 3-fl. fl. intermedio sessili. Petal. 5. sessil. ovata, integra. Filam. basi pilosa, arcta includunt receptaculum poris melliferis pertusum. Pericarp. punctis elevatis.

- tuberculata*, R. fol. lineari-lanceol. margine involutis: caulibus, fol. subtus, capsulisq. tuberculat. *Forsk. Æg.*

*In Ægypto 24.*

*Odor R. vulgaris.* Caul. diffusi, surgentes, ped. Fol. pollic. alterna, sessil. plana, pilosa, virid. vel rubra. Pedunc. terminal. dichotom.



- legitima*. Petal. concava, undulata, flava. Caps. 5. locul.  
 R. foliol. linear. acutis: petalis erectis, adunco-  
 rostratis, imberbibus: stipulis 3--fid. aristat.  
*Alt. Fl. Ped.*  
 R. *montana*. *Clus. in app. ult.*  
*In locis sterilibus Pedemontii &c. 24.*  
 Hortensi minor, simili odore, & col. glauco.  
 Foliola linearia, concava, acuta, non ovata,  
 non elliptica, nec emarginata. Stipul. in pe-  
 dunculis non cordatæ, sed profunde 3--fidæ.  
 Petal. non patentia, sed erecta, apice concava,  
 & veluti rostrata; non lutea, sed viridia,  
 margine albicante, non ciliato. Pedunc. non  
 divaricati, sed approximati. Flos, & fruct.  
 dimidio min.
630. TOLU- Cal. campanulat. 5-dent. Petal. 5. infimo maxi-  
 IFERA. mo, obcordato. Styl. nullus.  
 1. *Balsamum*. T. *Syst. veg. ed. 14.*  
*Prope Carthagenam h.*  
 Arb. mediocris magnitud. Fol. *Ceratiæ* similia.
631. HÆMA- Cal. 5-part. Petal. 5. Caps. lanceol. 1-locul. 2-  
 TOXYLUM. valv. valvul. navicular.  
*campechianum*. H. *Syst. veg. ed. 14.*  
*In Campeche Americ. h.*  
 Arb. sub-12-ped. tota spinis brevibus armata.  
 Foliol. parva, biuga, sine impari. Racem.  
 terminal. oblongi, densi. Petal. flava, odora.  
 Caps. fordide albescens.
632. PROSO- Cal. hemisphæric. 4-dent. Stigm. simplex. Le-  
 PIS. gum. inflatum, polysperm.  
 1. *spicigera*. P. *Syst. veg. ed. 14.* *Burm. Ind. tab. 25. f. 3.*  
*In India h.*  
 Arb. Fol. alterna, coniugat: foliol. pinnat. 8-iug.  
 sine impari, *Tamarindi* similibus; pinnis ob-  
 long. obtusis. Spic. terminal. & axillar. longæ,  
 angustæ. Fl. parvi.
633. CHAL- Cal. 5-part. Cor. campanul. petalis unguiculat.  
 CAS. Stigm. capitato-verrucolum.  
 1. *paniculata*. C. *Syst. veg. ed. 14.*  
*Camonium. Rumph. amb. 5. tab. 17.*  
*In India h.*  
 Frutex lævis, Fol. alterna, petiol. subovat. ob-  
 solete crenata. Fl. terminal. subpaniculati,  
 albi, odori. Bacca oblong. Sem. 2. tomentosa.  
*Colitur in hortis Indiæ ob fl. fragrantiss.*



634. MUR- Cal. 5-part. Cor. campanulata; Nectario germen  
 RAYA. cingente. Bacca 1-sperm.  
 1. *exotica*. M. *Syst. veg. ed. 14. Pluk. phyt. tab. 80. f. 6.*  
*In India orient. h.*  
*Diversiff. a Chalca paniculata*. Arb. inter minor.  
 cortice albicante, facie *Schini*. Fol. alterna,  
 petiol. impari-pinn. Foliol. 7. alterna, petio-  
 loluta, obovata, obtusiusc. rigidula, glabra.
635. ADENAN- Cal. 5-dentat. Petal. 5. Anth. apice exteriore  
 THERA. glandulæ globosæ adfixæ. Legum. membranac.  
 1. *pavonina*. A. fol. utrimq. glabris. *Syst. veg. ed. 14.*  
*Coralaria &c. Rumph. amb. 3. tab. 109.*  
*Mandfiadi. Hort. mal. 6. tab. 14.*  
*In India h.*  
 Arb. Fol. vassiff. duplicat-pinn. Foliol. magnitu-  
 dine extimi articuli pollic. alterna, vel oppo-  
 sita, breviter petiol. ovata, obtusa, integerr.  
 Panicul. e racemis crassis. Fl. respectu arboris  
 parvi. Petal. flava.
2. *falcata*. A. fol. subtus tomentosus. *Syst. veg. ed. 14.*  
*Clypearia alba. Rumph. amb. 3. tab. 111.*  
*In India h.*  
 Arb. lata, cortice albicante, coma umbellata.  
 Fol. 12-18-iuga, *Tamarindi* min. angustiora,  
 supra sature virid. Fl. lateral. pusilli, flave-  
 scent. Legum. ultra 4. pollic. longa, vix unum  
 lata, tenuissima, plana. Sem. nigricantia.
636. TRICHI- Cal. sub 5-dent. Petal. 5. Nectar. cylindric. ore  
 LIA. anth. gerens. Caps. 3-locul. 3-valv. Sem. bac-  
 cata.
1. *hirta*. T. fol. pinnat. subhirsutis. *Syst. veg. ed. 14.*  
*Evonymus &c. Sloan. Jam. Hist. 2. tab. 210.*  
*f. 2. 3.*  
*In Jamaica h.*  
 Arbusc. usque 10-ped. parum ramosa. Fol. in  
 apice ramorum, alterna, pedat. glabra, aut  
 subhirsuta. Foliol. sub 10-iuga, impari quan-  
 doq. deficiente, 2-pollic. lanceol-ovat. obtuse  
 acumin. petiol. integerr. intermediis gradatim  
 maioribus. Racem. axill. Fl. parvi, sub 30.  
 Petal. patent. albicant. Caps. subfusca.
2. *glabra*. T. fol. pinnat. glabris; foliol. extimis ma. *Syst.*  
*veg. ed. 14. Jacq. amer. tab. 175. f. 28. ed.*  
*pic. tab. 260. fig. 35. quoad folium.*  
*Ad Havanam in sylvis montosis h.*  
*Tom. III.*

Arb. comosa, odore fœtido. Fol. multa, alterna, costa alata. Foliol. 2-3-iuga, obovata, obtusa, integerr. nitida. Racem. axill. breves. Caps. globosæ, virentes.

3. *trifoliata*. T. fol. ternariis. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. amer. tab. 82. ed. picta tab. 123.*

*In Amer. merition. h.*

Arb. 15-ped. cortice leucophæo, fusco. Fol. multa, alterna, nitida. Foliol. sessil. obovat. obtusa, integerr. impari longiore. Racem. axillar. breves, sub 6-fl. Fl. parvi. Petal. alba. Caps. viridi-leucophæa.

*terminalis*. T. racem. terminalibus. *Jacq. amer. p. 130. In Jamaica h.*

Arb. 20-ped. Rami numerosi, diffusi, ad terram fere reclinati. Fol. impari-pinn. 9-pollic. numerosa, alterni, nitidiss. foliol. utrimq. 3-6-pollic. petiol. lanceol. obtusa, integerr. Racemi pl. terminal. paniculati. Fl. numerosi, simul. floribus *Melæ*, subfœtidi.

637. *TURRÆA*. Cal. 5-dent. Petal. 5. Nectar. cylindric. ore anth. gerens. Caps. 5-cocc. Sem. bina.

1. *virens*. T. *Syst. veg. ed. 14.*

*In India orient. h.*

Arb. sature virens, facie *Quisqualis*. Fol. alterna, breviter petiol. elliptico-lanceol. integerr. emarginata, lævia, subtus pallidiora. Ramuli 4-gon. compressi. Stipul. geminæ, linear. Fl. axillar. flavi, congesti in spicam minimam, foliol. aliquot parvis interstincti. Petal. lanceol. obtusa.

638. *SWIETEA*. Cal. 5-fid. Petal. 5. Nectar. cylindric. ore antheras gerens. Caps. lignosa, 5-ocular. basi dehiscens. Sem. imbricata, alata.

1. *Mahagoni*. S. *Syst. veg. ed. 14.*

Arbor &c. *Catesb. car. 2. tab. 81.*

*In Amer. merition. h.*

*Proxima Cedrelæ foliol. impari ma. at Cedrelæ foliol. alterno latere angustiora.* Arb. procera, ramosiss. coma ampla, nitida. Fol. alterna, abrupte-pinn. 8-pollic. reclinata, nitida. Foliol. 3-5-iug. sesquipollic. opposita, petiol. falcato-lanceol. acumin. retrorsum inflexa, integerr. Pedunc. axill. 2-pollic. sub 8-fl. Fl. parvi, albi. Caps. ferrugin.

639. EKEBER- Cal. 4-part. Petal. 4. Nectar. fertiform. cingens  
GIA. germen. Bacca 5-sperm. Sem. oblong.

1. *capensis*, E. *Syst. veg. ed. 14. Thumb. Diff. nov. pl. gen.*  
*Sparman. Act. Stock. 1779. tab. 9.*

*Habitat . . .*

*Ad Trichilia genus spectas, monente Vahl.*

640. MELIA, Cal. 5-dent. Petal. 5. Nectar cylindric. multi-  
dentat. ore anth. gerens cor. Drupa nucleo  
5-locul.

1. *Azedarach*, M. fol. impari-2-pinnat, *Syst. veg. ed. 14. Dod.*  
*pempt. 848.*

*Pseudo-Sycomorus Cam. epit. 181.*

*b. M. semper virens.*

*Azadirachta &c. Comm. hort. 1. tab. 76.*

*In Syria, b. In Zeylona h.*

Arb. procera. Fol. Fraxiniform. alterna, petiol.  
Foliol. petiol. integra. Fl. axillar. racemosi,  
longe peduncul. parvi, purpur.

*b. Semper virens, & semper florens, quæ sp. di-*  
*versa videtur.*

2. *Azadirach-* A. fol. pinnatis. *Syst. veg. ed. 14.*

*ta. Azedarach. Burm. Zeyl. tab. 15.*

*Azadirachta. Breyn. ic. tab. 15.*

*Olea &c. Pluk. alm. tab. 147. f. 1.*

*Aria Bepou. Hort. mal. 4. tab. 52.*

*In India h.*

Arb. procera, cortice nigricante. Fol. alterna,  
Foliol. sub. 15. dimidiato-cordat. retrorsum  
falcata, latere posteriore angustiss. acumin. ser-  
rata. Racemi ex summis alis, erecti, com-  
positi. Fl. exigui, candidi.

*Katjape, M. fol. ternis. Burm. Fl. Ind.*

*In Java h.*

*Arbuse. Barbadosensis, amplexic. 3-phyll. Pluk.*  
*phyt. tab. 145. f. 4. quæ differt petiol. alatis.*

*Habet stigm. 5.*

641. ZYGO- Cal. 5-phyll. Petal. 5. Nect. 10-phyll, germens  
PHYLLUM. tegens. Caps. 5-locul. *Datur sp. quæ  $\frac{1}{3}$  par-*  
*tem num. excludit.*

1. *simplex*. Z. fol. simplic. sessil, cylindricis, *Syst. veg. ed.*  
*14.*

*Z. portulacoides. Forsk. Æg. ic. tab. 12.*

*In Arabia.*

Planta tenera, succulenta. Caul. herbac. pollic,  
C. ij



- dichotom. divaricat. Fol. opposita, subsess. linear. patentiss. Fl. flavi.
2. *cordifolium*. Z. fol. simplic. oppositis, cordat-orbicul. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*  
*Ad cap. b. Spei.*
3. *Fabago*. Z. fol. coniugatis, petiolat. foliol. obovat. caul. herbac. diffuso. *Syst. veg. ed. 14. Knorr. del. 2. tab. C.*  
*Capparis Fabago. Dod. pempt. 741.*  
*In Syria, Mauritania, Sibiria 24.*  
 Caul. ramosi. Fol. terminalia, pinguia, nervo medio percurrente. Pedunc. axill. 1-fl. Petal. obtusa, col. Minii.
4. *coccineum*. Z. fol. coniugatis, petiol. foliol. cylindric. carnis, lævibus. *Syst. veg. ed. 14.*  
*Z. desertorum. Forsk. Æg. tab. 11.*  
*Fabago &c. Shaw. afr. f. 231.*  
*In Africa, Sibiria.*  
*Differt a sequenti, plantæ glabritiæ; caul. subrecto, subsesquiped; fl. rubris; caps. oblong.*
5. *album*. Z. fol. coniugat. petiolat. foliol. clavatis, carnis, arachnoideo-incanis. *Syst. veg. ed. 14.*  
*Z. proliferum. Forsk. Æg. ic. tab. XII. f. A.*  
*In Ægypto 1.*  
 Fruticul. succulentus, cano-albus. Fol. ovata, teretia. Petiol. ovat-oblong. adhuc maior. Pedunc. lateral. breviss. 1-fl. Cal. purpurasc. concavus. Petal. lato-lanceol. alba, rufescent.
6. *Morgsana*. Z. fol. coniugat. subpetiolat. foliol. obovat. caul. fruticoso. *Syst. veg. ed. 14.*  
*Fabago &c. Burm. afric. tab. 3. f. 2. Dill. elth. tab. 116. f. 141.*  
*Planta &c. Pluk. amalt. tab. 429. f. 4.*  
*In Æthiopia 1.*  
 Caul. teres, articulat. cinereus. Rami alterni. Fol. opposita. Foliol. integerr. carnosa, lævia. Stipul. inter petiol. solitar. linear. reflexæ. Pedunc. lateral. interfoliac. gemini, 1-fl. alterius lateris, nec oppositi. Cal. 4-phyll. obtusus, concavus. Petal. 4-raro 5. subemarginata, patent. flava. Stam. petalis duplo plura. Anth. flavæ.
7. *sessilifolium*. Z. fol. coniugat. sessilib. foliol. lanceolat-ovalib. margine scabris: caul. fruticoso. *Syst. veg. ed. 14.*



Fabago &c. *Dill. elth. tab. 116. f. 142. Burm. afr. tab. 2. f. 1. Comm. rar. tab. 10.*

b. Fabago. *Burm. afr. tab. 3. f. 1.*

*In Æthiopia h.*

Rad. tuberosa, nigricans. Caul. angulatus, ab imo ramosus. Fol. sessil. Foliol. margine cartilagineo, seu scabra. Pedunc. axill. solitar. Petal. crenata, lutea, vel. alba.

8. *spinosum.* Z. fol. coniugat. sessilibus: foliol. linear. carnosis, supra planis: caul. fruticoso. *Syst. veg. ed. 14.*

Fabago &c. *Burm. afr. tab. 5.*

*In Æthiopia h.*

Caul. erectus, fuscus, ramis alternis. Stipul. verticill. 4. subulæ, breviss. rigidulæ. Fol. quaterna, subtus teretiusc. Cor. nutans, lutea.

9. *æstuans.* Z. fol. coniugat. sessilib. foliol. obovat. retusis. *Syst. veg. ed. 14.*

*In Surinamo.*

Caul. herbac. diffusi, pedal. teretiuscul. Foliol. avenia. Stipul. quinæ, reflexæ; 2. inter fol. a latere superiore; 1. inter fol. a latere infer. unica inter folior. utrumq. par.

10. *microphyllum.* Z. fol. coniugat. subpetiol. foliol. ovalibus, minutis: caps. emarginat. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*

*Ad cap. b. Spei h.*

Caul. erectus, fruticos. ramis sæpius alternis. Fol. opposita, subpetiol. coniugata. Foliol. carnosa, lævia, plana. Pedunc. lateral. solitar. Petal. oblong. flava. Caps. utrimq. retusa, 5-angul. angulis valde compressis, rotundatis.

11. *arboreum.* Z. fol. pinnat. caul. arboreo. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. amer. tab. 83. ed. pict. tab. 124.*

*In America h.*

Arb. speciosa, 40-pedal. coma densa. Fol. multa, opposita, abrupte pinn. nitida. Pinnæ 6-7-iugæ, alternæ, lanceol. obtusæ. Racemi oppositi. Pedunc. ramosi. Fl. magni. Petal. fulva. Caps. alæ 5. membranac.

642. QUAS-SIA. Cal. 5-phyll. Petal. 5. Nectar. 5-phyll. Pericar. 5. distantia, 1-sperm.

1. *amara.* Q. fl. hermaphrod. fol. impari-pinnat. foliol. oppositis, sessil. petiolo articulato-alato: fl. racemosis. *Syst. veg. ed. 14. Am. acad. 6. tab. 429.*

Nux &c. *Comm. hort.* 1. tab. 77?

*In Surinamo* h.

Arb. ramis raris. Fol. alterna, petiol. patent. Foliol. 2-3-iuga, lanceol-oval. acumin. integerr. patentia, membranac. Racem. terminal. simplic. Cor. magnitudine, & fere statura *Dic-tan-ni albi*. Petal. lanceol. elongata, equalia.

2. *Simaruba*. Q. fl. monoicis: fol. abrupte-pinnat. foliol. alternis, subpetiol. petiolo nudo: fl. paniculat. *Syst. veg. ed.* 14. *Lin. Supp.*

*Simaruba amara*. *Aubl. Guian. tab.* 331.

*In locis arenosis Caiennæ, Guianæ, & in Carolina* &c. h.

Arb. 60-ped. superne ramosa, ramis longis, latis, & undiq. sparsis, ramosis. Fol. alterna. Foliol. 4-5. subsessil. ovata, acuta, integerr. rigida, glabra, costa in longum acumen desinente. Panicul. axillar. & terminal. ampla. Petal. alba.

*Cortex trunci, & radic. incisus est vera Simaruba Officin. lacteum, & amarum succum effundens. Decodum in Diarrhœa, & Dysenteria a Barbaris Europæi mutuarunt.*

643. FAGO- Cal. 5-phyll. Petal. 5. cordat. Capsl. 5-locul.  
NIA. 10-valv. locul. 1-sperm.

1. *cretica*. F. spinosa: foliol. lanceolat. planis, lævibus. *Syst. veg. ed.* 14.

*Trifolium* &c. *Clus. hist.* 2. p. 24. 2.

*In Creta* ☉.

Caul. ped. 5-gon. depressus, patens, dichotomus, nodoso-geniculat. Rami alterni, bifarii, patentes. Fol. opposita, petiol. ternata: foliol. sessil. integerr. Stipul. 4. breves, subulatæ, spinescent. recurvatæ, patentes. Pedunc. lateral. axillar. alterni, solitar. erecti, 1-fl. Cal. deciduus. Petal. violac. unguiculata, inter sinus calyc. patentia, etiam unguibus extra calyc.

2. *arabica*. F. spinosa; foliol. linear. convexis. *Syst. veg. ed.* 14.

*In Arabia*.

Fol. crassiuscula, subvillosa. Spinæ verticillat. quaternæ, fol. longiores. Petal. calyci non inserta, neque cordata, sed receptaculo, oblonga, emarginata, unguicular. violac. Stam. basi non appendiculata.

3. *hispanica* : F. inermis. *Syst. veg. ed. 14.*

*In Hispania ♂.*

*scabra* : F. fol. ternatis ; oppositis ; scabris : *Forsk. Æg. In Arabia :*

Stipul. 4: verticill: mucronatæ ; teretes : Cor. violac.

644. TRIBULUS. Cal. 5-part. Petal. 5: æqual. patent. Styl. o. Stigma capitatum : Capsl. 5: gibbæ ; spinosæ , polysperm. congestæ :

1. *maximus* . T. fol. sub. 4-iug. exterioribus ina. pericarpis mucicis , 10-sperm. *Syst. veg. ed. 14. Brown. Jam. tab. 132. f. 3: Sloan: Jam. hist. 1. p. 132. f. 1. Plum. ic. 254. f. 1.*

*In Jamaica aridis ☉.*

Caul. repens ; herbaceus , ramosus , geniculat. inermis . Fol. subovat. integerr. subtus hirsuta . Fl. axillar. solitar. pedunc. erecti . Cor. alba . Fructus non tam aculeari quam in congeneribus .

2. *lanuginosus* . T. fol. sub 5-iugis , subæqualibus : semin. bicornibus : *Syst. veg. ed. 14. Burm. Zeyl. tab. 106. f. 1.*

*In Zeylona .*

Caul. ascendens . pedal. & ultra ; teretes , pilosi , articulati . Fol. opposita (suprema alterna) petiolat. altero min. Foliol. oval-oblong acutiuscula , utrimq. pilosa . Petioli pilosi . Stipul. ad quodvis fol. petiolat. marcescens . Pedunc. pilosus , 1-fl. Petal. integra . Fruct. angulatus , pilosus .

3. *terrestris* . T. fol. sub 6-iug. subæqualibus : femin. 4-cornibus . *Syst. veg. ed. 14. Lob. ic. 2. p. 84. Bauh. hist. 2. p. 352. Barr. rar. tab. 558.*

Tribolo terrestre . *Matth.*

*In Europa australi ad semitas ☉.*

Caul. ped. & ultra , procumbens , ramosus , villosus , rubens . Fol. abrupte-pinn. Foliol. oblique lanceol. ciliata , subtus villosa . Fl. axillar. fasciculati , peduncul. flavi .

4. *Cistoides* . T. fol. octo-iugis , subæqualibus . *Syst. veg. ed. 14. Herm. par. tab. 136. Pluk. alm. tab. 64.*

*In America calidiore .*

Caul. procumbens . ramosi , subhirsuti . Fol. congeneribus ma. Fl. axillar. magni , lutei . Fruct. 10. rugosi , absque spinis lateralibus .



*pentandrus*. T. fol. sub 5-jugis, vix æqualibus: staminibus 5.  
Forsk. *Æg.*

*In Arabia.*

Caul. prostratus. *Var. fl. parvis, flavis; stamin.*  
5-8.

645. *THRYALLIS*. Cal. 5-part. Petal. 5. Caps. 3-coeca.

1. *brasiliensis*. T. *Syst. veg. ed. 14.*

Fruticescens &c. *Marcgr. Bras. f. 3.*

*In Brasilia h.*

Fruticul. ramis teretibus, articulatis. Fol. opposita, petiol. ovata, integerr. Stipul. setaceæ. Racem. terminal. e dichotomia ramorum, simplex, pedic. Bract. breviss. setaceæ. Fl. parvi, lutei.

646. *LIMONIA*. Cal. 5-part. Petal. 5. Bacca 3-locul. Sem. folitar.

1. *monophylla*. L. fol. simplicibus: spinis solitar. *Syst. veg. ed. 14. Burm. Zeyl. tab. 65. f. 1.*

*In India Orient. h.*

Arbor. Fol. alterna, breviter petiol. oblong-ovat. integerr. crassa, venosa. Spinæ axillares. Pedunc. axillares conferti, 1-fl. Fl. parvi.

2. *trifoliata*. L. fol. ternatis: spinis geminis. *Syst. veg. ed. 14. Burm. Ind. tab. 35. f. 1.*

*In India orient. h.*

Arb. facie *Citri*, ramulis flexuosis. Fol. alterna, petiol. ovata, integerr. glabra, subtus lucida, adspersa poris more *Citri*, magnitudine *Jasmini fruticosi*. Foliol. later. sessil. intermedium majus, emarginatum. Spinæ stipular. rectæ, petiolo longiores. Fl. solitar. pedunculat. Bacca globosa, pedunculata, glabra, rubra, magnitudine *Vaccinii*.

3. *acidissima*. L. fol. impari-pinn. spinis solitar. *Syst. veg. ed. 14.*

*Anisifolium. Rumph. amb. 2. tab. 43.*

Catu &c. *Hort. mal. 4. tab. 14. Pluk. phys. tab. 424. f. 2.*

*In India h.*

*Ad Cratevæ genus spectat. Retz. Obs. fasc. 4. Var. inermis.*

Arb. 30-ped. Fol. odore *Anisi*, petiolis membranac. vix alatis, 2-3-iuga, oblongo-rotund. crenata. Fl. ad spinarum exortum, breviter

peduncul. albi, odori. Bacca magnitudine uvarum, citrina.

647. MONO-TROPA. Cal. 4-phyll. deciduus. Petal. 4. duabus appendicibus aucta. Caps. oblonga, 4-locul. 4-valv. fem. scrobiform. continens. Fl. in spica squamosa. Supremi fl. solent esse 5-petal. & stam. 10. habere, cum cal. 5-phyll. Habitus Orobanche aphyllus.

1. *Hypopithys*. M. fl. lateralibus octandris; terminali decandro. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 232.*

Orobanche &c. *Mentz. pug. 3. f. 5. Moris. hist. 3. f. 12. tab. 16. f. 20. Plot. oxf. tab. 9. f. 6. Pluk. alm. tab. 209. f. 5.*

In *Europæ*, & *Canadæ sylvis* 24.

Parasitica radicum. Planta florida pallide flavescescens, succulenta, odore *Primulæ veris*. Rad. innascitur *Fagi*, & *Abietis* radicibus Scap. palmar. squamis imbricat. ovatis, terminatus spica concolore. Petal. erecta, oblonga.

2. *uniflora*. M. caul. 1-fl. flore decandro. *Syst. veg. ed. 14. Orobanche ec. Moris. hist. 3. f. 12. tab. 16. f. 5. mala. Catesb. car. 1. tab. 36. bona.*

In *Marilandia*, *Virginia*, *Canada*.

Scap. dodrant. squamis nigris. Flos nutans, pallidus.

648. DIONÆA. Cal. 5-phyll. Petal. 5. Caps. 1-locul. gibba, 1-sperm.

1. *Muscipula*. D. *Syst. veg. ed. 14. Nov. act. Ups. 1. tab. 3.*

In *Carolinæ uliginosis* 24.

Fol. radical. in orbem posita, petiol. 2-loba, subrotund. ciliata, ita inclinata ut deorsum flectantur, succulenta, sensibilia, insecta incarcerantia, supra spinul. 3-4. breviss. Petiol. alati, nudi. Scap. erectus, spitham. teres, filiform. Corymb. terminal. subumbellat. pedunc. bracteati. Petal. lineata, alba, 7-striata, concava, apicibus incurvis.

649. JUSSIEUA. Cal. 4-5-part. superus. Petal. 4-5. Caps. 4-5-locul. oblong. angulis dehiscens. Sem. numerosa, minuta.

1. *repens*. J. repens: fol. ovat-oblong. fl. pentapetal. decandris. *Syst. veg. ed. 14.*

Nir-Carambu. *Hort. mal. 2. tab. 51.*

b. *adscendens*.

In *India*.

Plantula in aquis nascent. Caul. crassi, fungosi, teretes fistulosi, læves, nitent. Fol. in petiol. longiuscul. attenuata, digitum transversum longa. Petal. calyce duplo longiora, col. albido, ad unguem croceo. Fruct. longitudine fol. Sem. albicantia.

b. Caul. herbac. adscendent. simplic. læves. Fol. alterna, petiol. ovat-oblon. obtusa, lævia. Pedunc. axill. solitar. 1-fl.

2. *tenella*. J. glabra; fl. pentapetal. subsessil. fol. oppositis, lineari-lanceolat. *Syst. veg. ed. 14. Burm. Ind. tab. 34. f. 2.*

In Java.

3. *peruviana*. J. erecta, fl. pentapetal. peduncul. foliosis. *Syst. veg. ed. 14.*

Onagra &c. *Few. per. tab. 9.*

In Lima.

Arbor. Fol. inordinata, sessil. elliptica, *Lauro* simil. nervosa, rudia, supra sature virid. subtus dilutiora. Fl. axillar. solitar. magni. Petal. cordiform. lutea.

4. *suffruticosa*. J. erecta, villosa: fl. 4-petal. octandris, pedunculat. *Syst. veg. ed. 14. Rumph. amb. 6. tab. 41. Carambu. Hort. mal. 2. tab. 49.*

In India h.

Caul. erectus, fruticos. sesqui-2-ped. alterne ramosus, virid. aut rufescens. Fol. alterna, vix petiol. parva, lanceol. utrinq. pubescent. uti tota planta. Fl. parvi, lutei. Caps. 2-pollic. longæ, subsessil. striatæ.

5. *erecta*. J. erecta, glabra: fl. 4-petal. octandris, sessil. *Syst. veg. ed. 14.*

Onagra &c. *Plum. sp. tab. 175. f. 2.*

Lyfimachia &c. *Sloan. Jam. hist. 1. tab. 11. f. 1.*

Jasminum &c. *Seb. thes. 1. tab. 24. f. 3.*

Herba &c. *Rumph. amb. 6. tab. 21. f. 1.*

In America ☉.

Caul. erectus, 2-ped. ramosus, lignosus, angulatus. Fol. elliptica, vel lanceol. 1-3-pollic. inæqual. integerr. patent. venosa, alterna, petiol. Fl. axillar. solitar. bini, raro terni, parvi, lutei. Caps. subsessil. foliis triplo breviores. Planta palustris glaberr.



6. *inclinata*. J. erecta, glabra: fl. 4-petal. octandris, pedunculat. *Syst. veg. ed. 14. Lin. suppl.*

*In Surinami paludosis* ☉.

Caul. simpl. teres, crassus, porosus, radicans.  
Fol. alterna, petiol. obovata, obtusa, costata. Pedunc. axill. solitar. 1-fl. Petal. ovat. maiora, tenerrima, venosa.

*diffusa*. J. caul. repente: fol. lanceol. *Forsk. suppl. Æg. Ad ripam Nili.*

Fl. 5-petal. flavi. Caps. sessil.

650. HEISTERIA. Cal. 5-fid. Petal. 5. Drupa calyc. colorato, maximo.

1. *coccinea*. H. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. amer. tab. 81. ed. pict. tab. 122.*

*In Sylvis Martinicæ ad torrentes* ♀.

*Lauro adfinis*. Arb. 20-ped. ramosa. Fol. semiped. alterna, breviter petiol. oblong. apice attenuata in acumen falcatum, integerr. nitida. Fl. axillar. parvi, pedunculat. Cal. in fructu coccineus, limbo maximo, patente.

651. QUISQUALIS. Cal. 5--fid. filiform. Petal. 5. Drupa 5--angular.

1. *indica*. Q. *Syst. veg. ed. 14. Burm. Ind. tab. 35. f. 2. est Q. pubescens: & tab. 28. f. 2. est Q. glabra. Rumph. amb. 5. tab. 38.*

*In India* ♀.

Arbuse. 3-4-ped. ramis teretibus. Fol. opposita, petiol. cordata, seu ovata, integerr. Stipul. nullæ. Spic. terminal. & axillar. pedunculatæ. Bract. oppositæ, ovat-oblong. Fl. oppositi, statura *Daphnes*. Petal. mane albicant; post meridiem pallide rubent. dein rosea; tandem sanguinea. *Var. pedunc. oppositis, quæ glabra: & alternis, quæ pubescens.*

652. DAIS. Involuc. 4-phyll. Cor. involucri longior, tubo filiform. 4 5-fid. Bacca 1-sperm.

1. *cotinifolia*. D. fl. 5-fid. decandris. *Syst. veg. ed. 14.*

*Ad cap. b. Spei* ♀.

Fol. opposita, petiol. obovata, integerr. glabra. Fl. terminal. fasciculati, pubescent. Involucr. gemmaceum, 4-valv. *Adfinis Passerina.*

2. *octandra*. D. fl. 4-fid. octandris. *Syst. veg. ed. 14. Burm. Ind. tab. 33. f. 2.*

*In India* ♀.

Fol. *Laurina*, opposita, petiol. elliptic-oblong. acumin. lævia. Involuc. unum, alterumve terminal. pedunculat. fl. brevius. Fl. glabri.

653. MELA-STOMA. Cal. campanulat. 5-fid. Petal. 5. calyci inserta. Bacca 5-locul. calyc. obvoluta.

1. *Acinodendron*. M. fol. late-elliptic. denticulat. subtrinerviis. *Syst. veg. ed. 14. Pluk. mant. tab. 159. f. 1.*

*Grossularia* &c. *Plum. ic. 142. f. 2. Sloan. Jam. hist. 2. tab. 196. f. 1.*

*In Amer. calidiore* h.

Arb. 20-ped. Fol. *Malabatri*, sesquiped. opposita, cum 5 nervis crassioribus acute crenata, supra intense virid. & glabra; subtus albicant. Racemi axill. laxi. Cor. alba.

2. *Grossularioides*. M. fol. ovat. acuminat. denticulat. triplicinerviis. *Syst. veg. ed. 14, Pluk. alm. tab. 249. f. 4.*

*In Surinamo* h.

Arb. Fol. utrimq. glabra.

3. *scabrosa*. M. fol. cordat. scabris, denticulat. 5-nerviis, subtus tomentosis: ramis tomentoso-villosis. *Syst. veg. ed. 14. Brown. Jam. tab. 24. f. 3.*

*In Jamaica* h.

Planta subhirsuta. Fol. reticulata. Racem. axill. min.

4. *hirta*. M. fol. ovat-lanceol. denticulat. 5-nerviis: caul. hispido. *Syst. veg. ed. 14.*

*Grossularia* &c. *Plum. ic. 141. Sloan. Jam. hist. 2. tab. 197. f. 2.*

*Arbuscula* &c. *Pluk. alm. tab. 264. f. 1. vel potius 265. f. 1.*

*In Amer. merid.* h.

Planta fruticosa, tota hispida. Fol. opposita, nunc latiora, nunc angustiora, supra lævia, subtus ferrugin. Corymb. ramosi. Fl. axillar. pedunculati, laxe spicati. Bacca ventricosa, coerul.

5. *fragilis*. M. fol. ferratis, 5-nerviis, reticularis: racemis fl. secundis, sessil. *Syst. veg. ed. 14. Lin. suppl.*

*Grossulariæ* &c. *Sloan. Jam. 2. tab. 196. f. 1.*

*Frutex rigidulus*. Fol. opposita, breviter petiol. ovat. fragiliss. lævia, ciliata. Racem. terminal. brachiat. Fructus ma: piliform. globosi, glabri, umbilico excavato: minores umbilico clauso squamis 5.

6. *aspera*. M. fol. lanceol. integerr. trinerviis, scabris.  
*Syst. veg. ed. 14.*  
*Fragarius &c. Rumph. amb. 4. tab. 71.*  
*Katou--Kadali. Hort. mal. 4. tab. 43. Burm.*  
*Zeyl. tab. 72.*  
*In India h.*  
 Caudex tenuis, spinulis exiguis præditus; ramul. purpur. hirsutis. Cal. asper. hirsutus. Cor. cœrul-purpureasc. Fruct. oblong-rotund. asper, hirsutus. Caro purpur.
7. *holosericea*. M. fol. oblong-ovat. integerr. trinerviis, subtus tomentosis: racemis brachiatis, spicis 2-part.  
*Syst. veg. ed. 14.*  
*Acinodendrum &c. Pluk. mant. tab. 250. f. 2.*  
*Arbor &c. Breyn. cent. 3. tab. 2. 4.*  
*In Brasilia, Jamaica &c. h.*  
 Arb. ramis tomentosis. Fol. petiol. reticulata. Racem. terminal. spicis lateralibus, coniugat. secundis, flavis.
8. *strigosa*. M. fol. ovatis, integerr. strigosis, trinerviis: fl. solitar. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*  
*In nova Granada h.*  
 Frutex caule strigis adpressis scabro. Fol. opposita, subpetiol. Pedunc. oppositi, aut terminal. 1-fl. cernui, sæpius 2-phylli. Cal. valde strigosus. Cor. purpur.
9. *sessilifolia*. M. fol. spathulat. integerr. sessilibus, triplicinerv. subtus tomentosis. *Syst. veg. ed. 14. Brown.*  
*Jam. tab. 24. f. 1. 2.*  
*Arbor &c. Pluk. phyt. 249. f. 2.*  
*In Jamaica h.*  
 Arb. fl. fasciculat. sparsis.
10. *Malabathrica*. M. fol. lanceol-ovat. integerr. 5-nerviis, scabris.  
*Syst. veg. ed. 14. Burm. Zeyl. tab. 73.*  
*Fragarius &c. Rumph. amb. 4. tab. 72.*  
*Kedali. H. Mal. tab. 42.*  
*In India h.*  
 Arb. caudice rufescente, tubercul. rufis obfuso; ramis scabris. Fol. opposita, petiol. lato-lanceol. supra setis rigidiuscul. scabra; subtus nervosa, vix serrata. Cal. setis albidis hispidus. Petal. eleganter purpur.
11. *lævigata*. M. fol. ovat--oblong. integerr. acumin. 5-nerv. læviuscul. margine lævibus. *Syst. veg. ed. 14.*  
*Aubl. Guian. tab. 159.*



Grossulariæ &c. *Sloan. Jam. hist. 2. tab. 197. f. 1.*  
*Plum. sp. tab. 140.*

*In America h.*

Arb. 5-6-ped. Rami recti, simplic. oppositi. Fol. opposita, petiol. tenuiora, & minus consistentia, subcœrul. subtus ferrugin. Racem. terminal. compositi. Fl. multi, minuti. Petal. 4. æqual. 5.<sup>o</sup> ma: alba. Baccæ exiguæ, globosæ, subcœrul. Sem. 6. oblong.

12. *discolor*. M. fol. oblong-ovat. integerr. 5-nerv. glabris, margine lævibus. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. am. tab. 84. ed. picta tab. 125.*

Grossularia &c. *Sloan. Jam. hist. 2. tab. 198. f. 1.*

Arbor &c. *Pluk. alm. tab. 264. f. 4.*

*In America h.*

*Demit ½ partem fructificat.* Arb. 15-ped. Rami reclinati; iuniores tomentosi. Fol. opposita, petiol. lævissime crenata, supra virent. & glabra, subtus leucophæa, & tomentosa. Racemi terminal. subcymosi, bini, tomentosi. Fl. parvi. Petal. flava. Baccæ succo purpur.

13. *oẽandra*, M. fol. ovatis, integerr. trinerv. glabris, margine hispidis. *Syst. veg. ed. 14.*

*In India u.*

Caulis procumbens, cinereus, ramulis oppositis. Fol. opposita, breviter petiol. dura, scabra, supra obscure virent. subtus pallidiora. Fl. terminal. qui in medio caul. solitar. laterales 4-5. magni, purpur. petal. ciliatis. Fruct. rotundi, glabri, pulpa nigra. Folior. forma; hispiditas in margine; & nervorum numerus ternarius, notæ sunt constantes.

14. *grossa*, M. fol. subcordat. integerr. 5--nerv. scabris, *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*

*In nova Granata u.*

Arb. ramis teretibus, rigidiusc. hispidis. Fol. quasi tomentosa. Fl. in apice ramorum subsessil. grossi. Cal. pilosus. Cor. extus subpilosa.

15. *crispata*. M. fol. quaternis, integerr. 5-nerv. ramis crispatis. *Syst. veg. ed. 14.*

Funis &c. *Rumph. amb. 5. tab. 35.*

*In Amboina h.*

Frutex flagellis longis, quæ proximis fruticibus incumbunt. Fol. ad genicula sessil. ovat-acut,

Fl. axillar. fascicul. Cal. purpuro-rubens. Petal. alba. Bacca *Oxyacanthæ æmula*, ex purpuro-rubens.

*purpurascens*. M. fl. racemosis: fol. ovat-oblong. acumin: denticulis, caul. & ramis hispidis. *Aubl. Guian. tab. 154.*

*In Guiana* 4.

Caul. pl. 3-4-ped. recti, superne ramosi, villosi. Fol. opposita, petiol. e virid-rubent. subpilosa, 5-nerv. Fl. terminal. minimi. Cor. alba. Bacca orbicul. purpurasc.

*bivalvis*. M. caul. alato: fol. brevibus, ovat. obtusis, 3-nerv. sessil. *Aubl. Guian. tab. 155. f. a.*

*In Caienna* ☉.

Tota planta cinerea. Caul. erectus, 6-10-unc. simpl. superne ramosus, 4-gon. angulis marginatis. Fol. opposita, sessil. Fl. terminal. corymbosi, 3-fl. Bract. 2. oppositæ ad basin calyc. Petal. inæqual. alba.

*trivalvis*. M. fol. linear. acutis: caps. 3-valv. *Aubl. Guian. tab. 155. f. b.*

*In Caienna* ☉.

Tota planta cinerea. Caul. 2-ped. simpl. superne ramosus, ramul. oppositis; 4-gonus. Fol. opposita, sessil. 3-nerv. Fl. terminal. corymb. 3-fl. Bract. 2. oppositæ, oblong. angustæ, ad basin cal. Petal. 5-4. min. alba. Caps. 3-valv. calyce obvoluta.

*racemosa*. M. fol. ovat. 5-nerv. petiol. & limbis fol. villosis. *Aubl. Guian. tab. 156,*

*In Guiana* 5.

Caul. pl. 8-ped. recti, 4-gon. superne ramosi. Fol. opposita, breviter petiol. ovat-acuta, subferrata, margine piloso, nervis purpurascens. Fl. terminal. sessil. racemulis subspicat. Cor. revoluta, alba. Bacca violac.

*rufescens*. M. fol. cordatis, crassis, rugosis, subsessil. subtus tomentosus. *Aubl. Guian. tab. 157.*

*In Guiana* 5.

Fruticulus. Caul. pl. 9-ped. erecti, ramosi, 4-gon. villosi, rufescent. Fol. opposita, acumin. subdent. 5-nerv. rufescent. Fl. terminal. congesti, racemosi: racemuli oppositi, ad basin bracteati. Cor. minima, alba. Bacca villosa, rubra.

*alata*.

M. fl. racemosis: fol. ovat-oblon. subtus tomentosis, incanis, subseffil. *Aubl. Guian. tab. 158. In Caienna, & Guiana h.*

Fruticul. Caul. pl. 7-ped. erecti, ramosi, 4-gon. angulis marginat. tomentoso-cinerei. Fol. opposita, integerr. 5-nervia, supra virid. Fl. terminal. Racemi, & racemuli oppositi, 3-part. singuli 3-fl. Petal. 5-4. æqual. unico ma. Bacca orbicul. rubra.

*grandiflora*.

M. caul. & fol. hirsutis, cordatis, acuminat. fl. violac. *Aubl. Guian. tab. 160.*

*In Caienna, & Guiana h.*

Caul. pl. 3-ped. recti, ramosi, villosi, rufescent. Fol. opposita, petiol. 5-7-nerv. subserrata, pilis rufescent. Fl. axill. & terminal. corymbosi, breviter peduncul. 3. insimul iuncti. Cal. villosus. Petal. 5. inæqual. in orbem expansa, unico ma. violacea. Bacca exsucca, rubra.

*rubra*.

M. fol. subcordat. sessilibus: fl. axillaribus. *Aubl. Guian. tab. 161.*

*In Guiana h.*

Fruticulus. Caul. pl. 1-2-ped. superne ramosi, 4-gon. tomentosi, inferne nudi, superne foliosi. Fol. subseffil. cordat. acumin. subserrata, 5-nerv. tomentosa, supra virid. subtus ferrugine. Fl. axill. 1-2-3. Cor. purpurasc. Bacca villosa, rubra.

*succosa*.

M. fol. ovat. hirsutis, asperis, subtus incanis: fructu purpurasc. *Aubl. Guian. tab. 162.*

*In Caienna, & Guiana h.*

Frutex 10-12 ped. ramis rectis, villosis, rufescent. apice foliosis. Fol. opposita, petiol. acuta, integerr. 5-nerv. supra hirsuta; novella incarnata. Fl. axillar. congesti, subseffil. Cal. villosus. Petal. subrotun. fimbriata, alba. Bacca orbiculata, edulis.

*arborescens*.

M. fol. subrotun. 5-nerviis: fl. corymbosis; petal. basi 2-fid. *Aubl. Guian. tab. 163.*

*In Guiana h.*

Arb. 60-ped. superne ramosa. Fol. opposita, petiol. ovata, integerr. rigida, glabra. Fl. racemosi intra fol. Racem. oppositi, bracteati. Petal. alba. Bacca subrotunda, umbilicata, lutea.

*flavesceus*.



*flavesceus*. M. fol. ovatis, 5-nerviis, subtus incanis. *Aubl. Guian. tab. 164.*

*In Guiana* H.

Arb. 10-ped. superne ramosa, ramis, & ramulis apice foliosis. Fol. opposita, petiol. basi angustiora, integerr. glabra, supra flavescent. subtus subcinerea. Fl. intra fol. racemis oppositis. Cor. & bacca ut in priore.

*spicata*. M. fol. ovat-oblong. acuminat. pilosis: fl. spicatis, carneis. *Aubl. Guian. tab. 165.*

*In Guiana* H.

Frutex. Caul. pl. erecti, 3-4-ped. ramosi, villosi. Fol. opposita, subsessil. 5-nerv. subterrata, pilis ferrugin. Fl. spicati, spicis axillar. & terminal. alternis. Bacca ovata, ferrugin. villosa.

*agrestis*. M. fol. ovat-oblong. fl. paniculat. albis. *Aubl. Guian. tab. 166.*

*In Caienna* U.

Caul. pl. erecti, 2-3--ped. ramosi, villosi. Fol. opposita, petiol. 5-nerv. subserrata, villosa, ferrugin. Fl. terminal. in axillis ramulor. paniculati. Bacca ovata, villosa, subcœrul.

*elegans*. M. fol. cordatis, pilosis, eleganter crenatis: fl. corymbosis. *Aubl. Guian. tab. 167.*

*In Caienna* U.

Caul. pl. erecti, 2-3--ped. ramosi, villosi, ferrugin. Fl. terminal. in axillis ramulor. Cor. alba-subcœrul. Bacca globosa, villosa, cœrul.

*villosa*. M. fol. ovatis, acutis, sessil. fl. corymbosis. *Aubl. Guian. tab. 168.*

*In Caienna* ☉.

Caul. uni-pl. 2--3-ped. ramosi, 4-goni, pilosi. Fol. opposita, declinata, utrimq. hirsuta. Fl. terminal. corymbis oppositis. Cal. villosus. Cor. alba. Bacca exsucca, calyce obvoluta.

*aquatica*. M. fol. cordat. crenatis, supra hirsutis, ferrugin. subtus lævibus: fl. paniculat. albis. *Aubl. Guian. tab. 169.*

*In Caienna* U.

Caul. pl. erecti, 2-3-ped. 4-goni, hirsuti, ferrugin. Fol. opposita, 5-7-nerv. Fl. utrimq. ex alis superior. longe pedunculati. Bract. 2. ad basin ramulor. Cal. turbinatus. Bacca exsucca, rufescens.

- longifolia*, M. fol. lanceol. glabris, trinerv. ad summitatem caul. quaternis: fl. paniculat. parvis, albis; fructu parvo, cœrul. *Aubl. Guian. tab. 170.*  
*In Guiana* h.
- Fru ex. Caul. pl. 8-ped. ramosi, 4-gon. glabri. Fol. infer. opposita, petiol. integerr. Fl. termin. l. Bacca exigua, globosa, subcœrul.
- parviflora*, M. fol. ovat-oblong. denticulat. glabris: fl. terminal. paniculatis: fructu parvo. *Aubl. Guian. tab. 171.*  
*In Caienna, & Guiana* 24.
- Caul. pl. recti, 8-ped. ramosi, 4-gon. glabri. Fol. opposita, petiol. subserrata, 5-nerv. Fl. minimi. Cor. alba. Bacca orbicul. subcœrul.
- scandens*, M. caul. & fol. pilosis: fl. terminal. albis. *Aubl. Guian. tab. 172.*  
*In Guiana* 24.
- Caul. pl. sarmentosi, volubil. 4-gon. Fol. opposita, petiol. ovata, acuta, subserrata, 5-nervia. Corymbi 3-fl. Bacca exsucca.
- Cacatin*, M. *Aubl. Guian. tab. 173.*  
*In Caribæis* h.
- Frutex 10-ped. ramis rectis, nodosis, glabris. Fol. ampla, octodecim uncial. opposita, longe petiol. ovat-oblong. acuta, 3-nerv. glabra.
- septemnervi-um*, M. fol. 7-nerviis. *Jacq. amer. In sylvis montosis Martinicæ* h.
- Arbor erecta, habitu congenerum. Fol. ovata, acuta, subtus tomentosa, venis transversis, parallelis.
654. KALMIA. Cal. 5-part. Cor. hypocraterifor. limbo subtus 5-corni. Caps. 5-locul.
1. *latifolia*, K. fol. ovatis; corymb. terminalibus. *Syst. veg. ed. 14.*  
*Chamædaphne &c. Catesb. car. 2. tab. 98.*  
*Ledum &c. Trew. Ehret. tab. 38. f. 1.*  
*Cistus &c. Pluk. alm. tab. 379. f. 6.*  
*In Virginia, Marilandia &c.*  
 Arb. 6-ped. crassitie brachii, sempervirens. Fol. alterna, petiol. coriacea, integerr. nitida, glabra, fere avenia. Bract. breves, 8-phyll. acutæ. Pedunc. filiform. nudi, multifi. Cor. purpureo-albicans.
2. *angustifolia*, K. fol. lanceol. corymb. lateralibus. *Syst. veg. ed. 14.*

Chamædaphne &c. *Catesb. car. 3. tab. 17. f. 1.*

Ledum &c. *Trew. ehret. tab. 38. f. 2.*

Cistus &c. *Pluk. alm. tab. 161. f. 3. phyt. tab. 339. 43. 5.*

*In Pennsylvania, Noveboracæ &c. h.*

Frutex semiped. sempervirens. Fol. duplo angustiora priore. Fl. magis saturati.

655. LEDUM, Cal. 5-fid. Cor. 5-part. plana. Caps. 5-locul. basi dehiscens.

1. *palustre*. L. fol. linearibus: staminibus cor. longioribus, *Syst. veg. ed. 14.*

Cistus *Ledon* &c. *Duham. arb. 13.*

Rosmarinum &c. *Cam. epit. 546.*

*In Europæ septentr. palud. uliginosis h.*

Odor totius plantæ gravis, & acutus. Frutex caulibus pedal. glabris. Fol. alterna, petiol. lanceol. revoluta, foetida, supra venosa, subtus tecta lana ferrugin. Gemma terminalis maxima, florifera. Corymbi simplic. Cor. alba. Capsula cernua.

*grælandicum*, L. *Retz. Prod. Fl. Scand.*

*In Grælandia.*

Fol. magis ferrugineo-tomentosa, etiam margine revoluta.

656. RHODODENDRON, Cal. 5-part. Cor. subinfundibulif. 5-fida. Stam. declinata. Caps. 5-locul. 5-valv. polysper.

1. *ferrugineum*, R. fol. glabris, subtus leprosis: cor. infundibuliform. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. Obs. 1. tab. 16, Austr. 3. tab. 255.*

*Evonymus* &c. *Dalech. hist. 27.*

*Montana* &c. *Lob. ic. 366.*

*In alpibus Helveticis, Italicis, Sibiricis &c. h.*

Frutex 2-ped. distortus, & difform. Fol. subtus ferrugineo polline obducta, cæterum flavicant. si rubigo abradatur, margine reflexo, punctato, non ciliato. In ramulor. apice fol. densius oriuntur, breviter petiol. ovalia, obtusiusc. integerr. crassa, firma. Fl. racemosi. Cor. declinata, inæqual. rubra, cum punctulis albis; raro alba.

2. *dauricum*, R. fol. glabris, punctatis, nudis: cor. rotatis. *Syst. veg. ed. 14.*

*Chamærodendros* &c. *Amm. ruth. tab. 21.*

*In Dauria h.*



*Melius Ledum groelandicum nuncupari debuisse.*  
 Radix crassa, tuberosa, extus fusca. Caul. pl. erecti, teretes, proliferi. Fol. crebra, alterna, breviter petiol. oblonga, supra obscure virid. nitida, subtus ferrugineo--punctata. Fl. axillar. breviter peduncul. Petal. albi, rubra, vel cœrul. Styl. sanguin. *Simil. Azalea Lapponi.*

3. *chrysan-*  
*thum.* R. fol. oblong. impunctatis, supra scabris, venosissim. cor. rotata, irregul. gemma florifera ferrugineo--tomentosa. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl. Pallas. ii. 3. tab. N. f. 1. 2.*

*Andromeda &c. Gmel. Sib. 4. tab. 54.*

*In iugis alpinis frigidissima Dauria, & Sibiria h.*

*An var. R. Daurici?* Frutex parvus, diffusus, cortice fusco. Fol. utrinq. adtenuata, margine reflexo, subtus pallidiora. Rami inter fol. squamis stipulæform. ferrugin. tecti; in quorum apice pedunc. pl. ex axill. superior. lquamarum, 1--fl. Flos magnus, nutans, luteus, figura R. *Daurici.*

*Vis antarthritica.*

4. *hirsutum.* R. fol. ciliat. nudis; cor. infundibulifor. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. Austr. 1. tab. 98.*

*Nerium alpinum &c. Bauh. hist. 3. p. 21. 22.*

*Ledum alpinum. Clus. hist. 1. p. 82.*

*Balsamum alp. Lob. ic. 468.*

*In alpinis italicis, Helveticis &c.*

*Odor balsamicus.* Frutex 1-4-ped. distortus, ramosus. Fol. petiol. subovata, obtusiusc. obsolete crenulata, margine subreflexo, sat ure vi-  
 rentia, subtus punctis albis notata. Pedunc. racemosi, subpollic. erecti. Cal. rubens. Cor. rubra, pustulis dilute albis picta.

5. *Chamæci-*  
*stus.* R. fol. ciliat. cor. rotatis. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. Austr. 3. tab. 217. Mont. in Zann. tab. 102.*

*Ledum &c. Mich. gen. tab. 106.*

*Chamæcistus VIII. Clus. hist. 1. p. 76.*

*Cistus &c. Bauh. hist. 2. p. 19. Pluk. alm. tab. 23. f. 4.*

*In Baldo, Austria &c. h.*

Frutex parvus, palmar. ramosiss. fuscus, extremis ramulis foliosus. Fol. parva, petiolo brevi, rubello, oblong. firma, nitida, subtus rubescent. Pedunc. terminal. 2--3. foliosi, villosi, fusco--rubri. Cor. carnea, aut subpurpur.

6. *ponticum*. R. fol. lanceolat. utrimq. glabris, nitidis: racemis terminalibus. *Syst. veg. ed. 14. Tourn. it. 2. pag. 99.*  
*In Oriente, Gibraltariæ subhumidis, umbrosis* *h.*  
 Fol. *Pruni Laurocerasti*, perennia, breviter petiol.  
 Cal. minutiss. Cor. campanulata, magnitudine  
*Nerii*, purpur. Stam. declinata. *Simil. Azaleæ*  
*ponticæ, sed differt num. staminum.*
7. *maximum*. R. fol. ovalibus, obtusis, venosis, margine acuto reflexo; pedunc. 1-fl. *Syst. veg. ed. 14.*  
*Andromeda &c. Gmel. Sib. 4. tab. 54. quæ junil. fig.*  
*Chamærododendros &c. Cates. car. 3. tab. 17. f. 2.*  
*In Virginia, Sibiria* *h.*  
 Frutex procumb. Rami, & fol. magnitudine, &  
 consistentia *Padi Laurocerasti*, margine reflexo,  
 venis reticulat. inscripta. Fl. corymbosi, ampli,  
 patentes, nutantes. Cor. flava, lacin. rotun-  
 dis, 3. superioribus paulo ma: infima maculata.
657. ANDRO-MEDA. Cal. 5-part. Cor. ovat. ore 5-fid. Caps. 5-  
 locul.
1. *tetragona*. A. pedunc. lateralibus, solitar. cor. campanulat.  
 fol. oppositis, imbricatis, obtusis, revolutis.  
*Syst. veg. ed. 14. Fl. Lapp. tab. 1. f. 4.*  
*In alpinis Lapponicis, Sibiricis* *h.*  
 Habitus *Passerinæ pisiformis*. Fol. plerumq. 4.  
 raro 3-fariam imbricata. Fl. *Lilii convallii*.
2. *hypnoides*. A. pedunc. terminalibus, solitar. cor. campanu-  
 lat. fol. confertis, subulat. *Syst. veg. ed. 14.*  
*Fl. Dan. tab. 10. Fl. Lapp. tab. 1. f. 3.*  
*In alpinis Lapponicis, Sibiricis* *h.*  
 Habitus *Hypni*. Cor. incarnata. Anth. aristatæ.
3. *cerea*. A. pedunc. axillar. solitar. diphyll. 1-fl. fol. al-  
 ternis, ovatis, ferratis. *Syst. veg. ed. 14.*  
*Lin. Suppl.*  
*In Takesti* *h.*  
 Simil. A. *racemosæ*, sed glabra. Fol. breviter  
 petiol. Cor. campanulata. Anth. oblong. lu-  
 tæ, dorso bicornes.
4. *cærulea*. A. pedunc. aggregatis; cor. ovatis: fol. sparsis,  
 linear. obtusis, planis. *Syst. veg. ed. 14. Fl.*  
*Lapp. tab. 1. f. 5. Fl. Dan. tab. 57.*  
*Erica &c. Buxb. cent. 4. tab. 53.*  
*In Lapponia, Sibiria* *h.*  
 Habitus *Empetri nigri*. Pedunc. terminal. longi,  
 erecti, rubri. Cor. cœrul. Anth. muticæ.

5. *mariana*. A. pedunc. adgregatis: cor. cylindric: fol. alternis, ovatis, integerrim. *Syst. veg. ed. 14.*  
*Arbuscula &c. Pluk. mant. tab. 448.*

*In Virginia* h.

Fol. ampla, coriacea, pallide virent. nitida. Fl. ampli, penduli. Cor. cylindrico-campanul. alba. Anth. muticæ.

6. *Polifolia*. A. pedunc. adgregatis; cor. ovatis: fol. alternis (plerumq.) lanceol. revolutis. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 54. Fl. Lapp. tab. 1. f. 2.*  
*Buxb. cent. 5. tab. 49. f. 1.*

*Vitis Idææ &c. Bauh. hist. 1. P. 1. p. 525.*

*Erica &c. Pluk. alm. tab. 175. f. 3.*

*In Europæ paludibus turfosis* h.

Fruticul. ped. ramosus, fuscus. Fol. rigida, fusco-virent. subtus ferruginea, vel glauca, quandoq. in medio latiora. Pedunc. longi, nutantes, 1-fl. purpur. Cal. coloratus, farinosus. Cor. herbido-purpur. Anth. aristatæ. Bacca sicca, coloratio.

7. *Bryantha*. A. fl. corymbosis: fol. ellipticis, caul. prostrato. *Syst. veg. ed. 14. Gmel. Sib. 4. tab. 57. f. 3.*

*In Camthchatca cum Empetro in rupibus* h.

Planta densis cespitibus uti *Serpyllum* provenit. Fol. conferta, alterna, breviter petiol. 2-lin. longa, unam lata, perennia crassa, rigida, supra sature, subtus pallide virent. Pedunc. terminal. multifl. rubent. Anth. dorso filamentor. perpendiculariter adhærent.

8. *Dabæcia*. A. racemis secundis: fl. ovat. 4-fid. fol. alternis, lanceolat. revolutis. *Syst. veg. ed. 14.*

*Erica &c. Pet. gaz. tab. 27. f. 4.*

*In Hiberniæ montibus, solo cespitoso* h.

*Facies tota Andromedæ. Num. Stam. Ericæ est.*  
*Fructus caps. 4-valv. 4-locul. Cauliculi ubi florere incipiunt, non minus viscosi sunt, quam Muscipulæ. Racemus terminal. simplex. Fl. alterni, bracteati. Cal. 4-phyll. purpurasc. Cor. cylindrico-oval. A. polifoliæ duplo ma. violac. ore coarctato, 4-fid. lacin. reflexis. Stam. 8.*

9. *droseroides*. A. racemis secundis: fol. linear. pilosis, viscidis. *Syst. veg. ed. 14.*

*Chamæcistus &c. Petiv. mus. tab. 161.*

*Ad cap. b. Speci* h.



Caul. suffruticos. dodrant. ramosus. Fol. *Drosera cistifloræ*; alterna, subsessil. obtusa, canaliculata, crassiuscula. Racemi terminal. solitar. Pedunc. purpurascens. Fl. nutantes. Cal. parvus, scariosus. Cor. ovata, violac. collo atropurpur. limbo minuto, obtuso, albo. Anth. aristatæ. *Fructificationis numerus interdum Eri-cæ propior.*

10. *paniculata*. A. racemis secundis, paniculat. nudis: cor. subcylindric. fol. alternis, oblong. crenulat. *Syst. veg. ed. 14.*

Frutex &c. *Catesb. car. 2. tab. 43.*

In *Virginia* h.

Frutex 10-ped. Fol. mucronata: Racemi longi. Cor. albo-virid. Anth. aristatæ. Baccæ rotundæ.

11. *japonica*. A. racemis paniculat. cylindric. bracteatis: fol. ellipticis, reflexis, apice serratis. *Syst. veg. ed. 14. Thumb. Jap. tab. 22.*

In *Japonia* h.

Arb. ramosa. Rami subumbellati, erecti, ramulosi, purpurasc. Fol. in apice ramulorum frequentia, 2-pollic. alterna, petiol. nervosa, glabra. Petioli linear. rubri. Fl. in apice ramulorum. Racemi digital. alterni, laxi, rubri. Bract. sparsæ, subulatæ. Cor. alba. Caps. ovat-globosa.

12. *racemosa*. A. racemis secundis, bracteatis: cor. gibboso-cylindric. fol. alternis, oblong. serratis. *Syst. veg. ed. 14.*

In *Pensilvania*.

Differt ab A. *paniculata* 1.º racemis minus paniculat. 2.º bractea sub singulo fl. lineari-lanceol. stricta, fl. longiore, viridi, decidua. 3.º capsul. retinentibus stylum.

13. *arborea*. A. racemis secundis, nudis: cor. rotundo-ovat. *Syst. veg. ed. 14.*

Frutex &c. *Catesb. car. 1. tab. 71.*

In *Virginia*, *Carolina* h.

Arb. 20-ped. ramosa. Fol. oblong-acumin. Fl. breviter peduncul. nutantes. Cor. alba.

14. *calyculata*. A. racemis secundis, foliaceis: cor. subcylindricis: fol. alternis, lanceolat. obtusis, punctat. *Syst. veg. ed. 14.*

*Chamædaphne. Buxb. ac. Petr. 4. tab. 8. f. 1.*

In *Virginia*, *Canada*, *Siberia* h. D iv

Frutex fol. ovali-lanceol. coriaceis, obtusis, margine recurvis. Fl. pedicellati, nutantes, albo-rosei. Anth. muticæ, 2-fid.

15. *anastomosis*. A. racemis confertis, foliaceis: fol. ovatis, subferrat. subrus anastomosibus, punctatis. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*

*In nova Granada.*

Frutex determinate ramosus, ramis pilosis. Fol. conferta, alterna, subpetiol. acuta, lucida. Racemi ad genicula annotina conferti.

16. *rupestris*. A. fol. oblong. alternis, ferrulatis. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*

*In nova Zeelandia.*

658. *EPIGÆA*. Cal. exterior. 3-phyll. interior 5-part. Cor. hypocrateriform. Caps. 5-locul.

1. *repens*. E. *Syst. veg. ed. 14.*

*Pyrolæ &c. Pluk. alm. tab. 107. f. 1.*

*In Virginia, Canadæ pinctis h.*

Suffrutex humilis, repens, sempervirens. Rami villis rufis adspersi. Fol. alterna, petiol. cordato-ovata, coriacea, integerr. plerumq. fusca. Racemus terminal. Cor. carnea.

659. *GUALTHERIA*. Cal. exterior 2-phyll. interior 5-fid. Cor. ovata. Nectar. mucronibus 10. Caps. 5-locul. vestita calyce. interior. baccato.

1. *procumbens*. G. *Syst. veg. ed. Duham. arb. 1. tab. 113.*

*In Canadæ sterilibus arenosis h.*

Planta facie *Pyrolæ*, aut *Vaccinii*. Fruticul. diffus; spitham. teres, vix ramosus, semper-virens. Folia terminalia, 3-4. obovat. coriacea, patent. ferraturis raris, acumin. Fl. axillar. solitar. peduncul. penduli. Cal. interior, & cor. alba. Fruct. subrotund. coccineus.

660. *ARBUTUS*. Cal. brevis 5-part. Cor. campanifor. globosa, 5-fida, ore basi pellucida. Bacca 5-locul. polysper. *Differt a Vaccinio fructu supero.*

1. *Unedo*. A. caul. arboreo: fol. obtuse ferratis, glabris: panicula terminali: baccis polysper. *Syst. veg. ed. 14. Knorr. del. 1. tab. E. 1. a. Steligm. au. 5. tab. 1. Mill. ic. tab. 48. f. 1. 2. Cam. crit. 168.*

*Arbuto. Matth.*

*In Europæ austr. Orientis sylvis h.*

Frutex magnus. Fol. Lauriform. alterna, petiol. oblonga, dura, læte virid. nitida. Cor. her-

bido-rubra. Bacca magna, sphaerica, rubicunda, tuberculis feminum exasperata.

2. *laurifolia*. A. caul. arboreo: fol. oblong. utrimq. acuminat. acute ferratis, glabris: racemis axillar. solitar. sessil. secundis. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*

*In Amer. septent. h.*

Simil. priori, sed differt ferraturis acutis, cuspidat. racemis axillar. simpliciss. secundis: fol. brevioribus.

3. *Andraehne*. A. caul. arboreo: fol. integerr. ferratisq. glabris: baccis polysperm. *Syst. veg. ed. 14. Ehret. Act. angl. 1767. Vol. 57. tab. 6. optima. Clus. hist. 1. p. 48.*

*In Oriente h.*

Frutex cortice rubente. Fol. laurina. Panicula erecta, pedunc. hispidis. *Simil. A. Unedoni, sed fol. nonnulla integerr. & panicula viscido--pubescens, cum in illa laevis sit.*

4. *ferruginea*. A. caul. arborecente: fol. oblong. obtusis, integerr. glabris: racemis terminal. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*

*In America h.*

Rami angulati, simplic. glabri. Fol. alterna, petiol. Racemi solitar. Fl. remoti, nutantes, bracteati. Cor. caeteris speciebus longior, fere ut in *Andromeda*. Pistil. cor. longius. Fl. siccati nigrescunt.

5. *mucronata*. A. caul. fruticoso: fol. alternis, ovatis, mucronat. ferratis: pedunc. axillaribus, 1-fl. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*

*In terra del Fuego h.*

Frutex rigidiss. Fol. breviss. petiol. rigida, margine cartilagineo, ferraturis utrimq. 4. avenia. Gemmae axillar. squamis paucioribus, imbricatis, unde exeunt pedunc. solitar. 1-fl. Fl. cernui.

6. *pumila*. A. caulibus diffusis: fol. alternis, distichis, oblong. integerr. fl. lateralibus, solitar. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*

*In terra del Fuego h.*

Planta pumila, fruticosa. Fol. minutiss. fere *Empetri*, supra glaberr. subrus carinata. Pedunc. e squamis gemmae, axillar. elongati, nudi, 1-fl. Fl. cernui.

7. *acadiensis*, A. caulibus procumbentibus: fol. ovatis, sub-



ferrat. fl. sparsis : baccis polysperm. *Syst. veg. ed. 14.*

*In Acadia* h.

Fol. *Alaterni*, alterna.

8. *alpina*.

A. caulibus procumbentibus : fol. ferratis, rugosis. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 73.*

*Vitis idæa. Clus. hist. 1. p. 61.*

*Uva Urti &c. Zan. tab. 178.*

*In alpibus Helvetiæ, Sibiricæ, Lapponicæ &c. h.*

Frutex 2-ped. ramosus, fuscus. Fol. oblongi, subtus albescent. Cor. albido-rufescens, margine rubescente. Fruct. niger, cœrul. vel ruber.

9. *Uva Urti*.

A. caulibus procumbentibus : fol. integerr. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 33. Black. tab. 592. Fl. Lapp. tab. 6. f. 3.*

*Uva Urti. Clus. hist. 1. p. 63. Bauh. hist. 1. p. 524.*

*In Europa frigida, Canada* h.

Frutex ped. Fol. obovat. crassa, glabra, læte virent. Cor. albido-virescens, margine purpur. Fruct. parvi, rotundi, rubri, 5-sperm.

661. INO-

CARPUS.

Cal. 2-fid. Cor. infundibulifor. Stam. duplici serie. Drupa 1-sperm.

1. *edulis*.

1. *Syst. veg. ed. 14. Thumb. nov. pl. gen. Forst. gen.*

*Gajani, gajanus. Rumph. amb. 1. tab. 65.*

*Ad Insulas maris austral. in Tahiti* h.

Arb. Fol. dodrant. alterna, breviss. petiol. subcordat. oblong. integerr. glabra, venosa. Spic. axill. parvæ, solitar. hirsutæ. Fl. parvi, alterni, bracteati.

662. CLE-

THRA.

Cal. 5-part. Petal. 5. Stigm. 3-fid. Caps. 3-valv. 3-locul.

1. *alnifolia*.

C. *Syst. veg. ed. 14. Duham. arb. 1. tab. 71. Mill. ic. tab. 28.*

*Alnifolia &c. Catesb. car. 1. tab. 66. Pluk. alm. tab. 115. f. 1.*

*In Carolina, Virginia &c. h.*

Frutex in aquis, aut locis aquosis innascens, 12-14-ped. Fol. alterna, elliptica, dentata. Fl. spicati, magnitudine *Oxyacanthæ*. Cor. alba. *An minor distincta species?*

663. PYRO-

LA.

Cal. campanul. 5-part. Petal. 5. Caps. 5-locul. angul. dehiscens, loculis polysper.

1. *rotundifolia*. P. stamin. adscendentibus: pistil. declinato. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 110. Black. tab. 594. Riv. tab. 135. & fol. obtuso tab. 136.*  
*Pirola. Math.*  
*In Europa septentr. Virginia &c. in dumetis saxosis, & umbrosis alpium*  $\mathcal{U}$ .  
 Caul. ped. simpl. nudus. Fol. pyriformia, petiolat. subrotund. quandoq. submucron. cum obtusitate, subserrata, carnosia. Fl. racemosi, unilateral. Pedunc. 1-fl. penduli. Cor. alba, odora.
2. *minor*. P. fl. racemosi, dispersi: staminibus, pistillisq. rectis. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 55. Riv. pent. 149.*  
*In Europa frigidiore*  $\mathcal{U}$ .  
 Fol. minora priore, ovata, obsolete crenulata; radical. petiolata. Racemus densus. Petal. ovata, alba, dorso rubicunda. Fructus penduli.
3. *secunda*. P. racemo unilaterali. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 402. Gm. l. Sib. 4. tab. 56. f. 2.*  
*Pirola 2. tenerior. Clus. pan. 506.*  
*In Europæ borealis sylvis montosis*  $\mathcal{U}$ .  
 Scap. anceps, simpl. multiflorus. Fol. elliptica, acumin. serrata, firma, nitida; radicalia petiol. Stipul. lanceol. Petal. ovata, conniventia, alba.
4. *umbellata*. P. peduncul. subumbellat. *Syst. veg. ed. 14.*  
*Pyrola 3. fruticans. Clus. pan. 507.*  
*In Europæ, Asix, & Amer. septentr. sylvis*  $\mathcal{H}$ .  
 Scap. subpalm. purpureasc. Fol. subverticill. lanceol. carnosia, nitida.
5. *maculata*. P. peduncul. 2-3-fl. *Syst. veg. ed. 14.*  
*P. mariana &c. Pluk. mant. tab. 349. f. 4.*  
*In Amer. septentr. sylvis*  $\mathcal{H}$ .  
 Fol. ad apicem caul. congesta, oblonga, aculeata, muricata, ad medium nervum linea alba utrimq. longitudinaliter discurrente. Pedunc. rubri. Cor. alba, odora.
6. *uniflora*. P. scapo 1-fl. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 8. Moris. hist. 3. f. 12. tab. 10. f. 2. Riv. pent. irreg. tab. 137.*  
*In Europæ borealis sylvis*  $\mathcal{U}$ .  
 Scap. triental. teres, ad basin squamosus. Fol. petiol. subrotunda, serrata. Flos magnus, nu-

tans. Cal. subalbid. Petal. ovat-lanceol. marginē undulato, lactea.

664. STYRAX. Cal. inferus. Cor. infundibulifor. 5--6-part. Drupa 2-sperm.

1. *officinale*. S. *Syst. veg. ed. 14. Mill. ic. tab. 260. Lob. ic. 151. Cam. epit. 48.*

Stirace *Matth.*

*In Italia, Syria, Judæa h.*

Arbuse. Fol. alterna, petiolata, ovata, supra viridi-nitent. subtus tomentosa, *Mali Cotonæi* similia, sed min. Pedunc. sæpe 2-fl. Cor. alba.

665. SAMYDA. Cal. 5-part. colorat. Cor. o. Caps. intus baccata, 3-valv. 1-loc. Sem. nidulantia.

1. *parviflora*. S. fl. decandris: fol. ovat-oblong. utrimque glabris (nectar. 1-phyll. truncato). *Syst. veg. ed. 14.*

*Casearia &c. Jacq. amer. tab. 85. ed. 2. piç. tab. 127.*

*Arbor &c. Sloan. Jam. hist. 2. tab. 211. f. 2.*

*In America h.*

Arbuse. 15-ped. ramis diffusis. Fol. pollic. alterna, petiol. ovat-acumin. obtusa, ferrata, glabra. Pedunc. adgregati. Fl. candidi.

2. *nitida*. S. fl. octandris: fol. cordatis, glabris. *Syst. veg. ed. 14. Brown. Jam. tab. 23. f. 3.*

*In America h.*

Arbuse. 15-ped. ramis horizontal. Fol. varia, sesquipollic. alterna, breviter petiol. crenato-ferrata, nitida. Corymb. axillar. pollic. erecti. Fl. parvi, albi. Caps. 4-valv. rubicunda, aut atro-purpur. pulpa coccinea.

3. *spinosa*. S. fl. octandris; ramis spinosis. *Syst. veg. ed. 14. Guidonia &c. Plum. ic. 147. f. 1.*

*In America.*

Arbuse. 7-ped. ramis multis, junioribus inermibus. Fol. multa, sesquipollic. alterna, petiolat. ovata, acuta, leviter ferrata, glabra. Pedunc. axillar. breviss. 1-fl. Fl. conferti, candidi. Caps. Olivæform. 4-valv. purpureo-virescens, pulpa aurantiaca.

4. *pubescens*. S. fl. dodecandr. fol. ovatis, subtus tomentosis. *Syst. veg. ed. 14.*

*In America h.*

Arbor. Racemi axillar. longi. Fl. pallide lutei, odori. Caps. 5-valv.



5. *ferrulata*. S. fl. dodecandr. fol. ovat-oblong. argute ferru-  
latis. *Syst. veg. ed. 14.*

*Guidonia* &c. *Plum. ic. 146. f. 2.*

*In America* h.

Frutex 3-4-ped. Fol. alterna, subsessil. Fl. ma.  
subsessil. solitar. inodori, roseo-nivei. Caps.  
subrotund. 1-locul. 4-sulca.

666. COPAI- Cal. o. Petal. 5. Legum. ovatum. Sem. 1. aril-  
FERA. lo baccato.

1. *officinalis*. C. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. amer. tab. 86. ed. pi-  
da tab. 128.*

*In Brasilia*, , *Antillis* h.

Arb. procera, comosa. Fol. alterna, abrupte,  
vel impari-pinn. Foliol. 4-iuga, 2-3-pollic. al-  
terna, exceptis ultimis, breviter petiol. lan-  
ceol-ovat. altero latere angustiore, subcoriac.  
integerr. nitida. Racemi axillar. patentes. Pe-  
tal. alba.

*Eruiur Balsamum Coppave.*

667. BUCIDA. Cal. superus, 5-dent. Cor. o. Bacca 1-sperm.

1. *Buceras*. B. *Syst. veg. ed. Brown. Jam. tab. 23. f. 1.*

*Mangle* &c. *Sloan. Jam. hist. 2. tab. 189. f. 3.*

*In Jamaica* h.

*Adfinis Rhizophoræ*. Arb. 30-ped. cortice glau-  
co, hirsuto. Fol. 2. unc. longa, 1. lata, ter-  
minalia, conferta, petiolat, obovat. integerr.  
glabra, luteo-virid. Spicæ pl. terminal. pedun-  
cul.

## D I G Y N I A .

668. ROYE- Cal. urceolat. Cor. 1-pet. limbo revoluta.  
NA. Caps. 4-valv. 1-locul.

1. *lucida*. R. fol. ovatis, scabriuscul. *Syst. veg. ed. 14.*

*Staphylodendron* &c. *Comm. hort. 1. tab. 96.*

*Herm. parad. tab. 232.*

*Pissacia* &c. *Pluk. alm. tab. 63. f. 4. tab. 317.*  
f. 5. *Phytog. tab. 63. f. 4.*

*Ad cap. b. Spei* h.

Frutex 4-ped. cortice cinereo-obscurus, valde  
ramosus. Fol. inordinata, 2. unc. longa, 1.

## DECANDRIA DIGYNIA.

lata, acuta, subundulata, rigida, supra obscure virid. subrus dilute nitentia, brevibus pilis obsita. Fl. circa apicem ad folior. exortum, parvi, albidi. Fruct. rotundi, involuc. membranac. tumido, triangulari, sulcato, griseo-fusco.

2. *villosa*. R. fol. cordat-oblong. subtus tomentosis. *Syst. veg. ed. 14.*

*Ad cap. b. Spei h.*

*Simil. priori, sed rami villosi.* Fol. elliptica, seu oblong. breviter petiol. obtusiusc. petiolis villosis. Fl. axill. solitar. nutantes, pedunc. villosis. Bract. binæ, oppositæ, ovatæ, acutæ, pubescent. sub calyce, deciduæ.

3. *glabra*. R. fol. lanceol. glabris. *Syst. veg. ed. 14.*  
*Vitis idæa &c. Comm. hort. 1. tab. 65. Pluk. alm. tab. 321. f. 4.*

*Ad cap. b. Spei h.*

Caul. fruticosus, ramis brachiat. Fol. conferta, sparsa, Buxi, sed min. unguicular. subseffil. ovat---oblong. integerr. sempervirent. hilari virore nitent. glabra. Fl. axillar. multi, pedicellati, nutantes, albidi.

4. *hirsuta*. R. fol. lanceol. hirsutis. *Syst. veg. ed. 14.*

*Ad cap. b. Spei h.*

Altitudo humana. Fol. terminal. alterna, erecta, integerr. subtus reticulata, perennia.

5. *polyandra*. R. fol. ovatis, subtus tomentosis: stamin. plurimis. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*

*Ad cap. b. Spei.*

*Polyandra, & polygama.*

669. **HYDRANGÆA**. Capsl. 2-locul. 2-rostris, circumscissa.

1. *arborescens*. H. *Syst. veg. ed. 14. Duham. arb. 1. tab. 118. Mill. ic. tab. 251.*

*In Virginia h.*

Frutex ramis 4--gonis. Fol. magna, opposita, petiol. cordat-acumin. superiora ovata, serrata, glabra, venis alternis. Corymb. terminal. densi, ut in *Tino*, peduncul. opposit. brachiat. Fl. parvi, albi, odori. Stam. 8-10.

670. **CUNONIA**. Cal. 5-phyll. Cor. 5-petal. Capsl. acumin. 2-locul. polysper. Styli fl. longiores.

1. *capensis*. C. *Syst. veg. ed. 14.*

*Oosterdykia &c. Burm. afr. tab. 96.*

*Arbuseula &c. Pluk. alm. tab. 191. f. 4.*

*Ad cap. b. Spei h.*

Arb. alta, ramosa. Fol. opposita, impari-pinn.  
Foliot. sæpe 7. pollicem lata, digitum longa,  
opposita, petiol. lanceol. serrata, glabra, ve-  
nosa, supra virid. subtus subincana. Glandul.  
axill. spatiform. petiolat. Racemi bini, simplic.  
Fl. parvi.

671. TRIAN- Cal. sub apice mucronatus. Cor. o. Stam. 5-10.  
THEMA. Germ. retusum. Caps. circumscissa.

1. *monogyna*. T. fl. pentandr. monogynis. *Syst. veg. ed. 14.*

Portulaca &c. *Herm. par. tab. 213.*

Kali &c. *Pluk. alm. tab. 95. f. 4.*

Popularia cristallina. *Forsk. Æg. Vahl.*

In Jamaica, Curaçao ☉.

Caulicul. procumbent. cubito longiores, subdi-  
chot. e viridi--purpurasc. Fol. petiol. ovalia,  
obtusā, integerr. crassa, margine rubro; altero  
folio semper min. Petiol. 2--dent. Fl. axill.  
sessil. parvi. Cal. 2-phyll. Petal. 5. ovalia,  
rubra. Filam. 6-10.

2. *pentandra*. T. fl. pentandris, digynis. *Syst. veg. ed. 14.*

Portulacæ &c. *Pluk. alm. tab. 104. f. 3.*

In Arabia ☉.

Caul. erectus, pedal. teres, scabriusc. Fol. op-  
posita, petiol. elliptica, obtusiusc. integerr.  
erecto-patent. oleracea. Rami alterni, brevior-  
es. Fl. axill. congesti, subsessil. intus pallidi,  
extus virecent. Cal. 5-part. intus purpurasc.  
Cor. o.

3. *decandra*. T. fl. subdecandr. digynis. *Syst. veg. ed. 14.*

Zaleja &c. *Burm. Ind. tab. 31. f. 3.*

Gymnocarpus decandrum. *Forsk. Æg. ad hoc genus  
spectat. Vahl.*

In India ☉.

Herba statura *Glini*. Caul. herbaceus, diffusus.  
Fol. opposita, petiol. elliptica, integerr. gla-  
bra. Petiol. utrimq. membranac. Bract. mem-  
branac. Cal. 5-phyll. Cor. o. Filam. 10--raro 12.

672. CHRY- Cal. 4-5-fid. persistens, coloratus. Cor. o. Stam.  
SOSPLENIUM. 8-10. Caps. 2--rostris, 1-locul. polysper.

1. *alternifoli-* C. fol. alternis. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab.  
um. 366.*

Sedum &c. *Morif. hist. 3. f. 12. tab. 8. f. 8.*

In locis opacis humentibus, & ad fontium scaturi-  
gines Europæ 24.

Caul. apice ramosus, ramis corymbosis, bifidis.



Fol. longis petiol. decurrent. innixa, reniform. ferrata, subhirsuta. Fl. umbellati, sessiles, flavescent. micantes.

2. *oppositifolium*. C. fol. oppositis. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 365. Sabb. hort. 1. tab. 51.*

*Saxifraga* &c. *Dod. pempt. 316. Lob. ic. 312.*

*Sedum* &c. *Morif. hist. 3. f. 12. tab. 8. f. 7.*

*In Europæ, & Canadæ locis umbrosis, humentibus* 24.

*Adfine ninium priori*. Caul. spitham. dichotom. villosus. Fol. petiol. semiorbicular. dentata, succulenta, lutescentia. Fl. in umbellam planam dispositi, peduncul. lutei.

673. **SAXI- FRAGA**. Cal. 5--part. persistens. Cor. 5--petal. Caps. 2--rostris, 1-loc. polysperma.

\* *Fol. indivisis: caule subnudo.*

1. *Cotyledon*. S. folior. ora cartilaginea: caul. triplicato--ramoso: petal. immaculatis. *Hall. helv.*

S. fol. radicatis, aggregatis, lingulat. cartilagineo-ferrat. caule paniculato. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 241. All. Fl. Pedem.*

*Sedum* &c. *Dodart. mem. 4.*

*In alpibus Europæis* 24.

Fol. iuniora ovalia; adulta oblonga, & lanceol. marginibus reflexis, in cespitem disposita, limbo albo. Caul. nudus, ramissimus. Fl. paniculati. Petal. elliptica, lineata, alba.

*Differt a S. Aizoo, fol. mollioribus, & versus suam originem magis contrahis; ramis repetitoramosis; petalis longioribus, immaculatis.*

2. *mutata*. S. fol. radicalibus, aggregat. lingulat. cartilagineo-ferrat. caul. racemoso, folioso: calyc. villosus, & viscido. *Syst. veg. ed. 14. Hall. helv. 1. tab. 16.*

*In alpibus Italiæ, Helvetiæ &c.* 24.

*Hybrida, adfinis priori*. Fol. ad basin ciliato--villosa. Caul. cubital. firmior, simpl. fol. copiosioribus, magis viscidus. Racemi alterni, breves. Petal. diversa, lanceol. longa, ante efflorescentiam crocea.

3. *Aizoon*. S. fol. radicatis, aggregatis, lingulat. cartilagineo-ferratis: caul. subracemoso; calyc. glabro. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. Austr. 5. tab. 438. Lin. Fl. Lapp. tab. 2. f. 2. Segu. ver. 1. tab. 9. f. 1.*  
*In montibus, & alpibus* 24. Simil.

*Simil. S. Cotyledoni, sed paucifl. cum illa sit valde paniculata. Var. fol. oblongis, & subrot.*  
*4. pensylvani- S. fol. lanceol. denticulat. caul. nudo, panicula-*  
*ca. to: fl. subcapitat. Syst. veg. ed. 14. Dill. elth.*  
*tab. 253. f. 328.*

*Sanicula &c. Pluk. alm. tab. 59. f. 1. & tab. 222. f. 1.*

*In Amer. septentr.*

*Caul. 2--ped. & ultra, hirsutus, e cuius medio ramulos e ligula foliacea alternos emittit, villo rufo. Fol. radical. plura, magna, interiora surrecta; media obliqua, & subreflexa; exteriora reflexa, ad terram strata, figura Primulæ veris, consistentia Auriculæ, læte virid. nitida, nervo medio lato notata. Fl. pl. pro plantæ magnitudine parvi, pallide herbacci.*

*5. androsacea. S. fol. lanceol. obtusis, pilosis, caule nudo, (plerumque) 2-fl. Syst. veg. ed. 14. Jacq. Austr. 4. tab. 389. Hall. opusc. tab. 2.*

*S. pyrenaica. Scop. Fl. Carn. ed. 2. tab. 16. Secundum Jacq. Hall. Comm. nor. 1746. tab. 1. f. 3.*

*Sedum &c. Col. ecphr. 2. tab. 67. f. ultim.*

*In Austria, Helvetia, Sibiria &c. 24.*

*Fol. ad terram strata, pauca, subpetiol. crassula, integerr. vel subtrident. Caul. a fescuncia ad semiped. longus, paucifol. hirsutus. Cal. hirsutus. Petal. patula, obverse ovata, integerr. alba.*

*6. cæsia.*

*S. fol. linear. aggregatis, recurvatis, perforato-punctat. caul. multifl. Syst. veg. ed. 14. Jacq. Austr. 4. tab. 374. Fl. Carn. ed. 2. tab. 15. Segu. ver. tab. 9. f. 2.*

*Sedum &c. Moris. hist. 3. f. 12. tab. 7. f. 32. Scheuz. alp. tab. 21. f. 1.*

*Sedi species &c. Gesn. fasc. 24. tab. 11. f. 30.*

*In alpidibus Europæ, ad rupes 24.*

*Planta cespitosa. Caul. unc. subnudi, 3--4--fl. purpur. Fol. crassa, glauca, obducta crusta albida, basi ciliata. Petal. patent. ovata, obtusa, subemarginata, alba, lineolis 3. subvirid. striata. Varietas ex alpidibus Italicis, cuius caul. duplo ma: hirsutus, viscosus. Fol. quadruplo ma: patentia, fere S. Cotyledonis; dignoscenda punctis pertusis. Cul. magni, hirsuti.*

7. *burseriana*. S. fol. adgregatis, imbricat. subulat. triquetris, lævibus: caul. subnudo, 1-fl. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. misc. 1. tab. 17. f. 3. Segu. ver. 3. tab. 5. f. 2. Hall. act. helv. tab. 39.*

*In Taureio Raftadiensî, in Corinthia, & in monte Canzo Italiae 24.*

Facies *Sedi min.* Cespites sæpe integri late rupes obtegunt. Caul. fere pollic. alii steriles, alii florigeri, iique annotini. Scap. 2--3--pollic. sanguineo-ruber, albo-villosul. squamis brevibus, subulatis, villosulis, rubris, cum apice virescente, inordinate, & laxè sparsis oblitus. Flos terminal. ratione plantæ magnus. Cal. sanguineus, albo-villosus. Petal. integra, alba, lineis pallidis, vel albo--flavescent. aut subpurpure.

8. *sedoides*. S. fol. adgregatis, alternis, oppositisque, sublanceolat. fl. p. dunculat. *Syst. veg. ed. 14. Segu. ver. tab. 9. f. 4.*

*In alpinis Tridentinis, Sibiricis 24.*

Caul. ramosul. filiform. depressus. Pedunc. sæpe 1-raro 2-3-fl. Flos superus. Petal. ochroleuca.

9. *bryoides*. S. fol. imbricat. ciliat. inflexis: caul. nudiuscul. paucifl. *Syst. veg. ed. 14. Scop. Fl. Carn. ed. 2. tab. 15.*

*Sedum &c. Scheuch. alp. tab. 21. f. 2. Col. ecphr. 2. tab. 67. f. 1. 2.*

*In alpinis Helveticis, Pyrenæicis, & Pedemontii 24.*

Caul. triental. simplex, ruber, pubescens. Fol. serrata, serraturis sæpe apice callosis, basi ciliata, erecta, non reflexa, lanceol. rugosa, lucida, luteo-virid. radical. in orbem digesta; caulina 5-6. alterna, tenera. Fl. 1-pauc. Petal. flava, maculis fulvis.

10. *bronchialis*. S. fol. imbricat. subulat. ciliatis, spinosis: caul. subnudo, multifl. *Syst. veg. ed. 14. Gmel. Sib. 4. tab. 65. f. 2.*

*In Sibiria.*

Planta cespitosa. Stolones oblong. confertim imbricati. Caul. palm. nudiuscul. fol. aliquot minimis, mucronatis, margine lævibus, plerumq. inferius rubentibus. Panic. parva. Petal. apice sanguin.

11. *stellaris*. S. fol. serratis: caul. subnudo, ramoso: petal. acuminat. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 23. Scop. Fl. Carn. ed. 2. tab. 13. f. 2.*



*Sedum* &c. *Morif. hist.* 3. f. 12. tab. 9. f. 13.  
*Sanicula* &c. *Pluk. alm. tab.* 58. f. 2. & tab. 222.  
 f. 4. *Bauh. hist.* 3. p. 708.

*In Europæ alpinis* 24.

Planta cespitosa. Caul. subdichotom. Fol. lanceol.  
 vel elliptica. Cal. reflexus. Petal. alba, cum  
 2. maculis croceis ad unguem; guttulis purpur.  
 adspersa.

12. *crassifolia*. S. fol. ovalibus, retusis, obsolete ferratis, petiolat. caul. nudo: panicul. conglomerata. *Syst. veg. ed.* 14. *Linn. dec.* 2. tab. 14. *Buchoz. Dec.* 10. tab. 1. *Gmel. Sib.* 4. tab. 65. fig. mala ob paniculam.

*In alpinis Sibiria* 24.

Radix crassitie fere digiti. Fol. bina, palmar.  
 coriacea, nitida, glabra, petiolis lata basi,  
 rubro-viridibus. Gemmæ maximæ, toliol. 2-3.  
 ovatis, concavis, quorum unum se-po adhe-  
 rens attollitur. Scap. pedal. & ultra, crassitie  
 digiti, subpaniculat. ramis pedat. Fl. superi,  
 subnutant. campanulati. Petal. obovat. ruber-  
 rima.

13. *nivalis*. S. fol. obovat. crenatis, subsessil. caul. nudo:  
 fl. congestis. *Syst. veg. ed.* 14. *Fl. Dan. tab.*  
 28. *Fl. Lapp. tab.* 2. f. 5. 6. *Ray. Angl.* 3.  
 tab. 16. f. 1.

*In summis alpinis Lapponia, Virginia &c.* 24.

Scap. hirsutus. Fl. 5-6. congesti. Petal. alba,  
 quandoq. 7. *Interdum tota planta purpurascit.*

14. *punctata*. S. fol. subrotund. dentat. longe petiolat. caul.  
 nudo. *Syst. veg. ed.* 14.

*Sedum* &c. *Morif. hist.* 3. f. 12. tab. 9. f. 17.

*In Sibiria* 24.

Fol. minora quam in *S. Geo*, fere lobata, non  
 retusa, absque ora cartilaginea, dentibus acu-  
 tis. Petioli superne sensim dilatati in folium.  
 Fl. min. quam in *S. Geo*, fere inferi, albi-  
 dios, parva rubedine punctati.

15. *sarmentosa*. S. fol. radicalibus, subrotund. cordatis, crena-  
 tis: sarmentis axillaribus, radicanibus: race-  
 mo composito; cor. irregulari. *Syst. veg. ed.*  
 14. *Lin. Suppl.*

*S. stolonifera*. *Comm. Gott.* 1781. tab. 1. *Jacq.*  
*ic. rar. tab.* 15.

*In Japonia* 24.

Radix fibrosa. Caul. palmar. hirsutus, succulentus. Fol. radical. plurima: caulina alterna, petiol. subpeltata, cordato-orbicul. ciliata, supra satore virid. striis, maculisq. rubris; subtus rubicunda. Petioli fol. longiores, piloso-scabri. Petal. 3. min. erecta, albida, rubro inquinata; 2. ma. alba.

16. *umbrosa*. S. fol. obovatis, subretusis, cartilagineo-crenatis: caul. nudo, paniculato. *Syst. veg. ed. 14.* Geum &c. *Magnol. hort. tab. 8. Mill. ic. 141. f. 2.*

*In montibus apud Cantabros 24.*

*Adfinis nimium* S. Geo. Fol. basi minime cordata, crenis angulatis; petiolis ciliato-villosis. Fl. inferi.

17. *hirsuta*. S. fol. cordato-ovalibus, retusis, cartilagineo-crenat. caul. nudo, paniculato. *Syst. veg. ed. 14.*

Geum &c. *Magnol. hort. tab. 87.*

*In Pyrenæis 24.*

*Adfinis nimium* S. Geo, sed fol. ovalia, nec reniform. Cal. reflexus.

18. *cuneifolia*. S. fol. cuneiform. obtusiss. repandis: caul. nudo, paniculato. *Syst. veg. ed. 14. Scop. Fl. Carn. 2. tab. 13. f. 1.*

Coryledon &c. *Gesn. fasc. 19. tab. 12. f. 37. bene. Bauh. Hist. 3. p. 974. Math.*

*In alpinis Europæ 24.*

*Simillima* S. *um rose*, sed folior. margo non crenatus, at obtusissime repandus; sicuti & fol. longe min. Caul. dodrant. Fol. in petiolum decurrentia, subtus rubella. Spica rara. Cal. reflexus. Petal. obtusa, alba, cum macula flava.

19. *Geum*. S. fol. reniform. dentatis: caul. nudo, paniculato. *Syst. veg. ed. 14.*

Sedum &c. *Morif. Hist. 3. f. 12. tab. 9. f. 12.*

*In alpinis Europæ 24.*

Caul. fere ped. ramosus. Fol. erecta, varia, ovata, vel subcordata, petiolis villosis. Cal. reflexus. Petal. alba, in medio punctata.

\*\* *Fol. indivisis: caule folioso.*

20. *oppositifolia*. S. fol. caulinis oppositis, imbricatis; summis ciliatis. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Den. tab. 34.*

*All. Fl. Ped. tab. 21. f. 3. Fl. Lapp. tab. 2. f. 1.*

*Sedum &c. Moris. hist. 3. f. 12. tab. 10. f. 36.*

*Varietas sterilis Gesn. fasc. 26. tab. 9. f. 3.*

*In alpinis Italicis, Pyrenaicis &c. 24.*

Caul. breves, filiform. dependentes, repentes.

Fol. sessilia, quadrifariam imbricata, dura, obscura, acumin. apice cartilagineo. Flos terminalis, solitar. sessilis. Cal. non ita patens.

Petal. ovalia, primum purpur. dein cœrul. raro alba, lineata. *Variat caul. 4-gono; & fol. calvis.*

21. *aspera*. S. fol. caulinis alternis, lanceolat. ciliatis: caulibus procumben. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. Austr. 5. tab. 31. Scheuz. it. 2. tab. 20. f. 3.*

*Sedum &c. Gesn. fasc. 22. tab. 6. f. 27. Moris. hist. 3. f. 12. tab. 10. f. 25.*

*In alpium saxosis irriguis 24.*

Caul. dodrant. debiles, 3 5-fidi. Fol. radicalia imbricata, ovat-acumin. nuda, vel subciliata.

Fl. 3-4. superi. Cal. viridis, oris albis. Petal. albida, ungue luteo, apice mucronato.

22. *Airculus*. S. fol. caulinis lanceol. alternis, nudis, inermibus: caul. erecto. *Syst. veg. ed. 13. Fl. Dan. tab. 200. Gmel. Sib. 4. tab. 65. f. 3. Breyn. cent. tab. 48. Hall. helv. tab. 11.*

*In Helvetia, Sibiria &c. 24.*

*Differt a S. autumnali fol. numquam ciliatis: fl. paucioribus, latioribus, lineatis. Caul. simpl. ped. purpur. sub fl. hirsutus, sæpe 2-fl. Fol. ima latiora, ovata. Pedunc. pubescent. Flos magnus. Cal. reflexus. Petal. ovato-lanceol. nervosa, flava punctis fulvis.*

23. *aizoides*. S. fol. caulinis lineari-subulat. sparsis, nudis, inermibus: caulibus decumbentibus. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 72.*

*Sedum &c. Moris. hist. 3. f. 12. tab. 6. f. 3.*

*Sedum 6. Clus. hist. 2. p. 60.*

*In alpinis Lapponicis, Baldo &c. 24.*

Caul. 1-pl. palmar. Fl. magni. Cal. patens, longitudine cor. Petal. ciliata, flava, punctis croceis.

25. *autumnalis*. S. fol. caulinis linear. alternis, ciliatis: radicalibus adgregatis. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Gern. 2. tab. 14. Breyn. cent. tab. 48.*

## DECANDRIA DIGYNIA.

*Sedum* &c. *Morif. hist.* 3. f. 12. tab. 8. f. 6.  
*In lo is humentibus* 24.

*Videtur varietas S. aizoidis.* Caul. subdiffusi, dodrant. foliosi, villosi. Fol. sessil. Pedunc. 1-2-fl. Fl. 4 14. inferi. Cal. corolla longe brevior. Petal. ligulata, patentia, flava; adulta croceis punctis supra variegata; quandoq. aurantiaca, cum venis purpur.

26. *rotundifolia.* S. fol. caulinis renifor. dentat. petiol. t. caule paniculato. *Syst. veg. ed.* 14. *Mill. ic. tab.* 141.

*Sanicula* &c. *Gesn. fasc.* 19. tab. 10. f. 25. *Cam. epit.* 764.

*In alpinis Helveticis* &c. 24.

Caul. pedal. foliosus. Fol. ima longe petiol. Panicula dichotoma, laxa. Fl. inferi. Petal. lanceol. alba, punctata.

27. *granulata.* S. fol. caulinis renifor. lobatis: caule ramoso: radice granulata. *Syst. veg. ed.* 14. *Fl. Dan. tab.* 514. *Black. tab.* 56. *Ludw. ed. tab.* 120. *Dod. penst.* 316.

S. IV. *Matth.*

*In Europæ apricis* 24.

Caul. pedal. villosus, pallide rubens. Fol. radical. longe petiol. lobata, pingua, dilute viridia, subhirsuta, petiolis basi dilatatis. Fl. paniculati, longe peduncul. Cal. profunde 5-fid. Petal. alba. Germ. inferum. *Var. fl. pleno.*

\*\*\* *Fol. lobatis: caulibus erectis.*

28. *bulbifera.* S. fol. palmato-lobat. caulinis sessil. caule ramoso, bulbifero. *Syst. veg. ed.* 14. *Col. ecphr.* I. tab. 317.

*Sedum* &c. *Morif. hist.* 3. f. 12. tab. 9. f. 24.

*In Italix pratis saxosis, umbrosis* 24.

*Videtur var. prioris. Germen inferum.*

29. *cernua.* S. fol. caulinis palmat. petiolat. caule simpliciss., 1-fl. bulbifero. *Syst. veg. ed.* *Fl. Dan. tab.* 22. *Gunn. norv. tab.* 8. f. 2. *Fl. Lapp. tab.* 2. f. 4.

*In alpinis Lapponicis* 24.

Fol. caulina glabra; magis palmata, & germen supra receptacul. magis quam in priore. Flos parum nutans. *Var. caule ramoso.*



30. *rivularis*. S. fol. caulinis palmat. summo florali ovato: caule simplici, sub-2-fl. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 118. Fl. Lapp. tab. 2. f. 7.*  
*Ad alpium Lapponicarum rivulos.*  
 Fol. omnia, potissimum radical. longe petiolata, 5-quandoq. 3-loba. Petal. alba.
31. *geranioides*. S. fol. radicalibus renifor. quinquelobis multifid. caulinis linear. caule subnudo, ramoso. *Syst. veg. ed. 14. Gouan. Illust. tab. 18. f. 2.*  
*In Pyrenæis.*  
*Habitus S. rotundifoliæ.* Rad. stolonifera. Caul. pedic. pubescens, viscosus. Fol. glabra. Pedunc. axill. 3-raro 5-fl. Cal. urceolatus ut in *Rosâ*, dein elongatus, fructu longior. Petal. magnitudine *S. granulata*, alba.
32. *aiugifolia*. S. fol. radicalibus palmato-5-part. caulinis linear. indivisis; caulibus adscendent. multifl. *Syst. veg. ed. 14.*  
*In Galloprovinciæ montibus.*  
 Caul. filiform. Stolones, antequam fol. emittant, hirsuti. Fl. 3-5. pedunculati.
33. *sibirica*. S. fol. caulinis renifor. palmatis, pilosis: caulibus, pedunculisq. filiformibus. *Syst. veg. ed. 14.*  
*In Sibiria.*  
 Radiculæ capillar. Fol. radical. petiol. lobis ovatis, petiolis hirsutis. Caul. semiped. adscendens. Pedunc. terminal. & laterales longissimi, 2-fidi. Flos maiuscul. inferus, albus.
34. *tridactylites*. S. fol. caulinis cuneifor. (plerumq.) 3-fid. alternis; caul. erecto, ramoso. *Syst. veg. ed. 14.*  
*Paronychia &c. Black. tab. 212. Dod. pempt. 113. tertia. Tabern. 85.*  
*In Europæ arenosis & muris ☉.*  
 Caul. 3-4-unc. ramosus, subruher. Fol. succulenta, villosa, viscida; radical. longe petiol. caulina quandoq. integerr. ovata; iuniora lanceol. Pedunc. nudi, 1-fl. Petal. ovata, alba, aut purpur.
35. *petraea*. S. fol. caulinis palmato-tripart. lacin. sub-3-fid. caul. ramossiss. laxo. *Syst. veg. ed. 14. Gouan. Illustr. tab. 18. f. 3. Poir. bald. f. 337. Pluk. alm. tab. 222. f. 3.*  
*Sedum &c. Moris. hist. 3. f. 12. tab. 9. f. 28.*  
*In alpinis 24.*

*Adfinis priori, sed caul. ramosiss. quadruplo ma.*  
Caul. ped. & ultra, ramosiss. villosus, basi  
purpur. Fol. ramea linear. integerr. raro den-  
tata. Rami axill. multifi. Petal. alba, aut sul-  
phurea.

36. *adscendens*. S. fol. caulinis cuneifor. apice dentatis: caule  
adscendente, subvillosus. *Syst. veg. ed. 14. Al-*  
*lion. Fl. Ped. tab. 22. f. 3. Specim. tab. 3. f.*  
*1. sed fol. minus divisa.*

*In alpibus Pedemontii ☉.*

*Differt a priore; nam fol. longe villosi, sepe 5-*  
*fid. Flos longe maior. Habitat S. tectorum, sed*  
caul. altior, semiped. valde ramosus, & mul-  
tifi. Fol. ad terram lata, ovata, palmata,  
dein 3-dent. hirsuta: caulina late palmata,  
etiam simplic. Pet. l. ovat-lanceol. alba, aut  
cum 3. lineis roseis.

37. *caespitosa*. S. fol. radicalibus adgregat. linear. integris, tri-  
fidisq. caul. erecto, subnudo, subbifi. *Syst.*  
*veg. ed. 14. Fl. Din. tab. 71. Fl. Carn. 2.*  
*tab. 14. Hall. opusc. Bot. tab. 1. Segu. ver. tab. 9.*  
*f. 4.*

*Sedum &c. Gesn. fasc. tab. 6. f. 31.*

*Tridactyrites &c. Bauh. hist. 3. p. 762.*

*In alpibus 24.*

Planta caespite lato, glabra, ramulis summis  
viscidis. Fol. varia, semper virid. modo li-  
gulata, modo ovata, integra, vel apice acu-  
te dentata, aut trilobata. Caul. humilis, tri-  
entalis: paucis, integris, raro 3-fid. ligulis  
adpersus. Petal. ovat. flava, quandoq. sub-  
virid. per ætatem rubore al quo, ut totus caul.  
donata. *Var. etiam magnitudine.*

38. *moschata*. S. fol. radicalibus adgregat. linear. integris, 3-  
fidisq. una cum caule glutinosi, hirsutis: fl.  
longe pedunculat. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. misc.*  
*2. p. 128. tab. 21. f. 21.*

*Sedulum. Gesn. fasc. tab. 6. f. 31.*

*Habitat*

Rad. repens, rufa. Cespit. ampliss. læte virent.  
& ex virore flavescent. Fol. S. muscoidi simi-  
lia, sed longiora, & angustiora, pilis deci-  
duis. Caul. erectus, teres, præditus fol. spar-  
sis, lingularis, plerumq. integris, versus ap-  
icem preliifer. Fl. 3-6, similes S. muscoidi,

sed odori, petalis tantisper longioribus, nec lineatis. Color idem, sed dilute citrinus.

39. *groelandi-sa.* S. fol. caulinis palmatis, sparsis, lacin. acutis: caule erecto. *Syst. veg. ed. 14. Gunn. norv. tab. 7. f. 1. Dill. elth. tab. 35. f. 329.*

*In Groelandia, & in alpinis Helveticis &c.*

*Videtur var. S. cespitosæ. Planta subhirsuta, & viscida. Caul. pumilus, erect. 2-3-fl. Fol. dense imbricata, sessil. plerumq. 3-sid. nonnulla linear. & subcuneifor. Cor. recens alba; sicca flavescentes.*

\*\*\* *Fol. lobatis; caulibus procumbentibus.*

40. *cymbalaria.* S. fol. caulinis cordatis, trilobis, integrisq. caulibus procumbent. *Syst. veg. ed. 14. Buxb. cent. 2. tab. 45. f. 2.*

*In Oriente.*

Caulic. numerosi, parvi. Petal. lutea.

41. *hederacea.* S. fol. caulinis ovatis, lobatis: caul. filiform. flaccido. *Syst. veg. ed. 14.*

*In Creta.*

Planta parva.

42. *hypnoides.* S. fol. caulinis linear. integris, trifidisq. stolonibus procumbent. caul. erecto, nudiusculo. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 348. Fl. Carn. tab. 16. All. Fl. Ped. tab. 21. f. 4.*

*Sedum &c. Moris. hist. 3. f. 12. tab. 9. f. 26.*

*Sedum VII. Clus. paun. p. 491.*

*In alpinis &c.*

*Adfinis S. cespitosæ. Planta viscosa. Caul. 3-unc. villis glandulosis, adultus ruber. Fol. longe petiol. cuneifor. trident. ima obtusa: caulina alterna, sessil. sursum latefcent. Pedunc. in summo caule foliosi, 2-3-fl. Petal. suberecta, obtusa, vel emarginata, alba. Var. stolonibus gemmiferis.*

*trichodes,*

*S. Scopol. Fl. Carn. tab. 15.*

*S. muscoides. All. Fl. Ped. tab. 61. f. 2.*

*S. alpina &c. Segu. ver. tab. 9. f. 3. Hall. helv. n. 985.*

*In Carniolæ, & Pedemontii locis irriguis alpinum &c.*

Laxos cespitulos constituit. Caul. tenues, prostrati ramos erigunt. Fol. lanceol. villosa. Pedunc. filiform. fol. longiores, sæpe 1-fl. Petal. lacteo-virid. calycin. dentibus breviora.

## DECANDRIA DIGYNIA.

*Allionianæ*, & *Hallerianæ* fol. *acuminata non sunt*, ut exhibet ic. Scop.

*Differt a reliquis speciebus cauliculis simplicibus: fol. integerr. oblong-ovat. teneris, luteo-viridibus.*

*biflora.*

*S. fol. imbricat. ovatis: caulibus reptantibus, bifloris. Hall. helv. n. 981. All. Fl. Ped. tab. 21. f. 1.*

*In editioribus scopulis alpium 24.*

*Ad instar S. oppositifoliæ ex radice, saxorum rimas penetrante, cespitem cauliculor. filiformium facit, qui varie, & dense ramosi sunt. Juxta cauliculor. longitudinem dense positæ oriuntur folior. rosulæ, ex quibus caulicul. aut ramus erigitur uncial. 1-2-fl. Flos magnus, pulchre roseus, petal. ovat-acutis, duplo calyc. amplioribus. Stam. purpur. Fol. sessil. hirsuta, pilis ciliata, non reflexa, obscura, in ramis floriferis etiam alterna. Tota planta plerumque valde viscida.*

*Bellardi.*

*S. acaulis; fol. cuneiform. 3-5-lobis. All. Fl. Ped. tab. 83. f. 1.*

*In scopulosis humidis, viscosis secus rivulos 24.*

*Rad. fibrosa, ex qua cespes rosularum. Fol. hirsuta, non lineata, obscure virent. lobo intermedio maiore, & obtusiusculo. Ex centro rosularum flos plerumq. unicus, raro 2-3. hi sessiles, petalis elliptic. albiss.*

*exarata.*

*S. fol. palmato-trifidis, superne lineatis, hirsutis: caul. adscendente, multifloro: petalis trinervosis. Vill. prosp. All. Fl. Ped. tab. 88. f. 2.*

*In scopulis alpium, præsertim (otiarum 24.)*

*Simil. S. hypnoidi, sed differt caule humiliore; fol. brevius lingulat. sæpius 5-dent. nervoso-lineatis.*

*Ad radicem fol. plura rosulam effrangentia, cuneifor. 3-5-fida. Caul. rubent. viscosi, & hirsuti, ramosi; fol. plerumq. simplic. integerr.*

*Petal. calyce maiora, elliptica, pallide sulphur.*

*pedemontana. S. caule erecto, subnudo: fol. trilobis, & trident. caulinis palmatis. All. Fl. Ped. tab. 21. f. 5. 6.*

*In alpibus, e summorum rupium fissuris 24.*

*Ad radicem rosula fol. quæ ex angusto principio triangulariter amplificantur, lobis 3-4-dent. Fol. caulinum unicum. Fl. terminales, umbellati. Flos patens, albus, petal. calyce longioribus. Tota planta viscida, & hirsuta; quæ aliquando etiam faciem induit.*



*media.*

*S. fol. radicalibus aggregat. ligulat. cartilagineis, integerr. margine supra punctatis: caul. ramoso. Gouan. Illust.*

*Habitat . . . . .*

*Differt a S. mutata.* Caul. palm. simpl. viscosi, villosi. Fol. radical. basi tantum ciliata, mucronata: caulina pauca, alterna, villosiss. glutinosa. Racemi simpl. Pedunc. 1-fl. nudi, valde pilosi, purpur. Cal. coloratus, villosiss. Cor. purpuro-cœrul. Petal. obtusa, vix calycem superantia, quibus a *S. mutata* differt.

*Clusii.*

*S. fol. cuneifor. semident. caul. paniculato, folioso. Gouan. Illust.*

*In montibus 24.*

Caul. palm.-ped. ramosus, villosus-viscidus. Fol. omnia uniform. villosa, viscida, in petiolum adtenuata. Racem. axill. dichot. multifi. Cor. alba.

*retusa.*

*S. propaginibus prostratis: fol. oppositis, 4-fariam imbricat. punctatis, triquetris, acutis: fl. terminal. geminatis. Gouan. Illust. tab. 18. f. 1.*

*S. purpurea. All. Fl. Ped. tab. 21. f. 2.*

*In summis scopulosis iugis, & uberius in alpidibus Cottiis 24.*

*Differt ab omnibus varietatibus S. oppositifoliae.* Cauliculi pl. humifusi, ramulis axillar. confertis. Fol. in rosulas densas disposita, retusa instar *Alcæretusæ* acuminata, reflexa, glabra, ad oras versus basin quandoq. ciliata: in caulibus dense congesta, imbricata; in ramis florigeris opposita, & rara. Cor. purpuro-cœrul. ut in *S. oppositifolia*, expansa, sicuti calyx. Caps. valde mucronata.

*orientalis.*

*S. fol. radicalibus, rameisq. 5-7-lobat. summis integerr. 2-fidisq. caul. ramosiss. basi decumbente. Jacq. Obs. Bot. P. II. tab. 34.*

*Geum orientale &c. Tourn. Cor.*

674. TIARELLA. Cal. 5-part. Cor. 5-petal. calyci inserta, petal. integris. Caps. 2-valv. 1-locul. valvula altera ma.

1. *cordifolia.* T. fol. cordatis. Syst. veg. ed. 14.

Cortusa &c. Herm. par. tab. 129.

*In Amer. & Asia septentr. 24.*

Caul. plane aphyllus, simpl. filiform. Fol. *Mitellæ diphyllæ* simil. obscura, sublobata, crenis cre-

brionibus. Fl. terminal. alterni, patuli. Petal. lanceol. acumin. plana.

2. *trifoliata*. T. fol. ternatis. *Syst. veg. ed. 14.*

*In Asia boreali 24.*

Caul. erectus; semiped. filiform. piloso--scaber. Fol. petiol. radicalia pauca; caulina sæpius 2. altero versus radicem, altero in medio caulis versus racemum. Foliol. angulata, serrata, pilosa, medio rhombæo; lateralibus trapeziform. Racemus terminal. semiped. constans corymbis raris. Petal. vix calyc. longiora.

*unifolia*.

T. caul. 1-fol. fol. omnibus cordatis. *Retz. Obs. fasc. 3.*

*Habitat . . . . .*

Minor T. *cordifolia*; fol. haud lobatis; scapo paucifl. foliolo fere sessili.

675. MITELLA. Cal. 5-fid. Cor. 5-petal. calyci inserta; petal. pinnatifid. Caps. 1--locul. 2--valv. valvulis æqualibus.

1. *diphylla*. M. scapo diphylo. *Syst. veg. ed. 14.*

Cortusa &c. *Mentz. pug. tab. 10.*

Sanicula &c. *Dodart. mem. 299. cum fig.*

*In America septent. 24.*

Scap. ped. simpl. filiform. Fol. caulina 2. opposita, subsessil. lacinulata, & inæqualiter serrata; radicalia petiol. angulata, 3. pollic. longa. Fl. terminal. alterni, breviter peduncul. Petal. undiq. ciliata, albo-rubentia.

2. *nuda*.

M. scapo nudo. *Syst. veg. ed. 14. Gmel. Sib. 4. tab. 63. f. 2.*

*In Asia boreali 24.*

Scap. dodrant. simpl. filiform. multifl. Fol. priorum similia, radical. longe petiol. cordato-reniform. hirsuta, supra virid. subtus albescent. Pedunc. distantes, incurvi. Petal. lanceol. utrimq. acumin. patentia, caule paulo longiora. Caps. e rotundo-acumin.

676. SCLE-RANTHUS. Cal. 1-phyll. semi-5-fid. segment. acutis, margine coloratis. Cor. o. Sem. 2. calyce inclusa, hinc convexa, inde plana.

1. *annuus*. S. calyc. fructus patulis. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 504. Gmel. Sib. 3. tab. 6. f. 2.*

Polygonum &c. *Tabern. hist. 1217.*

*In Europæ arvis arenosis ☉.*

Caul. digital. a basi ramosus, crebro geniculat. erectus, donec a feminum pondere decumbat. Fol. sequenti simil. fasciculata, longiora. Fl. fastigiati. Cal. lacin. acutis, vix albido-marginatis.

2. *perennis*. S. calyc. fructus clausis. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 563. Gmel. Sib. 3. tab. 6. f. 1.*

Knavei. *Raii. Angl. 3. tab. 5. f. 1.*

Alchimilla &c. *Vaill. parif. tab. 1. f. 5.*

Polygonum &c. *Tabern. hist. p. 1215.*

Polygonum cocciferum. *Cam. epit. p. 691.*

*In Europæ campis apricis, arenosis &c.*

Caul. pl. 4 6-unc. semiprocumben. filiform. geniculati, superne dichotomi. Fol. glauco-virid. & crebriora, opposita, linear. angusta, inferne latiora. Fl. ramei, congesti, breviter peduncul. albi, cum linea viridi.

3. *polycarpus*. S. calyc. fructus patentiss. spinosis: caul. subviloso. *Syst. veg. ed. 14.*

Polycarpus. *Dalech. hist. 444.*

Vermiculata &c. *Col. ecphr. 1. tab. 294.*

*Habitat Monspeli, & in Italia &c.*

Fl. per totam longitudinem caulis diffusi.

677. GYPSO-PHILA. Cal. 1--phyll. campanulat. angulatus, persistens. Petal. 5. ovata, subsessil. Caps. globosa, 1--locul. polysper.

2. *repens*. G. fol. lanceol.-linear. flaminibus cor. emarginata brevioribus. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. Austr. 5. tab. 407. Ger. prov. tab. 15. f. 2.*

Alsine &c. *Buxb. cent. 3. tab. 60.*

*In montibus &c.*

Planta glabra. Caul. semiped. undiq. diffusi, ramosi, superne subnudi. Fol. opposita, sessil. sæpe curva, pulposi, glauca. Stipul. sub fl. breves. Paniculi imperfecte trichotomia. Cal. margine albo. Petal. calyce duplo longiora, patent. leviter emarginata, pallide rosea, vel alba.

2. *prostrata*. G. fol. lanceol. lævibus: caulibus diffusis: pistillis cor. campanulata longioribus. *Syst. veg. ed. 14.*

Alsine &c. *Pluk. alm. tab. 75. f. 2.*

*In alpidibus &c.*

Caul. pl. diffusi, læves, subpedal. ad genicula rufescentes. Panicul. brachiata. Petal. obtusa, patent. apice canaliculata, alba. Anth. flavæ.

## DECANDRIA DIGYNIA.

*Simil. priori, sed radix vix repens. Caul. geniculatus minus purpurascens. Fol. minus carnosus. Cal. foliolis non carinatis. Cor. minor, albus, nec subrubens. Anth. flavæ. Styli divergentes.*

3. *viscosa*. G. fol. lanceol. internodiis caulibus, ramorum, & peduncul. medio viscosis: petal. emarginatis. *Syst. veg. ed. 14. Comm. Gott. 1783. tab. 3.*

*Habitat . . . . .*

4. *adscendens*. G. fol. lanceol.-linearibus: caulibus prostratis: cor. flaminibus, & pistillis ejusdem longitudinis. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. hort. 2. tab. 138.*

*Habitat . . . . .*

Caul. pl. herbacei, procumbent. tandem adscendent. foliosi, basi purpurasc. Rami multi, fol. opposita, sessil. acutiuscula, integerr. pulpa glauca. Petal. obverse ovata, carneo-albida.

5. *paniculata*. G. fol. lanceol. scabris: cor. revolutis. fl. dioicis. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. Austr. 5. tab. 1.*

*In Sibiria, Tataria desertis sabulosis 24.*

Caul. pl. sesquiped. humifusi, nodosi, inferne villosi, subscabri; a quorum medio rami adscendentes, ped. patentissime ramosi, foliosi, glabri, pallent. nitidi. Fol. opposita, sessil. acuta, margine scabra, integerr. subglauca. Fl. valde paniculati. Petal. cæteris speciebus min. revoluta, alba. Stam. in fundo floris sterilia latent. Styli longiores cor. incurvi.

6. *altissima*. G. fol. lanceol. subtrinerviis: caulibus rectis. *Syst. veg. ed. 14.*

*Lychnis &c. Gmel. Sib. 4. tab. 60.*

*Caryophyllus &c. Bocc. mus. tab. 5. f. 3.*

*In Sibiria 24.*

*Differt a seq. magnitud. dupla, vel quadrupla omnium partium. Rad. ampla, circa quam fol. fasciculat. sessil. satore viridia, succosa. Caul. pl. cubital. glabri, genicul. rubentibus. Fol. longitudine, & latitudine digiti: caulina sessil. oblong. obtusa, crassa, subtus glauca. Corymb. terminal. Fl. exigui, albi.*

7. *frutium*. G. fol. linear. carnosis; axillaribus confertis, teretibus. *Syst. veg. ed. 17.*

*Kali &c. Barr. rar. tab. 119. Bocc. mus. 2. tab. 122.*

*In Hispania 24.*

Caul. inferne fruticos. ex alis fol. rudimenta fo-



liacea. Fol. carnosa, femiteretia, internodiis longiora. Cor. alba.

*Saponis loco veteribus, & hodie Hispanis.*

8. *fasciata*. G. fol. lanceol-linear. obsolete triquetris, obtusis, lævibus, secundis. *Syst. veg. ed. 14.*

Lychois &c. *Gmel. Sib. 4. tab. 61. f. 1.*

Saponaria &c. *Hall. jen. tab. 2. f. 1.*

Polygonum &c. *Mentz. pug. tab. 2. f. 2.*

*In rupibus 24.*

Caul. ped-cubit. ante florescentiam procumbent. ramosi, nodosi, superne visci, umbellati. Fol. pulposa, glauca; radical. plurima; caulina pauca; summa ovat-lanceol. Fl. congesti, breviter peduncul. Cal. ex livido varius. Petal. ovata, rosea.

9. *perfoliata*. G. fol. ovat-lanceol. femiamplexicaul. *Syst. veg. ed. 14.*

Spergula &c. *Dill. elth. tab. 276. f. 357.*

*b. G. tomentosa.*

Linum &c. *Barr. ic. tab. 1002.*

*In Hispania, & Oriente 24.*

Caul. sesqui--2--cubit. nodosi, glauci, ramis ramulosis. Fol. cleracea, subcarnosa, glauca; super. lanceol. glaberr. infer. scabra, *Saponaria* æmula. Fl. undiq. sparsi, primum purpurasc. dein pallidiores, tandem candicantes. *Var. tota tomentosa.*

10. *muralis*. G. fol. linear. planis: calyc. aphyllis: caule dichotom. petalis crenatis. *Syst. veg. ed. 14.*

Lychnis &c. *Mentz. pug. tab. 7. f. 4.*

Spergula &c. *Eph. nat. cur. cent. 6. tab. 4.*

*Ad vias, & inter stipulas ☉.*

*Similis G. saxifragæ, sed caret squamis calycinis.*

Planta minima. Caul. triental. ramosus, valde brachiatus. Fol. filiform. Fl. laxè pedunculati. Pedunc. longi, 1-fl. Cal. margine albo. Petal. rosea.

11. *rigida*. G. fol. linear. planis: caule dichotomo: pedunc. 2-fl. petal. emarginatis. *Syst. veg. ed. 14.*

*Tunica minima. Dalech. hist. 1191.*

*Habitat Monspelii &c. 24.*

Caul. brachiatus. Fol. viscosa. Fl. sparsi, minimi. Petal. vix calyc. superantia, rubella.

12. *saxifraga*. G. fol. linearibus: calyc. angulatis, squamis quatuor: cor. emarginatis. *Syst. veg. ed. 14.*

## DECANDRIA DIGYNIA.

Betonica &c. *Bauh. hist.* 3. p. 337.

Lychnis &c. *Barr. rar. tab.* 998.

*In Austria, Italia &c.* 4.

*Pertinet ad Dianthi genus.* Caul. palmar. cespitosus, filiform. ramosiss. dichotomus. Fol. acuta. Fl. longe peduncul. Petal. incarnatopallida, basi striis purpur. obsoletis. *Stam. etiam 8. & pauciora.*

678. SAPO- Cal. 1-phyll. nudos, tubulosus, 5-dent. persi-  
NARIA. stens. Petal. 5. unguicular. Caps. oblong. 1-  
locul. polysper.

1. *officinalis.* S. calyc. cylindric. fol. ovat-lanceol. *Syst. veg.*  
*ed.* 14. *Fl. Dan.* 543. *Ludw. ed. tab.* 170.  
*Knorr. del.* 1. *tab.* S. 17. *Black. tab.* 113.  
*Cam. epit.* 152.

b. *S. hybrida.* *Mill. dict.*

*S. concava* &c. *Morif. hist.* 3. f. 5. *tab.* 22. f. 52.

*Gentiana fol. convoluta.* *Bauh. hist.* 3. p. 521.

*In Europa media* 4.

Caul. cubital. Fol. opposita, sessil. subconnata, integerr. trinervia, glabra. Pedunc. 3-fl. medio simplici. Petal. pallide rosea. *Var. fl. pleno.*

2. *vaecaria.* S. calyc. pyramidatis, 5-angular. fol. sessilibus, ovatis, acuminat. *Syst. veg. ed.* 14. *Dod. pempt.* 104.

*Myagrum* &c. *Tabern.* p. 866.

*Inter segetes* ☉.

Planta pallide virens, in summis alis ramosa.

Caul. erectus, cubital. brachiatus, firmus.

Petal. exigua, crenulata, rosea.

3. *cretica.* S. calyc. 5-angular. striatis: caul. erecto, subdichoto: fol. subulatis. *Syst. veg. ed.* 14.

*Saxifraga* &c. *Alp. exot. tab.* 291.

*In Cretæ aridis.*

Caul. pedal. teres, angustus, villosus-viscidus.

Fol. lævia. Pedunc. axill. solitar. 1-fl. stricti

Flos erectus. Cal. oblong. acutus, inter dentes membranac. Petal. parva, integra, purpur.

4. *porrigens.* S. calyc. cylindric. pubescentibus: ramis divaricatis. fructibus pendulis. *Syst. veg. ed.* 14.

*Jacq. hort.* 3. *tab.* 109.

*Lychnis* &c. *Morif. hist.* 3. p. 541. *fig. mala.*

*In Oriente* ☉.

*Habitus*

*Habitus fere Ceraſtii dichotomi*. Caul. erectus, 2-ped. articulatus, rigidulus; inferne glaber, superne pubescenti-viscidus. Fol. opposita, sessil. lanceol. integerr. inferiora glabra; super. sub ramificationibus pubescent. viscida. Pedunc. axill. capillar. longitudine fol. laxi, patentes, solitar. 1-fl. dum fructiferi penduli. Petal. emarginata, lacin. brevibus, subincarnata.

5. *illyrica*. S. calyc. subcylindric. caul. erecto, viscido-purpureo. ramis alternis: cor. punctata. *Syst. veg. ed. 14. Ard. sp. 2. tab. 9.*

*In Illiria.*

Planta erecta, spitham. tenera, viscoso-pubescent. Fol. lineari-lanceol. glabra. Cal. marginem membranaceum. Petal. integra, alba, punctatis 3. purpur. Anth. violac.

6. *ocymoides*. S. calyc. cylindric. villosis: caulibus procumbentibus, dichotom. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. Austr. 5. tab. 23. Bauh. hist. 3. p. 344. Lob. ic. p. 341.*

*In petrosis umbrosis* 24.

Caul. spitham. ramosi, nodosi, infracti, viridirubent. Fol. radical. petiol. perfecte ovata; caulina elliptico-lanceol. hirsuta, subviscida. Fl. umbellati. Cal. ventricosus. Petal. ovata, integra, purpur. subrus albido-rubella.

7. *orientalis*. S. calyc. cylindric. villosis: caul. erecto, parvulo, dichotomo. *Syst. veg. ed. 14.*

*Lychnis &c. Dill. elth. tab. 167. f. 204.*

*In Oriente, Carniola* ☉.

Fol. subsessil. lineari-lanceol. carnea, glabra, glauco-virid. Cal. elevatus, adpersus punctis elevatis, piliferis. Petal. angusta, 2-fid. non unguiculata, rosea.

8. *lutea*. S. calyc. teretibus: cor. coronatis: fl. subumbellatis: fol. sublinear. canaliculatis. *Syst. veg. ed. 14. All. Fl. Ped. tab. 23. f. 1. & specim. pedem. tab. 5. f. 2.*

*b. Globularia &c. Col. ceph. 1. tab. 153.*

*Lychnis &c. Barr. ic. 498. Bocc. mus. 2. tab. 62. f. 1.*

*In alpinis* 24.

Rad. obscure albescens. Cauliculus digital. Fol. graminea; radical. ad instar rosulae disposita,



plerumq. elliptico-acuta; caulina pauca, amplexicaul., superiora, in primis calycina, pubescent. Pedunc. longi, fusci. Stipul. sub umbellulis 2. maximæ; ovat-lanceol. Cal. oval. subturgidus, hirsutus. Petal. oblong-ovata, integra, ochroleuca.

679. **DIANTHUS**. Cal. cylindric. persistens, 1-phyll. 5-dent. ad basin cinctus squamis 4. Petal. 5. unguiculata. Caps. cylindrica, 1-locul. apice dehiscens, polysp.

\* *Fl. aggregati.*

1. *barbatus*. D. fl. aggregatis, fasciculat: squamis calycin. ovat-subulat. tubum æquantibus: fol. lanceolat. *Syst. veg. ed. 14.*

b. *Armerius &c. Dod. pempt. 176.*

*In Carniola &c. 24.*

Fol. 1-nervia, villosa. Squamæ calyc. ad 6. Laminæ petal. longitudine calyc. infra medium punctis albis variegatæ, apice serrulatæ. Variat fl. col.

2. *carthusianorum*. D. fl. subaggregat. squamis calyc. ovat. aristat. tubum subæquantibus: fol. trinerviis. *Syst. veg. ed. 14.*

*Caryophyllus &c. Loef. pruss. 37. f. 7. Tabern. 287.*

b. *Caryophyllus &c. Segu. ver. tab. 8. f. 2.*

*In sterilibus apricis 4.*

Caul. erectus, cubital. simpl. Fol. graminea, connata, glauca. Stipul. sub fl. magnæ, aristatæ. Fl. terminal. in duobus ramis, 4-6. Cal. coloratus. Squam. accessoriarum longe aristatæ. Petal. laminæ ovatæ, 5. dent. glabræ, sature rubræ, auricul. acutis in fine unguis. Flos ma. quam in atrorubent. *Var. fl. solitar.* *Differt a priore fol. dimidio angustioribus, rigidioribus, 3-nec 1-nerviis: caul. parum scabro, nec laviss. petalis distantibus, supra villosis, nec glabris: pistillis tubo longioribus.*

3. *ferrugineus*. D. fl. aggregatis: petal. 2-fid. laciniis 3-dent. *Syst. veg. ed. 14.*

*Caryophyllus &c. Barr. rar. tab. 497.*

*In Aprutio Italiæ.*

*Simil. priori, sed caul. angustiore: fol. magis gra-*



*mineis, & magis carinatis: petal. subtus rufis, intus flavicantibus &c.*

4. *armeria*. D. fl. aggregat. fasciculat. squamis calycinis lanceol. villosis, tubum æquantibus. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 230.*

*Caryophyllus barbatus. Segu. tab. 7. f. 4. Lob. ic. 448.*

*In locis sterilibus ☉.*

Caul. erecti, pedal. Fol. latiora, mollia, viridia. Fl. inter fol. sessil. Cal. hirsutus, squamis accessoriis mucronat. Petal. min. angusta, acumin. uno, alterove dente notata, suave purpur. maculis albis adspersa, sine auriculis, bractea elliptica circumferrata.

5. *japonicus*. D. fl. aggregatis, fasciculat. squamis calycinis acutis, ciliatis, tubo brevioribus. *Syst. veg. ed. 14. Thumb. Jap. tab. 23.*

*In Japonia.*

Caul. pedal. basi decumbens, dein erectus, simpl. raro apice divisus, glaber. Fol. pollicar. opposita, petiol. ovata, acuta, integerr. glabra, enervia, erecta. Petioli amplexicaul. lati. Cal. longitudine tubi cor. striatus, glaber. Calyculus basi ovatus, dein lanceol. acuminat. ciliatus.

6. *prolifer*. D. fl. aggregat. capitatis: squamis calyc. ovatis, obtusis, muticis, tubum superantibus. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 221.*

*Caryophyllus &c. Segu. tab. 7. f. 1.*

*In Europæ pascuis sterilibus ☉.*

Caul. pedal. & ultra, ramosus, 4-gonus, decumb. inde erectus. Involuc. 4. Stipul. capituli 2. ovatae, siccae. Petal. parva, breviter 2-fid. rubra, raro alba.

\* *Fl. solitar. pl. in eodem caule.*

7. *diminutus*. D. fl. solitar. squamis calycinis octonis, fl. superantibus. *Syst. veg. ed. 14.*

*Caryophyllus. Tabern. Hist. 290.*

*In Germania, Helvetia ☉.*

*Adfinis priori, sed fol. angustiora. Caul. ramosus. Cor. breviss.*

8. *Caryophyllus*. D. fl. solitar: squamis calyc. subovat. breviss. cor. crenatis. *Syst. veg. ed. 14.*

## DECANDRIA DIGYNIA.

*b. D. coronarius* . Black. tab. 85.

*c. D. inodorus* . Segu. ver. tab. 7. f. 3.

*d. D. imbricatus* . Knorr. del. 1. tab. N. 12. var. *singularis* .

*In alpibus* 24 .

Caul. ped.-cubit. 5-nodosus , angulat. Fol. linear. glauca . Fl. 1-2-3. *Var. fl. forma , & col.*

9. *pomeridianus* . *D. fl. solitar. squamis calyc. binis , cordat. breviss. cor. emarginatis , subintegerr. Syst. veg. ed. 14.*

*Constantinopoli , in Palæstina* 24 .

Simil. priori . Caul. ramis 3-4. longis , simplicibus . Petal. lateribus revoluta , lutea , subtus virescenti-albida . *Flos aperitur hora diei 12½. clauditur noctis hora 10*

10. *deltoides* . *D. fl. solitar. squamis calyc. 2. lanceol. cor. crenatis . Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 577.*

*Betonici &c. Bauh. hist. 3. p. 329.*

*In Europæ pratis* 24 .

Caul. decumb. simpl. Fol. subconnata , lineari-subulata . Petal. atro-purpur. subtus flavo-virescent. cum punctulis albis .

11. *rupestris* . *D. fl. solitar. squamis calycin. 2. obtusissim. petal. crenatis . Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl. Caryophyllus . 1. Clus. hist. 1. p. 282. fig. tenuis .*

*In alpibus Europæ australis* 24 .

Caul. prostratus , filiform. 1-2-fl. Fol. linear. angustiss. triquetra , canalicul. rigidula , cespitosa , margine utrimq. scabra . Fl. remoti , odori . Petal. sanguinea ,

12. *glaucus* . *D. fl. subsolitar. squamis calyc. lanceol. quaternis , brevibus : cor. crenatis : Syst. veg. ed. 14. Tunica &c. Dill. elth. tab. 298. f. 348.*

*In Anglia , Sibiria &c. 4 .*

Caul. dodrant. ramosus , glaucus . Fol. e viridiglaucescent. Petal. alba , striis purpur.

13. *chinesis* . *D. fl. solitar. squamis calyc. subulat. patulis , tubum æquantibus : cor. crenatis . Syst. veg. ed. 14.*

*Caryophyll. &c. Ad. Paris. 1705. f. 5. Mill. ic. 81. f. 2.*

*In China* ☉ .

Fol. *Keiri* , margine aspero . Petal. alba , vel rubra . *Var. fl. pleno .*

14. *monspeliacus*. D. fl. solitar. squamis calyc. subulat. longitud. tubi: cor. multifid. caul. erecto. *Syst. veg. ed.* 14.

*Monspeli*, *Veronæ &c.* 24.

Caul. pedat. Fol. graminea, longa, laxa, viridia. Calyc. squamæ 4. apice fulcescente.

15. *plumarius*. D. fl. solitar. squamis calyc. breviss. subovat. cor. multifid. fauce pubescentibus. *Syst. veg. ed.* 14.

*Caryophyllus &c.* V. *Clus. hist.* 1. p. 284.

*In pascuis nemorosis* 24.

Caul. subprocumb. pedat. 1-2-raro-3-fl. Fol. decussata, acuta, etiam reflexa, glauca. Cal. longus. Squamæ 2. accessoriaræ utrimq. aristatæ. Petal. magna, profunde laciniata, suave purpur. odora. Barba ad fl. faucem rara, purpurascens.

16. *superbus*. D. fl. paniculat. squamis calycin. brevibus, acuminat. cor. multistido-capillar. *Syst. veg. ed.* 14.

*Fl. Dan. tab.* 578. *Jacq. Obs.* 1. *tab.* 25.

*Caryophyllus &c.* VI. *Clus. hist.* 1. p. 284.

*In Gallia, Germania &c.* ♂.

Caul. ad terram procumb. inde erectus, cubital. Fol. graminea, connata, lineata, in medio latefcent. Stipul. aristatæ, sub fl. Utrumq. squamarum par mucronatum. Petal. subviolac. aut alba; ad quorum unguis expansionem pili obscuro col. aut purpur. Fl. fragrant, præcipue nocte.

\*\*\* *Caul.* 1-fl. *herbac.*

17. *arenarius*. D. caul. sub-1-fl. squamis calyc. ovatis, obtusis: petal. multifid. fol. linear. *Syst. veg. ed.*

14.

*Caryophyllus* 1. *Clus. hist.* 1. p. 282.

*Armerius &c.* *Dod. pempt.* 176.

*In Europæ frigidioris arena mobili* 24.

*Adspinitas cum D. plumario*. Petal. magis oblonga, divisa, & lacera ultra medium disci (illi vero tantum multifid.) basi macula livida acuta, pilis purpurascens. adpersa. Caul. vix digit. Fol. obtusiuscula, denticulata: radical. multa, fasciculata; caulina sæpe 2.

18. *alpinus*. D. caul. sub 1-fl. cor. crenatis; squamis calycin. exterioribus tubum fere æquantibus: fol. linear. obtusis. *Syst. veg. ed.* 14. *Jacq. austr.*

1. *tab.* 52.

F iij



Caryophyllus &c. 2. *Clus. hist.* 1. p. 283. f. 1. *bona*.

*In montibus* 24.

Caul. pl. digit. articulis 3. constantes. Fol. infer. lanceol-linear. Cal. ventricosus, atropurpur. Petal. magna, rotunda, dentibus numerosis, breviss. crenata, purpureo-rubra, raro pallida, inodora, fauce subvillosa.

19. *virginicus*. D. caul. sub 1-fl. cor. crenatis: squamis calycin. breviss. fol. subulat. *Syst. veg. ed.* 14. *Jacq. austr.* 5. tab. 15.

b. *Tunica* &c. *Dill. elth. tab.* 298. f. 385. *sed fol. iusto latiora*.

*Monspeli*, in *Carniola* &c. 24.

Fol. radical. in cespitem imbricata, erecta, brevica, acumin. facie *Statices*, denticulata. Caul. spitham: 4. articulis constantes. Cal. squamis breviss. latis, ovatis, acutis. Cor. rosea, inodora.

\*\*\*\* *Frutescentes*.

20. *arboreus*. D. caul. fruticoso: fol. subulat. petal. ferratis. *Syst. veg. ed.* 14.

Caryophyllus &c. *Alp. exot. tab.* 38. *mala*.

*Betonica* &c. *Bauh. hist.* 3. p. 328.

*In Creta* h.

Caul. 2-cubit. & ultra, dense geniculatus, ramis ramosis. Fl. parvi, dilute purpur. lineis saturationibus, odori.

21. *fruticosus*. D. caul. fruticoso: fol. lanceol. *Syst. veg. ed.* 14. *Tourn. it.* 1. tab. 219.

*In Græcia* h.

Caul. 2-pedal. tortuosus, ramis ramosis. Fol. pollic. obtusa, carnosa, in apice ramulor. conferta. Fl. 1-pl. Petal. sesquipollic. crenata, venis purpur. saturationibus.

22. *pungens*. D. caul. suffrutic. fol. lineari-subulat. petal. integris. *Syst. veg. ed.* 14.

*In Hispaniæ maritimis* 24.

Caul. alterne dense ramosi. Fol. caulina conferta, connato-vaginant. ramea vaginis distantibus. Pedicel. 1-3-fl. Cal. squamis 4.

---

*atro-rubens*. D. fl. adgregatis; squamis calycin. ovatis, aristatis, tubo brevioribus; fol. connatis, striatis. *All. Fl. Ped.*



*Caryophyllus* &c. *Segu. Veron. tab. 7. f. 2.*

*In locis aridis collinis ad oras sylvarum* 24.

*Non est variet. D. Carthusianorum.* Caul. 2-3-pedal. Fol. erecta, lanceol. plana, glabra, subtus striata. Capitulum terminale, quod hac ratione se habet: par folior. ellipticorum longam aristam emittentium, duos primum utrimque breves pedunculos suscipit: inde adhuc paulisper elata caulis portio similiter tres alios breviss. profert, singuli 3-fl. similes bractæ calycinās glumas excipiunt. Squamæ calyc. ex albedo rubent. arista brevi, fusca instructæ. Cal. fuscus, densissime striatus. Ungues petalorum albi: lamina coccinea, rhombea, inæqualiter dentata. Petala supra paucis pilis nigris, erectis instructa. Odor vix ullus.

## TRIGYNIA.

680. CUCU- **C**AL. inflatus. Petal. 5. unguicul. absque co-  
BALUS. rona ad faucem. Caps. acumin. plerumq. 3-  
locul. *Differt a Silene cor. absque corona ne-  
darea.*

1. *baccifer.* C. calyc. campanulat. petal. distantibus: pericarp. coloratis; ramis divaricatis. *Syst. veg. ed. 14.*

*Lychnanthus* &c. *Gmel. Act. petrop. 1759. vol. 14. tab. 17. f. 1.*

*Alfine* &c. *Dod. pempt. 403.*

*In nemoribus, & sepibus* 24.

*Petal. coronata; ergo Silene est.* Caul. valde divaricat. & brachiatus. Fol. ovat-lanceol. villosula. Pedunc. axill. 1-fl. Cal. semi-5-fid. Petal. lacera, serrata, alba. Caps. ovat. 1-locul. nigra.

2. *Behen.* C. calyc. subglobosis, glabris, sæpe reticulato-venosis: capsul. 3-locul. cor. subnudis. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 857.*

*Lychnis* &c. *Black. tab. 268. Knorr. del. 2. tab. L. 4.*

*Papaver* &c. *Lob. ic. 340.*

- b. Allion. Specim. Pedem. tab. 5. f. 3.*  
*In Europæ pratis siccis 24.*  
 Caul. dodrant-cubital. brachiatus. Fol. opposita, sessil. elliptico-lanceol. integerr. Pedunc. terminal. dichotomi, dein nigrantes. Cor. alba.  
*Var. fol. angustioribus, & acutioribus; ac fl. pleno; & fol. hirsutis.*
- b. Humilis, dodrant. reptans. Fol. lanceol. hirsuta, ciliata. Rami 1-2-fl. Cal. purpur.*
3. *fabarius.* C. fol. obovat. carnosus. *Syst. veg. ed. 14.*  
*Behen &c. Bocc. mus. tab. 92.*  
*In Sicilia.*  
 Fol. *Anacampserotis*, opposita, sessilia.
4. *viscosus.* C. fl. lateralibus, undiq. decumbentibus: caul. indiviso: fol. basi reflexis. *Syst. veg. ed. 14.*  
*Lychnis &c. Tourn. it. 2. tab. 361.*  
*In Italia &c. ♂.*  
 Planta viscosa. Caul. ramosus, villosulus. Fol. sessil. oris modice undulat. radical. angustolanceol. acumin. sæpe glabra; caulina amplexicaul. latiora. Pedunc. oppositi, breves, 3-fl. Fl. 1-lateral. noctu odori. Cal. 10-gon. Petal. apice crenulata. Caps. ovata.
5. *stellatus.* C. fol. quaternis. *Syst. veg. ed. 14.*  
*In Virginia, Canada.*  
 Fol. quandoq. opposita, longe acumin. glabra. Fl. terminal. ampli, penduli, fimbriati, albi.
6. *ægyptiacus.* C. fl. erectis: petal. emarginat. retroflexis, utrimq. denticulo notatis. *Syst. veg. ed. 14.*  
*In Ægypto.*  
 Caul. ad terram sparsus, ramosus. Fol. linear. juniora basi ciliata. Fl. axillar. solitar. sessiles. Cal. cylindric. dein obovatus, 10-gon. interstitiis membranac. Petal. minuta, vix calyc. longiora. Styli sæpe 4.
7. *italicus.* C. petal. semibifid. calyc. clavatis: panicul. erecta, dichotoma: genitalibus declinatis: caul. erecto. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. Obs. 4. tab. 97.*  
*In Italia ♂.*  
 Caul. 2-3-pedal. ramosus, superne paniculat. Fol. sessil. caule minus tomentosa, lanceol. obtususc. aut. acuta, secunda, summa fere linear. Cal. clavatus, 10-sulcat. Petal. latiusc. alba, subrus. plumbea, Stam. alba.

8. *ataricus*. C. petal. 2--part. fl. secundis, decumbentibus: pedunc. solitar. oppositis, erectis: caulibus simpliciss. *Syst. veg. ed. 14.*

*In Tartaria, Russia* 24.

Caul. sesquiped. geniculis distantibus. Fol. cruciata, inferiora petiol. super. sessil. oblonga, retrorsum scabra, mucron. læte virid. hirsuta, vel glabra. Pedunc. infer. foliosi. Fl. 3--4. Petal. ampla, fimbriata, alba.

9. *sibiricus*. C. petal. emarginat. fl. subverticillat. verticillis umbellat. aphyllis. *Syst. veg. ed. 14.*

Viscago &c. *Hall. Goett. 1. p. 150. f. bona.*

*In Sibiria desertis.*

Caul. erectus, 3--ped. vix ramosus, superne viscidus. Fol. ad terram strata, multa, petiol. ovat--acum. scabra, pallide virid. caulina angusta, acutiora. Pedunc. oppositi, ramosi. Petal. exigua, alba. Stam. flore longiora.

10. *catholicus*. C. petal. 2--part. fl. paniculat. stamin. longis: fol. lanceol-ovatis. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. hort. 1. tab. 59.*

*In Italia* 24.

Caul. diffusi, 3--ped. subdichotomi, viscosi. Fol. sessil. acuta, scabra, subvillosa. Cal. fuscus, nitidus. Petal. alba.

11. *mollissimus*. C. petal. semibifid. panicula dichotoma: caul. foliisq. holosericeis: radical. spatulatis. *Syst. veg. ed. 14.*

*Lychnis* &c. *Bocc. mus. tab. 118?*

*In Italia maritima* 24.

Caul. pl. erecti, pedal. subtomentosi, rigiduli, molliss. ramis inferne alternis, brevioribus. Fol. super. lanceol. omnia patentia, obtusiusc. apice subreflexa, subcarnosa, molliss. tomentosa. Panicula viscida, ramul. 3--fl. Fl. erecti, albi. Styli cor. longiores.

12. *otites*. C. fl. dioicis: petal. linear. indivisis. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 518.*

*Lychnis* &c. *Mentz. pug. tab. 3. f. 2.*

*Sesamoides* &c. *Clus. hist. 1. p. 295.*

*In Europa* 24.

Caul. cubital. paniculat. Fol. opposita, sessil. integerr. radical. *Bellidis* ovat--lanceol. caulina angusta. Racemi verticillati. Petal. dilute purpureasc. aut dilute herbacea. *Var. fl. maioribus: cal. subrubro; & fl. min. calyce viridi.*



13. *reflexus*. C. fl. spicatis, alternis, secundis, subsessil. petal. sub 2--part. obsoletis. *Syst. veg. ed. 14.*

*Lychnis* &c. *Magn. monsp. tab. 170.*

*Monspelii*.

Caul. erectus, pedat. Fol. opposita, angusta, hirsuta. Petal. alba.

14. *saxifragus*. C. petal. 2--fid. calycibus striatis: terminalibus subsessilibus; lateralibus pedunculat. *Syst. veg. ed. 14. Schreb. dec. 9. tab. 5.*

*In Oriente* 24.

Caul. palm. Fol. linear. Cal. inter 2. foliol. sessilibus, e quorum alis sæpe novi petiol. prodeunt.

15. *pumilio*. C. caulibus 1-fl. flore brevioribus. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. Austr. 5. tab. 2.*

*Betonica* &c. *Bauh. hist. 3. p. 337.*

*Caryophyll. VII. Clus. hist. 1. p. 285.*

*In alpebus Italiae* &c. 24.

Caul. cespitosi, subunc. 1-fl. Fol. radical. in cespitem congesta, linear. obtusa, lævia: caulina connato-amplexicaul. Cal. oblong. campanulat. obtusus, patulus, pubesc. longitudine caul. Petal. rosea.

- fruticulosus*. C. *Pall. it. 2. tab. T.*

*In Dauuria* h.

Trunci antiqui breves, subramosi. Fol. subconata, linear. acutiss. nervo crassiusculo. Fl. terminal. pauci, alterni. Cal. cylindr-ventricosus, 10-striatus, scaber. Petal. sublinear. 2--fid. alba.

- glutinosus*. C. petal. 2-part. calyc. clavatis: panicul. dichotoma, patentiss. genitalibus rectis. *Retz. Obs. fasc. 2.*

*Habitat* . . . . .

Caul. erecti, subvillosi, hinc inde visco tenaci obducti. Fol. lanceol. acuta, integerr. hispida, præcipue carina; summa linear. Fl. albo-viridiuscul. Caps. globosa.

681. *SILENE*. Cal. 5--dentatus. Petal. 5. unguicularia, squamis coronata ad faucem. Caps. 3--locul. polysper.

\* *Fl. solitar. lateralibus*.

1. *anglica*. S. hirsuta; petal. integerr. fl. erectis: fructibus reflexis, alternis, pedunculat. *Syst. veg. ed. 14. Viscago* &c. *Dill. tab. 309. f. 398.*



*Lychnis* &c. *Vaill. parif. tab. 16. f. 12.*

*In Anglia, Gallia* &c. ☉.

Planta hirsuta, & viscosa. Caul. pedal. Fol. infer. obovata, lanceol. versus basin ciliata, superior. angustiora: Fl. parvi. Cal. non pilosus, angulis muricatis, aculeis reflexis, vix conspicuis.

2. *lusitanica*. S. hirsuta; petal. dentat. indivisis: fl. erectis: fructibus divaricato-reflexis, alternis. *Syst. veg. ed. 14. Mont. in Zann. tab. 111.*

*Viscago* &c. *Dill. elth. tab. 311. f. 401.*

*In Lusitania* ☉.

Caul. pedal. ramosus. Fol. opposita, retusa, ac pene rotundata, mollia. Fl. subspicati, sæpe 1-lateral. Cal. fructus horizontaliter reflexus, valde pilosus. Cor. incarnata.

3. *quinquevul-nera*. S. petal. integerr. subrotund. fructibus erectis, alternis. *Syst. veg. ed. 14.*

*In Europa* ☉.

Caul. pedal. ramosus, villosus. Fol. lanceol. villosula. Pedunc. axillar. solitar. Cal. 10-gon. angulis rubris; fructiferi pilosi, viscid. Petal. obtusa, vix emarginata, rubra, margine albo. oblique-emarginat. *Syst. veg. ed. 14.*

4. *nocturna*. S. fl. spicatis, alternis, secundis, sessil. petal.

*Viscago* &c. *Dill. elth. tab. 310. f. 400.*

*Lychnis* &c. *Barr. ic. tab. 27. f. 1. Morif. hist. 3. f. tab. 36. f. 7.*

*In Hispania* &c. ☉.

Caul. scaber. Fol. inferiora obovata, concava, rigida: caulina angustiora, longiora. Cal. hirsutus. Petal. maiuscul. alba, subtus virescent. nec post anthesin rubra. *Simil. Cucubalo reflexo, sed caule altiore, ramosiore: petalis extra calyc. patentibus.*

5. *gallica*. S. fl. subspicatis, alternis, secundis: petal. indivisis: fructibus erectis. *Syst. veg. ed. 14.*

*Viscago* &c. *Dill. elth. tab. 310. f. 399.*

*Lychnis* &c. *Vaill. parif. tab. 16. f. 12.*

*In Helvetia, Gallia* ☉.

Caulicul. erecti, pedal. Fol. lanceol. subhirsuta. Fl. axillar. & terminal. breviter peduncul. Cal. 10. virid. lineis obsitus. Petal. exigua, ovata, integra, vel leviter emarginata, æqualis rosei coloris.

6. *cerastoides*. S. hirsuta; petal. emarginatis: fructibus erectis: calyc. subsessil. subpilosis. *Syst. veg. ed. 14.*

Viscago &c. *D. ll. elih. tab. 309. f. 307.*

*In Europa australi* ☉.

Caul. spitham. Fol. infer. subrotunda; super. longiora, angustiora. Fl. parvi. Cal. striis longitudinalibus, fusco--viridibus notatus. Petal. dilute purpurascens.

7. *ægyptiaca*. S. petal. emarginat. utrimq. dentatis: fol. subtomentosis. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*

*In Ægypto*.

Caul. herbaceus, palmar. brachiatus, leviter tomentosus. Fol. obovata, acutiuscula, vix carnosa, lævia. Fl. terminal. unus, alterve, erecti, peduncul. Cal. clavatus, subpubescens, dentibus brevibus. Petal. emarginata, obtusa, incarnata, calyc. breviora, 4-fid.

\*\* *Fl. lateralibus, confertis*.

8. *mutabilis*. S. petal. 2-fid. calyc. angulatis, pedunculat. fol. lanceol-linear. *Syst. veg. ed. 14.*

*In Europa australi* ☉.

*Adfinis Cucubalo reflexo*. Differt a *S. nocturna*, cui similis, fol. linear. nec ovatis, etiam ad radicem: fl. pedunculat. nec subsessil. calyc. 10-gon. petal. post efflorescentiam purpurascens, nec viridibus.

9. *nutans*. S. petal. 2-fid. fl. lateralibus, secundis, cernuis, panicul. nutante. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 242.*

*Lychnis* &c. *Tabern. 293. Clus. Pann. 328. Hist. 290. 291.*

*In Europæ pratis aridis* ☿.

Caul. ped-cubit. ramosi, sub fl. viscosi. Fol. viscosa; infer. lanceol. super. linearia. Pedunc. & calyc. villis capitatis pubescentes. Cal. cylindric. inflatus, 10--striat. hirsutus. Petal. linear. supra alba, subtus rubella. Caps. 6-fariam dehiscit. *Var. fl. pleno*. *Altera var. fol. ovatis, vix sinuatis, lucide virentibus, minus hirsutis: petal. intus roseis, extus fuscis*.

10. *amœna*. S. petal. 2-fid. coronula subcoadunata: fl. secundis: pedunc. oppositis, 3--fl. ramis alternis. *Syst. veg. ed. 14.*

*Lychnis* &c. *Morif. hist. 3. f. 5. tab. 20. f. 2. Bauh. hist. 3. p. 357.*

*In Tataria; Angliæ meridional. litoribus* ☿.

Caul. diffusi, adscendentes, læviusculi. Rami breviores, divaricati. Fol. supra glabra. Cal. angulis 10. purpurascens. villosis. Petal. alba. Nectarii lamellæ 2-fid. patulæ, stria alba.

11. *paradoxa*. S. fl. racemosis: calyc. 10-fulcat. viscidis: fl. aliis staminibus exsertis; aliis inclusis. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. hort. 3. tab. 84.*

Lychnis &c. *Zann. hist. tab. 109.*

*In Italia 24.*

*Silenes nutantis quadruplo ma.* Caul. subincani, alii florentes sesquiped. alii steriles breves. Fol. opposita, lineari-lanceol. ad basin canalicul. integerr. Cal. subcylindr. Cor. purpurasc. aut albida, noctu se explicans, odora, 2-fid. subcrenata. Caps. ovat. nitida.

12. *fruticosa*. S. petal. 2-fid. caul. fruticoso: fol. lato-lanceol. panícula trichotoma. *Syst. veg. ed. 14.*

Ocymoides &c. *Cam. hort. tab. 33.*

Saponaria &c. *Bocc. Sic. tab. 58.*

*In Sicilia, Germania h.*

Caul. palmar. lignosi. Fol. Bellidifol. opposita, nitida. Rami terminal. Petal. carnea.

13. *bupleuroides*. S. petal. 2-fid. fl. pedunculat. oppositis, bractea brevioribus: fol. lanceol. acutis, glabris. *Syst. veg. ed. 14.*

Lychnis &c. *Tourn. it. 1. tab. 154.*

*In Persia.*

Caul. erectus, 3-ped. nodosus, glaber. Fol. 4-pollic. Pedunc. axill. 3-4-fl. Petal. semipollic. supra alba, subtus viridi-lutea.

14. *gigantea*. S. petal. 2--fid. fol. radicalibus cochlearifor. obtusiss. fl. subverticillat. *Syst. veg. ed. 14.*

Lychnis &c. *Walt. hort. tab. 11.*

*In Africa ♂. h.*

Fol. prioris anni maxima. Caul. posterioris anni 2-ped. simpl. articulis inferioribus brevibus, villosis; superior. longiss. nudis, viscoso--glutinosis. Fol. sessil. carnosa, concava, pubescent. Pedunc. oppositi, breviss. patentes, dichotomi. Cor. virid. noctu explicata.

15. *crassifolia*. S. petal. emarginat. fol. suborbiculat. carnosis, hirsutis: racemo secundo. *Syst. veg. ed. 14.*

*Ad cap. b. Spei.*

Caul. 2-ped. firmus, hirsutus, ramis alternis. Fol. *Portulacæ*, obtusiss. vix extimi pollic. ma-



gnitudine . Racem. terminal. 8-12-fl. Cal. hirsutus . Bract. ovatae . Petal. emarginata , col. tristi .

16. *viridiflora*. S. petal. semibifid. fol. ovatis , acutis , scabriuscul. panicula elongata , subaphylla . *Syst. veg. ed. 14.*  
*Lychnis &c. Herm. par. tab. 199.*  
*In Lusitania &c. ♂.*

Caul. ped. & ultra , erecti , teretes , pubescent. geniculis incrassatis . Fol. pubescent. Panic. pedunc. dichotomis , paucifl. Cal. cyindr. nutans , angulis 10. viscosis . Cor. albido-virens .

\*\*\* *Fl. ex dichotomia caulis .*

17. *conoidea* . S. calyc. fructus globosis , acuminat. striis 30. fol. glabris : petal. integris . *Syst. veg. ed. 14.*  
*Lychnis &c. Moris. hist. 3. f. 5. tab. 36. f. 6.*  
*Lychnis 2. Clus. hist. 1. p. 288.*  
*Inter segetes Hispania &c. ☉ .*

Caul. erectus , cubit. ramosus , striatus , hirsutus . Fol. late lanceol. Petal. purpurasc.

18. *conica* . S. calyc. fructus conicis , striis 30 fol. mollibus : petal. sub 2-fid. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. Austr. tab. 253.*

*Lychnis &c. Moris. hist. 3. f. 5. tab. 36. f. 6.*  
*In Germania , Oriente &c. ☉ .*

Caul. subped. incanus . Fol. sessil. lanceol. integerr. subtus incana . Pedunc. 1-fl. Cal. floriger oblong. Petal. rosea . Caps. rotundato-conica , nitida .

19. *bellidifolia* . S. calyc. fructus ovatis , villosis : fol. pilosis , subasperis : petal. 2-fid. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. hort. 3. tab. 81.*

*Habitat . . . . .*

Caul. erectus , subped. simpl. vel subdichotom. subvillosus , paucifl. Fol. opposita , sessil. lanceol-oblong. integerr. Fl. erecti . Petal. rosea , lacin. oblongis . Caps. ovat. glabra .

20. *Behen* . S. calyc. ovatis , glabris , venoso-reticulat. *Syst. veg. ed. 14.*

*Lychnis &c. Dill. elth. tab. 317. f. 409.*

*In Creta ☉ .*

*Differt a Cucubalo Behen corona cor. petal. laminis vix  $\frac{1}{2}$  longitud. calyc. rad. annua : cor. purpurasc. anth. albis .*

Cal. obtusus. Fl. nutantes, pedunculo e dichotomia, flore ipso brevior.

21. *stricta*. S. petal. emarginat. calyc. glabris, reticulato-venosis, acuminat. pedunc. longioribus: caule dichotomo, stricto. *Syst. veg. ed. 14.*

*In Hispania* ☉.

*Differt a priore fl. erectis: cal. angustiore: fol. angustis*. Caul. viscidus. Fol. lineari-lanceol. Pedunc. solitar. breviss. e dichotomia. Petal. parva.

22. *pendula*. S. calyc. fructiferis pendulis, inflatis: angulis 10. scabris. *Syst. veg. ed. 14.*

*b. Viscago &c. Dill. elth. tab. 312. f. 404.*

*In Creta, & Sicilia* ☉.

Caul. pl. pedal. & ultra, supini, pilosi. Fol. subhirsuta, modice cava, dein plana. Petal. dilute purpurea.

23. *nodiflora*. S. calyc. 10-angularibus: dentibus tubum æquantibus: caul. dichotomo: petal. 2-fid. *Syst. veg. ed. 14.*

*Ocymoides &c. Cam. hort. tab. 34.*

*In Svecia, Germania &c.* ☉.

Caul. erectus, pedal--cubit. parum brachiatus, pilosus, viscidus. Fol. sessil. ovat-lanceol. hirsuta; super. elliptica. Fl. terminal. solitar. pedunculati, obliqui. Cal. admodum viscidus, dentibus longioribus præ reliquis; florifer cylindricus; fructifer globoso-ovatus, 10. lineis virid. pictus. Petal. albidæ, extus sublutea.

24. *virginica*. S. calyc. fl. cylindricis: panicula dichotoma. *Syst. veg. ed. 14.*

*Lychnis &c. Pluk. alm. tab. 203.*

*f. 1.*

*In Virginia* 24.

Planta polymorpha. Fl. facie *Lychnidis dioicæ albæ*, at saturate rubri. Cal. angustior quam in congeneribus, hirsutus. Caul. nunc simpl. digiti longitudine, terminatus fl. in fasciculum collectis; nunc pedal. apice trichotomus, pedunculo intermedio semper 1-fl. Fol. oblonga, seu lato-lanceol. ut in *Gomphrena globosa*.

25. *atrocion*. S. calyc. fructigeris clavatis; petal. semibilobis: fasciculo fl. terminali, dichotomo: fol. obovat. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. hort. 3. tab. 32.*

*S. orchidea. Lin. Suppl.*

*In Oriente* ☉.

Planta viscido-villosula. Caul. vix pedalis, e basi ramosus. Fol. infer. petiol. super. sessil. opposita, obverse ovata, integerr. firmula. Fasciculi multifl. dichotomi. Petal. obtusa, plana, rosea. Anth. cœrulesc. Caps. oblonga, glabra.

26. *antirrhina*. S. petal. emarginat. calyc. ovatis; pedunc. 3-fidis: fol. lanceolat. subciliat. *Syst. veg. ed.* 14.

Viscago &c. *Dill. elth. tab.* 313. f. 403.

In *Virginia*, *Carolina* ☉.

Caul. pedalis-cubit. ramosus, plerumq. fusco-rubens. Fol. *Antirrhini*. Pedunc. axill. & terminal. longi. Cal. striatus. Petal. purpurascens.

27. *rubella*. S. erecta, lævis: calyc. subglobosis, venosis, glabris: cor. inapertis. *Syst. veg. ed.* 14.

Viscago &c. *Dill. elth. tab.* 314. f. 406.

In *Lusitania*, *Oriente* ☉.

Caul. vel solitar. & erecti; vel pl. & supini; geniculis inferior. crebris. Fol. radical. oblong. rotunda; super. angustiora. Pedunc. terminal. Petal. parva, rubella.

28. *inaperta*. S. caul. dichotomo, paniculato: fol. lanceolat. glabris: calyc. lævibus: petal. breviss. emarginat. *Syst. veg. ed.* 14.

Viscago &c. *Dill. elth. tab.* 315. f. 407.

In *Europa australi* ☉.

Planta glabra. Caul. 1-fesquiped. erectus, ramosus. Fol. satiore glauco-virid., infer. latiora, reflexa; super. angustiora, minus reflexa. Cal. dilatatus, 10-striatus. Petal. albida, absque limbo. Stam. sæpe 5.

29. *portensis*. S. caul. paniculato, dichotomo: fol. linearibus: calycibus striatis: petal. 2-fid. *Syst. veg. ed.* 14.

In *Lusitania* ☉.

Habitus prioris, et fol. angustiora, & cal. longitudinaliter striatus. An Var. ejusdem? Caul. spitham. Pedunc. erecti, longi, 1-fl. Cal. longus, clavatus, purpurasc. striis alternis, albis. Petal. alba, cum striis rubris.

30. *cretica*. S. erecta, lævis; calyc. erectis, 10-angularibus, petal. 2-fid. *Syst. veg. ed.* 14.

Viscago &c. *Dill. elth. tab.* 314. f. 404. 405.

In *Creta* ☉.

Caul.



Caul. 1-2-pedal. filiform. dichotomo-panicul. patens, articulis viscidis. Fol. ima latiora, hirsuta; super. angustiora, minus hirsuta. Cal. glaber. Petal. erecto-patula, amœne purpur.

31. *Muscipula*. S. petal. 2-fid. fl. axillar. sessilibus: caul. dichotomo: fol. glabris. *Syst. veg. ed. 14.*

*Lychnis &c. 3. Clus. hist. 1. p. 289.*

*In Hispania, Gallia.*

Planta viscosa. Fol. sessil. lanceol. Fl. terni. Petal. rubra.

32. *polyphylla*. S. fol. fasciculat. setaceis; ramorum florentium oppositis. *Syst. veg. ed. 14.*

*Lychnis VIII. Clus. hist. 1. p. 290.*

*In Austria, Pannonia &c. 24.*

Caul. ped. & ultra, ramosi. Fol. angusta, dilute virid. Fl. terminal. intus albi, extus purpur.

33. *Armeria*. S. fl. fastigiatis, fasciculat. fol. superior. cordatis, glabris: petal. integris: *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 559.*

*Armerius flos 4. Dod. pempt. 176.*

*In Europa ☉.*

Caul. 1-3-ped. ramosi, superne viscidi. Fol. ovat-lanceol. glauca. Cal. longus. Petal. suave rubent. vel alba. *Var. fl. pleno.*

34. *rupestris*. S. fl. erectis: petal. emarginat. calyc. teretibus: fol. lanceol. *Syst. veg. ed. 14.*

*Alfina &c. Fl. Dan. tab. 4.*

*Auricula &c. Bauh. hist. 3. p. 360.*

*In montibus aridis, & rupibus umbrosis 24.*

Caul. erectus, palmar. valde ramosus, & brachiatus. Fol. sæpe ovata, linearia in umbra nata, glauca, glabra. Fl. terminal. veluti umbellati. Petal. cordata.

35. *Saxifraga*. S. caul. sub-1-fl. peduncul. longitudine caul. fl. hermaphrodit. femineisq. petal. 2-fid. *Syst. veg. ed. 14.*

*Saxifraga &c. Bauh. hist. 3. p. 338.*

*Lychnis &c. Segu. ver. tab. 6. f. 1. Bocc. tab. 71.*

*Saxifraga grande. Matth.*

*In montibus cretaceis 24.*

Rad. lignosa, ramosa. Caul. pl. digital. glabri. Fol. opposita, linear. 4. 6. oppositionibus, glabra. Pedunc. terminal. filiform. raro alter la-

teral. Flos unicus. Cal. clavatus, glaber, 10-fstriatus. Petal. limbo calyce brevior, subtus rubro. Caps. flavescens.

36. *vallesia*. S. caulibus decumbent. sub-1-fl. fol. lanceol. tomentosis, longitudine calyc. *Syst. veg. ed. 14. All. Fl. Ped. tab. 23. f. 2.*

Lychnis &c. *Bocc. mus. tab. 54.*

*In alpinis Vallesiacis &c. 24.*

Caul. lignosi, palmar. filiform. nunc 1-fl. nunc dichotomi, 3-fl. Fol. radical. petiol. pulposa; caulina linearia: confertim opposita, viridicinea, glutinosa. Peduncul. terminal. solitar. Fl. grandes, erecti. Petal. 2-fid. basi limbi subauriculata, intus alba, subrosea, extus phoenicea noctu odora. Cal. clavatus, viscido-hirsutus, striis 10. fuscescentibus: absoluta florescentia inflatus evadit, ut *Behen*.

37. *acaulis*. S. acaulis, depressa: petal. emarginatis. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 21. All. Fl. Ped. tab. 79. f. 1.*

Lychnis &c. *Dill. elth. tab. 167. f. 206. Barr. ic. 379. 380.*

Muscus &c. *Bauh. hist. 3. p. 767.*

*In alpinis 24.*

*Herba Bryo similis*. Cespites lati. Scapi longitudine calycis. Fol. conferta, graminea, tenuiter spinulosa. Pedunc. 2-phylli. Cal. fuscoruber, 10-gon. glaber. Petal. dilute purpur. vel alba. Fruct. cylindricus.

*alpestris*.

S. *Jacq. Austr. tab. 96.*

*In subalpinis ad margines sylvar. 24.*

*Differt a Lychnide 4-dentata fruct. conico-oblongo nec subrotundo. Statura varia, 2-unc-pedal. Caul. pl. adscendent. teretes, quandoq. purpur. in maioribus individuis, supra medietatem dichotomi, cæterum 1-fl. vel subdivisi; quandoq. cespitem densum efformant. Fol. opposita, sessil. linear-lanceol. acuta, glabra; infer. lanceol. Petal. magis, minusve profunde 4-fid. nivea. Anth. pallentes.*

*villosa*.

S. petal. 2-fid. oblong. basi sub germine in tubum connatis. *Forsk. Æg.*

*In Ægypto.*

*Color, & facies e longinquo Bellidis annua. A*

*Cerastioide suo simili differt fl. pedunculat.* Caul. diffusus, pedal. opposite ramosus, foliosus, totus villosus. Fol. digitum transversum longa, sessil. lanceol. Pedunc. axillar. solitar. longitud. calyc. Cor. violac.

*villosa.* S. fol. cuneiform. basi ciliatis. Forsk. Suppl. Æg.

*Prope Constantinopolim.*

Tota planta villosa. Fl. solitar. violac. petal. integris, crenulatis. Fruct. axill. sessil. secundus, 10-carinatus.

*succulenta.* S. fl. axillaribus, solitar. pedunculat. petal. 2-fid. fol. ovalibus, carnosus, villosus, subviscid. confertis, patentiss. sessilibus. Forsk. Æg.

*In Ægypto.*

*involuta.* S. fol. lanceol-linear. sessil. ciliatis, subtus tomentosis. Forsk. Suppl. Æg.

*Ad Dardanellos, in arvis.*

Caul. fruticosus, teres, crassus, villosus. Fl. quandoq. aggregati in axillis, præsertim ad apicem caul. Petal. involuta, olivac. 2-fid.

*diffusa.* S. caul. repente; fol. lanceolat. Forsk. Æg.

*In Ægypto.*

Fl. flavi. Caps. sessil.

*vespertina.* S. petal. 2-fid. nectar. cornuto; fl. alternis. Retz.

*Obs. fasc. 3.*

*Habitat* . . . . . ⊙ .

Planta tota hirta, non viscida. Caul. semiped. erectus, ramis plerumq. alternis. Fol. infer. ovata; super. lanceol. opposita, sessil. integerr. Racemus 2-fid. fl. unico pedicellato in dichotomia; 3-4. in singulo ramo, fol. 2. linearibus suffultis; carneis, vespertinis: sæpe etiam racemus simpl. Cal. oblong. pilosus, striis 10. virid. Caps. ovata, subtrigona.

*elongata.* S. caulescens; foliis linear. petalis emarginatis: calyc. subpelvisiformibus. Bellardi *Osserv. Botaniche* &c.

*In Pedemontio.*

Simil. S. *acauli*, & *exscapæ* Fl. Pedem. sed caul. 3-4. digit. longus. Fol. 3-4. coniugationes non cespitosa; ramis diffitis. Flos maior.

*An var. dictarum specierum?*

*sericea.* S. fol. acumin. succulentis, hirsutis, lucidis: fl. carneo. All. Fl. Ped. tab. 79, f. 3.

*Ad maris litus, in sabulosis* ⊙ . G iij



## DECANDRIA TRIGYNIA.

Tota planta sericeo-subincana, sapore aquoso.

Caul. teres, statim alterne, aut per dichotomiam divisus, ramis procumbent. sæpius simplicibus. Fol. opposita, amplexicaul. elliptica, firmula, succosa. Fl. terminales, pedunculati. Cal. clavatus, 10-striato-angulat. albido-transparens. Petal. cordata, ultra medium 2-fida, segmentorum fine subrotundo, subtus pallidiora. Coronæ squamæ erectæ.

*nicaensis*.

S. villosa, & viscosa; fol. linear. obtusis: petal. semibifidis: fructibus ovatis: calycibus 10-striatis. *All. misc. Taur. & Fl. Ped. tab. 44. f. 2.*

*In agro Nicaensi* ☉.

Tota planta villosa, & viscosa. Caul. infirmi, vix erecti, de more gentis in pedunculos dichotome finduntur. Cal. tubulosus. Petal. coronata squamis subrotundis, extus pallide flavo purpurascens. intus albida, & per diem intus convoluta.

*cordifolia*.

S. caul. simplici: fol. ovatis, acutis: fl. terminalibus, subsessil. petal. semibifidis. *All. Fl. Ped. tab. 25. f. 3.*

*In præruptis saxosis alpium* 24.

Cauliculi cespitosi, filiform. sesquidigital. Fol. *Alfinæ mediæ* similia, opposita, sessil. leviter sinuata, viridia, & tenuissime villosa; mediæ coniugationis ma. Coniugation. sæpe 5. Petal. ex albo-levissime rosea, extus flavescens. segmentis lineari-subrotund. squama coronatrice. Cal. inflatus. *Planta glutinosa*.

*exscapa*.

S. fl. sessili; fructibus subrotundis. *All. Fl. Ped. tab. 79. f. 2.*

*In locis editioribus* 24.

*Differt a S. acauli, planta tota min. fl. dilutione: fruct. non cylindrico, sed globoso.*

682. STELLARIA. Cal. 5-phyll. patens. Petal. 5. profunde 2-part. Caps. 1-locul. polysper.

1. *nemorum*. S. fol. cordat. inferiorib. petiolat: panicula pedunculis ramosis. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 271.*

*Alfine &c. Col. ecphr. I. tab. 290.*

*In Europæ nemoribus montosis* 24.

*Adfinis Ceraftio aquat.* Caul. sesquiped. Petiol. longiss. Fol. angusta, margine undata. Petal. alba. *Var. caulibus erectis, & repentibus.*

2. *dichotoma*. S. fol. ovatis, sessil. caul. subdichotomo: fl. solitar. pedunc. fructifer. reflexis. *Syst. veg. ed.* 14.

*In alpibus* ☉.

*Videtur var. adulta prioris*. Planta subvillosa. Fol. vel petiol. & cordata; vel sessil. & ovatlanceol. Cal. margine albo. Petal. calyc. duplo longiora.

3. *radians*. S. fol. lanceol. ferrulat. petal. 5-part. *Syst. veg. ed.* 14.

Aline &c. *Amm. ruth. tab.* 10.

*In Sibiria uliginosis*.

Caul. fragilis, geniculatus. Fol. saligna, opposita, hirsuta, margine scabro. Fl. ampli, lactei.

4. *Holostea*. S. fol. lanceol. ferrulat. petal. 2-fid. *Syst. veg. ed.* 14. *Fl. Dan. tab.* 698.

Gramen. *Fuchf. hist.* 136.

*In Europæ nemoribus, & collibus* ☿.

Caul. pl. pedal. densi. Fol. graminea, subconata, coerul-virescent. infer. breviora, crassiora. Petal. cal. fere duplo longiora, alba, basi virescente.

5. *graminea*. S. fol. linear. integerr. fl. paniculat. *Syst. veg. ed.* 14. *Fl. Dan. tab.* 414. 415. *Gmel. Sib. 4. tab.* 61. f. 2.

Gramini &c. *Bauh. hist.* 1. p. 361.

Gramen &c. *Tabern. ic.* 232.

*In Europæ sepibus* ☿.

Caul. 3-ped. debilis, brachiat. 4-gon. Fol. priore breviora, non graminea, sed lanceol. plerumq. virid. quandoq. glauca, subtus carinata. Pedunc. longi. Fl. priore min. Cor. calyce paulo longior. Petal. ad basin usque 2-fid. apicibus rubris.

6. *cerastoides*. S. fol. oblong. peduncul. sub-2-fl. *Syst. veg. ed.* 14. *Gunn. norv. tab.* 6. f. 2.

*In alpibus Lapponicis*.

Habitus *Cerastii viscosi*, sed planta fere glabra. Caul. diffusi, digital. Fol. lanceol. Pedunc. terminal. Petal. calyce duplo ma. vix semibifida, alba.

7. *undulata*. S. fol. oblong. undulatis: caul. angulato, fl. axillar. *Syst. veg. ed.* 14. *Thumb. Jap.*

*In Japonia*.

Caul. herbac. decumbens. Rami erecti, paucum ramulosi, debiles, glabri. Fol. semiunguic. opposita, sessil. glabra. Fl. bi-terni, peduncul.

8. *biflora*. S. fol. subulat. scap. sub 2--fl. petal. emarginat. germinibus oblong. calyc. striatis. *Syst. veg. ed. 14.*

*Sagina* &c. *Fl. Dan. tab. 12.*

*Aline* &c. *Segu. ver. 3. tab. 4. f. 1.*

*In alpinis* 24.

Planta parva, facie *Saginæ procumbentis*. Fol. radical. in acervum congesta. Caul. digital. filiform. maxima parte nudi. Fl. foliosi. Cor. alba.

9. *arenaria*. S. fol. spatulatis: caul. erecto, 2-fid. ramis alternis: petal. emarginat. *Syst. veg. ed. 14.*

*In Hispania* ☉.

Caul. spitham. teres, pubescens, subglutinosus. Fol. sessil. subtus, & margine pilosa. Primus flos e dichotom. caul. reliqui ex alis ramorum alterni, maiuscul. Cal. apice purpurasc. Petal. obtusiss. vix manifeste emargin. alba. Stam. alba. Anth. cœrulesc.

- aquatica*. S. fol. lanceolat. petal. 2-part. calycem longitudine æquantibus. *Syst. veg. ed. 14. Pollich. Palat.*

*Habitat* . . . . .

Caul. longus, procumbens, quandoq. repens, dichotom. 4--gon. glaber. Fol. opposita, connato-sessil. lanceol-acumin. integerr. læte virid. glabra. Fl. in dichotomia solitar. aut fasciculati. Stipul. 2. lanceol. pellucidæ, albæ. Petal. alba.

- ciliata*. S. fol. imbricat. semi--cylindric. margine infra medium ciliato. *Scop. Fl. Carn. tab. 17.*

*In Carniola*.

Caul. diffusi, filiform. dichotomi, fol. aridis vestiti. Fol. 2. lineas longa, acumin. sine aculeo, læte virid. Pedunc. semunc. villosuli, 1-fl. Petal. elliptica, obtusa, integerr. alba. Caps. 6-valv.

- rupestris*. S. fol. planis, subtus trinerviis: petalis cal. brevioribus. *Scop. Fl. Carn. tab. 18.*

*An Arenaria striata* Lin.? *sed in nostra flos duplex: nec petal. obtusa.*

*In Carniola.*



Planta multicaul. Caul. digital. villosuli, paucifl.  
Petal. ovat. acumin.

*hypericifolia*. S. All. Fl. Ped.

*Anagallis aquatica* 4. Lob. p. 467.

*Ad rivulos aquarum in collinis, & montosis* ☉.

Caul. infirmi, ramosi. Fol. tenera, sessilia, ima ovata; superiora elliptico-lanceol. glauca, glabra. Petala parva, vix calycem æquantia. Caps. angulose ovalis, 6-valv.

683. ARENA- Cal. 5--phyll. patens. Petal. 5. æqual. integra.  
RIA. Caps. 1--locul. polysperm. *Differt a Stellaria petal. integris.*

1. *peploides*. A. fol. ovat. acutis, carnosis. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 624. Gmel. Sib. 4. tab. 64.*  
Alfine &c. *Loesel. pruss. tab. 2.*

*Ad litora maris* ☿.

Planta suffruticosa, crassa, salsa. Fol. tenuissime crenata. Petal. plerumq. contracta, alba. Glandulæ in receptaculo.

2. *tetraquetra*. A. fol. ovatis, recurvis, 4-fariam imbricat. carinatis. *Syst. veg. ed. 14. All. Fl. Ped. tab. 89. f. 1.*

*b. Caryophyllus* &c. *Magnol. monsp. tab. 5.*

*In Pyrenæis, Monspelii* ☿.

Caul. pl. digital. ramosi. Fol. breviss. connata, mucronata, margine cartilagineo, striata, glabra, basi subciliata. Capitulum fastigiatum, pedunculat. fl. sub 5. sessil. Petal. obtusa, lineata.

3. *biflora*. A. caulibus procumbent. fol. obovatis, obtusis: pedunc. lateralibus, 2-fl. *Syst. veg. ed. 14. All. Fl. Ped. tab. 44. f. 1. & tab. 64. f. 3.*

*In Europæ australis alpinis* ☿.

Fol. *Serpylli*. Bract. 2. linear. Cal. ovat. Petal. alba. Caps. subglobosa.

4. *lateriflora*. A. fol. ovatis, obtusis: pedunc. laterali, 2--fl. *Syst. veg. ed. 14.*

*In Sibiria.*

Caul. digital. simpliciss. filiformi. Fol. subpetiol. glabra. Pedunc. solitar. longus. Cor. calyce longior.

5. *trinervia*. A. fol. ovatis, acutis, petiolat. nervosis. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 329.*

Alfine &c. *Bauh. hist. 3. p. 364.*

*In Europæ sylvis* ☉.

Caul. pedat. ramosus, dichotom. hirsutus. Fol.

3--5--nervia, subhirsuta, in origine connata, Pedunc. axill. longi, 1-fl. Cal. longe lanceol. Petal. calyce breviora, elliptica, alba. Caps. pendulæ.

6. *ciliata*. A. fol. ovatis, acutis, nervosis, ciliatis. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 346.*

Alfine &c. *Segu. ver. 1. tab. 5. f. 2. Hall. helv. tab. 17.*

*In alpinis Helvetiæ, Pedemontii &c. 24.*

Caulicul. incurvi, bifurcati. Fol. *Serpylli*, opposita, sessil. Petal. ampla, alba.

7. *balearica*. A. caul. repente: fol. subovat. carnosis, lucidis: pedunc. 1-fl. *Syst. veg. ed. 14. Ad. palat. vol. 3. physic. tab. 12? videtur. Herit. Stirp. Fasc. 2. tab. 15.*

*In insulis Balearicis.*

Caul. pollic. subpubescent. ramosi. Fol. confertiuscul. petiol. supra pilis raris, enervia, patentia. Pedunc. longi, subpubesc. inferne pari fol. instructi. Cal. concavus, pubesc. rufescens. Cor. *Spergulae nodosæ*. Petal. obovat. obtusa. Caps. cernua. *Media inter priorem, & sequentem.*

8. *multicaulis*. A. fol. ovatis, acutis, sessil. enerviis: cor. calyce ma. *Syst. veg. ed. 14.*

*In alpinis.*

Caul. multi. Fol. magis, minusve ciliata, pulposa. Flos magnus. Petal. triplo ma. sequenti. *Videtur var. Arenariæ ciliatæ.*

9. *serpyllifolia*. A. fol. subovat. acutis, sessil. cor. calyce brevioribus. *Syst. veg. ed. 14.*

Alfina minor. *Fuchsf. hist. 23. Tabern. pag. 708. Dod. pempt. 30.*

*In Europæ sylvis glareosis, ad muros & locis aridis ☉.*

Planta tota villis hispida, ramosiss. odore oleoso, nauseoso. Caulic. 4-unc. sæpe inferne purpurascen. Fol. *Serpylli*, opposita, aristata, quandoq. oblonga. Pedunc. 1-fl. Caps. basi 10-gona.

10. *triflora*. A. fol. lanceolat-subulat. ciliatis: ramis subtrifloris: petal. obtusis, lineatis. *Syst. veg. ed. 14.*

*In Europa australi 24.*

Caul. multi, palmar. diffusi, adscendent. subpubescent. ramis alternis, erectis. Fol. Juniperina, patentia, subtus pubescent. floralia ovata.

lanceol. subtus pilosa. Bract. 2. ovatæ, ciliatæ.  
Cal. pubescens. Petal. calyce duplo longiora,  
alba.

11. *montana*. A. fol. lineari-lanceol. scabris: caulibus sterilibus longiss. procumbentibus. *Syst. veg. ed.* 14.

*In Gallia austral. montibus* ☉.

Caul. digital. purpurasc. flores erecti; steriles longe flagellati. Pedunc. solitar. 1-fl. subhirti, fol. longiores. Fl. magni. Cal. acutus. Petal. ovata, nervosa, alba. Stam. & pistil. alba. Caps. pendulæ.

12. *rubra*. A. fol. filiform. stipul. membranac. vaginantibus. *Syst. veg. ed.* 14.

a. *Polygonum* &c: *Loef. pruss. tab.* 63.

*Spergula* &c. *Bauh. hist.* 3. p. 722.

b. *A. marina*. *Fl. Dan. tab.* 740.

*Habitat a. in Europæ arenosis collibus: b. in litoribus marinis* ☉.

Caulic. prostrati, ramosiss. summitates viscosæ, & villosæ. Fol. opposita, firmula. Stipul. nitidæ. Pedunc. axillar. breves, 1-fl. Cal. tegens dimidiam capsulam, viscidus. Petal. ovata, concava, ex cœrul-purpurascens. Stam. 5-10.

13. *media*. A. fol. linear. carnosis: stipul. membranac. caulibus pubescentibus. *Syst. veg. ed.* 14.

*Spergula* &c. *E. N. C. cent.* 5. f. 6. *tab.* 4.

*In Germania, Gallia*.

*Simil. A. rubræ maritimæ, sed minus ramosa; caulibus magis adscendentibus, pubescentibus.*

Caul. erectus, digital. ex viridi-rubellus. Fol. ad genicula utrimq. 3. summa opposita, breviora, pubescentia. Pedunc. ex dichotomia 1-fl. Petal. calyce vix ma. alba. Sem. margine membranaceo cincta.

14. *bavarica*. A. fol. semicylindric. obtusis, carnosis: peduncul. terminalibus, subbinatis: petal. lanceolat. *Syst. veg. ed.* 14.

*In Bavaria, Baldo &c.* 24.

Caul. subdichotom. patulus. Fol. opposita, longiora, articulata. Pedunc. 1-fl. Petal. tenuia, alba.

15. *gypsophioides*. A. fol. linearibus; radicalibus setaceis: panicula subpubescent. petal. lanceol. *Syst. veg. ed.* 14.

*In Oriente* 24.

*Statura A. saxatilis. Caul. erectus, semiped. læ-*



- vis, articulis 7-8. Fol. radical. copiosa: caulina ma. Panicula terminal. subfastigiata, dichotoma. Petal. alba, calyce triplo longiora.
16. *saxatilis*. A. fol. subulatis: caulibus paniculatis: calycis foliol. ovatis, obtusis. *Syst. veg. ed. 14.*  
*Alfine &c. Gmel. Sib. 4. tab. 63. f. 2. Vaill. parif. tab. 2. f. 3. Pluk. alm. tab. 7. f. 3.*  
*Anthyllis &c. Barr. ic. 580.*  
*In Europa 24.*  
 Planta dense cespitosa. Fol. connata, plana, glabra, subtus linea dorsali. Pedunc. plerumq. 2-fl. villosi. Petal. calyce longiora, alba. Caps. oblong.
17. *verna*. A. fol. subulatis: caulibus paniculatis: calycibus acumin. striatis. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. Austr. 5. tab. 404.*  
*Alfine &c. Herm. par. tab. 12.*  
*In alpiibus 24.*  
*Differt a priore caul. vix palm. pedunc. villosis: calyc. acutis.* Caul. inferne glabri, superne hirsuti. Fol. opposita, acuta, glabra; ramea breviora, lanceol. concava. Petal. patentiss. obtusa.
18. *hispida*. A. fol. subulat. subtus hispidis. *Syst. veg. ed. 14.*  
*Habitat Monspeli.*  
*Habitus Spergulæ.* Caul. simplic. pilis raris adspersi. Panicula primum dichotoma, mox peduncul. alternis ramosa.
19. *iuniperina*. A. caulibus erectis: fol. subulat. spinosis; calyc. striatis: capsul. oblong. *Syst. veg. ed. 14. Ger. prov. tab. 25. f. 1.*  
*In Gallia 24.*  
*Facies A. saxatilis.* Caul. semiped. stricti, læves. Fol. stricta, rigida; ad radicem conferta; caulina opposita, inæqual. Fl. paniculati. Pedunc. subterni, medio longiore, paucifl. Cal. oblong. acut. 5-nerv. Petal. lanceol. alba.
20. *tenuifolia*. A. caul. paniculat. fol. subulat. petal. calyce brevioribus, lanceolat. caps. erectis. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 389.*  
*Alfine &c. Vaill. parif. tab. 3. f. 1. Bauh. hist. 3. pag. 364.*  
*A. hybrida. Vill. prosp. tab. 30. f. 3.*  
*In Europa, ad muros vetustos &c. ☉.*  
 Caul. digit-palm. subdecumb. filiform. dichotomus,

geniculis incrassatis, quandoq. rubellus. Fol. subconnata, erecta, crassiuscula, integerr. quandoq. rubella. Fl. parvi. Calyc. foliola fere aristata, subtus lineis 2. virid. picta. Petal. lato--lanceol. calyce  $\frac{1}{2}$  breviora, alba.

21. *laricifolia*. A. caul. superne nudiusculo: fol. setaceis: calyc. subhirsutis. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. austr. 3. tab. 272.*

*Stellaria* &c. *Fl. Carn. ed. 2. tab. 18.*

*Alfina* &c. *Magnol. hort. tab. 11.*

*In locis montosis* 24.

Caul. pl. semiped. prostrati. Fol. opposita, sessil. subtus convexula, rigida, pallide viridia; axillaria min. Pedunc. longi paucifl. Cal. cylindr. lineatus. Petal. ampla, obtusa, lineata, glabra, alba. Caps. ovata.

22. *striata*. A. fol. linear. erectis, adpressis: calyc. oblong. striatis. *Syst. veg. ed. 14. All. Fl. Ped. tab. 26. f. 4.*

A. *Cherlerioides*. *Vill. prosp. tab. 30. f. 1. 2.*

*In alpinis* 24.

Caulic. palm. simplic. nudi. Fol. opposita, crassiuscula. Pedunc. terminal. 3. breves. Petal. oblong. Caps. ovata.

23. *fasciculata*. A. caul. erecto, stricto: fol. subulat. fl. fasciculatis: petal. breviss. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. Austr. 2. tab. 182.*

*Stellaria rubra*. *Scop. Fl. Carn. ed. 2. tab. 17.*

*In Austria, Carniola* &c. ☉.

*Habitus Minuartiæ*. *Planta fruticulosa, cespitosa. Sylvestris 3-4-unc. culta pedal. ramosior.* Caul. pubesc. quandoq. purpurasc. Fol. connata, erecta, subciliata, patent. Fl. dichotom. Cal. fol. longis, subciliat. margine albo. Petal. ovat-oblon. alba. Anth. didymæ, globosæ.

24. *grandiflora*. A. fol. subulatis, planis, strictis; radicalibus confertis: caulibus plerumq. 1-fl. *Syst. veg. ed. 14. All. Fl. Ped. tab. 10. f. 1.*

*Alfina* &c. *Allion. Spec. tab. 10. f. 1.*

*Stellaria aculeata*. *Scop. Fl. Carn. tab. 17.*

*In montibus editioribus* 24.

Rad. repens. Caulic. 2-unc. simpl. vel ramosi. Fol. caulina bina. Flos magnus. Cal. foliola caulinis latiora, rigida, striis pl. Petal. ovat. alba. Caps. oblon. *Var. caul. 3-fl.*

25. *austriaca*. A. caulibus suffruticosis, prostratis; inde herbaeis, & erectis: fol. subulatis: fl. geminis: petal. emarginat. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Austr. 3. tab. 270. All. Fl. Ped. tab. 64. f. 2.*

*In alpihus* 24.

Cespes densus. Caul. semiped. bi--trichotomi. Fol. plura, opposita, connata, crassula, subvillosa. Pedunc. & cal. pubescent. Fl. & fruct. erecti. Cal. foliolis lanceol. concavis. Petal. obverse, & anguste ovata, patentiss. aibæ. Cāps. oblon-conica, nitida, calyce brevior.

26. *liniflora*. A. caulibus suffruticosis, erectis, inferne ramosis: fol. subulat. fl. geminis. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. austr. 5. tab. 445.*

*In Europa australi* 24.

Caul. breves, distorti, perennant. Fol. lævia. Cal. foliol. lanceol. striis 2. Petal. obovat. alba. *Differt. a grandiflora fol. non planis; cal. foliolis non multistriatis.*

- capillacea*. A. fol. setaceis, rigidis, glabris: fl. erectis: petalis calyce maioribus. *All. Fl. Ped. tab. 86. f. 2.*

*In Pedemontio* 24.

- recurva*. A. fol. radicalibus congestis, recurvis, subulatis: caul. simplici, sub 3-fl. *All. Fl. Ped. tab. 89. f. 3.*

*In pascuis saxosis editiorum alpium Valdensium &c.*  
♂.

Cespitosa planta. Rosulæ folior. ad terram, ex quibus cauliculi digital. Fol. teretia, supra planiuscula, lævia, 3-4. conjugationibus. Caul. summus semel plerumq. dichotomus. Calycina foliol. ovar--lanceol. aristata, 3 striis donata. Caul. & pedunc. subhirsuti. Fl. albus, calyce paulo ma. Petala aristata.

- obtusis*. A. *All. Fl. Ped. tab. 64. f. 4.*

*In pascuis saxosis, umbrosis alpium* 24.

Caul. pl. procumbent. ramosi. Fol. connata, linearia, obtusa, mollia, viridia. Rami sub 2-fl. Cal. foliolis ovato-lanceolat. virid. Petal. ovata, vix calyce maiora. Fruct. conicus. *Distinguitur a proximis speciebus fol. linear. non revolutis, obtusis: caule infirmo, procumb. ramoso: calyc. foliis non acutis, aut profunde striatis.*



*lanceolata*. A. fol. & calycibus lanceolatis, trinerviis. *Misc. Taur. tom. 5. All. Fl. Ped. tab. 26. f. 5.*

*In pascuis saxosis alpium 24.*

Cespes cauliculorum ramosorum repentium, qui folior. gemmis donantur; hæque gemmæ in cauliculos se explicant uncial. & ultra, erectos, simplices. Ad ortum horum cauliculor. rosula fol. ovato-acutorum; deinde opposita, sessilia fol. duo, quæ quo magis summitati accedunt, magis interne se distant. Fol. glabra sunt, raro subhirsuta, erecto--patent. firma, 3. lin. longa in elatioribus cauliculis. Caul. in 2, raro 3 pedunc. abit, vix divergentes, nudos, vel una coniugatione donatos. Flos amplus, patens. Petala ovata, calyce paulo ma. Fruct. conicus, 1--locul. 5--valv.

*norvegica*. G. Gunn. *Fl. norv.*

*In Norvegia.*

*Simil. A. balearicæ. Differt ab A. ciliata, & multicauli fol. margine prorsus nudis &c. Caul. digital. procumb. subteret. Fol. ovata, vel ovato-lanceol. enervia, ubique nuda, nitida, parum carnosa, directe, aut decussatim opposita, hinc conferta. Fl. terminal. bini. Petal. oblong. obtusiusc. cal. paulo ma. Caps. ovata.*

*filifolia*. A. fol. filiform. liberis. *Forsk. Suppl. Æg.*

*In Arabia.*

Caul. debiles, dichotomi. Calyc. æqual.

*Haller*. A. caul. recto, prostrato: fol. ovatis. *Hall. hist. n.º 877.*

An *Aline* &c. *Zann. tab. 10. f. 12?*

*In alpibus altioribus Helvetiæ.*

*Simil. A. ciliatæ, sed caul. longi, prostrati. Fol. perfecte rotunda, absque acumine, ad basin subciliata. Fl. breviter peduncul. Petal. ovata.*

684. **CHER- LERIA**. Cal. 5--phyllus. Squamæ 5. bifidæ, petaloideæ. Anth. alternæ, steril. Caps. 3--valv. 1--locul. 3--sperm.

1. *Sedoides*. C. *Jacq. Austr. 3. tab. 284. Hall. Helv. tab. 29. opusc. tab. 1. f. 3. Segu. ver. 3. tab. 4. f. 3.*

*Lychnis* &c. *Pluk. alm. tab. 42. f. 8.*

*Sedum* &c. *Morif. hist. 3. f. 12. tab. 6. f. 14.*

*In alpium pascuis saxosis 24.*

Planta cespitosa, late sese diffundens. Caulicul. repentes, 2-3-unc. Fol. parva, opposita, o-

bovat. succulenta, margine scabra, basi con-  
nata in vaginam. Ex centro rosulæ adultioris  
furgunt pedunc. breves, 1-fl. Cal. flavo-virid.  
Nectar. e viridi-lutea. Petal. luteola. *Culta*  
*planta produxit nectar. 10. integra.*

685. DEUTZIA. Cal. 1-phyll. Filam. 3. cuspidata. Caps. 3-  
locul.

1. *scabra*. D. *Syst. veg. ed. 14. Thumb. Jap. tab. 24. Act.*  
*Medic. Svec. T. I. tab. 16.*

Jamma usugi. *Kamph. amœn. exot. Fasc. V.*  
pag. 854.

*In Japonia h.*

Arb. orgyal. ramosiss. Rami alterni, teretes,  
læves, purpurasc. Ramuli patuli, villosi. Fol.  
pollic. & ultra, opposita, petiol. ovar--acum.  
ferrata, patentia, venoso--rugosa, pilis stel-  
latis scabra, Petiol. linear. villosa--scabri. Fl.  
in apice ramulor. paniculati. Petal. alba.

686. GARI- Cal. 5--phyll. coloratus. Petal. 5. æqualia, ne-  
DELLA. ctarifera, 2-labiata, 2-fid. Caps. 3. connexæ,  
polysper. *Nigellæ adfinis.*

1. *Nigella-* G. *Syst. veg. ed. 14. Garid. prov. tab. 39.*  
*strum.* *Nigellastrum &c. Magn. hort. tab. 143.*

*Nigella &c. Moris. hist. 3. f. 12. tab. 18. f. 6.*  
*In Gallo--provincia &c. ☉.*

Caul. pedal. ramosus. Fol. alterna, sessil. lineari--  
multifid. Fl. axill. & terminal. solitar. peduncul.  
Petal. albido-pallescent. Sem. nigra, subaromat.

687. MALPI- Cal. 5-phyll. basi extus poris melliferis. Petal. 5.  
GHIA. subrotund. unguicul. Bacca 1-locul. 3-sperm.

1. *glabra*. M. fol. ovat. integerr. glabris: pedunc. umbel-  
latis. *Syst. veg. ed. 14. Mill. ic. tab. 181. f. 2.*

*Cerasus &c. Comm. hort. 1. tab. 75.*

*Arbor &c. Sloan. Jam. hist. 2. tab. 207. f. 2.*

*In Jamaica, Brasilia &c. h.*

Arb. 15--ped. ramis caput formantibus. Fol.  
opposita, breviter petiol. unciam longa. Um-  
bellæ interfoliac. peduncul. 4-fl. Cal. incurvus.  
Petal. patent. ciliata, purpur. Bacca Cerasi-  
form. rubra.

2. *Unicifolia*. M. fol. ovatis, integerrim. glabris: peduncul. 1-fl.  
*Syst. veg. ed. 14. Plum. gen. tab. 166. f. 2.*

*Cerasus &c. Pluk. alm. tab. 57. f. 7.*

*In Amer. meridion. h.*

Arb. *Mali Punica* facie, ramis brachiatis.

Fol. opposita, subsessil. acuta, venosa. Pedunc. axillar. Petal. eleganter crenata. Baccæ subrotund. angulosæ, molles, sulcatæ. Sem. canaliculata.

3. *niida*. M. fol. lanceol. integerrim. glabris: spicis lateralibus. *Syst. veg. ed. 14.*

*In America* h.

Arbuse. Fol. opposita, 4-pollic. acumine obtuso. Styl. unicus. Sem. plerumq. bina, glabra.

4. *urens*. M. fol. oblong-ovat. setis subtus decumbentibus, rigidis: pedunc. aggregatis, 1-fl. *Syst. veg. ed. 14. Mill. ic. tab. 181. f. 1. Plum. gen. tab. 167. f. 1.*

Arbor &c. *Sloan. Jam. hist. 2. tab. 207. f. 3.*

*In Amer. calidiore* h.

Planta fruticosa. Fol. lauriform. sed leviter sulcata, opposita, subpetiol. integerr. Stipul. utrimq. binæ. Fl. axillar. utrimq. 4. pedunc. 1-fl. geniculo instructis. Petal. angusta, extremo subrotundo, pallide purpur. Bacca Cerasiform. rubra.

5. *angustifolia*. M. fol. lineari-lanceol. setis utrimq. decumbentibus, rigidis: peduncul. umbellatis. *Syst. veg. ed. 14.*

*In Amer. meridion.* h.

Altitudo humana. Fol. multa, opposita. Petal. e roseo--albentia.

6. *crassifolia*. M. fol. ovatis, integerr. subtus tomentosis: racemis terminal. *Syst. veg. ed. 14. Aubl. Guian. tab. 182.*

Tiliæ &c. *Sloan. Jam. hist. 2. tab. 163. f. 1.*

*In Amer. calidiore* h.

Arb. 60-ped. Fol. palmar. subpetiol. sæpe alterna, crassa, supra pubescent. Stipul. 2. oblong. villosæ, ad basin petiolor. Racemi terminal. longi, tomentosi. Cor. lutea. Bacca subvirid. villosa.

7. *Verbascifolia*. M. fol. lanceol-ovar. subtus tomentosis, integerr. racemis terminalibus. *Syst. veg. ed. 14.*

Baccifera &c. *Sloan. Jam. 2. tab. 198. f. 2.*

*In Amer. calidiore* h.

Frutex tortuosus, ped. subramosus. Fol. 6-8. ad summitatem opposita, pedalia, in petiolos desinentia, villosa. Stipul. 2. breves, oppositæ. Racem. longi, villosi. Cor. lutea. Bacca globosa, villosa, sublutea.



8. *aquifolia*. M. fol. lanceolat. dentato-spinosis, subtus hispidis. *Syst. veg. ed. 14. Plum. gen. ic. 168. f. 1.*  
*In Amer. calidiore h.*

Planta fruticosa. Fol. opposita, supra glabra.  
 Fl. axill. 1-2. longe peduncul. penduli. Baccæ  
 subrot--obtusæ, sulcatæ, pendulæ.

9. *coccigera*. M. fol. subovat. dentato-spinosis. *Syst. veg. ed. 14. Plum. gen. ic. 168. f. 2.*

*In Amer. calidiore h.*

Planta suffrutic. Rami flagellofi. Fol. opposita, sessil. Fl. axillar. solitar. longe peduncul. Bacca pusilla, contracta, sulcata, durior, & rigidior.

*altissima*. M. fol. ovat-oblong. subtus tomentosis: fl. spicat. albis. *Aubl. Guian. tab. 181.*

*In Caribæis h.*

Arb. 80-ped. superne ramosiss. ramis sparsis. Fol. opposita, longe petiol. acuta, integerr. subtus rufescent. Stipul. 2. breves, rufescent. ad basin petiolor. Fl. terminal. Bacca globosa, pallide rubens.

*Mourella*. M. fol. ovatis, subtus tomentosis: fl. spicatis, luteis. *Aubl. Guian. tab. 183.*

*In Caribæis h.*

Arb. 20-ped. superne ramosa, ramis sparsis. Fol. opposita, breviter petiol. integerr. rigida. Stipul. 2. oppositæ ad basin petiolor. Spica terminal. Bacca globosa, subvirid. villosa.

*martinicensis*. M. fol. ovatis, subtus setis decumbentibus, rigidis. *Jacq. amer.*

*In Martinicæ fruticetis h.*

*Habitus* M. glabræ, a qua differt setis, & sapore fructus minus grato. Omnium congenerum urentissima.

*diphylla*. M. *Jacq. amer.*

*In Carthagenæ sylvaticis maritimis h.*

Frutex erectus, 8--ped. Fol. opposita, integerr. Racemi 2--pollic. simpl. in ramusculis, 2--phyll. Fl. flavi. Baccæ rubræ.

*odorata*. M. fol. ovatis, emarginatis, utrimq. tomentosis: racemis axillaribus. *Jacq. amer. tab. 177. f. 41. ed. pict. tab. 260. f. 36.*

*In Carthagenæ fruticosis h.*

Frutex erectus, 8-pedal. Fol. 3--pollic. opposita, obtusa, integerr. Racemi oppositi. Petal. flava,  
 odore

odore *Lupini lutei*. Baccæ aurantiacæ. Sem. rugosa, vel glabra.

*grandiflora*. M. fol. lanceol--oblon. racemis axillar. corymbosis. *Jacq. amer.*

*In Martinicæ sylvis apricis* h.

Arbuse. erecta, 10-pedal. comosa. Fol. pedal. opposita, integerr. Petal. flava.

688. BANI- Cal. 5-part. basi extus poris melliferis. Petal.  
STERIA. subrotunda, unguiculat. Sem. 3. membrana-  
ceo-alata.

1. *angulosa*. B. fol. sinuato-angulosis. *Syst. veg. ed. 14.*

*Clematis &c. Plum. amer. tab. 92.*

*In America calidiore* h.

Sarmenta prælonga, nodis distantibus, tumidis.

Fol. opposta, longe petiol. palmar. area fere quadrata, lævia, cum prominentiis ambitum angulosum efficientibus, supra obscura, subtus dilutiora. Pedunc. axill. 6-7-fl. Petal. lutea.

2. *purpurea*. B. fol. ovatis: spicis lateralibus: seminibus erectis. *Syst. veg. ed. 14.*

*Acer &c. Plum. sp. ic. 15.*

*In Amer. meridion.* h.

Fol. ad petiolum opposita; in pinnis 4-iuga, integra, venosa. Petal. purpur. Sem. 2. opposita.

3. *laurifolia*. B. fol. ovat-oblong. rigidis: racemis terminalibus. *Syst. veg. ed. 14.*

*In Jamaica* h.

Frutex scandens, aliquot pedum, ramis pedali-  
bus. Fol. 3-unc. longa, sescunc. lata, oppo-  
sita, petiolat. obscure virid. Fl. parvi, lutei.

4. *benghalen- B. fol. ovat--oblon. acuminat. racemis lateralibus:*  
sis. seminibus patentibus. *Syst. veg. ed. 14.*

*Acer &c. Plum. sp. ic. 14. Pluk. alm. tab. 3.*  
f. 1.

*In Indiis* h.

Arb. Fol. opposita, petiol. integerr. venosa. Ra-  
cemi oppositi. Petal. crenata, cœrul. Semin.  
alæ introrsum tenuiores.

5. *dichotoma*. B. fol. ovatis: ramis dichotomis. *Syst. veg. ed. 14.*

*Acer &c. Plum. sp. ic. 13.*

*In Amer. calidiore* h.

Caul. volubili. Fol. integerr. subtus hirsuta. Fl.  
axillar. congesti. Petal. connata, ex aureo--  
cinerea. Nectar. 2. ad basin petalor. Sem.  
pendula.

6. *fulgens*. B. fol. subovat. subtus tomentosis : racemis brachiatis ; pedunc. umbellatis . *Syst. veg. ed. 14.*  
*Acer &c. Sloan. Jam. Hist. 2. tab. 162. f. 2.*  
*In America h.*  
 Caul. 4-5-pedal. scandens . Fol. opposita ,  $2\frac{1}{2}$  unc. longa ,  $1\frac{1}{2}$  lata , nitida . Racemi oppositifol.  
 Fruct. fulgens , aureus .
7. *brachiata* . B. fol. subovat. ramis brachiatis : semin. introrsum angustioribus . *Syst. veg. ed. 14.*  
*In America h.*  
*Simil. priori , sed fol. magis obtusa . Rami summi paniculati .*
- 
- sinemariensis* . B. fol. ovatis , acumin. fl. corymbosis , luteis .  
*Aubl. Guian. tab. 185.*  
*In Caribæis h.*  
 Frutex 5--ped. ramis sarmentosis , volubilibus .  
 Fol. opposita , petiol. integerr. subtus dilutiora , setis minimis , utrimq. acutis tecta . Stipul. 2. minimæ , oppositæ ad basin petiolor. Fl. axillar. Cor. lutea .
- Quapara* . B. fol. ovatis , subtus tomentosis : fl. corymbosis : femin. erectis . *Aubl. Guian. tab. 186.*  
*In Caribæis h.*  
 Frutex 6-ped. Rami sarmentosi , volubil. ramuscul. villosis , rufescent. Fol. opposita , petiol. acuta , integerr. supra pubescent. subtus rufescentia . Stipul. 2. exiguæ , rufescent. Fl. axill. globosi , oppositi , longe peduncul. Cor. lutea .
- tetraptera* . B. *Sonnerat. Voyag. aux Indes &c. 2. tab. 135.*  
*In Malabarâ h.*  
 Arb. pumila . Fol. opposita , breviter petiol. ovalia , acumin. integerr. subtus nervosa , 4. pollic. longa , 2. lata . Fl. terminal. racemosi , peduncul. oppositis , bracteati . Cor. albo-rufescens . Fruct. præditus 4. alis inæqualibus .
689. *HIRÆA*. Cal. 5-phyll. Petal. subrotund. unguiculata . Caps. alis tribus , 3-locul. Sem. 2.
1. *reclinata* . H. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. amer. tab. 176. f. 42. ed. picta tab. 260. f. 37. quoad folium.*  
*In Carthagenæ sylvis h.*  
 Arbusc. 15-ped. ramis longis , reclinatis , cortice cinereo . Fol. oblong. superne paulo latiora , obtusa , integerr. subtus glabra , supra subvillosa . Petiol. 2. stipulis cincti . Pedunc. multi , breves . Fl. flavi , inodori .



690. TRIOP- Cal. 5--part. Petala mentiuntur germinis alæ 6.  
TERIS. Caps. 3, bialatæ, 1-sperm.

1. *jamaicensis*. T. Syst. veg. ed. 14.

Acer &c. Plum. ic. tab. 16?

In Amer. calidior.

Caul. volubil. Fol. opposita, breviter petiol.  
Ligustriform. ovato-oblong. glabra, utrimq. virid.  
supra nitida. Rami axillar. oppositi, 3. coniugationibus: panicula sæpius 3-fid. Fl. herbacei.

691. ERY- Cal. turbinat. Cor. petalis basi squamula nectathROXYLON. rifea, emarginata. Stam. basi connexa.  
Drupa 1-locul.

1. *areolatum*. E. fol. (plerumque) obovatis. Syst. veg. ed. 14.

Jacq. amer. tab. 87. f. 1. ed. pict. tab. 129.

Brown. Jam. tab. 38. f. 2.

In maritimis arenosis Carthagenæ h.

Arb. 12-ped. ramis patentiss. cortice sature fusco.  
Fol. sesquipollic. alterna, petiol. raro subrotund.  
emarginata, integra, nitida, supra virid. subtus  
leucophœa. Pedunc. aggregati, breves. Petal.  
candida, odore suavi *Jonquillæ*. Fruct. mollis.  
ruber.

2. *havanense*. E. fol. ovatis. Syst. veg. ed. 14. Jacq. amer. tab.  
87. f. 2. ed. picta tab. 130.

In Havanæ rupestribus maritimis h.

Frutex 3--ped. habitu prioris, sed fol. ovata,  
obtusâ, integerr. Fruct. aurantii col.

## PENTAGYNIA.

692. AVER- **C**AL. 5-phyll. Petal. 5. superne patentia. Po-  
RHOA. inum 5--gon. 5--locul.

1. *Bilimbi*. A. caudice nudo, fructificante: pomis oblong.  
obtusangulis. Syst. veg. ed. 14. Rumph. amb. 1.  
tab. 36. H. Mal. 3. tab. 45. 46.

In India h.

Arbuseul. 8-12-ped. ramis in orbem diffusis. Fol.  
pinnata, longiss. petiol. Foliol. sub 11--iuga,  
subæqual. ovato-lanceol. infer. paulo breviora,  
breviter petiolat. acumin. integerr. uniformia,  
nec apicem versus ma. supra nitida, odora.

- Fl. trunco, & ramis inhærent, in fascias spirithamæas collecti. Cal. rubens. Petal. purpur. subtus pallidiora. Poma ovi gallinacei similia, viridia, edulia.
2. *Carambola*, A. axillis folior. fructificantibus: pomis oblongis, acutangulis. *Syst. veg. ed.* 14.  
*Prunum* &c. *Rumph. amb.* 1. tab. 35.  
*Tamara* &c. *Hort. mal.* 3. tab. 43. 44.  
*In India* h.
- Arb. 12--14--pedal. ramis nudis; stipulis subulat. Fol. alterna, impari-pinn. foliol. alterna, ovat-acumin. integerr. crassa, glabra, supra nitida; inferiora distant. breviora, & angustiora. Fl. paniculati. Cal. rubens. Petal. purpur. Poma flavescent. edulia. *Fol. tactu contrahuntur, ut Mimosa.*
693. SPONDIAS. Cal. 5--dentat. Cor. 5--petal. Drupa nucleo 5--locul.
1. *Mombin*, S. fol. petiolo comm. compresso. *Syst. veg. ed.* 14.  
*S. Myrabolanus*. *Jacq. amer. tab.* 88. *ed. pida* tab. 131. *Sloan. hist.* 2. tab. 219. fig. 3. 4. 5.  
*Prunus* &c. *Pluk. alm. tab.* 218. f. 3.  
*In India occident.* h.
- Arb. magnitudine varia, etiam 30-ped. Fol. plerumq. in apice ramorum, alterna, impari-pinn. Foliol. sub 10-iuga, breviter petiol. subovat. integra, vel supra medium serrata, nitida, venosa. Racemi breves. Fl. parvi, rubri. Fruct. purpuro-flavi, pulpa dulci.
2. *Myrabola*-*nus*. S. petiol. teretibus: foliol. acuminat. nitidis. *Syst. veg. ed.* 14. *Sloan. Jam. hist.* 2. tab. 219. f. 1. 2.  
*Prunus* &c. *Mer. Surin. tab.* 13. bona.  
*In Amer. meridion.* h.
- Arbor procera, coma ampliff. Fol. alterna, petiol. impari-pinn. Foliol. sub 8. ovāt--oblong. obtusa, integerr. glabra. Fl. terminal. laxe panicul. multi, parvi, albidi. Fruct. flavi cum rubedine, odori, graveolent. pulpa acidula.
- 
- Cytherea*. S. *Sonnerat. Voyag.* 2. tab. 123.  
*In Taïti* h.
- Arb. magna, erecta, ligno fragili, cortice viridi, glabro. Fol. impari-pinn. Foliol. 9-13. ovalia, acumin. serrata, glabra, nervis parallelis. Fl. axillar. racemosi, parvi. Drupa filamentosa.

694. COTY- Cal. 5-fid. Cor. campanifor. 4-5-fida. Squamæ  
LEDON. nectariferæ 5. ad basin germinis. Caps. 5. Fol.  
carnosa, succulenta.

1. orbiculata. C. fol. orbiculat. carnosus, planis, integerr. caule  
fruticoso. *Syst. veg. ed. 14.*

Sedum &c. *Morif. hist. 3. f. 12. tab. 7. f. 39.*  
*Herm. Lugd. tab. 551.*

*Ad cap. b. Spei h.*

Caul. pollicem crassus; ramosus, e viridi--cane-  
scens. Fol. parte inferna caul. dense congesta;  
sessil. glauca, limbo purpur. vel palléscente.  
Caul. superne nudus; in tenue geniculum pre-  
tuberans, quo divaricatur in ramulos. Fl. ob-  
long. 5-goni. Petal. sursum reflexa, incarnata,  
flamin. flavescentibus.

2. spuria. C. fol. spatulato-lanceol. carnosus, integerr. caul.  
fruticoso. *Syst. veg. ed. 14. Comm. rar. tab. 23.*  
*Burm. afric. tab. 18. 19. & f. 1. tab. 22. f. 1.*

Sedum &c. *Morif. hist. 3. f. 12. tab. 7. f. 40.*

*Ad cap. b. Spei h.*

Caul. crassiss. ramis apice tantum foliosis. Fol.  
naturaliter opposita, monstrosa variant alterna,  
petiol. obtusa. Scapus pedal. subumbellato--  
divaricat. Fl. nutantes, flavescent. limbo re-  
voluto, intus consperso atomis rubris. Anth.  
rubræ.

3. spinosa. C. fol. oblong. spinoso--mucronat. caul. spicato.  
*Syst. veg. ed. 14. Comm. Gott. 1776. tab. 5.*  
*Gmel. Sib. 4. tab. 67. f. 2.*

*In Sibiria &c. 24.*

Fol. radical. in orbem disposita more *Sempervivi*,  
subulata, subplana, apice spina molli. Caul.  
erectus, pedal. simpl. crassus, angulat. imbri-  
catus fol. spiraliter dispositis. Fl. axill. sessiles,  
3-5. albi. Petal. 5. lanceol. calyce duplo lon-  
giora, conniventia.

4. hemisphæri- C. fol. semiglobosis. *Syst. veg. ed. 14. Dill. elth.*  
ca. *tab. 95. f. III.*

*In Æthiopia h.*

Caul. palmar-pedal. incurvi, plerumq. tortuosi,  
spadicei, cum lineis cinereis; quibus fol. hinc  
inde singularia adhærent, in apice vero plu-  
ra, levi tactu decidua, crassi, glabra, glau-  
ca, punctata; inferiora rotundiora. Petal. vi-  
rescent. margine purpur.



5. *ferrata*. C. fol. ovalibus, crenatis: caul. spicato. *Syst. veg. ed. 14. Dill. elth. tab. 95. f. 112.*  
*In Creta, Sibiria.*  
 Caul. 1-pl. Fol. inferior. in orbem posita, latiora; caulina alterna. Cor. purpur.
6. *Umbilicus*. C. fol. cucullato-peltat. ferrato-dent. alternis: caul. ramoso: fl. erectis. *Syst. veg. ed. 14. Black. tab. 263. Dod. mem. tab. 73.*  
*b. C. tuberosa.*  
 C. umbilicus &c. *Clus. hist. 2. p. 63.*  
 Sedum &c. *Moris. hist. 3. f. 12. tab. 10. f. 4.*  
 Ombilico di Venere. *Matth.*  
*In Europæ locis humenibus 24.*  
 Caul. semiped. subnud. Fol. alterna. Fl. terminal. racemosi. Cor. albido-subflavescens, aut purpurasc.
7. *hispanica*. C. fol. oblong. subteretibus: fl. fasciculatis. *Syst. veg. ed. 14 Loeffl. it. tab. 1.*  
*b. C. palustris &c. Shaw. afr. tab. 178.*  
*In Hispania, Africa &c. ♂.*  
 Caul. digital. erectiuscul. teres, simpl. Fol. sessil. obtusiusc. subpilosa, supra planiuscul. rufopunctata. Cor. extus rufescens, subpilosa, limbo supra incarnato, striis 3. purpurascens. & apice purpur. *Habitus fedi albi.*
8. *papillaris*. C. fol. oppositis, tereti-ovatis; fl. corymbosis. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*  
*Ad cap. b. Spei.*
9. *mamillaris*. C. fol. alternis, tereti-ovatis: fl. alternis, subsessilibus. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*  
*Ad cap. b. Spei.*
10. *triflora*. C. fol. obovatis, integris: fl. ternis, subpeduncul. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*  
*Ad cap. b. Spei.*
11. *Cacalioides*. C. fol. teretibus: fl. corymbosis: caul. fruticoso. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*  
*Ad cap. b. Spei.*  
 Fl. lutei referunt *Cacaliam*.
12. *reticulata*. C. fruticosa, fol. teretibus: fl. reticulato-corymbosis. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*  
*Ad cap. b. Spei b.*  
 Refert *Staticem reticulatam*.
13. *paniculata*. C. fruticosa, fol. oblong-ovat. sessil. paniculato-divaricato-racemosa. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*  
*Ad cap. b. Spei.*

14. *laciniata*. C. fol. (inferior.) laciniat: fl. 4-fid. *Syst. veg. ed. 14. Boerh. Lugd. 1. tab. 288.*

*Telephium* &c. *Pluk. alm. tab. 228. tab. 3.*

*Planta* &c. *Rumph. 5. tab. 95.*

*In Ægypto, India* h.

Caul. ad apicem usq. foliosus. Fol. pinnatif. basi dilatata. Fol. caulina infer. cuneiform. 3-5-fid. summa oblong. integra. Fl. paniculati. Cor. lutea, tubo 4-gon. inferne amplo. Stam. 8. brevia; 2. longa.

35. *nudicaulis*. C. fol. spathul-ovatis; cinæ fl. 4-fid. *Syst. veg. ed. 14.*

*C. integra. Comm. palat. Vol. 3. tab. 9.*

*Habitat*

Caul. in apice subnudus. Fol. obsolete serrata. Pedunc. dichotomi. Caul. & cor. extus pubescens, limbo supra coccineo, subtus pallidior. Stam. 8.

*malacophyllum*. C. *Pall. it. 3. tab. O. f. 1.*

*In Dauuria* ♂.

*Simil. Crassula spinosa*. Fol. radical. in orbem posita; interiora longiora, lanceol.-ligulata, plana, carnosa, tenerrima, margine acuto, integerr. apice rotundato, inermi. Scap. plerumq. solitar. simpl. Fol. caulina crebra, alterna. Fl. spicati, confertim imbricati, subpeduncul. albidi, bract. ovat-acutis, carnosus.

695. *SEDUM*. Cal. 5-fid. aut 5-phyll. Petal. 5. æqualia. Squamæ nectariferæ 5. ad basin germinis. Caps. 5. polysper. *Fol. succulenta*.

\* *Planifolia*.

1. *verticillatum*. S. fol. (plerumq.) quaternis. *Syst. veg. ed. 14.*

*Amæn. acad. 2. tab. 4. f. 14.*

*In Europa, & Sibiria* h.

Caul. erectus, ped. teres. Fol. vix digitum longa, lanceol. acutiuscul. serrata, lævia, minus carnosa. Racem. axill. parvi, solitar. Petal. e rubro-albentia.

2. *Telephium*. S. fol. planiuscul. ferratis: corymb. folioso: caul. erecto. *Syst. veg. ed. 14. Ludw. ed. tab. 200. Knorr, del. 1. tab. f. 5.*

*Telephium album*. *Fuchf. hist.* 800.

b. *S. Telephium purpur.* *Fl. Dan. tab.* 686.

c. *S. Telephium maximum*.

*Telephium hispanic.* 1. *Clus. hist.* 2. p. 66. *Blacke tab.* 191.

*In Europæ siccis* 24.

Rad. ex tubercul. candidis constans. Caul. erectus, simpl. Fol. sessil. elliptica, surrecta, glauca. Corymb. foliosi, 3-fid. Petal. subrubra, extus albescentia.

3. *Anacamptis*. *S.* caulibus decumbent. fol. cuneiform. fl. corymbosis. *Syst. veg. ed.* 14.

*Telephium* VI. *Clus. hist.* 2. p. 67.

*Anacampteros* min. *Bauh. hist.* 3. p. 682.

*In alpinis, & rupibus* 24.

Caul. dodrant. contorti. Fol. inordinata, cuneiform. integerr. cito, & hyeme decidua. Cal. margine albo. Petal. cava, subrubra, extus glauca, farina conspersa.

4. *Aizoon*. *S.* caul. erecto: fol. lanceolat. ferratis, planis: cyma terminali, sessili. *Syst. veg. ed.* 14. *Gmel. Sib.* 4. tab. 67. f. 1.

*Anacampteros* &c. *Amm. ruth. tab.* 11.

*In Sibiria* h.

Radix crassa, extus lutea, intus alba. Caul. sesquidodr. dilute virid. Fol. crebra, inordinata, pollicar. Petal. lanceol. flava.

5. *hybridum*. *S.* fol. cuneifor. concavis, aggregatis, subdent. ramis repentibus: cyma terminali. *Syst. veg. ed.* 14. *Gmel. Sib.* 4. tab. 62. f. 1. *Comm. nov. Goett. Tom.* 6. tab. 5.

*In Tataria* h.

Caul. dodrant. propaginibus foliosis, usque ad 2. partes nudus, tuberculatus. Fol. subtus dilutiora. Cor. flava.

6. *populifolium*. *S.* fol. petiolat. cordat. dentatis: fl. paniculat. *Syst. veg. ed.* 14. *Pall. it.* 3. tab. O. f. 2.

*In Dauuria* h.

*Simil. Saxifragæ rotundifoliæ, sed fol. cordata, crassa, carnosæ. Fructificatio sedi. Rami multi, lignosi, furcul. spitham. herbac. floriferis. Fol. Populi, longe petiol. inæqualiter crenato-sinuat. peltato-concava, carnosæ, mollia; lære virid. Rami floriferi, rubri; fol. min. alternis, ovat. Petal. fugacia, flava, apice rubicundo.*



7. *stellatum*. S. fol. angulat. planiuscul. fl. lateralibus, solitar. sessilibus. *Syst. veg. ed. 14. Bauh. hist. 3. p. 680.*

*Sempervivum 3. Col. phytob. tab. 11.*

*Aizoon. &c. Camer. hort. ic. 2.*

*In Italia, Helvetia &c. ad aggeres lapidum &c.*



Caul. diffusus, debilis, ramosus. Fol. ovata, lata, obtusa. Petal. acuta, dilute carnea, cum linea virid.

8. *Cepæa*. S. caul. ramoso: fol. planis: fl. paniculat. *Syst. veg. ed. 14. Moris. hist. 3. f. 12. tab. 7. f. 37. Math. 933. Clus. hist. 2. p. 68. Cam. epit. p. 673.*

S. gallioides. *Pourr. & All. Fl. Ped. tab. 65. f. 3. cum etiam in S. cepæa fol. quandoq. sint verticillata.*

*In locis umbrosis, humidis ♂.*

Caul. dodrant. multifi. Fol. sessil. summa alterna: ima *Serpyllifolia*, ni succulenta forent; super. ovata. Petal. alba, linea purpurea divisa.

9. *libanoticum*. S. fol. radical. fasciculat. spathulato-lanceol. caul. subnudo, simpliciss. *Syst. veg. ed. 14.*

*In Palæstina 24.*

*Facies sempervivi montani*. Fol. integerr. glabra. Caul. adscendens, semiped. inferne adpersus fol. linear. acutis. Racemus terminal. longitudine caul. Capsl. non divergentes, calyce cinctæ.

## \*\* *Terebifolia*.

10. *dasyphyl- lum*. S. fol. oppositis, ovatis, obtusis, carnosis: caul. infirmo: fl. sparsis. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. hort. 2. tab. 153. Bauh. hist. 3. p. 691. Moris. hist. 3. f. 12. tab. 7. f. 35. Dalecham. hist. 1133.*

*In Hispania, Italia &c. ad muros, & rupes 24.*

Caul. prostrati, triental. & ultra, ramosiss. superne cum calyc. viscidis. Fol. in acervos collecta, brevia, pene conica, versus caul. excavata, venis rubris adpersa. Umbel. terminal. paucifi. peduncul. ramosis. Petal. ovar. lanceol. alba, mixta rubore; sicca rubentia.

11. *reflexum*. S. fol. sparsis, subulatis, basi solutis: inferior. recurvatis. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 113.*

S. minus V. *Clus. 60.*

*Ad montium radices, & muros, in Europa 24.*

Caul. suberecti, pedal. superne ramosi. Fol. glauca, recta, caduca, virid. quandoq. crispata, in spinulam terminata: radical. in orbem disposita; caulina conferta. Petal. lutea, 6-7-8-9.

12. *rupestre*. S. fol. subulat. quinquefariam confertis, basi solutis: fl. cymosis. *Syst. veg. ed. 14. Dill. elth. tab. 255. f. 333.*

*In Europa ad radic. montium, & in vallium locis saxosis, apricis 24.*

Caul. plerumq. inferne nudi, folior. vestigiis præditi, rubentes, superne pallide virentes. Fol. alterna, sessil. attenuata, acumin. glauca, liberam membranam a basi demittentia. Petal. lutea. *Differt a Sempervivo sediform. fol. paulatim in acutum apicem adtenuatis; petal. luteis &c.*

13. *lineare*. S. fol. tereti-linear. oppositis: cymis 3-fid. *Syst. veg. ed. 14. Thumb. Jap.*

*In Japonia.*

Caul. simpl. glaber. Fol. pollic. amplexicaul. patentia, glabra. Fl. lutei, intermedio sessili.

14. *hispanicum*. S. fol. teretiuscul. acutis: radicalibus fasciculat. cyma pubescente. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. austr. 5. tab. 47. Dill. elth. tab. 256. f. 332.*

*In Hispania 24.*

15. *album*. S. fol. oblongis, obtusis, compresso-teretibus, sessil. patentibus: cyma ramosa. *Syst. veg. ed. 14. All. Fl. Ped. tab. 65. f. 2. Fl. Dan. tab. 66. Black. tab. 428.*

*Sempervivo minore. Matth.*

*In Europa petris, & muris humidioribus 24.*

Caul. 3-unc-pedal. superne ramosi, rubri. Fol. non admodum conferta. Petal. acumin. alba, cum linea rubra longitudinali.

16. *acre*. S. fol. subovat. adnato-sessil. alternis, gibbis, erectiuscul. cyma sub 3-fid. *Syst. veg. ed. 14. Knorr. del. 2. tab. S. 12. f. 1. Black. tab. 232.*

*Sedum VIII. Clus. 61.*

*In Europæ campis sterilibus 24.*

Caul. cespitosi, palmar. ab imo ad summum ramosi, toti foliosi. Petal. lutea.

17. *sexangulare*. S. fol. subovat. adnato-fessil. gibbis, erectiuscul. re. sexfariam imbricatis. Syst. veg. ed. 14.

Sempervivum &c. Cam. epit. 856.

*In Europæ campis apricis, siccis 24.*

Caul. pl. subdigital. patentes. Fl. in singulo cymæ ramo raro ultra 3. unilateral. fessil. flavi. Stam. 8-12.

18. *annuum*. S. caul. erecto, solitar. annuo; fol. fessil. alternis, ovatis, gibbis: cyma recurva. Syst. veg. ed. 14. Ray. angl. 3. tab. 12. f. 2.

*In Europa boreali, secus vias alpiam ☉.*

Simil. priori, sed fol. rubicunda, & planta annua. Differt a *S. acri* rad. annua; caul. erecto, solitario. Cyma proprie nulla, sed rami florent. recurvati. Petal. lutea.

19. *villosum*. S. caul. erecto: fol. planiuscul. pedunculisq. subvillosis. Syst. veg. ed. 14.

*S. minus III. Clus. hist. 2. p. 59.*

*In Europæ pratis paludosis, & locis uliginosis ☉.*

Caul. semiped. parum ramosi, hirsuti, visceri. Fol. sparsa, hinc convexa, inde plana, oblong. obtusa, crassula. Pedunc. lateral. 1-2-fl. Petal. purpur.

20. *atratum*. S. caul. erecto: fl. fastigiatis, corymbosis. Syst. veg. ed. 14. Jacq. Austr. 1. tab. 8. All. Fl. Ped. tab. 65. f. 4. Scheuz. it. 1. tab. 6. f. 3. 4.

*In Italia, Helvetiæ alpibus ☉.*

*Diversum a Crassula rubente*. Caul. pollicar. ramis ad radicem 2. oppositis, altitud. caulis. Fol. fessil. oblon. obtusiss. basi soluta, crassa, carnosa. Cal. atro-purpurasc. Petal. ovat. pallide virent. aut subrubra. Germ. atro-purpur.

- quadrifidum*. S. Pall. it. 3. tab. P. f. 1. A.

*In Dauria.*

Caulic. pl. erecti, sesquipollic. simplic. Fol. crebra, alterna, acuta, carnosio-teretia. Corymb. fastigiati, paucifl. Fl. 4-fid. octandri, 4-gon. minor. quam in *S. acri*. Petal. 4. flava.

- alsinesifolium*. S. erectum, ramosum, fol. planis: si. albis,



longe peduncul. *All. Spec. Ped. tab. 3. f. 2.*  
*Fl. Ped. tab. 22. f. 2.*

*In umbrosis lapidosus ♂.*

*æstivum.*

*S. fol. ovat-teretiuscul. obtusis, alternis: caule 2-fido: fl. luteis, sessil. All. Fl. Ped. Bauh. hist. 3. p. 693. Lob. ic. 378.*

*In collibus saxosis ☉.*

Caul. procumb. ex quo prodeunt cauliculi, sive ramuli erecti, digitales, teretes, glabri, albo-purpurasc. etiam ramosi. Fol. in furculis primum prodeuntibus conferta, oblongas rotulas faciunt. Fol. sessilia, oblonga. Fl. singulares, subsessil. lutei. Cal. foliolis succulentis, foliis similibus. Flos calyc. paulo maior. Petala 5. acuminata. In cauliculorum divisione flos unus solet sedere. Planta tota acida.

*saxatile.*

*S. caule ramoso, prostrato: fol. teretibus, ramosis: fl. longe sessilibus. Hall. helv. n. 964. All. Fl. Ped. tab. 65. f. 6. Fl. Dan. tab. 59.*

*In saxosis summorum alpium ♀.*

Caul. procumbent. semiped. lignosi. Fol. sessilia, multo rariora quam in *S. atrato*, alterna, viridia, versus caulem plana. Petal. lanceol. lutea.

*Nicæense.*

*S. fol. subulatis, sparsis, basi solutis, alternis: cyma bifida; fl. longe pedunculatis. All. Fl. Ped. tab. 90. f. 1.*

*In scopulosis Comitatus Nicæensis ☉.*

Caul. vix spithama longior, suberectus, subrubens, simpl. Fl. terminal. magni pro ratione plantæ, subalbidi. Petal. calyce duplo longiora. Singuli fl. uno versu dispositi, veluti spicati, longe pedunculati, sed peduncul. in summis fl. brevis.

*hirsutum.*

*S. teretiusculum, hirsutum; caule erecto, ramoso: petalis aristatis, stamina superantibus: peduncul. 1-fl. All. Fl. Ped. tab. 65. f. 5. Fl. Dan. tab. 24.*

*Ad rupes ♂.*

Rotulæ fol. radicales. Cauliculi pollic. rubentes, primum dichotomi, dein alternè ramosi. Fol. caulina alterna, sessil. erecta, minus hirsuta, maiora magis compressa. Calyc. apex spinula subrubente. Flos magnus, patens. Petal. ovata, aristata, alba, linea purpurasc. magna

subtus divisa. Ad ramorum divisiones foliolum positum est.

696. PENTHORUM. Cal. 5-fid. Pet. nulla, vel 5. Caps. 5-cuspidata, 5-locul. *Differt a Sedo absentia nectarii.*

1. *Sedoides*. P. Syst. veg. ed. 14. *Ad. Upf.* 1744. tab. 2. In Virginia 24 ☉.

Caul. herbaceus, diffusus, seu rectus, angulis scabris. Rami alterni. Fol. alterna, subpetiol. ferrata, vix carnosa, utrimq. viridia. Peduncul. terminal. spicis aliquot revolutis. Fl. alterni, pedicellati, adscendentes. Cal. lacin. alternis, sæpe maior. Petal. concava, alba. Anth. rubicundæ. Styli nulli. Caps. depressa. Sem. plurima.

1. *capensis*. B. fol. lanceol. seu ellipticis: fl. verticillatis. Syst. veg. ed. 14.

*Ad cap. b. Spei.*

*Statura Ammanniæ*. Caul. erectus, semiped. simpl. lævis, subsucculent. Fol. opposita, subpetiol. obtusiusc. tenuissime ferrata, patentia, lævia. Fl. multi, conferti, subsessil. Caps. valvulæ, post maturitatem persistentes, formant quasi florem monopetal. rotatum.

2. *glomerata*. B. fol. obovat. crenulatis: fl. glomerat. Syst. veg. ed. 14. *Lin. Suppl.*

*Ad cap. b. Spei.*

*Differt a priore* fol. minutis, glomeratis, crenulatis: fl. minutis, glomeratis: caul. magis diffuso, ramoso.

698. SURIANA. Cal. 5-phyll. Petal. 5. Styli inserti lateri interiori germinum. Sem. 5. nuda.

1. *maritima*. S. Syst. veg. ed. 14. *Plum. gen. ic.* 249. f. 1. *Thymelææ &c. Sloan. Jam.* 2. tab. 162. f. 4. *Arbor &c. Pluk. alm. tab.* 241. f. 3.

*In Amer. calidioris maritimis h.*

Frutex erectus, 3-ped. elegans. Lignum rubrum, durissimum. Fol. sparsim, & dense ramorum apices ornant, obovat: acuta, integerr. crassiuscula, mollia, dilute virent. avenia. Fl. pl. adgregati, inodori. Petal. flava, caduca.

699. GRIELUM. Cal. 5-fid. Petal. 5. Filam. persistentia. Pericarp. 5. monosper.

1. *renuifolium*. G. *Syst. veg. ed. 14.*

Geranium &c. *Burm. afr. tab. 34. f. 1.*

Ranunculo &c. *Burm. afr. tab. 53.*

*In Æthiopia 24.*

Frutex. Fol. *Abrotani*, alterna, incana, subto-  
mentosa. Pedunc. 1-fl. absque bracteis. Fl.  
magni. Cal. glabri. Petal. æqual. dentata,  
lutea.

700. OXALIS. Cal. campaniform. acute 5-fid. Cor. 5-petal.  
unguibus primum distinctis, deinde congluti-  
natis. Fruct. 5-gonus, foetus ex 5-coniunctis  
loculis polysperm. & per maturitatem dissi-  
lientibus.

\* *Fol. simplicibus.*

3. *monophylla*. O. fol. ovatis, indivisis. *Syst. veg. ed. 14.*

*Thumb. differ. de Oxalide, tab. 6.*

*Ad cap. b. Spei 24.*

Rad. bulbosa. Fol. radical. longe petiol. (*Bel-  
lidis*) tenera, emarginata, margine ciliata.  
Petioli fol. longiores, hirti. Scapi pl. fili-  
form. 1-fl. Flos fol. maior, lacin. obtusis;  
tubo flavesce. limbo dilute purpur. *Simil. O.  
Acetosella.*

\* *Fol. ternatis.*

— *Acaules.*

2. *minuta*. O. scap. 1-fl. fol. ternatis: foliol. oblong. gla-  
bris, integris. *Syst. veg. ed. 14. Thumb. diff.  
de Oxalide tab. 2. AÆ. Medic. Svec. T. 1.  
tab. 7.*

*Habitat . . .*

Cor. calyc. multoties longior; tubo flavescente,  
limbo albo. Differt a *purpurea* fol. neque mar-  
gine, neque apice ciliatis: a *punctata* foliol.  
ovatis, integris, nec obcordatis.

3. *punctata*. O. scap. 1-fl. fol. ternatis: foliol. obcordatis,  
punctatis. *Syst. veg. ed. 14. Thumb. l. c. tab.  
1. AÆ. Medic. Svec. T. 1. tab. 6.*

*Ad cap. b. Spei.*

Cor. tubus flavus; limbus albicans. Differt ab  
*O. Acetosella* fol. consertim excavato-punctat.  
& rad. non dentata, sed bulbosa.

4. *natans*. O. scap. 1-fl. fol. ternatis: foliol. obcordatis,



glaucis, natantibus. *Syst. veg. ed. 14. Thumb. l. c. tab. 1. Act. Medic. Suec. T. 1. tab. 6.*

*Ad cap. b. Spei.*

Scap. tenuissim. apice foliosus. Fol. conferta, alterna, petiol. lævia, patent. Foliol. integerr. quandoq. emarginata, sessil. Petal. alba, basi flavescent.

5. *Acetofella*. O. scap. 1-fl. fol. ternatis: foliol. obcordat. pifolios. *Syst. vég. ed. 14. Sabb. hort. 1. tab. 32.*

*Luifula. Black. tab. 308.*

*Oxys. Tabern. 525.*

*Trifolio acetoso. Matth.*

*In Europæ borealis sylvis 24.*

Rad. dentata, squamosa. Folior. petioli rubri: radical. plura, longe petiol. læte virent. Stipul. 2-3. ovales. Fl. carnei, aut albid, cum venis rubris, vel subcœrul.

6. *lanata*. O. scap. 1-fl. fol. ternatis: foliol. obcordat. hirsutis. *Syst. veg. ed. 14.*

*Ad cap. b. Spei.*

Rad. bulbosa. Fol. supra virid. hirta, pilis albis; subtus alba, fere purpurea, dense tomentosa. Scap. longi, villosi, pedicell. cernuis. Cor. flava, subcampanulata, basi 5-dent. *Var. limbo albo, & purpur.*

7. *compressa*. O. scap. 1-fl. fol. ternatis; foliol. obcordat. ciliatis: petiol. compressis. *Syst. veg. ed. 14.*

*Ad cap. b. Spei.*

Fol. supra virid. glabra, subtus albida, hirsuta. Cor. lutea. *Similis O. cernua, sed differt peduncul. 1-fl. minori magnitudine, & petiol. compresso-alatis.*

8. *purpurea*. O. scap. 1-fl. fol. ternat; foliol. (obcordatis) ciliatis. *Syst. veg. ed. 14. Ehret. pict. tab. 10. f. 2.*

*Oxalydi &c. Breyn. cent. tab. 46.*

*Oxys &c. Comm. hort. 1. tab. 21. Burm. afr. tab. 27. f. 3. Seb. mus. 1. tab. 22. f. 10.*

*In Æthiopia 24.*

Rad. bulbosa. Fol. inæqualia, intermedio maius obsolete emarginata, etiam subtus glabra, tenuissime ciliata, subcuneiformi-rotundata. Petiol. pilosi. Cal. pubescens. Cor. maiuscul. campanul. 5-part. tubo flavo; limbo plerumq. purpurasc. quandoq. albo, luteo, rubro &c.

9. *longiflora*. O. scap. 1-fl. fol. ternatis; foliol. semibifid.  
*Syst. veg. ed. 14.*  
*In Virginia.*  
 Scap. simpl. squamosus. Foliol. sessil. lobis lanceol. Pedunc. stipulatus. Flos longus.
10. *violacea*. O. scap. umbellifer. fol. ternatis, glabris; calyc. callosis. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. hort. 2. tab. 180.*  
*Oxys &c. Pluk. alm. tab. 102. f. 4.*  
*In Virginia, Canada &c.*  
 Bulbilli fusci. Foliol. obcordata, reflexa. Cor. violaceo-rubra, cum venis saturioribus. *Adfinis sequent. sed huic foliol. parum biloba, illi semibifida; huic calyc. foliola ovata, illi lanceol. utriq. apice callosa.*
11. *caprina*. O. scapo umbellifer. fol. ternat. glabris: fl. erectis. *Syst. veg. ed. 14. Mill. ic. 195. f. 1. Burm. afr. tab. 29. & tab. 28. f. 3.*  
*In Æthiopia h.*  
 Rad. granulata. Foliol. obcordat. obtusa, tenera, reflexa, subtus læte purpur. Petiol. longiss. Fl. laxè dependentes. Cal. margine rubro. Cor. limbo cœrul. vel incarnato, laciniis crenulatis.
12. *cernua*. O. scapo umbellifer. fol. ternat. glabris: fl. plerisque clausis, cernuis. *Syst. veg. ed. 14. Thumb. l. c. tab. 2. Act. Medic. Svec. tab. 7. T. I. tab. 7.*  
*Habitat . . . . .*  
 Rad. longa, filiform. bulbosa. Foliol. obcordata, semibifid. lobis rotundatis, subtus pallida. Scapi pedal. & ultra. Fl. 4. ad 20. Cor. flava.
13. *sericea*. O. scapo umbellifer. fol. ternatis, tomentosis. *Syst. veg. ed. 14.*  
*Ad cap. b. Spei,*  
 Fol. subverticillata, obcordata, supra virid. circulo rubro; subtus purpur. vel argentea. Cor. flava, *Differt ab O. lanata pedunc. multist.*
- *Caulescentes.* —
14. *repens*. O. caul. repente: pedunc. 1-fl. fol. ternatis; foliol. obcordat. hirtis. *Syst. veg. ed. 14. Thumb. l. c. tab. 1. Act. Medic. Svec. T. I. tab. 6.*  
*Habitat . . . . .*  
 Rad. fibrosa. Fl. parvi, flavi. *Minor O. corniculata, cui similis.*

13. *incarnata*. O. caul. bulbifero: pedunc. 1-fl. fol. ternatis; foliol. obcordat. glabris. *Syst. veg. ed. 14.*  
*Oxys &c. Comm. hort. 1. tab. 22.*  
*In Æthiopia.*  
 Bulbi post efflorescentiam ex alis nascuntur. Caul. dichotomus, purpur. Fol. respective ad lucem subtus incarnata. Fl. ex albedo-purpurasc.
16. *bifida*. O. caul. erecto, glabro: pedunc. 1-fl. fol. ternatis; foliol. semibifid. *Syst. veg. ed. 14. Thumb. l. c. n.º 16, tab. 1. Ad. Medic. Svec. T. I. tab. 6.*  
*Habitat . . . . .*  
 Tota planta glabra, excepto calyce. Cor. tubus flavesce. limbus violac.
17. *glabra*. O. caul. erecto, glabro; pedunc. 1-fl. fol. ternatis: foliol. oblong. emarginatis, glabris. *Syst. veg. ed. 14. Thumb. l. c. tab. 2. n.º 17. Ad. Medic. Svec. T. I. tab. 7.*  
*Habitat . . . . .*  
 Tota planta glabra. Rad. bulbosa. Caul. palm. Cor. tubus flavesce. limbus purpureus.
18. *hirta*. O. caul. erecto, hirta: pedunc. 1-fl. fol. ternatis, subsessil. foliol. oblong. emarginatis, glabris. *Syst. veg. ed. 14. Burm. afr. tab. 28. f. 2. Oxys &c. Seb. musf. 1. tab. 22. f. 11.*  
*In Æthiopia.*  
 Rad. bulbosa. Caul. palmar. foliosus. Foliol. ovata, infer. indivisa, subtrus præcipue pubescent. suprema conferta, longe petiol. utrinq. hirta, foliol. semibifid. lobis divaricatis, ovatis. Pedunc. pubescent. Bract. 2. oppositæ, subulatæ. Cal. lanceol. pubesc. Cor. violac. quandoq. plena. Tota planta pubescens.
19. *versicolor*. O. caul. erecto, hirta; pedunc. 1-fl. fol. ternatis; foliol. linear. apice callosis. *Syst. veg. ed. 14. Burm. afr. tab. 57. f. 1. & tab. 27. f. 2. Oxys &c. Pluk. amalt. tab. 434. f. 5.*  
*In Æthiopia 24.*  
 Rad. bulbosa, ovata. Caul. semiped. Fol. longe petiol. Fl. albicantes, atro--virenti linea in margine cincti.
20. *corniculata*. O. caule decumb. herbaceo: pedunc. umbellifer. *Syst. veg. ed. 14. Sabb. hort. 1. tab. 33.*  
 Trifolio acetofo giallo. *Mauth. Clus. hist. 2. p. 249. Bauh. hist. 2. p. 388.*  
*Tom. III.*



Trifolium &c. *Morif. hist. 3. f. 2. tab. 17. f. 2.*  
*In Europa* ☉.

Rad. fibrosa. Caul. pedul-cubit. teres, villosulus, rubeus. Fol. ternata. Foliol. cordiform. serrata; mollia, utriusq. virid. Pedunc. 2-5-fl. Petal. rotunda, flava.

21. *stricta*. O. caul. erecto, herbaceo: peduncul. umbellifer. *Syst. veg. ed. 14. Morif. hist. 3. f. 2. tab. 17. f. 3.*

*In Virginia, & Pedemontio, ad sepes &c. 24.*

*Fere Var. prioris.*

22. *frutescens*. O. caul. erecto, fruticoso: pedunc. umbellifer. *Syst. veg. ed. 14.*

Oxys &c. *Plum. jp. 2. ic. 213. f. 1.*

*In Amer. meridion. h*

Caul. vix ramosus. Petiol. longiss. vagi. Fol. integerr. venosa, lateralia sessil. intermed. petiolat. Pedunc. longi, vertical. 3--fl. Fl. penduli. Cor. plana, emarginata, lutea.

23. *Barrelieri*. O. caul. erecto: pedunc. racemiferis. *Syst. veg. ed. 14.*

Oxys &c. *Fewil. per. 2. tab. 23.*

Trifolium &c. *Barr. rar. 64. Bocc. mus. 2. tab. 51.*

*In America.*

*Simil. O. strictæ, sed rami longiores, & petal. rosea, cum lineis saturioribus.*

\*\*\* *Fol. digitatis.*

24. *flava*. O. fol. multifid. glabris. *Syst. veg. ed. 14. Burm. afr. tab. 27. f. 4. 5. & tab. 30. f. 1.*

*In Æthiopia 24.*

Planta exigua. Foliol. parva, obovato--lanceol. angusta, hirsuta. Flos amplus, luteus.

25. *tomentosa*. O. fol. multifid. hirtis. *Syst. veg. ed. 14.*

Oxys &c. *Pluk. amalt. tab. 360. f. 6.*

*Ad cap. b. Spei 24.*

Foliol. 12--20. obovata, sericea, semiunguicul. integra, convoluta. Cor. alba, seu flavescens.

\*\*\*\* *Fol. pinnatis.*

26. *sensitiva*. O. fol. pinnatis. *Syst. veg. ed. 14.*

Oxyoides &c. *Ad. angl. 1730. tab. 2.*

Herba mimosa &c. *Zann. hist. tab. 61. ed. 2. tab. 131. f. 2.*

Herba viva. *Clus. exot. 290.*

Todda vaddi. *H. Mal.* 9. tab. 19.

*In India.*

Scapi filiform. decumbent. usque ped. Fol. verticillata, digital. Foliol. multa, sessil. oblonga, oblique sursum acuminata, adproximata, æqual. glabra, quæ tactu contrahuntur. Umbella multifl. Cor. lutea.

701. AGRO- Cal. 5-dent. 5-angulat. vel 10-striatus, coria-  
STEMMA. ceus. Petal. 5. unguiculata; limbo obtuso, indiviso. Caps. 1-locul.

1. *githago*. A. hirsuta; calycibus cor. æquantibus: petalis integris, nudis. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 576.*

*Lychnis &c. Knorr. del. 2. tab. L. 10.*

*Lolium Fuchsi. hist. 127.*

*Pseudomelantio. Matth.*

*Inter Europæ segetes ☉.*

Caul. cubital. subramosus, villosus. Fol. opposita, sessil. longa, acuta, albescens. Pedunc. longiss. 1-fl. Cor. non coronata. Petal. rubra, vel alba. *Var. fol. linear. angustiss. & fl. solitario.*

2. *coronaria*. A. tomentosa: fol. ovat-lanceol. petal. emargin. coronatis, ferratis. *Syst. veg. ed. 14. Knorr. del. 1. tab. R. 20.*

*Lychnis &c. Cam. epit. 56).*

*In Italia, Sibiria &c. 24.*

Caul. ramosus, articular. Fol. opposita, sessil. integerr. Pedunc. 1-fl. Cal. angulis decem, 5. minoribus alternis. Petal. ex purpureo-fulgencia, vel alba, medio rubra.

3. *Flos Jovis*. A. tomentosa: petal. emarginat. *Syst. veg. ed. 14.*

*Lychnis &c. Barr. ic. 1005. Bocc. mus. tab. 42.*

*Morif. hist. 3. f. 5. tab. 36. f. 2. Mont. in Zann. tab. 10.*

*In Helvetia, Palatinatu, Pedemonio, ad rupes 24.*

Caul. cubit. Fol. opposita, lanceol. crassa, solida, virent. Fl. corymbosi. Sub corymbis stipul. ovat-lanceol. aristatæ. Petal. subrotunda, rubentia.

4. *cæli rosa*. A. glabra: fol. lineari-lanceol. petal. emargin. coronatis. *Syst. veg. ed. 14.*

*Lychnis &c. Herm. Lugd. tab. 393. Morif. hist. 3. f. 5. tab. 22. f. 32. Bocc. Sic. 27.*

*In Sicilia, Oriente &c. ☉.*

Caul. 1-pl. pedal--cubit. ab imo ramosi, nodosi.  
Fol. opposita. Fl. terminal. longe pedunculati.  
Cal. striatus. Petal. rosea.

702. LYCHNIS. Cal. 1-phyll. oblongus, 5-dent. lævis. Petal. 5. unguiculata; limbo sub 2--fid. Caps. triplerumque 5--locul.

1. *chalcedonica*. L. fl. fastigiati, fasciculati. *Syst. veg. ed. 14.*  
Flos Constantinop. *Dod. pempt. 178.*

*In omni Russia* 24.

Caul. sesqui-2-ped. hirsutus. Fol. opposita, sessil. ovat--lanceol. Petal. plerumq. coccinea, vel dilute rosea. *Var. fl. duplici.*

2. *Flos cuculi*. L. petal. 4-fid. fructu subrotundo. *Syst. veg. ed. 14.*  
*li.* *Fl. Dan. tab. 590.*

Caryophyllus &c. *Tabern. 291.*

b Caryophyllus &c. *Mill. ic. 169. f. 2.*

Odontites &c. *Clus. hist. 1. p. 292. 293.*

*In pratis Europæ humidiuscul. 24.*

Caul. pubescens. Fol. opposita, sessil. elliptico--lanceol. glabra; infer. obtusa, super. acutiora. Fl. terminal. Cal. subcampanulat. purpurasc. striis 10. virid. petal. rubent. vel alba, apicibus cinereis; lacin. intermediis latioribus, & longioribus. *Var. fl. pleno.*

3. *alpestris*. L. petal. 4--fid. coronatis: fol. recurvis. *Syst. veg. ed. 14. Segu. ver. 3. tab. 5. f. 1.*

Aline &c. *Pluk. alm. tab. 75. f. 3.*

*In Austria &c. 24.*

Caul. erecti, spitham. læves. Fol. linear--lanceol. lævia. Fl. e panicula dichotoma. Cal. dentibus obtusis. Caps. calyc. longior.

L. 4-dentata. *Syst. veg. ed. 14.*

Silene 4-fida. Lin. sp. *Jacq. Austr. 2. tab. 120.*  
*Var. huius.*

3. *coronata*. L. glabra; fol. axillaribus, terminalibusq. solitar. petalis laciniat. *Syst. veg. ed. 14. Thumb. Jap.*

*Ganpi. Kæmph. am. exot. Fasc. V. p. 873.*

*In Japonia.*

Caul. erectus, pedal. simpl. teres. Fol. pollic. & ultra, opposita, amplexicaul. oblong--ovata, acuta; integerr. Fl. sub 3. sessil. Cal. 10-gon. Petal. coronato--multifid.

6. *Viscaria*. L. petal. subintegris. *Syst. veg. ed. 14.*

L. sylv. IV. *Clus. hist. 1. p. 289.*

L. sylv. purpur. *Tabern. 294.*

*In Europæ septentr. pratis siccis 24.*



Caul. erectus, cubit. simplex, superne viscidus. Fol. elliptico--longe lanceol. glabra; caulina ad basin lanuginosa. Racemi oppositi, corymbosi. Cal. ruber. Petal. rubra, magnis auriculis albis.

7. *alpina*. L. petal. 2-fid. fl. corymbosis, capitatis, tetragynis. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 65. Hall. helv. tab. 17.*

*In alpihus* 24. ♂.

Caul. semiped. simplex. Fol. radical. plura, elliptica, firma, glabra, virid. caulina opposita, sessil. Fl. breviter peduncul. Bractææ magnæ, ovar-lanceol. ora purpur. Cal. ventricosus, ora alba. Petal. acuta, incoronata, suave purpurasc. Squamæ coronatrices, lineares. Styli 4.

8. *sibirica*. L. petal. 2-fid. caule dichotomo: fol. subhirtis. *Syst. veg. ed. 14.*

*In Sibiria* 24.

Statura *Silenes rupestris*; sed rad. perennis. Fol. minus glabra; & Styli 5.

9. *dioica*. L. fl. (plerumque) dioicis. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 792. Till. pis. tab. 41. f. 1.*

Ocymastrum &c. *Tabern. p. 299.*

*In Europæ pratis succulentis. Var. purpur. ad radices alpium* 24.

Caul. pl. 1-3-ped. purpur. Fol. connata, cuneiform. integerr. subnervosa, hirsuta. Petal. alba, vel purpur. *Var. fl. pleno; & fl. hermaphroditis in Tartaria.*

10. *apetala*. L. calyc. inflato: cor. calyce brevior: caul. sub 1-fl. fl. hermaphrodito. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 806.*

Cucubalus &c. *Fl. Lapp. tab. 12. f. 1.*

*In alpihus Lapponicis, Sibiricis* 24.

Planta hirsuta. Caul. pedal. & ultra. Fol. variæ longitudinis, & latitudinis. Fl. 1-5. penduli. Petal. 2-fid. violac.

703. CERA-STIUM. Cal. 5--phyll. Petal. 5. æqualia, magis, minus incisa. Caps. 1-locul. apice dehiscens.

\* *Capsul. oblongis.*

1. *perfoliatum*. C. fol. connatis. *Syst. veg. ed. 14. Gmel. Sib. 4. tab. 62. f. 1.*

*Myosotis* &c. *Dill. elth. tab. 217. f. 284.*

*In Græcia, Sibiria* ☉.

Caul. 1-fesquiped. reclinati. Fol. elliptica, lata, pinguia, glauca, nitida, glabra. Ramul. axill. dodrant. surrecti. Capitul. conica. Fl. parvi, albi.

2. *vulgatum*. C. caulibus diffusis: fol. ovatis: petal. calyci æqualibus. *Syst. veg. ed. 14.*

Myosotis, *Vaill. parif. tab. 30. f. 1.*

Auricula &c. *Bauh. hist. 3. p. 359.*

In Europæ pratis, areis ☉.

*Simil. C. viscoso, sed denso cespite crescens: caul. magis decumb. fol. minus lanceolat. magis ovatis. Caul. pedal. ramosus, brachiatus, obscure purpur. Fol. hirsuta, summa acutiora. Pedunc. breves. Petal. alba.*

3. *viscosum*. C. erectum, vill. fo-viscosum. *Syst. veg. ed. 14.*

Myosotis &c. *Vaill. parif. tab. 30. f. 1. 3.*

In Europæ pratis macilentis ☉.

*Differt a sequenti caul. altiore, magis divaricato, & pilis glutinosis adperso, sicuti & fol. Caul. pedal. basi ramosus, dichotomus. Fol. subconnata, ovata, flavo--virescent. Pedunc. dichotomi. Petal. alba.*

4. *semidecandrum*. C. fl. pentandr. petal. emarginatis. *Syst. veg. ed. 14. Raii. angl. 3. tab. 15. f. 1.*

Myosotis &c. *Vaill. parif. tab. 30. f. 2.*

In locis apricis, sterilibus Europæ ☉.

Caul. 3-unc. vix ramosus. Folior. coniugationes paucæ. Fol. ovata, obtusa, cum pilis breviss. Cal. hirsutus. Petal. calyce breviora. Caps. 5--valv.

5. *pentandrum*. C. fl. pentandris: petal. integris. *Syst. veg. ed. 14. In Hispania.*

*Planta minima, similis priori, a qua differt col. viridi, nec incano &c.*

Caul. ad summum pollic. Fol. opposita, sessil. oval. patent. plana, pubescent. linea in medio sulcata. Fl. sub 4. Petal. intrus sublutea, extus subalbida.

6. *arvense*. C. fol. linear-lanceol. cor. calyce maioribus. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 626.*

Myosotis &c. *Vaill. parif. tab. 30. f. 4. 5.*

In Europa australiore, ad vias, & in montanis secus arva ☿.

Caulicul. cespitosi, semiprostrati. Fol. graminea, opposita, sessil. vel in medio latiora, ciliata.

Pedunc. umbellati. Cal. margine albo. Petal. lineata.

7. *dichotomum*. C. fol. lanceol. caul. dichotomo, ramosiss. capsul. erectis. *Syst. veg. ed.* 14.

Alfane &c. *Clus. hist.* 2. p. 184.

*Inter segetes Hispania* ☉.

Planta sesquiped. hirsuta, viscosa. Caul. decumb. articul. geniculis tumidis, quandoq. vix dichotomus. Fol. opposita, sessil. Petal. alba.

8. *alpinum*. C. fol. superior. ovat-lanceol. caul. diviso: capsul. oblong. *Syst. veg. ed.* 14. *Fl. Dan. tab.* 6.

Alfane &c. *Raii. Angl.* 3. tab. 15. f. 2.

*In alpinis Europæ, & in rupium scopulis* 24.

Caul. dodrant. plerumq. procumb. Fol. sessil. infer. ovata. Pedunc. 6-8. Petal. calyce duplo longiora, alba, vel carnea. *Var. hirsutic, & glabrius.*

\*\* *Caps. subrotundis.*

9. *repens*. C. fol. lanceolat: peduncul. ramosis: capsul. subrotund. *Syst. veg. ed.* 14.

Myosotis &c. *Vaill. parif. tab.* 30. f. 5.

Ocymoides &c. *Col. phytob. tab.* 31.

*In Italia, Gallia &c.* 24.

Caul. procumb. Fol. villosa. Petal. calyce duplo longiora, sæpe 4-5-fid. alba.

10. *strictum*. C. fol. linear. acuminat. glabris: peduncul. 1-fl. subtomentosis: capsul. globosis. *Syst. veg. ed.* 14. *Hall. helv. T. I. tab.* 14. f. 1.

*In alpinis Austriac. Helveticis* 24.

Caul. procumb. subhirsuti, visceridi. Fol. paulo elliptica, stricta, glabra. Bract. 2. breves, lanceol. latiores, subtoment. Petal. alba.

11. *suffruticosum*. C. caul. perenni, procumb: fol. lineari-lanceol. subhirsut. *Syst. veg. ed.* 14.

*In Europa australi* h.

12. *maximum*. C. fol. lanceol. scabris: petal. crenatis: capsul. globosis. *Syst. veg. ed.* 14. *Gmel. Sib. 4. tab.* 62. f. 2.

*In Sibiria* ☉.

Caul. suberecti, dodrant-ped. striati, inferne subhirsuti, ramo medio brevior. Fol. opposita, utrimq. acuta, pilosa. Fl. solitar. aut umbellati. Petal. magnitudine varia, speciosa, fundo viridi,



13. *aquaticum*. C. fol. cordatis; caulinis infer. sessil. fl. solitar: fructibus pendulis. *Syst. veg. ed.* 14.  
*Alfine &c. Cam. epit.* 851. *Mentz. tab.* 1. f. 3.  
*Ad littora lacuum Europæ* 24.  
*Pertinet ad capsul. oblongas. Adfin. Stellariæ nemorum.* Caul. procumb. sub 2-ped. Fol. cordat-acum. super. præsertim undulata, lævia, subviscida; ramea petiol. Pedunc. axillar. Petal. alba. Caps. pyriform. cartilaginea.
14. *latifolium*. C. fol. ovat. subtomentosis; ramis 1-fl. caps. globosis. *Syst. veg. ed.* 14.  
*In alpinis Helvetiæ &c. inter diffractos lapides* 24.  
 Caul. prostrati, 3-unc. ramosi, ad angulos rectos divaricati. Fol. ima ovata, congesta; summa ovat-lanceol. pulposa. Pedunc. 2-fl. Fl. magni. Cal. campanulat. hirsutus, alis albis. Petal. alba. Caps. baccata.
15. *tomentosum*. C. fol. oblong. tomentosis; pedunc. ramosis; caps. globosis. *Syst. veg. ed.* 14.  
*In Granada* 24.  
 Planta albo-tomentosa. Caul. dodrant. ramosi. Fol. elliptico-lanceol. Petal. alba.
16. *manticum*. C. glabrum; caule striato: fol. lanceolat. pedunc. longiss. capsul. globosis. *Syst. veg. ed.* 14.  
*Alfine &c. Segu. ver.* 3. *tab.* 4. f. 2.  
*In Helvetiæ, Veronæ agris subhumidis &c.* ☉.  
 Caul. erectus, ped-cubit. simpl. laxè brachiat. Fol. longe linear. infer. connata; summa ovat-lanceol. oris albis. Panicul. 3-fid. Cal. marginè albo. Petal. obtusa, alba.
- 
- illyricum*. C. capsul. ovatis; calycibus, foliisq. barbatis: caule dichotom. ramosiss. *Ard. Sp.* 2. *tab.* II.  
*In Dalmatia.*  
 Caul. 3-unc-triental. teres, nodosus, pilosus, ramis infer. reclinatis. Fl. ex dichotomia caulis, solitar: pedunculati, nudi, pedunc. oppositis, 1-3-fl. Fol. opposita, amplexicaul. lanceol. Cal. cartilagineus, pilosus, limbo membranac. Petal. obverse cord. 2-fid. alba. Caps. pyramidal.
- procumbens*. C. caule procumb. dichotomo: caps. diffusis.  
*Forsk. Suppl. Æg.*  
*Prope Constantinop.*

Caul. ped. villosus, viscidus. Fol. lanceol. undulata, viscosa. Petal. calyce longiora. Caps. semper erectæ.

*angustifolium*. C. (Centunculus) Scop. Fl. Carn. tab. 19.

*In Carniola.*

Caul. digital. foliosi, floriferi. Fol. lineari-lanceol. mollia. Cal. lacin. carinatis, acuminat. villosis. Petal. non profunde 2-fid. calyce longiora. Caps. calyce brevior, 10-valv.

*rigidum*. C. (Centunculus) Scop. Fl. Carn. tab. 19.

*In Carniola.*

Caul. erectus, 4-unc. rigidus, villis densis, reflexisq. hirsutus. Fol. lanceol. acumin. dura, aspera, rigida. Sub singula dichotomia bract. 2. Cal. lacin. lanceol. villosis. Caps. calyce paulo longior, apice dentata, dentibus ferrugineis.

*refractum*. C. fol. glabris, lanceolat. petiolis infractis. Hall. helv. n. 890. Atl. Fl. Ped.

*In locis humidis summarum alpium 24.*

Cauliculi pl. digital. virides. Fol. de more gentis seniamplexicaul. linearia, sine obtusiusculo, pulposula, virent. Cauliculi 2-fl. peduncul. longis, quorum unus refractus, sive geniculat. alter minime; qui refractus, ad locum refractionis 2. stipul. habet. Pedunc. evidenter hirsutuli. Cal. nunc glaber, nunc hirsutus, viridis, foliol. ovatis, non aristatis, limbo subalbicante. Cor. calyce multo maior, petalis 1-3-fid. segment. linear. Fruct. conicus, virens, transparens, 7-valv. Sem. orbiculata, reniform.

*lineare*. C. fol. linear. aristatis, flaccidis: pedunc. sub 1-fl. tomentosus: capsul. oblong. All. Fl. Ped. tab. 88. f. 4.

*In rupibus subhumidis summarum alpium 24.*

Cauliculi pl. decumbent. ex quibus cauliculi florigeri eriguntur. Primi habent fol. longe elliptica, acumin. pubescent. mollia, facile marcescentia. In florigeris fol. linear. aristata, utrimq. glaberr. margine levissime ciliato. Folior. conjugationes solent esse 4, nodis tumidis. Fol. unc. unam, & semissem longa. Caulic. simplic. nudi, semel dichotomi; quorum quilibet 1-fl. intermedius interdum adiungitur.

Bract. 2, connatæ, lanceol. ad dichotomiam. Pedunc. tomentosi, sed magis calyx. Petal. calyce duplo ma. lineata, fere ad medium 2-fida, segment. subovatis. Anth. luteæ. Fructus cylindricus.

704. SPERGU- Cal. 5-phyll. Petal. 5. integra, æqualia. Caps.  
LA. ovata, 5-valv. 1. locul. *Differt a Ceraslio petalis integris.*

1. *arvensis*. S. fol. verticillat. fl. decandris. *Syst. veg. ed. 14. Hamel. cult. 6. tab. 1. Dod. pempt. 527.*

*In Europæ agris* ☉.

Caul. suberecti, ramosi, dichotomi. Fol. fena, sessil. linear. teretiusc. nitida, sulcata. Panicul. laxa. Cal. ovatus, viscidus, margine albo. Petal. ovat. lactea. Filam. 6-7-10.

2. *pentandra*. S. fol. verticillat. fl. pentandris. *Syst. veg. ed. 14.*

*In Europa* ☉.

*Simil priori, sed magis glabra: hæc vernalis; illa autumnalis.* Planta tota pubescens. Caul. erectus, digital. Fol. 6-8-tona. Sem. nigricant. albo, & membranac. margine cincta.

3. *nodosa*. S. fol. oppositis, subulat. lævibus: caulibus simplicibus. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 96.*

*Arenaria. Bauh. hist. 3. p. 720.*

*Alline &c. Pluk. alm. tab. 7. f. 4.*

*Polygonum &c. Loef. pruss. tab. 64.*

*In Europæ campis subhumidis* ☿.

Plantula triunc. cespitosa, pulchre virens, glabra. Caul. erecti, aut prostrati, ramosi, geniculis tumidis. Pedunc. 1-fl. Fl. min. priore. Petal. calyce non longiora, ovata, spinulosa, alba.

4. *laricina*. S. fol. oppositis, subulatis, ad basin ciliatis, fasciculatis. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 858.*

*In Sibiria.*

Folia rigida. Pedunc. alterni, solitarii, 1-fl.

5. *saginoides*. S. caul. repente: fol. oppositis, linear. lævibus: pedunc. solitar. longissi. *Syst. veg. ed. 14. All. Fl. Ped. tab. 64. f. 1.*

*In Helvetia, Gallia &c. herbis umbrosis pascuis alpium* ☿.

*Saginæ procumb. valde simil.* Planta cespitosa. Caul. 2--pollic. divaricat. subhirsutus. Fol.



splendide virent. incurva, ad terram congesta, inferne latiuscul. nitida; ad genicula pauca, fideiculata, sicuti in apice ramorum. Pedunc. lateral. ebracteati. Fl. per ætatem cernui. Cal. margine albo. Petal. ovata, calice maiora, obtusa, lineata, alba. *Vix diversa a priore.*

705. FORSKO-Cal. 5-phyll. cor. longior. Petal. 10. spathulata. HLEA. Peric. nullum. Sem. 5. lana connexa. 1. *tenacissima*. F. fol. ovatis, ferratis. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. Austr. 1. tab. 48. Linn. fasc. 1. tab. 1. Pluk. alm. tab. 375. f. 6.*

*In Arabia, Numidia* ☉.

Caul. 2 ped. paniculat. teres, hispidus, ruber. Fol. alterna, petiol. lato-ovato, lineata, ferraturis 8-10., hispida, superne hamata; subtus, præcipue iuniora, tomentoso-albida. Fl. axillar. gemini, sessiles, hirti. Inter utramq. florem novus ramus axillar. egreditur. Cal. hirsutiss. Petal. 6-8.

2. *candida*. F. fol. ovalibus, dentatis. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*

*Ad cap. b. Spei 24.*

Caul. suffruticos. lævis, simil. priori. Fol. alterna, petiol. 3-4. angulis, seu dentibus utrumque, priore minora, subtus niveo-tomentosa, supra hamata, ut in priore. Fl. etiam min. Petal. alba.

3. *angustifolia*. F. fol. lanceol. dentatis, sinuatis. *Syst. veg. ed. 14. Pluk. phyt. tab. 315. f. 4. Comm. Gott. 1784. tab. C.*

*Habitat . . . .*

## DECAGYNIA.

706. NEURA-Cal. 5-part. Petal. 5. Capf. infera, 10-locul. DA. 10-sperm. aculeata.

1. *procumbens*. N. *Syst. veg. ed. 14.*

*In Ægypto &c.* ☉.

Herba tota albicans, arachnoideo--tomentosa. Cotyledones sagittatæ. Rad. perforat fructum

integrum in medio. Caul. palm. & ultra, teretes, depressi, rigidi. Rami ex singulis alis inferioribus. Fol. alterna, petiol. ovata, plicata, eroso-sinuata, supra minus tomentosa. Fl. axillar. subsessil. Fruct. orbicular. aculeatus, subtus lævis. *Serenda cum calyce, fructuq. integro.*

707. PHYTO-LACCA. Cal. o. Petal. 5. calycina. Stam. 8-10. Bacca supera, 8-10-locul. 10-sperm.

1. *octandra*. P. fl. octandris, 8-gyn. *Syst. veg. ed. 14. Dill. elth. tab. 239. f. 308.*

Jamma goba. *Kæmph. amæn. tab. 829.*

*In Mexico* 24.

Statura sequentis. Fol. albidiora. Pedunc. comm. breviss. Pedicel. subnulli. Cor. alba, omnino plana. Fruct. ruber.

2. *decandra*. P. fl. decandris, decagynis. *Syst. veg. ed. 14. Black. tab. 515. Dill. elth. tab. 239. f. 309.*

*Solanum* &c. *Pluk. alm. tab. 225. f. 3.*

*Blitum americ. Munt. phyt. tab. 112.*

*Olim in Virginia; nunc in Europa* 24.

Altitudo humana. Fol. ampla, petiol. ovat-lanceol. patula, integerr. Pedunc. ramosi, purpur. Racemi axillar. & terminal. Petal. herba-  
cea. Baccæ sature purpur.

3. *icosandra*. P. fl. icosandris, decagynis. *Syst. veg. ed. 14. Mill. dicti tab. 207.*

*In Malabaria* ☉ 15.

Caul. 3-ped. perennans, paucis ramis subdivisus. Fol. strictiora, acutiora. Peduncul. inferne triqueter, at intra racemum multangular. Pedicell. infer. sæpe 3-fl. Bacca sature purpur.

4. *dioica*. P. fl. dioicis. *Syst. veg. ed. 14.*

*Habitat* . . . 15.

Caul. fruticosus. Fol. exacte ovata, glabra, magnitudine *Populi nigrae*, longius petiol. Fl. ut in reliquis.

## NOVA GENERA.

## MONOGYNIA.

## C A D I A .

**Cor.** **P**etalor. num. communis 5. quandoq. 6--7--narius.

**Stam.** Filam. quandoque 12--14. basi introrsum gibba.

**Pistill.** flexum ad latus.

**Peric.** Legum. lineare, compressum, membranac. polyspermum.

**I. purpurea.** **C. Forsk. Æg.**

Panciatica fol. pinnatis, multi--iugis; foliol. linear. retusis, ramis, petiolisque pubescent. Zuccagni. *Cat. Hort. Panc.*

*In Arabia* **H.**

Frutex sesquiuln. Foliol. 15--30. Fl. penduli, folitar. regular. violac-rubri.

*Fol. recentia corpori fortiter adpressa, levare cordis dolorem (hypochondriam) putant Arabes.*

## C O O K I A .

**Cal.** Perian. parvum, 5-phyll. lacin. ovalibus, extus subpubescentibus.

**Cor.** 5-petal. Petal. lanceol. patentia, aut reflexa.

**Stam.** Filam. 10. petalis longiora. Anth. subrotun.

**Pistil.** Germ. ovoideum, 5--gon. Styl. brevis. Stigm. obtusum.

**Peric.** Bacca parva, ovalis, viridis, tomentosa, multilocul.

**Sem.** solitar. oblonga, dura, nigricant.

**I. punctata.** **C. Sonner. Voyag. aux Ind. 2. tab. 130.**

*In China* **H.**

**Arb.** crassa. Fol. impari--pinn. Foliol. 7--11. ovalia, acuta, breviter petiol. alterna, glabra, integerr. aut undulata. Fl. racemosi, parvi. Pedunc. pubescent.

## M A R S A N A .

**Cal.** Perian. parvum, 1-phyll. 5-dentat.

**Cor.** 5-petal. Petal. lanceol. angusta.



## DECANDRIA MONOGYNIA.

*Stam.* Filam. 10. inæqualia, cor. parum breviora. Anth. subrotund. 2-locul.

*Pistil.* Germ. parvum, ovoideum. Styl. flaminum longitudine. Stigm. 5-angul.

*Peric.* Nucleus ovalis, apice acuto, reticulatus, 1-locul.

*Sem.* tenerum, succulentum, squamis adhærens, quibus continuatur.

1. *Buxifolia.* M. Sonner. *Voyag. Ind.* 2. tab. 139.

*In China* h.

Frutex 6-7-ped. Rami alterni, erecti. Fol. pinnat. Foliol. sub 7. alterna, ovalia, integerr. utrimq. glabra, firma, Buxiformia.

## CRISTARIA.

*Cal.* Perian. 1-phyll. 5-dent.

*Cor.* 5-petal. Petal. ovalia, calyc. dentibus innixa.

*Stam.* Filam. 10. cor. duplo longiora, petalis concoloria. Anth. parvæ, ovatæ.

*Pistil.* Germ. parvum, vix conspicuum. Stylus extra cor. sed flaminibus brevior. Stigm. simpl.

*Peric.* Sem. nudum, ovale, 5-angul. & veluti 5. alas efformans.

1. *coccinea.* C. Sonner. *Voyag. Ind.* 2. tab. 140.

*In Madagascar.* 24.

Caul. farmentosus, fruticosus. Fol. opposita, breviter petiol. ovalia, integerr. glabra, firma, Racemi terminal. compositi. Fl. peduncul. coccinei.

## EPERUA.

*Cal.* Periant. 1-phyll. concavum, 4-part. lacin. latis, oblongis, obtusis.

*Cor.* Petal. 1. latum, subrotund. patens, lateribus basi convolutis, fauci calyc. insertum.

*Stam.* Filam. 10. longiss. varie inflexa, calyc. inserta, basi crassiora, villosa, 9. inferne coalita; unicum simpl. Anth. oblong. obtusæ, 2-locul. nutantes.

*Pistil.* Germ. subovat. pedicellatum. Styl. longiss. incurvus. Stigm. obtusum.

*Peric.* Legum. longum, falciform. compressum, coriaceum, apice acuto, incurvo, 1-locul. 2-valv. elastice dehiscens.

*Sem.* 3-4. magna, compressa, coriacea, quandoq. uno latere emarginato.

1. *falcata*. *Eperua*. *Aubl. Guian. tab. 142.*

*In Caribæis* h.

*Arb.* 60--ped. cacumine ramosiss. *Fol.* alterna, pinnata, 3--iuga. *Foliol.* opposita, subsessil. ovat-oblonga, acuta, integerr. glabra. *Stipul.* 2. exiguae, ad basin costæ foliosæ. *Fl.* numerosi, spicati, spicis alternis: in apice spicæ nudæ, longiss. pendulæ. *Cor.* rubra. *Legum.* ferrugin. subtomentosum.

## TACHIGALI.

*Cal.* *Perian.* 1-phyll. turbinat. patens, persistens, 4--part. lacin. inæqual. subrotund. 4. erect. concavis, infima maiore, declinata.

*Cor.* *Petal.* 5. inæqual. 3. erecta, 2. reclinata, unguibus calyc. fauci inserta.

*Stam.* *Filam.* 10. villosa, calyc. inserta infra petala; 3. brevia erecta. *Anth.* oblong. 2--locul.

*Pistil.* *Germ.* pedicellat. oblong. *Styl.* tenuis. *Stigm.* acut.

*Peric.* *Legum.* longum, crassum, ventricosum, acutum, villosum, 1-locul. 2-valv.

*Sem.* ampla, crassa, subreniform. marginibus valvular. adfixa.

1. *paniculata*. *T.* fol. pinnat. foliol. oppositis. *Aubl. Guian. tab. 143. f. 1.*

*In Caribæis* h.

*Arb.* 60--ped. superne ramosa. *Fol.* ampla, alterna. *Foliol.* 6-iug. breviter petiol. subovata, acuta, integerr. glabra, subtus tomentosa, e viridi-cinerea, costâ triangulari. *Stipul.* 2. oppositæ, ad basin costæ foliosæ. *Fl.* terminal. panícula ampliss. *Ramuli* paniculæ longi, 3--goni, multifi. fl. alternis, subpeduncul. *Bract.* ad basin pedunc. *Cor.* flava. *Legum.* cinereum.

2. *trigona*. *T.* fol. pinnat. foliol. alternis. *Aubl. Guian. tab. 143. f. 2.*

*In Caribæis* h.

*Differt a priore foliol. alternis.*

## A P A L A T O A .

*Cal.* Perian. 1-phyll. turbinat. limbo 4-part. lacin. ovat-oblong. acutis. *Bract.* 2. ad basin calyc.

*Cor.* nulla.

*Stam.* Filam. 10. calyce longiora, & ipsius fauci inserta. *Anth.* ovatae, 2-locul.

*Pistil.* Germ. ovat--oblong. pedicellat. tomentosum. *Styl.* longus, incurvus. *Stigm.* obtusum.

*Peric.* Legum. subrotund. depressum, rugosum, ala ampla membranacea cinctum, 1-locul. non dehiscens.

*Sem.* 1. reniforme.

*1. spicata.*

*A. Aubl. Guian. tab. 147.*

*In Caribæis h.*

*Arb.* 30-ped. superne ramis undiq. sparsis. *Fol.* alterna, impari-pinn. *Foliol.* alterna, 7-iugi, subsessil. ovat--oblong--acuminata, integerr. glabra. *Stipul.* 2. ad basin costæ. *Fl.* axillar. & terminal. spicati, breviter peduncul.

## T O U C H I R O A .

*Cal.* Perian. 1-phyll. turbinat. limbo 4-part. lacin. oblong. acutis.

*Cor.* nulla.

*Stam.* Filam. 10. calyce longiora, ipsius fauci inserta. *Anth.* ovat. 2-locul.

*Pistil.* Germ. ovat-oblong. angulosum, pedicellat. villosum. *Styl.* longus, incurvus. *Stig.* obtusum.

*Peric.* Legum. subrotund. depressum, rugosum, ala ampla membranac. cinctum, marginibus undulat. 1-locul. non dehiscens.

*Sem.* 1. reniforme.

*1. aromatica.* *T. Aubl. Guian. tab. 148.*

*In Caribæis h.*

*Arb.* 40--50--ped. superne ramis undiq. sparsis. *Fol.* ampla, alterna, petiol. ovata, acuta, integerr. glabra. *Stipul.* 2. ad basin petioli. *Fl.* axill. spicati.



## T R I G O N I A .

*Cal.* Perian. 1-phyll. 5-part. lacin. inæqual. 2 superioribus erectis; 3 inferioribus basi coalitis.

*Cor.* 5-petal. inæqual. receptaculo pistil. inserta, infra stam. Petal. super. erectum, planum, ad basin villosum, 2. curvitatibus præditum: lateral. 2. reflexa, angustiora, longiora: 2. infer. carinæ in modum connexa.

*Stam.* 10--11. simul in vaginam coalita, parte superiore seiuncta, intra 2. petal. infer. reclusa. Anth. 3-5-7. steriles; fertiles 2--locul. subrotun.

*Pistil.* Germ. ovat. villosum. Styl. brevis. Stigm. capitatum, planum, margine membran. cinctum.

*Peric.* Capsl. oblong. acuta, 3-gon. 1-locul. 3--valv. extus tomento brevi rufescente vestita; intus tomento ferrugineo cincta.

1. *villosa*. T. fol. ovatis, integerr. fructu longo, rufescente. *Aubl. Guian. tab. 149.*

*In Guiana h.*

Frutex. Caul. pl. sarmentosi, volubiles, ramosi, tomentosi, ferrugin. Fol. opposita, petiol. ovata, acuta, integerr. supra virid. subtus subvillosa, cinerea, nervis ferrugin. Stipul. 2. breves, latiuscul. acutæ. Fl. terminal. paniculati, ramulis oppositis, fl. spicatis, subverticillat. Petal. super. flavum: lateral. 2. sublutea; 2. infer. rubra.

2. *lævis*. T. fol. ovatis: fructu brevi, aspero. *Aubl. Guian. tab. 150.*

Frutex. Caul. ut in priore. Fol. opposita, breviter petiol. ovat--subrotun. integerr. glabra. Stipul. 2. exiguæ, ad basin petioli. Fl. axillar. & terminal. spicati, oppositi, peduncul. Cor. alba. Filam. 5--6--7--10. Capsl. brevis.

## P O T A L I A .

*Cal.* Perian. 1-phyll. turbinat. crassum, 4--part. lacin. latis, obtusis, concavis; 2. oppositis externis, & 2. internis.

*Cor.* 1--petal. 10--fid. lacin. oblong. angustis, rigidis, apice incurvis, tubo breviss. receptac. pistilli inserto.

*Tom. III.*

K

*Stam.* Filam. 10. breviss. basi in membrana co-  
alita, receptaculo inserta. *Anth.* oblong. a-  
cutæ, 4--gon. 2--locul.

*Pistil.* Germ. ovatum. *Styl.* brevis. *Stigm.* peltat.  
striatum.

*Peric.* Caps. subrotund. subcarnosa, apice com-  
pressa, 3--locul.

*Sem.* plurima, minima, angulata.

*I. amara,*

*P. Aubl. Guian. tab. 151.*

*In Guiana* H.

*Caul.* 1--2--3--ped. simpl. nodosus. *Fol.* tantum  
ad 2--3. nodos superior. opposita, petiolis  
longiss. ovat--acum. integerr. glabra, luteo--  
virent. ad basin angusta; vaginæ breviss. am-  
plexicaul. *Fl.* terminal. corymbosi. *Cal.* luteus.  
*Cor.* alba. *Caps.* cerasiform. subflaves.

### O U R A T E A .

*Cal.* Perian. 5--phyll. lacin. ovatis, acutis.

*Cor.* Petal. 5. subrotund. receptacul. pistil. inserta.

*Stam.* Filam. 10. *Anth.* oblon. in cylindrum co-  
alita.

*Pistil.* Germ. minimum, 5--angul. *Styl.* longus,  
setaceus, tubum antherar. perforans. *Stigm.*  
5. acuta, minima.

*Peric.* . . . . .

*Sem.* . . . . .

*I. Guianensis,* *O. Aubl. Guian. tab. 152.*

*In Caribæis* H.

*Arb.* 60-ped. superne ramosa, ramis sparsis. *Fol.*  
alterna, petiol. ovat-oblong. acuta, integerr.  
rigida, glabra. *Stipul.* 2. oblon. acumin. an-  
gustæ. *Fl.* terminal. paniculati, odori. *Cal.*  
lacin. carnosis, subtus virid. supra luteis.  
*Petal.* sulphur.

### S I M A B A .

*Cal.* Periant. 1--phyll. 4--5--part. lacin. acutis.

*Cor.* Petal. 4-5. ovata, ad ambitum disci inserta.

*Stam.* Filam. 8-10. inferne latiora, villosa, disco  
inserta. *Anth.* ovat. 2--locul. incumbentes.

*Pistil.* Germ. 4-5. connata, extus convexa. *Styl.*  
longi, 4--5--striati. *Stigm.* 4--5--radiatum.

*Peric.* Capsl. 4--5. lateral. distantes, ovat. coriac. disco carnosio insertæ, 1--locul.

*Sem.* 1. testa fragili tectum.

1. *Guianensis*. *S. Aubl. Guian.* 153.

*In Guiana* h.

Frutex 8-ped. ramis; & ramulis undiq. sparsis. Fol. alterna, ternata, aut impari-pinn. Foliol. opposita, subsessil. ovat-oblon. acumine obtuso, emarginato, integerr. rigida, glabra. Fl. axillar. super ramos sparsi, corymbosi. Cortex subvirid. amarus. Petal. subalbida. Capsl. sublutea.

## T O C O C A.

*Cal.* Perian. 1-phyll. turbinat. 5--dent. denticul. acutis, margine pilosis.

*Cor.* 5-6-petal. Petal. subrotund. concava, involuta, fauci calyc. intra divisuras inserta.

*Stam.* Filam. 10. infra petal. disco circulari inserta. Anth. oblon. acutæ, 2-locul.

*Pistil.* Germ. subrotund. Styl. brevis. Stigm. capitatum.

*Peric.* Bacca ovata, calyc. carnosio obvoluta, 3-locul.

*Sem.* numerosa, minutiss. in pulpa molli, eduli nidulant.

1. *Guianensis*. *T. Aubl. Guian.* tab. 174.

*In Caienna, & Guiana* h.

Fruticulus. Caul. pl. 5-6--ped. ramosi, nodosi, 4-goni, villosi, tubulosi. Fol. opposita, petiolis superne tumidis innixa, ampla, ovata, acumin. 5-nervia, emarginata, subcrenata, pilis rufescentibus. Spica terminal. longa, verticillis utrimq. 6. subsessil. Cal. purpurasc. Petal. subcarnea. Bacca subpurpur.

## F O T H E R G I L L A.

*Cal.* Perian. 1-phyll. turbinat. 5--dent. denticul. obtusis. Bract. 2. oppositæ, ovatæ, concavæ, emarginatæ, extus incanæ, fl. ante expansionem recludentes, deciduæ.

*Cor.* 5--petal. Petal. in orbem expansa, marginata, disco intra calyc. inserta.



*Stam.* Filam. 10. erecta, oblon. infra petal. disco inserta. Anth. oblon. incurvæ, 2-locul.

*Pistil.* Germ. calyc. adnatum, subrotund. Styl. longus, pilosus. Stigm. capitatum, planum.

*Peric.* Bacca orbicul. exsucca, striata, incana, calyc. denticulis coronata, 3-locul.

*Sem.* plurima, minutiss.

**1. mirabilis.** F. *Aubl. Guian. tab. 175.*

*In Caienna, & Guiana h.*

*Arbuse.* 4-5-ped. superne ramosa. Fol. opposita, petiolat. ovat-oblon. acuta, integerr. 5-nervia, supra flavo-virent. subtus tomentosa, subrufo-fescent. Fl. terminal. racemosi, racemul. oppositis. Petal. alba, ungue luteo.

### M A I E T A.

*Cal.* Perian. 1-phyll. oblong. 5-gon. 5-dent. hirsutum.

*Cor.* 5-petal. Petal. æqual. subrotund. concava, fauci calyc. intra divisuras, ungue inserta.

*Stam.* Filam. 10. brevia, infra petala calyci inserta. Anth. oblon. 2-locul. basi bicornes, apice membranac. acuto, concavo.

*Pistil.* Germ. oblong. 5-gonum. Styl. brevis. Stigm. capitat.

*Peric.* Bacca calyc. carnosio, hirsuto involuta, 5-locul.

*Sem.* plurima, minutiss. in pulpa dulci, eduli nidulantia.

**1. Guianensis.** M. *Aubl. Guian. tab. 176.*

*In Guiana h.*

*Fruticulus.* Caul. pl. 3-ped. ramosi, 4-gon. nodosi, villosi. Fol. opposita, uno ma. altero min. breviter petiol. ovata, acuta, 5-nerv. ferrulata, pilosa, rufescent. basi tumida in modum vesicæ. Fl. axillar. solitar. sessiles. Cal. hirsutus, coccineus. Petal. alba. Bacca coccin.

### T I B O U C H I N A.

*Cal.* Perian. 1-phyll. ovat-oblong. squamosum, 5-lacin. oblon. acutis.

*Cor.* Petal. 5. uno ma. fauci calyc. inserta.

*Stam.* Filam. 10. incurva, infra petala calyci inserta. Anth. oblong. 2-locul. basi bicornes.

*Pistil.* Germ. ovatum. Styl. long. 5-angulat. Stigm. acutum.

*Peric.* Caps. ovata, 5-locul. 5-valv. calyce obvoluta.

*Sem.* plura minutiss.

*I. aspera.* T. Aubl. *Guian. tab.* 177.

In *Guiana* h.

Caul. pl. 3-ped. ramosi, 4-goni, fragiles, squamosi. Fol. opposita, petiol. ovat-acuta, serrulata, 3-5-nerv. rigida. Fl. axill. solitar. aut corymbosi. Petal. purpur.

## T A N I B O U C A.

*Cal.* Perian. 1-phyll. superum, turbinat. campanifor. villosum, 5-part. lacin. subrotund. acutis.

*Cor.*

*Stam.* Filam. 10. calyc. inserta infra divisuras. Anth. ovatae, sulcatae, 2-locul.

*Pistil.* Germ. inferum, calyc. fundo adnatum.

Styl. longus. Stigm. acutum.

*Peric.*

*Sem.*

*I. Guianensis.* T. Aubl. *Guian. tab.* 178.

In *Caribæis* h.

Arb. 25-ped. superne ramosa, ramis tortuosis, apice foliosis. Fol. alterna, petiol. ovata, integerr. glabra, decidua. Fl. axill. & terminal. alterni, sessil. longe spicati, odori. Cal. intus albus.

## C A C O U C I A.

*Cal.* Perian. 1-phyll. campanulat. 5-dent. deciduum.

*Cor.* Petal. 5. venosa, ad incisuras calyc. inserta.

*Stam.* Filam. 10. longiss. versus fundum calyc. inserta. Anth. ovatae, 2-locul.

*Pistil.* Germ. inferum, angulatum. Styl. longitudine stamin. Stigm. acutum.

*Peric.* Bacca ovata, utrimq. acuta, sub 5-angul. cortice subligneo, intus pulposa.

*Sem.* unicum, oblong. membrana alba tectum.

1. *coccinea*, C. *Aubl. Guian. tab. 179.*

*In Guiana h.*

*Frutex* ramis plurimis, longiss. scandentibus, 6-7-pollic. ramis, & ramulis dependent. *Fol.* ampla, alterna, breviter petiol. ovata, longe acumin. integerr. rigida. *Spica* terminal. longiss. *Fl.* solitar. ad axillam squamulæ oblong. acutæ.

### M O U R I R I.

*Cal.* *Perian.* 1-phyll. 5-dent. denticul. acutis.

*Cor.* 5-petal. *Petal.* subrotund. acuta, carnosa, lato ungue infra divisuras calyc. inserta.

*Stam.* *Filam.* 10. calic. inserta, 5. corolla longiora. *Anth.* oblong. incumbent. 2-locul.

*Pistil.* *Germ.* inferum, calyc. fundo adnatum. *Styl.* longus. *Stigm.* acutum.

*Peric.* *Bacca* globosa, carnosa, 1-locul.

*Sem.* 4. hinc convexa, inde angulata.

2. *Guianensis*, M. *Aubl. Guian. tab. 180.*

*In Caribæis h.*

*Arb.* 40-ped. superne ramosa, ramis latis, & undiq. sparsis. *Fol.* opposita, breviter petiol. ovat. acumin. integerr. rigida, glabra. *Fl.* axillar. corymbosi. *Bract.* minimæ. *Cor.* lutea. *Bacca* flava, punctis rubris adspersa.

### M Y R O S P E R M U M.

*Cal.* *Perian.* 1-phyll. campanulat. patens, marcescens, limbo levissime 5-dent. superne introrsum protruso.

*Cor.* *Papilionac.* 5-petal. caduca. *Vexill.* subrotund. obtuse emarginatum, superne concavum, patentiss. ungue breviss. & lato.

*Alæ* 2. oblon. obtusæ, cum exiguo acumine, planæ, patentes, longitud. vexilli, unguibus brevibus; appendiculo nullo.

*Carina* 2-petal. erecta, concava, lateribus possicis conniventibus; anticis sibi incumbentibus hinc clausa, cæterum alis conformis.

*Stam.* *Filam.* 10. distincta, declinata, subulata, in carina recondita, longitud. cor. persistent. *Anth.* suboval. incumbentes.



*Pistil.* Germ. oblong. pedicellat. planum, situ staminum, desinens in styl. subulatum, adscendentem, longitud. staminum. Stigm. simpl. acutum.

*Peric.* Capsl. membranac. oblon. obtusa, cum acumine abrupto laterali, basi attenuata, plana, apice 1-locul. non dehiscens.

*Sem.* pauca, reniform. oblong. compressa.

1. *frutescens.* M. Jacq. *Amer. tab.* 174. ed. pict. *tab.* 118.

*In Carthagenæ fruticetis apricis* h.

Frutex erectus, 8-10-ped. parum ramosus. Fol. impari-pinn. 8-pollic. alterna: foliol. sub 7-iuga, pollic. alterna, breviter petiol. oblon. obtusa, integerr. glabra. Racem. subterminal. erecti, simpl. & 2-fid. laxi. Cor. albedo-rosea, inodora. Capsl. magna, membrana venosa, leucophæo-fusca. Sem. plerumq. unicum, scatens balsamo, odore ingrato, & forti.

## D I G Y N I A .

### R O K E J E K A .

**C**al. 1-phyll. Cor. 5-petal. Capsl. 1-locul. 3-sperm. Forsk. *Æg.*

*In Arabia* h.

Caul. multi, diffusi, cubit. ramosiss. articulati, dichotomi. Fol. opposita, sessil. vaginant. pollic. lanceol. basi angustata, integra, glabra; super. min. linearia. Pedunc. axill. apice incrassati, ad dichotomias superior. ramorum, & caulium, solitarii in media dichotomia; deinde gemini; terminales ramuli. Cal. virid. margine albo. Cor. alba, venis, lineisq. violac. *Styli, & pericarpium indole a Saxifraga differt.*



## PENTAGYNIA.

## ROUREA.

**P** *Cal.* Perian. 1-phyll. persistens, 5-part. lacin. subrotund. concavis, extus tomentosis.

*Cor.* Petal. 5. oblon. subrotund. receptaculo germinis inserta.

*Stam.* Filam. receptaculo ad basin germinis inserta. Anth. exiguae, subrotund. 2-locul.

*Pistil.* Germ. subrotund. viliosum. Styli 5. Stigm. oblong. crassa, sulcata.

*Peric.* Drupa ovat. 1-locul.

*Sem.* unicum, testa fragili tectum.

1. *frutescens*. R. Aubl. Guian. tab. 187.

In Guiana h.

Frutex 5-ped. tortuosus, ramis sarmentosis, volubilibus. Fol. alterna, impari-pinn. Foliol. 3-4-iuga, ovat. acuta, integerr. supra glabra, subtus tomento albicant. superiora inferioribus maj. Stipul. 2. ad basin costae foliosae. Fl. axill. & terminal. paniculati. Cor. alba, odora. Drupa nigra.

## TAPIRIRA.

*Cal.* Perian. 5-phyll. lacin. subrotund. deciduis.

*Cor.* Petal. 5. subrotund. concava, receptaculo stam. inserta, infra divisuras calyc.

*Stam.* Filam. 10. disco inserta. Anth. ovat. 2-locul.

*Pistil.* Germ. subrotund. disco insidens. Stigm. 5.

*Peric.* Caps. subrotund. 5-sulcata, 1-locul. 5-valv.

*Sem.* 5. ovata, membrana obvoluta, valvis adfixa.

1. *Guianensis*. T. Aubl. Guian. tab. 188.

In Caribæis h.

Arb. 50-ped. superne ramosa, ramis centralibus erectis. Fol. alterna, impari-pinn. Foliol. 3-4-5-iuga, subopposita; super. maj. ovat-oblon. integerr. glabra. Fl. axillar. & terminal. paniculati. Petal. alba.

## ZANTHORRIZA.

Cal. o. Petal. 5. Nectar. 5-phyll. pedicellatum.

Filam. 5-10. receptaculo inserta. Germina plura, supera. Capsl. totidem, 1-sperm.

*apiifolia*.

Z. Herit. *Stirp. nov. fasc. 4. tab. 37.*

Frutex Petroselinii &c. *Pluk. alm. tab. 270. exclusis aliis synonymis.*

In Georgia, & Carolina h.

Suffrutex sesqui-2-cubit. Rad. stolonifera, lutea, intus crocea, subodora. Caul. pl. erecti, subsimplices. Rami alterni, teretes, anulati, cinerei, libro luteo. Involucra gemmarum, nascentibus turionibus oblonga, acumin. subsistentia. Fol. alterna, petiolata, impari-pinn. biuga, patent. 5-6. poll. incluso petiolo, longa, 3. poll. lata. Foliol. opposita, sessilia, extimo plerumq. pedicellato, maiore; lanceol. acuta, incisa, læte virid. concolora, glabra, patentia,  $1\frac{1}{2}$  poll. longa, 1. poll. lata. Petioli teretes, supra plani, basi ampliati, amplexicaul. Racemus e gemma terminali prodiens, constat ex racemulis alternis, primum erectus, dein nutans, pubescens, bracteatus, sanguineus, 4-6. poll. longus. Racemuli 2-3-fl. fl. lateralibus serotinis, minoribus. Fl. erecti, pedicellati, obscure purpur. 3-4. lin. lati. Bractea linearis, acuta sub singulo fl. & sub racemulis. *Excluso partium numero, vix aliquid superest comm. cum Zantoxilo.*





## CLASSIS XI.

## DODECANDRIA.



## MONOGYNIA.

710. *Bocconia*. Cal. inferus, 2-phyll. deciduus. Cor. o. Styl. 2-fid. Bacca exarida, 1-sper.
725. *Hudsonia*. Cal. inferus, tubulosus, 5-phyll. Cor. o. Stam. 15. Capsl. 3-valv. 1-locul. 3-sper.
708. *Afarum*. Cal. superus, coriaceus, campanulat. 3-4-fid. segment. acutis, apice reflexis. Capsl. coriacea, coronata, 6-locul. polysper.
709. *Tomex*. Cal. duplex: involucr. 5-phyll. Periant. 5-phyll. Cor. o.
712. *Rhizophora*. Cal. inferus, 4-part. Cor. 4-part. Sem. 1. longiff. basi carnosum.
713. *Apadisa*. Cal. o. Cor. 4-petal.
717. *Garcinia*. Cal. inferus, 4-phyll. lacin. concavis. Cor. 4-pet. concava. Bacca globosa, coriacea, coronata stigm. peltato, 8-sper.
721. *Cratæva*. Cal. inferus, 4-fid. Cor. o. seu 4-pet. Petal. ad idem latus sursum flexa. Bacca globosa, pedicell. 2-locul. polysper.
718. *Halesia*. Cal. superus, minimus, 4-dent. Cor. ventricosa, sub 4-fid. Nux 4-angul. alata, 2-sper. *Styraci proxima*.
722. *Triumfetta*. Cal. inferus, 5-phyll. Cor. 5-pet. petal. linearib. erectis, reflexis. Capsl. muricata, in 4. diffiliens, 2-sper.
723. *Eurya*. Cal. 5-phyll. calyculatus. Cor. 5-pet. Stam. 13. Capsl. 5-locul.
724. *Peganum*. Cal. inferus, nullus, vel 5-phyll. segment. erectis, linearib. acutis. Cor. 5-pet. Petal. suberecta, ovata, calyc. æqualia. Stam. 15. Capsl. 3-valv. 3-locul. polysper.
726. *Dodecas*. Cal. superus, semi 4-fid. corollifer. Capsl. 1-locul. calyce connata.

727. *Nitraria*. Cal. inferus, parvus, 5-fid. Cor. 5-pet. patens, petal. apice fornicatis. Stam. 15. Nux conica, apice crenata, 1-sper.
716. *Vatica*. Cal. erectus, 5-part. segment. lanceol. Cor. 5-pet. Petal. magna, elliptica. Anth. 15. sessil. 4-locul. local. interiorib. brevioribus.
720. *Canella*. Cal. inferus, campanulat. 3-lob. Anth. 16. adnatae nectar. urceolato. Bacca ovata, 3-locul. 2-sper.
782. *Portulaca*. Cal. 2-fid. aut 2-5-phyll. persist. Cor. 5-pet. Petal. erecta, obtusa, æqual. Caps. ovata, circumscissa, aut 3-valv. 1-locul.
729. *Lythrum*. Cal. cylindric. sub 12-fid. segment. 6. ma. Petal. plerumq. 6. calyci inserta, quandoq. 4. Stam. 6. ad 12. Caps. 2-locul. polysper.
730. *Ginora*. Cal. inferus, 6-fid. segment. colorat. Cor. 6-pet. Petal. subrotund. patentia. Caps. depresso-subrotund. colorata, nitida, 4-valv. 1-locul. polysper.
714. *Blakea*. Cal. floris superus, indivisus; fructus 6-phyll. Cor. 6-pet. Petal. patentia. Anth. connexæ. Cap. 6-locul. polysper.
715. *Besleria*. Cal. deorsum gibbus, supra ventricosus, 7-fid. lacin. parvis, subæqualib. ovatis, acutis, conniventib. exteriorib. latioribus. Cor. 7-pet. Petal. oblong. superne latiora. Stam. 14. Bacca exsucca, 7-gona. 7-locul. polysper.
711. *Bassia*. Cal. 4-phyll. segment. ovatis, coriac. persistentib. Cor. campanul. 8-fid. tubo inflato. Stam. 16. Drupa 5-sper. lactescens.
719. *Decumaria*. Cal. superus, minimus, 10-phyll. foliol. ovatis, reflexis, coloratis. Petal. 10. lanceol. obtusa, æqual. patent. Fruct. 10-locul.
- \* *Cleome viscosa*; *dodecandra*.
- \* *Rivina octandra*.
- \* *Chironia dodecandra*.

DIGYNIA.

731. *Heliocarpus*. Cal. 4-phyll. segment. longis, linearib. Cor. 4-pet. Petal. angusta, calyce breviora. Styl. simplic. Caps. compressa, utrimq. longitudinaliter radiata, 2-locul. 1-sper.
732. *Agrimonia*. Cal. 5-dent. altero obvallatus. Pet. 5-6. elliptica. Stam. 10-12. Sem. 2. in fundo calyc.

## TRIGYNIA.

733. *Reseda*. Cal. 1-phyll. 5-part. in variis speciebus diversimode. Cor. 5-pet. quandoq. pet. 6. multifida, inæqual. Caps. angulata, ore dehiscens, 1-locul.
734. *Euphorbia*. Cal. 1-phyll. ventricosus, coloratus. Cor. 4-5-pet. calyci insidens. Caps. 3-cocca, pedicellata. Difficulus a num. Stam. dignoscitur, cum in plerisq. speciebus stam. 6; in aliis 7. 8 9. 10. 11. raro 12: sed facilius a lacte, quo scatet &c. dignoscitur hoc Genus.
735. *Visnea*. Cal. inferus, 5-phyll. Cor. 5-pet. Stigm. 3-fid. Nux 2-3-locul. feminifera.
736. *Tacca*. Cal. superus, 5-phyll. Cor. 6-pet. fornicata. Bacca sicca, angulata, 3-locul.
736. *Pallasia*. Est *Calligonum polygonoides*, monente Vahl. in literis.

## TETRAGYNIA.

- \* *Tormentilla cretæa*.  
 \* *Resedæ aliquot*.

## PENTAGYNIA.

738. *Glinus*. Cal. 5-phyll. Cor. 0. Nect. setis 2-fid. Caps. 5-angul. 5-locul. 5-valv. polysper.
- \* *Reseda purpurascens*.

## DODECAGYNIA.

739. *Sempervivum*. Calyc. segmenta quot petala. Pet. 9-12. Caps. tot quot petal. Sedo adfine. Fol. succulentia.

## POLYGYNIA.

- \* *Alisma cordifolia*.



## MONOGYNIA.

708. ASARUM. **C**al. coriaceus, campanulat. 3--4--fid. persistens, coloratus, segmentis acutis, apice reflexis. Cor. o. Caps. coriacea, coronata, 6--locul. polysper.
1. *europæum*. **A.** fol. binis, renifor. obtusis. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 633. Black. tab. 383. Mill. ic. tab. 53. Ludw. ed. tab. 182. Matth.*  
*In Europæ nemoribus 24.*  
 Scap. radical. petiolos binos sustinet, inter quos peduncul. nudus, 1-fl. Fol. hemisphærico-cordata, coriacea, integerr. nitida, subhirsuta. Cal. extus virid. intus obscure purpur. *Odor cum gravitate gratus.*
2. *canadense*. **A.** fol. reniform. mucronatis. *Syst. veg. ed. 14. Moris. hist. 3. f. 13. tab. 7. f. 4. Corn. Canad. tab. 25.*  
*In Canada 24.*  
 Fol. ampliora priore: *an var.?*
3. *virginicum*. **A.** fol. cordat. obtusis, glabris, petiolat. *Syst. veg. ed. 14. Pluk. alm. tab. 78. f. 2. Moris. hist. 3. f. 7. tab. 7. f. 3. Black. tab. 359.*  
*In Virginia &c. 24.*  
 Fol. longe petiol. pallido, & atro virore maculata.
709. TOMEX. **Cal.** dupl. Involuc. 5--phyll. Periant. 5--phyll. Cor. o.
1. *japonica*. **T.** *Syst. veg. ed. 14. Thumb. Jap.*  
*In Japonia 24.*  
 Arbor plusquam orgyal. ramosa. Rami, & ramuli tomentosi. Fol. palmar. alterna, petiol. oblong. obtusa, erecta, integerr. parallele nervosa, supra glabra, virid. subtus incano--tomentosa. Petiol. pollic. tomentosi. Fl. axill. capitati, pedicellati. Bract. prope basin, oppositæ, minutæ, tomentosæ.
710. BOCCO. **Cal.** 2--phyll. deciduus. Cor. o. Styl. 2--fid. Bacca exarida, 1--sperma.
1. *frutescens*. **B.** *Syst. veg. ed. 14. Trew. chret. tab. 4. Chelidonium &c. Sloan. Jam. hist. 1. tab. 125.*  
*In Mexico, Jamaica &c. 24.*  
 Arbuse, 9--pedal. succo rufo. Fol. semipedal. ai-

terna, petiol. ovato--sinuata, subtus tomentosa. Fl. axillar. & terminal. numerosi, paniculato--racemosi, virescentes. Stam. 6.

711. BASSIA. Cal. 4-phyll. segment. ovatis, coriaceis, persistent. Cor. campanul. tubo ovato, inflato, carnoso, limbo 8-fid. lacin. ovaris, erectiuscul. Drupa 5-sper. lactescens.

1. *longifolia*. B. *Syst. veg. ed. 14.*

*In Malabarica* B.

Arb. procera, ramis ultimis recurvis, griseo--pubescent. Fol. in extremis ramulis, adproximata, alterna petiol. ovat--lanceol. integerr. venosa, nuda, decidua, semipedal. Petiol. breves, teretiuscul. Pedunc. axill. 1--5. erecti, simpl. filiform. 1-fl. post efflorescentiam elongati, penduli.

712. RHIZOPHORA. Cal. & cor. 4-part. Sem. 1. longiss. basi carnosum.

1. *coniugata*. R. fol. ovat-oblong. obtusiuscul. integerr. calyc. sessilibus; fructibus cylindrac--subulat. *Syst. veg. ed. 14.*

*Anonyma. Herm. pict. 279.*

*In India* B.

2. *gymnorhiza*. R. fol. ovat--lanc. integerr. radice terræ superimposita. *Syst. veg. ed. 14.*

*Mangium &c. Rumph. amb. 3. tab. 68.*

*Candel. H. Mal. 6. tab. 31. 32.*

*In India ripis falsis* B.

Frutex ramis deflexis, & terræ superficiei insertis. Ramuli, & furculi in conum fastigiati. Fol. fastigiata, decussata, densa, solida, glabra, supra fusco--nitent. subtus dilutiora, venosa, costa media crassa. Fl. *Rosis* similes. flavo-rubicundi. Petal. 12. Fruct. spitham. carne alba, & fungosa, medulla intermedia rubra.

3. *Candel*. R. fol. obtusis: peduncul. bigeminat. fol. longioribus: fructibus subulatis. *Syst. veg. ed. 14.*

*Hort. mal. 6. tab. 35.*

*In India falsis* B.

Frutex 7--ped. Fol. opposita, breviter petiol. Fl. exalbidi, odore debiliore.

4. *corniculata*. R. fol. ovatis: fl. confertis: fructibus arcuatis acuminat. *Syst. veg. ed. 14.*

*Mangium &c. Rumph. amb. 3. tab. 77.*

*In Moluccis* h.

Frutex 2-orgyal. ramosus. Fol. 4-5-pollic. longa, 2 digitos lata, oris deorsum inflexis, opposita, quodammodo cruciata, plerumq. inordinata, crassa, glabra, parce venosa. Fl. pl. laterales, reflexi; albi, odori. Fruct. 2. transversos digitos longi, col. glauco, dein rufo.

5. *Mangle*. R. fol. acutis: fructibus subulato--clavatis. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. amer. tab. 89. ed. pict. tab. 132.*

*Mangle*. *Pluk. alm. tab. 204. f. 3. Phyt. tab. 204. f. 3.*

*Candela* &c. *Cates. car. 2. tab. 63.*

*Mangium* &c. *Rumph. amb. 3. tab. 71. 72.*

*Peekandel*. *H. mal. 6. tab. 34.*

*In paludibus Malabariae* &c. h.

Arb. 50--ped. cortice ferrugin. Fol. opposita, petiol. apice leviter attenuata, coriacea, integerr. nitida, supra virid. subtus subflavescent. cum punctis nigricant. Pedunc. axill. pollic. compressi, 2-3-fl. 2-fid. Cal. flavescent. Cor. candida. Stam. 8. Pericarp. ovat--oblong. basi gibbosum, carnosum, scabriuscul. fuscum, pollice longius, *Cassia solutivæ* simil.

6. *cylindrica*. R. fructibus cylindric. obtusis. *Syst. veg. ed. 14. Hort. Mal. 6. tab. 33.*

*Mangium minus*. *Rumph. amb. 3. tab. 69.*

*In Malabariae uliginosis* h.

Frutex 3--orgyal. ramosus. Fol. min. quam in 2. spec. breviter petiol. Fl. candidi, supra fol. exortum terni, raro bini. Fruct. min. e rubro--cœrul.

7. *caseolaris*. R. fol. ovatis, obtusis: fl. solitar. fructibus orbiculat. mucronat. depressis. *Syst. veg. ed. 14. Rumph. amb. 3. tab. 73. 74.*

*In Moluccis* h.

Arbor vasta instar *Quercus*, ramis incurvis. Fol. instar *Portulacæ* cruciatim posita, rara, lata, subrotun--acumin. crassa, glabra. Fl. ex summis ramorum alis. Petal. ma. rubra.

---

*ceratophylloides*. R. fol. ovat. acumin. fl. confertis: fructibus conicis, coronatis. *Burm. Ind. Rumph. amb. 3. tab. 78.*

*In India*.



713. *APACTIS*. Cal. o. Cor. 4-petal.

1. *japonica*. A. *Syst. veg. ed. 14. Thumb. Jap.*

In *Japonia* h.

Arb. ramosiss. Rami erecti, alterni, teretes, punctato--scabri, ramulosi. Fol. in ramulis, pollic. alterna, petiol. ovata, acuta, serrata, basi integra, nervosa, glabra, subtus pallidiora. Fl. in ultimis ramul. racemosi. Racemi sæpe ovati.

714. *BLAKEA*. Cal. inferus, 6-phyll. Superus integer. Petal. 6. patent. Caps. 6-locul. polysper.

1. *trinervia*. B. bicalyculata: fol. enerviis, transversum subtilissime striatis. *Syst. veg. ed. 14. Brown. Jam. tab. 35.*

In *Jamaica* h.

Arbor. Fol. opposita, petiol. oblong--ovata, integerr. coriacea, nervis subtus nigricantibus. Fl. oppositi, solitari.

2. *triplicinervia*. B. ecalyculata: fol. triplicinerviis. *Syst. veg. ed. 14.*

In *America* h.

Differt a priore, arbore 16--ped. fol. costatis. Fol. spitham. Flos magnitudine *Punica*. Petal. sub 7. ovato--oblong. lutea, intus alba. Fruct. luteus, sapidus.

*quinquenervia*. B. fol. ovato--oblong. acuminat. 5--nerviis. *Aubl. Guian. tab. 210.*

In *Guiana* h.

Arb. 7--8--ped. superne ramosa, ramulis oppositis, nodosis. Fol. ampla, opposita, petiol. integerr. glabra. Fl. axillar. 1--2. longe peduncul. Petal. 8-9. ovata, fimbriata, carnea, supra alba, subtus carnea. Bacca magna, turbinata, sublutea, 8--9--locul.

715. *BEFARIA*. Cal. deorsum gibbus, subventric. 7-fid. lacin. parvis, subæqual. ovatis, acutis, conniventibus: exterior. latioribus. Petal. 7. oblong. superne latiora, obtusa, patula. Stam. 14. Bacca 7--locul. polysperm. exsucca, depressa, urabilic. 7--gon.

1. *æsuans*. B. fol. lanceolat. fl. racemosis. *Syst. veg. ed. 14.*

In *Mexico* h.

Frutex 2--orgyal. altior sequent. ramis teretiusc. patentibus. Fol. sæpius alterna, conferta, varia, obovata, oblong. obtusa, integerr. a-

venia

avenia, nitida, subtus tomentosa. Petiol. breviss. planiusculi. Fl. axill. pauci; terminal. plurimi. Pedunc. racemosi; pedicell. hirsutis. Cor. incarnata.

2. *resinosa*. B. fol. ovatis: fl. congestis. *Syst. veg. ed. 14.*  
*Lin. Suppl. Mutis. Amer. Vol. I. tab. 8.*  
*In nova Granada h.*

Arb. ramis proliferis, cortice rudi, tenello subpubescente. Fol. sparsa, pollic. subpetiol. integerr. lævia, perennia. Fl. in apice ramorum in racemis minime elongatis. Cor. purpur. valde resinosa, seu viscosa. Stam. prope basin pubescent.

716. *VATICA*. Cal. erect. 5-part. segmentis lanceol. Petal. 5. magna, elliptica. Anth. 15. sessil. 4-locul.

1. *chinesis*. V. *Syst. veg. ed. 14.*  
*In China 24.*

Statura accedit ad *Citrum*: Rami striati, subto-mentosi. Fol. alterna, petiol. cordat--ovata, integerr. utrimq. glabra, venosa, alterne nervosa, spitham. latitudine palmari. Fl. paniculati, præcipue terminal. magnitudine *Citri*.

717. *GARCI-NIA*. Cal. inferus, 4-phyll. lacini concavis. Petal. 4. concava. Bacca globosa, coriacea, 8--sperm. coronata stigm. peltato.

1. *Mangostanum*. G. fol. ovatis: peduncul. 1--fl. *Syst. veg. ed. 14.*  
*Garc. Act. angl. tab. 1. Rumph. amb. 1. tab. 43. Ellis. 1775. c. tab. M.*

*In Java, & Moluccis h.*

Arb. 17--18--ped. *Citro* similis, sed non spinosa, & inodora, ramosa, conica ut *Abies*. Fol. *Mali*, sed maiora, supra nitida, subtus olivæ col. 6--7. crassioribus venis ex utroq. nervi medii latere prodeuntibus, cum aliis venis min. 4--6. unc. longa, 3. lata, integerr. Fl. in apice ramulorum. Cal. laciniis superioribus latioribus, extus virid. intus sature rubris. Peral. subrotun. *Rosæ* col. saturiore. Fruct. subrotundi, cortice referentes Pomum aurantiacum, diamet. 1--sesquipollic. cortice purpureo--fusco, viridi col. mixto, intus roseo. Succus col. purpur. dulcis, gratiss. sapore *Fragarum*, & *Uvæ*. Fructus in apice gestat coronam tot radiis, quor nuclei.

*Fructus cortex in dysenteria, & tenesmo. Garg.*  
*Tom. III.*

rismus in faucium ulceribus. Succus etiam laudatur in febribus putridis, & inflammatoriis.

2. *celebica*. G. fol. lanceol. peduncul. 3-fl. Syst. veg. ed. 14. Rumph. amb. 1. tab. 44.

In India h.

Arb. non procera, coma eleganti extensa. Fol. opposita, breviter petiol. 5--6--iuga in quolibet ramo, 3--8. pollic. longa, ultra 3. digitos lata, crassa, & firma, sed priore rariora, costis transversalibus, parallelis, glabra. Pedunc. axill. 1-2-fol. 3-fl. Petala concava, squallide albert. odora. Fruct. ut in priore, crocei instar Pomi granati.

3. *cornea*. G. fol. lanceol. avenis: pedunc. 1-fl. cernuis. Syst. veg. ed. 14.

Lignum corneum. Rumph. amb. 2. tab. 30.

In India h.

Arb. alta, cortice nigro. Rami terminal. ampli, ramulosi. Fol. opposita, breviter petiol. 11-15. pollic. longa, 4. lata, glabra, firma, nitida, crasso nervo medio notata, supra sulcata, subtus dorso trigono prætuberant. venulosa. Pedunc. axillar. in apice 2-foliosi. Inter fol. flos min. Rosarum. Petal. subrotund. crassa, concava, reflexa, lutea. Fruct. Pruni magnitudine, obscure fuscus, non edulis.

*Mangium sylv.* Rumph. amb. 3. tab. 30. *distincta* sp. videtur.

718. *HALESIA*. Cal. minimus, 4-dent. superus. Cor. ventricosa, 4-fid. Nux 4-angular. alata, 2-sperm. *Styraci proxima*.

1. *tetraptera*. H. fol. lanceolat-ovat. petiolis glandulosis. Syst. veg. ed. 14. Ellis. Aët. angl. tab. 22. f. A. Frutex &c. Catesb. car. 1. tab. 64.

In Carolina h.

Arbuscula. Fol. subtus subtomentosa. Cor. campanifor. alba. Fruct. alis 4. æqualibus.

2. *diptera*. H. fol. ovatis; petiolis lævibus. Syst. veg. ed. 14. Ellis. Aët. Angl. tab. 931. f. B.

In Carolina h.

Fol. sextuplo ma. prioris, nec subtus subtoment. Fruct. mucronatus, alis 2. oppositis magnis, 2. minutis.

719. *DECU-MARIA*. Cal. minimus, superus, 10-phyll. segment. ovaris, reflexis, coloratis. Petal. sub 10. lanceol. obtusa, æqualia, patentia. Fruct. 10-locul.



1. *barbura*. D. Syst. veg. ed. 14.

In *Carolina septentrionali*, monente Vahl. h.

Rami inconditi, genicul. nodosis radicales. Fol. opposita, petiol. obovata, coriacea, venosa, versus basin remote serrata. Stipul. nullæ. Panicula terminal. corymbosa. Fl. *Tilia* similes. Cal. superus, dentibus 8-16. Petal. lanceol. ex viridi albescentia, odora.

720. CANEL-LA. Cal. campanulat. 3-lobus, lobis concavis. Petal. 5. fessil. Anth. 16. adnatæ nectar. urceol. Bacca ovar. 3-locul. Sem. 2.

1. *alba*. C. Syst. veg. ed. 14.

*Winterania Canella*. Syst. veg. ed. 13. Black. tab. 206. Clus. exot. 75. Brown. Jam. tab. 27. f. 3.

Arbor &c. Sloan. Jam. 2. tab. 191. f. 2. Catesb. car. tab. 50.

Cassia &c. Pluk. alm. tab. 81. f. 1. & tab. 161. f. 7.

In *America* h.

Arb. sub 20-ped. ramis dichotomis, quasi articul. scabris. Fol. plura, inordinata, subpetiol. verticalia, obovata, obtusa, ut in *Cotino*, cum unica costa, nitida, sature virid. Fl. corymbosi, vertical. Petal. linear. purpur. odora. Bacc. purpur. Substituatur *Cinnamomo*.

721. CRATÆVA. Cal. 4-fid. Cor. 4-petal. Petal. ad idem latus sursum flexa. Bacca globosa, pedicellat. 1-locul. polysper.

1. *gynandra*. C. inermis; fol. ovatis, integerr. fl. gynandris. Syst. veg. ed. 14.

Arbor &c. Pluk. phyt. f. 6.

In *Jamaica* h.

Differt a sequenti fol. tenuibus, nec crassis: petal. lanceol. nec ovatis,

2. *Tapia*. C. inermis; foliol. lateralibus integerr. basi antice brevioribus. Syst. veg. ed. 14. Plum. gen. tab. 21. Pis. bras. tab. 69.

Malus &c. Comm. hort. 1. tab. 67.

Apioscorodon &c. Pluk. alm. tab. 137. f. 7.

Nurruala, Hort. mal. 3. tab. 22.

In *Indiis* h.

Arb. Fol. ternata, longe petiol. ovat-acum. læte virent. nitida. Foliol. breviter petiol. Fl. gynandri. Bacca ferruginea, vel aurantiaca, *Allii* odore.

3. *Marmelos*. *C. spinosa*, fol. ferratis. *Syst. veg. ed.* 14.  
*Cucurbitifera* &c. *Pluk. alm. tab.* 170. f. 5.  
*Bilanus Rumph. amb.* 1. tab. 81.  
*Coualam. Hort. Mal.* 3. tab. 37.  
*In India* ‡.

Arb. Fol. ternata. Fl. odori, extus virid. intus albo-virides. Fruct. Mali magnitudine, oblong. pulpa *Cydonii æmula*. *Ex fl. elicitur aqua, odorem Rosarum æmulans*.

722. TRIUM-CAL. (si adfit) 5-phyll. Cor. 5-petal. Petal. li-FETTA. near. erect. retroflexa. Caps. hispida, in 4. diffiliens.

1. *Lappula*. *T. fol. basi emarginatis: fl. ecalyculatis. Syst. veg. ed.* 14. *Plum. ic.* 255.

*Lappula* &c. *Pluk. alm. tab.* 245. f. 7.

*In Jamaica* &c. ‡.

Frutex 8-ped. ramosus, scaber, ad basin griseus, lincis longitudinal. virid. lævis. Fol. remota, alterna, petiol. fere cordata, 5-angular. nervosa, mollia, virid. rugosa, utrimq. subto-ment. ferrata, magnitudine vix manus, horizontaliter patent. Stipul. subulatae. Racem. terminal. reflexus, digiti longitudine. Cal. o. Petal. reflexa, lutea. Fruct. magnitudine Pili, sphaericus, echinatus.

2. *Bartramia*. *T. fol. basi integris, indivisis. Syst. veg. ed.* 14. *Jacq. amer. tab.* 90. ed. *pic. tab.* 134.

*Lappula* &c. *Pluk. alm. tab.* 41. f. 5.

*Agrimonia* &c. *Pet. gaz. tab.* 42. f. 10.

*Lappago* &c. *Rumph. amb.* 6. tab. 25. f. 2.

*In India* ☉.

Frutex erectus, 3-ped. ramosus, totus odore ingrato. Rami subdichot. Fol. alterna, subsessil. summa minus rhomboidæa, rugosa, villosa. Pedunc. axill. ramosi, multifi. Cal. rubens. Petal. flava. *Orientalis differt fol. angulatis*.

3. *Semitriloba*. *T. fol. semitrilob. fl. completis. Syst. veg. ed.* 14. *Jacq. amer. pic. tab.* 133. *Hort. app. tab.* 76.

*In Amer. calidiore* ‡.

*Simil. T. Lappula, sed fl. calyculati*. Frutex 6-ped. ramosus, cortice pallide fusco. Fol. alterna, petiol. utrimq. tomento sericeo mollissima, subcordata, acuta, ferrata, lobo me-

dio longiore. Stipul. utriusque ad petiolos subulata. Racemi terminal. erecti, compositi, foliosi.

3. *annua*. T. fol. ovatis, indivisis, rariusve lobatis. *Syst. veg. ed. 14. Mill. ic. tab. 298.*

*In Ind. orient. ☉.*

Fol. longe petiol. obtusa, ferrata.

723. *EURYA*. Cal. 5-phyll. calyculat. Cor. 5-petal. Stam. 13. Caps. 5-locul.

1. *japonica*. E. *Syst. veg. ed. 14. Thumb. Jap. tab. 25.*

*Fisakaki. Kämpf. am. exot. Fasc. V. p. 778.*

*In Japonia h.*

Planta glabra. Caul. fruticosus, ramosus. Fol. pollic. & ultra, in ramulis frequentia, alterna, petiol. elliptica, ferrata, margine parum reflexo, basi integra, crassiuscula, sempervirent. erecta, disticha, acumine emarginato, nervosa, supra virid. subrus flavescen. Petiol. lineam longi, decurrentes. Fl. axill. bini; peduncul. cernui, raro solitar-terni. Cor. alba. Fl. sæpe dioici.

724. *PEGANUM*. Cal. 5-phyll. (seu 0) segment. erectis, linear. acutis. Petal. 5. suberect. calyci æqual. ovata. Caps. 3-gon. 3-locul. 3-valv. polysper.

1. *Harmala*. P. fol. multifidis. *Syst. veg. ed. 14. Black. tab. 310. Dod. pempt. 121.*

*In arenis Madriti, Alexandria, Sibiria &c. 24.*

Caul. cubital. ramosus, striatus. Fol. alterna, sessil. succulenta. Fl. oppositifol. solitar. pedunculati. Fol. calycina linear. 3. longiora. Petal. luteo-virid. Stam. 15.

2. *dauuricum*. P. fol. indivisis. *Syst. veg. ed. 14.*

*Ruta &c. Gmel. Sib. 4. tab. 68. f. 2.*

*In Sibiria 24.*

Caul. multi, vix pedal. lignosi, ramis divaricatis. Fol. *Polygalæ*, alterna. Fl. terminal. solitar. Petal. alba, vel lutea.

- Criethmifolium*. P. caul. frutescente: fol. multifidis. *Retz. Obs. fasc. 3.*

*Ad mare Caspium.*

*Simil. P. Harmalæ, sed caul. 3-ped. perennans; sempervirens, Fl. min. Cal. simpl. fl. brevior.*

- retusum*. P. fol. sessil. cuneiform. retusis, subcarnosis. *Forsk. Æg.*

*Alexandria h.*



- Frutex ramis spinosis, tomentosis. Stam. 15.  
 725. HUDSONIA. Cal. 5-phyll. tubulosus. Cor. o. Stam. 15. Caps.  
 1-locul. 3-valv. 3-sper.

1. *ericoides*. H. Syst. veg. ed. 14.

In Virginia.

Frutex facie, & habitu *Ericæ*. Ramuli sparsi, filiform. imbricati. Fol. subulato-acerosa, hirsuta; tenella hirsutiora, incana. Pedunc. e gemmis fol. solitar. filiform. Cal. erectus, pubescens.

726. DODECAS. Cal. semi 4-fid. corollifer, superus. Cor. 5-petal. Caps. 1-locul. calyc. connata.

1. *surinamensis*. D. Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.

In Surinamo b.

Frutex facie *Lycii barbari*, sub 4-gon. lævis, ramis brevibus, oppositis. Fol. opposita, subpetiol. cuneata, obrusa, integerr. lævia. Stipul. nullæ. Pedunc. axill. solitar. breves, 1-fl. Bract. 2. parvæ. Cal. ante explicationem 4-gon. 4-valv. inferne turbinat. teres. Petal. calyc. ad divisuras inserta.

727. NITRARIA. Cal. parvus, 5-fid. Petal. 5. oblongi patentia, apice fornicato. Stam. 15. Nux conica, apice crenata, 1-sper.

1. *Schoberi*. N. Syst. veg. ed. 14. Ait. nov. Petrop. tab. 10. Murr. Fl. Gott. tab. 2.

Osyris &c. Gmel. Sib. 2. tab. 98.

Ad salsas aquas lacus *Astracanensis* &c. b.

Caul. fruticos. pedal. ramosus. Fol. ex eodem puncto terni-quaterna, ramea, alterna, radiatim divaricata, sessil. linear-lanceol. basi angustiore, integerr. subpollic. nitida, succosa. Pedunc. terminal. alter ex axillis fol. penultimis, multifariam divisi. Fl. 3-7. erecti. Petal. lanceol-linear. cymbiform. patent. reflexa, alba. Drupa ovat-oblong.

728. PORTULACA. Cal. 2-fid. aut 2-5-phyll. superus, persistens. Petal. 5. erecta, obtusa, æqualia. Caps. ovata, 1-locul. circumscissa, aut 3-valv. polysper.

*Orygia* Forsk. Æg. spectat ad hoc genus, monente Vahl.

1. *oleracea*. P. fol. cuneiform. fl. sessil. Syst. veg. ed. 14. Black. tab. 207. Bauh. hist. 3. p. 678.

b. *P. latifolia sativa*. Lob. ic. 388.

In Europa, America ☉.

Caul. procumb. subruher. Fol. integerr. carno-  
sa, nitida. Fl. axillar. solitar. lutei. Caps.  
circumscissa. *Var. num. staminum.*

2. *pilosa.* P. fol. subulat. alternis; axillis pilosis: fl. ter-  
minal. sessilibus. *Syst. veg. ed. 14.*

P. *curassavica* &c. *Comm. hort. 1. tab. 5. Herm.*  
*par. tab. 215. & 214.*

P. *lanuginosa* &c. *Volk. norib. tab. 341. Pluk.*  
*aln. tab. 247. f. 7. & tab. 105. f. 4.*

*In Amer. meridion. ☉.*

Planta humilis. Rami subdichot. Fol. sessil. cras-  
sa, retroflexa, alterna, sed terminalia, seu  
floralia 8. in orbem digesta. Fl. terminal. so-  
litar. suaverubent. Cal. 2-fid. Stam. 15. Styl.  
5-fid. Caps. pyramidal. circumscissa.

3. *quadrifida.* P. caul. geniculis pilosis: bract. quaternis: fl.  
4-fid. *Syst. veg. ed. 14.*

*In Ægypto ☉.*

Rad. fibrosa. Caul. numerosi; prostrati, semiped.  
alterni, ramosi, teretes. Fol. distantia, op-  
posita, sessil. ovat-lanceol. integerr. carno-  
sa, patent. lævia, subtus concava, adspersa m. s.  
diaphanis. Petioli florentes terminales, adulti  
laterales facti superne incrassati, 1-fl. terminati  
bract. 4. patent. folio similibus. Flos sessilis,  
flavus, cinctus pilis albis. Filam. 8. setacea,  
Caps. circumscissa.

4. *halimoides.* P. fol. oblong. carnosus: caul. corymbofo: fl. sessi-  
libus. *Syst. veg. ed. 14. Sloan. Jam. hist. 1.*  
*tab. 129. f. 3.*

*In Jamaica ☉.*

Planta *Sedi min. facie.* Fol. summis ramulis dense  
sita. Cal. 2-phyll. Caps. circumscissa.

5. *triangula-* P. fol. obovatis, planiuscul. racemo simpl. tri-  
*ris.* quetro. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. Obs. 1. tab. 23.*  
*amer. ed. pict. tab. 135.*

*Helianthemum* &c. *Plum. sp. tab. 150. f. 2.*

*In Amer. ad maris littora b.*

Fruticul. 2-ped. Caul. procumbenti-erecti. Fol.  
alterna, oblong. cum acumine, basi adtenua-  
ta, crassiuscula, emarginata, convexa, vel pla-  
na, fragilia, sæpe revoluta. Pedunc. terminal.  
3--angul. erecti, sub 3-fl. Fl. inodori. Cal.  
2-phyll. Petal. lutea. Caps. 3-valv.

6. *crassicaulis*. P. fol. lanceol. planis: racemis triquetris: caul. erecto. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. hort. 3. tab. 52. Habitat . . .*

Caul. erectiuscul. 2-ped. & ultra, ramosus, carnosus, intra fol. purpur. Fol. alterna, sessil. lanceol. obtusa, vel acutiusc. quandoq. emarginata, integerr. crassula, avenia, ad basin adtenuata. Racemi terminal. erecti, triangul. simpl. aut ramosi. Fl. peduncul. inodori. Petal. obverse ovata, obtusiss. patentiss. rubra. Caps. globosa.

7. *Anacamptis* - P. fol. ovatis, gibbis: pedunc. multiss. caul. fruticoso. *Syst. veg. ed. 14. Comm. hort. 2. tab. 89. ros.*

*Telephiastrum* &c. *Dill. elth. tab. 281. f. 363.*

*Oxalis* &c. *Burm. afr. tab. 30. f. 2. vitata.*

*Ad cap. b. Spei h.*

Caulicul. oblique surrecti, non, aut parum ramosi, carnosolignosi, inferne cinerei, aut squallide fusci. Fol. crebra, alterna, sessil. crassa, succulenta, inferne crassiora, & rotundiora, per ætatem rugosa, avenia, subglauca, cum punctis crebris virentibus. Surculi palmar. aphylli, simplic. vel bifurcati, in quorum apice fl. amœne purpur. Cal. 2-phyll. Petal. inæqual.

*Fol. succulenta coniungunt hanc plantam cum Portulacis, quamvis flum. plurima, & caps. 3-valv.*

8. *patens*. P. fol. lanceol-ovatis, planis: panicula ramosa; calyc. 2-phyll. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. amer. ed. picta tab. 136. Hort. 2. tab. 151.*

*In America h.*

Caul. 1-2-ped. flexilis; ramis alternis, lævibus, 4-gonis, inferioribus longioribus. Fol. alterna, vel opposita, petiolat. lanceol-ovata, basi attenuata, subsucculenta, integerr. carinata, fragilia, semipollic. Panicula terminal. elongata, pedicellis filiform. dichotom. Cal. 2-phyll. ruber. Petal. 5. ovata, obtusa, concava, rubra. Anth. luteæ. Styl. 3. Caps. globosa. Sem. plura, nigra. *Differt a P. fruticosa, cui fl. albi, & cal. 5-phyll.*

9. *meridiana*. P. fol. elliptic. carnosis, planis; geniculis pilosis, fl. sessil. terminalibus. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*

*P. curassavica. Herm. parad. tab. 215.*

*In India orient. ☉.*



Caul. statura *Sedi acris*, herbac. repentes, ramosi, rubentes. Fol. terminal. elliptico-lanceol. opposita, etiam quaternata, subcarnosa. Fl. terminal. solitar. sessil. lutei, cincti lana, foliisq. 4. Stam. variant num. 4-ad 8.

10. *fruticosa*. P. fol. obovatis, planiuscul. peduncul. racemosis, calyc. 5-phyll. caul. fruticoso. *Syst. veg. ed. 14. Comm. hort. 1. tab. 4.*

*In Americ. maritimis* B.

Caul. erectus, 1--sesquiped. superne ramosus, teres, foliosus, splendens. Fol. palmum transversum longa, cuneiform. crassa, pulchre virent. nervo insigni donata. Fl. racemosi. Cal. 5-phyll. Petal. alba. Caps. 3-valv.

*imbricata*. P. fol. confertis, ovato--acutis, subtus planis, supra convexis, punctatis: geniculis basi hirsutis: fl. terminal. sessilibus. *Forsk. Æg.*

*In Arabia*.

Fol. longa, sessilia, brachiatim opposita. Fl. magni, flavi.

729. LYTHRUM. Cal. cylindricus, sub 12--fid. segment. 6. maioribus. Petal. plerumq. 6. calyci inserta, interdum 4. Stam. 6. ad 12. Caps. 2--locul. polysperm.

1. *Salicaria*. L. fol. oppositis, cordato--lanceol. fl. spicatis, dodecandris. *Syst. veg. ed. 14. Black. tab. 520. Fl. Dan. tab. 671.*

*Lythymachia* &c. *Clus. hist. 2. p. 51.*

*Lythymachia* altra. *Matth.*

b. *Blattaria* &c. *Morif. hist. 3. f. 5. tab. 10. f. 11.*

*In Europa, ad ripas aquarum* U.

Caul. purpurasc. apice ramosus. Fol. binata, ternata, raro quaternata, sessil. integerr. Fl. spicæ longæ, densæ, foliosæ. Verticill. 18-fl. Petal. purpur. *Var. fol. angustiss.*

2. *virgatum*. L. fol. (plerumq.) oppositis, lanceol. panicula virgata: fl. subternis, dodecandris. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. Austr. tab. 7.*

*Lythymachia* 2. *Clus. hist. p. 51.*

*In Austria, Sibiria* &c. U.

Planta nitida. Caul. 2-ped. paniculat. fuscescens, Fol. integerr. Fl. axill. 2-3. Cal. ex viridi--purpur. Cor. purpureo-rubra.

3. *fruticosum*. S. fol. oppositis, subtus tomentosis: fl. decandris; corollis calyce, & genitalibus brevioribus. *Syst. veg. ed.* 14.

*In China* F.

Frutex cortice lacero. Fol. sessil. lanceol. integerr. Fl. subterminal. solitar. pedunculati.

4. *verticillatum*. L. fol. oppositis, subtus tomentosis, subpetiolat. fl. lateralibus, verticillat. *Syst. veg. ed.* 14.

*In Virginia*.

Caul. fruticosus. Fol. salicina. Pedunc. multifl. breviss. Petal. purpur.

5. *petiolatum*. L. fol. petiolat. oppositis, linear. fl. dodecandris. *Syst. veg. ed.* 14.

*In Virginia*.

Caul. pubescens, viscosus, cito marcescens. Fol. integerr. Fl. axill. solitarii. Petal. purpur.

6. *lineare*. L. fol. oppositis, linear. fl. oppositis, hexandris. *Syst. veg. ed.* 14.

*In Virginia*.

Caul. erectus, filiform. angulatus. Spica media: duæ laterales min. Fl. remoti. *Facies* L. *hyssopifolii*.

7. *Parsonia*. L. fol. oppositis, ovalibus: fl. alternis, sessilibus, hexandris: caul. diffuso. *Syst. veg. ed.* 14. *Brown. Jam. tab.* 21. f. 2.

*In Jamaica* 24.

Fol. subsessil. integerr. trinervia, nuda. Racemi alterni. Fl. solitar. alterni, sessiles, ad alterum folior. latus siti.

8. *Melanium*. L. fol. oppositis, ovatis: fl. alternis, subdecandris. *Syst. veg. ed.* 14.

*In Jamaica* 24.

Caul. herbac. Fl. solitar. ad alas alternas.

9. *Cuphea*. L. fol. oppositis, petiolat. ovat-oblong. scabriusculis; fl. dodecandris. *Syst. veg. ed.* 14. *Lin. Suppl. Jacq. hort.* 2. tab. 77. *Vandel. Fasc.* 1771. tab. 3.

*In Zona Amer. horrida, & Brasiliæ umbrosis humentibus* ☉.

Caul. erectus, pedal. ramosus, teres, viscosus. Fol. basi adtenuata, acutiuscula, integerr. ciliata, subvillosa. Pedunc. axill. breves, solitar. 1-fl. Cal. tubulos. striatus, inferne ventricosior, viscidus, gibbus, purpur. Petal. 6. obverse ovata, obtusiss. plana, patentiss. pur-

puro-rubra, quorum 2. super. maiora; reliquis deorsum tendentibus. Caps. ovata, obtusa, pallida, pellucida.

10. *triflorum*. L. glaberrimum; fol. opposit. subsessil. lanceol. integris: peduncul. axill. oppositis: capitulo 3-fl. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*

*In America* ☿.

*Differt a reliquis, peduncul. filiform. terminatis bract. binis, lanceol. fl. longioribus: inter quas fl. 3. æquales, breviter pedicell. parvi, cærul.*

11. *Pemphis*. L. fruticosum, hirsutum: fol. oppositis, oblong. integris: fl. axillar. solitar. peduncul. caps. circumscissa, 1-locul. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*

*Pemphis acidula*. Forst. *gen. tab. 34.*

*Ad littora maris Zeylonæ* ☿.

Frutex canus. Fol. approximata in apice ramorum. Cal. 12-dent. Petal. alba. Fruct. 1-locul.

12. *racemosum*. L. diffusum; fol. opposit. petiolat. ovatis: racemis terminal. fl. oppositis. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*

*In Amer. meridion.* ☿.

Fol. integerr. venosa. Racemi longi. Fl. remoti, recti, longi, pedicell. bracteati. Apices ramulor. calyc. & pedicelli piloso-viscidi.

13. *dipetalum*. L. hispidoviscosum: fol. ternis, seu oppositis, sessil. ovatis: fl. axillar. nutantibus, dipetal. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*

*In America* ☿.

Planta fl. speciosa. Frutex fuscus, ramis alternis. Fol. oblong. integerr. utrimq. hispeditate scaberrima, supra splendent. inferiora terna; ramulorum opposita. Petal. erecta, obovata, violac. seu cærul.

14. *hyssopifolium*. L. fol. alternis, linearibus; fl. hexandris. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. Austr. 2. tab. 133. Rupp. jen. tab. 6. f. 3.*

*In Helvetiæ, Germaniæ &c. inundatis* ☉.

Caul. prostrati, vix semiped. toti solis, rigidi, ramosi, virgati. Fol. pollic. alterna, inferiora sæpe opposita, obtusa, integerr. glauca. Fl. axillar. solitar. vel gemini. Cal. tubulosus, dentibus 5-6. Petal. 5-6. ovalia, purpur. basi alba. Stam. 6. calyce breviora.



15. *thymifolium*. L. fol. alternis, lineari-lanceol. fl. 4-petal. *Syst. veg. ed.* 14.

*Polygonum* &c. *Barr. ic.* 773. f. 2.

*In Italia* &c. *uliginosis* ☉.

Priore humilior. Caul. vix ped. 4-gonus, erectus. Fol. ima opposita. Fl. axillar. solitar. sessil. Cal. stipulis 2. lateralibus cinctus. Stam. 2.

*carthagenense*. L. fol. oppositis, lanceol. petiolat. scabriuscul. *Jacq. Amer.*

*In Carthagenæ sylvis umbrosis* ☉.

Caul. erecti, 1-semiped. teretes, pilosi. Fol. utriusq. attenuata, acuta. Fl. lateral. parvi, plerumq. solitar. Cal. pilosus. Cor. purpur.

730. GINO- Cal. 6-fid. segmen. coloratis. Petal. 6. subro-  
RA. tun. patentia. Caps. depresso-subrotunda, colorata, nitida, 1-locul. 4-valv. polysper.

1. *americana*. G. *Syst. veg. ed.* 14. *Jacq. amer. tab.* 91. *ed. pic. tab.* 137.

*In Cuba, ad ripas fluviorum rupestres, & glareosus* h.

Frutex pulcher, habitu *Myrti*, erectus, 3-4-ped. Fol. multa, sesquipollic. opposita, breviter petiol. lanceol-acuta, integerr. patent. glabra. Pedunc. axill. & terminal. pollicar. patentes, 1-fl. Fl. pulchri, inodori. Cal. rubens. Petal. cœrul. Caps. atro-rubens, quæ baccam externe mentitur, nitidissimam. Sem. albicant.

## D I G Y N I A .

731. HELIO- Cal. 4-phyll. segment. longis, linear. Petal.  
CARPUS. 4. angusta, calyc. breviora. Styl. simpl. Caps. turbinata, compressa, utriusq. longitudinaliter radiata, 2-locul.

1. *americana*. H. *Syst. veg. ed.* 14. *Hort. Cliff. tab.* 16. *Trew. chret. tab.* 45.

*In vera Cruce* h.

Altitudo plusquam humana. Fol. perfecte cordata, acumin. inæqualiter serrata, plana, glabra, 5-ner. Stipul. breves, retroflexo-patentes, deciduæ.

732. AGRI-MONIA. Cal. 5-dentat. altero obvallatus. Stam. 10-12. Petal. 5-6: elliptica. Sem. plerumq. 2. in fundo calyc.

1. *Eupatoria*. A. fol. interrupte pinnat. impari petiolato: fructibus hispidis. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 588. Sabb. hort. 4. tab. 57. Black. tab. 21. Ludw. cæ. tab. 29.*

*Eupatorio. Math.*

*Eupatorium. Fuchf. hist. 244. Cam. epit. 756. Mill. ic. 15.*

*In Europæ pratis, & viis 24.*

Caul. erectus, cubital. simpl. hirsutus. Fol. pinnis acute circumferrat. pilis raris adspersa. Spicæ longæ. Petal. flava. *Var. odorata.*

2. *repens*. A. fol. interrupte-pinnat. impari sessili: fructibus hispidis. *Syst. veg. ed. 14.*

*In Oriente.*

Adfinis nimium priori, sed radix crassa, repens. Caul. breviores, crassiores, hirsuti. Stipul. reflexæ fere totum obumbrant caulem. Spicæ brevis, densa, sessilis, bracteis longitudine fl.

3. *decumbens*. A. fol. pinnat. hirsutis: caul. procumbente: fructibus undique hispido-uncinat. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*

*Ad cap. b. Spei 24.*

Caul. ped. subaphyll. simpl. Fol. radical. *Potentillæ anserinæ*. Foliol. sub 20. ovata, æqualia, ferrata. Fl. racemosi. Fruct. ovati, tomentosi: inferi plerumq. monosper. monogyni.

4. *Agrimono-ides*. A. fol. caulinis ternatis: fructibus glabris. *Syst. veg. ed. 14. Colum. ecphr. 1. tab. 144. Barr. ic. 612.*

*In Italia &c. nemoribus umbrosis, humentibus 24.*

Fol. radical. interrupte pinn. 2-3-iuga, imparima. Pinnæ ovatæ, villosæ, dentatæ. Fl. corymb. parvi, raro 6. Cal. exterior liber ab interiore. Petal. ovata, obtusa, flava. Stam. sæpe vix ultra 2. Sem. 1.

## TRIGYNIA.

733. RESE-  
DA. **C**aul. 1-phyll. partitus, in variis speciebus, di-  
versimode. Petal. inæqualia, sæpius 5, inter-  
dum 6, aliquibus multifidis. Capsl. angulata,  
ore dehiscens, 1-locul.
1. *Luteola*. R. fol. lanceol. integris, basi utrimq. 1-dent.  
calycibus 4-fid. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan.  
tab. 864. Black. tab. 283.*  
Lutum &c. *Dod. pempt. 80.*  
Strusio falso. *Matth.*  
*In Europa ad vias, & pagos ☉.*  
Caul. cubital. ramosus. Fol. elliptica, obtusa,  
juniora undulata, denticul. glabra: radical. in  
orbem sparsa; caulina alterna, sessil. Fl.  
spica terminal. aphylla, prælonga. Petal. exi-  
gua, e luteo-virescent.
2. *canescens*. R. fol. lanceol. undulatis, pilosis. *Syst. veg.  
ed. 14.*  
Sesamoides &c. 2. *Clus. hist. 1. tab. 295.*  
*In Salmantica 24.*  
Caul. erectiuscul. pedal. pilis albis, Rami ex alis  
superioribus inferiores. Fol. alterna, sessil. ca-  
rina pilosa, vix ciliat. integerr. Racem. ter-  
minal. Petal. alba. Anth. luteæ.
3. *glauca*. R. fol. linearibus, basi dentat. fl. 4-gynis. *Syst.,  
veg. ed. 14. Moris. hist. 3. f. 15. tab. 1. Pluk.,  
alm. tab. 107. f. 2.*  
*In Pyrenæis.*  
Caul. procumb. Fol. tenuia, glauca, Fl. spicati,  
Petal. pallide flavescens.
4. *purpurascens*. R. fol. linear. obtusis: fl. 5-gynis, *Syst. veg.,  
ed. 14.*  
Sesamoides &c. 1. *Clus. hist. 1. p. 296.*  
*In collibus Salmanticis, Monspelii 24.*  
Caul. 3-4-dodran. Fol. Lini, inordinata, crassa..  
Fl. spicati, primum ex herbac-purpurasc. dein  
tenuibus capillamentis, ex albo-pallescent. præ-  
diti.
5. *sesamoides*. R. fol. radicalibus, elliptico-spathulat. integris:  
fructibus stellatis. *Syst. veg. ed. 14. All. Fl.  
Ped. tab. 88. f. 3.*  
*Monspelii in horto Dei, & in saxosis apricis Pro-  
vinciæ Aquensis 24.*



Caul. pl. prostrati, semipalm. striati, subangulati, virides, sæpe simplices. Fol. radicalia longe lingulata: caulina sessil. fere linear. apice ampliore, obtusa, glabra. Fl. longe racemosi, subsessil. Cal. profunde 5--fid. qui expansus, & reflexus tribus segmentis sursum spectantibus; & duobus inferius. Petal. alba.

6. *fruticosa*. R. fol. pinnat. apice recurvatis: fl. 4-gyn. calyc. 5-part. patentibus: caul. basi fruticoso. *Syst. veg. ed. 14.*

*In Hispania 24.*

Caul. supra terram perennans, breviss. e cuius apice caul. pl. adscendent. læves, stricti elevati. Fol. pinnæ 5--7. decurrent. lanceol. fere undatæ. Spic. pl. alternæ, ad caulis apicem primores. Petal. 6-5. alba, 3-fid. calyce ma. *Media inter R. undatam, & albam.*

7. *alba*. R. fol. pinnat. fl. 4-gynis; calyc. 6-part. *Syst. veg. ed. 14.*

*R. maxima. Lob. hist. 110.*

*In Hispania, Monspelii &c. ☉.*

8. *undata*. R. fol. pinnat. undulatis: fl. trigynis, tetragynisve. *Syst. veg. ed. 14. Barr. rar. tab. 588.*

*In Hispania 24.*

Caul. pedat. strictus, striato-angulat. Fol. omnia pinn. foliol. decurrent. lanceol. acuta; alternis minoribus erectioribus. Superiora excludunt alterna fol. min. Racem. terminal. Cal. 5-part. Petal. 5. trifida, alba. Anth. 10. luteæ. Caps. magnæ.

9. *lutea*. R. fol. omnibus 3-fid. inferioribus (plerumque) pinnat. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. Austr. 4. tab. 353. Bauh. hist. 3. p. 467.*

*b. R. gallica &c. Bocc. Sic. tab. 41. f. 3.*

*R. massiliensis &c. Pluk. alm. tab. 55. f. 4.*

*In Europæ austral. collibus cretaceis ☉.*

Caul. semiprostrat. cubital. hirsutus. Fol. alterna, sessil. sæpius undulata: caulina simplicia. Fl. spicati. Petal. e luteo-albescent.

10. *Phyteuma*. R. fol. integris, trilobisque: calyc. maximis, 6-part. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. Austr. 2. tab. 132.*

*Refedæ &c. Bauh. prodr. tab. 42. Bauh. hist. 3. pag. 306. quoad iconem.*

*Erucago* &c. *Col. ecphr. tab. 269.*

*In Europa, ad vias, & in vineis collium &c. ☉.*

Caul. pedal. ramosus, angulat. Fol. obverse lanceol. ima integra. Spica rarior, aphylla. Pedunc. patentes. Petal. exigua, subciliata, alba, lacin. intermediis brevioribus. Caps. lævis.

**11. mediterranea.** R. fol. integris, trilobisq. calycibus fl. brevioribus. *Syst. veg. ed. 14.*

*In Palæstina.*

Caul. adscendens, seu erectus, pedal. superne ramosus, scaber. Fol. infer. lanceol. alterna, subtus scabra. Racemus terminal. longus, erectus. Cal. 6-phyll. breviss. linearis, patens. Cor. alba. Petal. 2. super. 3-part. media min. 2. lateral. 2-part. inferiore min. 2. infima linear. Stam. pallida.

**12. odorata.** R. fol. integris, trilobisq. calyc. florem æquantibus. *Syst. veg. ed. 14. Mill. dict. tab. 217.*

*In Ægypto ♂.*

*Simil. R. Phyteumæ, sed fol. magis undulata. Rami declinati, setis vagis adspersi. Calyc. cor. non longiores. Odor fl. suavis. Caul. erecti, pedal. ramis paucis, alternis. Fol. infer. oval-lanc. obtusa, integra, sicuti & ramea. Petal. c. luteo-virid. lacin. lateralibus brevioribus.*

**tetragyna.** R. fol. lanceol. repandis, interdum basi pinnatim incisis; calycino dente supremo æqual. *Forsk. Ægyp.*

*In Ægypto.*

Est tetragyna, & alba.

**hexagyna.** R. fol. lanceol. repandis, undulat. fl. hexagynis. *Forsk. Æg.*

*In Arabia.*

Caul. pl. decumbent. sesquiped. ramosi, teretes, hispidi, striis elevatis. Fol. 2-pollicar. sessil. Racemi terminal. breviter pedicell. bracteolæ lineari suffulti. Fl. alterni, albi.

**734. EUPHORBIA.** Cal. 1-phyll. ventricosus; coloratus. Cor. 4-5-petal. calyci insidens. Caps. 3-cocca, pedicellata.

\* *Fruticosa, aculeata.*

**1. antiquorum.** E. aculeata, subnuda, (plerumq.) triangular. articu-

articulata; ramis patentibus. *Syst. veg. ed. 14.*

*Black. tab. 339. Comm. hort. 1. tab. 12.*

Schadidacalli. *Hort. mal. 2. tab. 42.*

b. Tithymalus &c. *Comm. præl. tab. 3.*

In India h.

Caul. quandoq. 4-gon. & ultra. Rami horizontales, ex internodiis orti, (in variet. erecti). Angulis insident aculei 2. oppositi, semipollic. subulati. Super hos foliol. minimum, ovat-lanceol. deciduum. Articuli subrotund. obscure virid. radiis obliquis, obscurioribus. Stam. tantum 5.

b. Planta 4-5-pedal. lactescens.

2. *canariensis*. E. aculeata, nuda, sub 4-angul. aculeis geminatis. *Syst. veg. ed. 14. Black. tab. 340. f. 1.*

Tithymalus &c. *Comm. hort. 2. tab. 104. Pluk. -alm. tab. 320. f. 2.*

In Canariis h.

Caul. rectus, integerr. angulis compresso-planis. Spinæ aduncæ, atro-virent. Flos infra par aculeorum, sessilis, utrimq. bractea brevior ovata, concava, viridi. Cal. clausus, lacin. 5. connivent. purpur. Petal. 5. extra calyc. posita, sessil. carnosa, integra, obtusiss. obscure purpur.

3. *heptagona*. E. aculeata, nuda, 7-angular. spinis solitar. subulatis, floriferis. *Syst. veg. ed. 14. Boerh. Lugd. 1. tab. 25. Bradl. succ. 2. tab. 13.*

In Æthiopia h.

Caul. obtusus, hinc inde ramosus. Fol. quandoq. in apice aculei. Spinæ longæ, fuscae. Fl. concolores.

4. *mammillaris*. E. aculeata, nuda; angulis tuberculosis, spinis interstinctis. *Syst. veg. ed. 14.*

Tithymalus &c. *Comm. præl. tab. 9.*

In Æthiopia h.

Differt ab *heptagona*, angulis duplicatis, torulosis: spinæ solitar. inter singula tubercula, longitudinaliter digesta. Planta pedal. primum virid. dein cinerea, tandem fusca, ab imo ad summum sulcata, margine tuberculoso. Singula tubercula in folium aliquod breve, acuminat. supra planum, subtus convexum terminantur: post folior. casum spinæ exeunt acutiss. ex rubro--albicantes.



5. *cereiiformis*, E. aculeata, nuda, multangular. spinis solitar.  
subulatis. *Syst. veg. ed. 14. Burm. afr. tab. 9.*  
f. 3.

*Tithymalus* &c. *Pluk. alm. tab. 231. f. 1.*

*In Æthiopia* h.

Caul. semiped--dodrant. simpl. sine ramulis, &  
geniculis, glaber, glaucus, striis oblique ad  
angulos, ubi se mutuo tangunt, inclinantibus.  
Fl. coma densa. Fruct. viridis, apicibus coc-  
cineis.

6. *officinarum*, E. aculeata, nuda, multangul. aculeis geminatis,  
*Syst. veg. ed. 14. Black. tab. 340. f. 2. Isnar.*  
*Ad. 1720. tab. 10. Comm. hort. 1. tab. 19. f. 2.*

*In Æthiopia, & Africa calidiore* h.

Caul. numerosi, in orbem dispositi, stipati, e-  
recti, teretes, 18--vel pl. fulcis longitudinal.  
donati, atro--virescent. spinis brevibus. Rami  
exterior. ad exortum, duas spitham. longi,  
brachium crassi, sensim attenuati arcuantur.  
Folior. loco tuberculum acuminat. Petal. e  
viridi--lutescent.

7. *nereifolia*. E. aculeata; angulis oblique tuberculat. *Syst. veg.*  
*ed. 14. Seb. thes. 1. tab. 9. f. 1.*

*Tithymalus* &c. *Comm. præl. tab. 6. Brad. succ.*  
*tab. 28. Comm. hort. 1. tab. 13.*

*Ligniaria. Rumph. amb. 4. tab. 40.*

*Ela calli. Hort. mal. 2. tab. 43.*

*In India* h.

Caul. teretiuscul. 5-fariam tuberculis prominulis  
angulatus. In summo caule fol. spitham. 3. di-  
gitos transversos lata, ex angusto principio in  
apicem subrotund. dilatata, linguiform. sature  
virent. decidua, ad quorum basin duplex acu-  
leus; & ex ipsa basi fl. exeunt virides.

\*\* *Fruticosæ, inermes.*

*Caul. nec dichotom. nec umbelliferus.*

8. *Caput Me-* E. inermis, imbricata, tuberculis foliolo lineari  
*dusæ,* instructis. *Syst. veg. ed. 14.*

*Planta* &c. *Comm. hort. 1. tab. 17.*

*Tithymalus* &c. *Comm. præl. tab. 7. & 8.*

b. *Euphorbium* &c. *Isn. Ad. 1720. tab. 11. Breyn.*  
*prod. tab. 19.*

c. *Euphorbium* &c. *Burm. afr. tab. 7. f. 2.*

d. *Euphorbium* &c. *Burm. afr. tab. 10. f. 1.*

e. Euphorbium &c. *Burm. afr. tab. 8.*

f. Euphorbium &c. *Burm. afr. tab. 9. f. 1.*

*In Æthiopia* h.

Caul. tenuis, vel crassus, cum pl. ramis undique incumben-  
tibus, rotundus, tuberculis *Pini* fru-  
ctum imitantibus. Foliol. incondita per stolo-  
num partem superiorem oriuntur, semunc. lon-  
ga. *Distinctissima planta petal. palmatis.*

9. *mauritani-* E. inerm. seminuda, fruticosa, filiform. flaccida :  
*ca.* fol. alternis. *Syst. veg. ed. 14.*

*Tithymalus* &c. *Dill. elth. tab. 289. f. 373.*

*In Africæ maritimis* h.

Caul. 5-8-ped. debilis, raro ramosus, crassitie  
pennæ anserinæ, similis *Spartio iunceo*. Fol.  
summis ramulis alterna; sessil. lanceol. glauca,  
Fl. terminal. 6-7. & ultra, subpallidi.

10. *Tirucalli.* E. inerm. seminuda, fruticosa, filiform. erecta :  
ramis patulis, determinate confertis. *Syst. veg.*  
*ed. 14.*

*Tithymalus* &c. *Comm. hort. 1. tab. 14. Pluk.*  
*phyt. tab. f. 9.*

*Ossifraga* &c. *Rumph. amb. 7. tab. 29.*

*Tiru Calli.* *Hort. mal. 2. tab. 44.*

*In India* h.

Caul. 3-ped. & ultra, ramis ramosis, patentibus,  
nudis, acutis. Fol. in apice ramorum, pauca,  
fere petiol. lanceol.--linear. Fl. parvi, albidii.  
11. *Tithymalo-* E. inermis, fruticosa: fol. distiche alternis, ova-  
*ides.* tis. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. amer. tab. 42. ed.*  
*piç. tab. 38.*

*Tithymalus* &c. *Herm. par. tab. 234. Comm. hort.*  
*1. tab. 16. Pluk. alm. tab. 230. f. 2.*

b. *E. padifolia.*

*Tithymaloides* &c. *Dill. elth. tab. 288. f. 372.*

*In Curassao; at b. forte in India* h.

Fruticul. 6-ped. Fol. coriacea, 2-3-pollic. petiol.  
integerr. sature virent., primum tomentosa.  
Pedunc. in ramusculor. apice, breves, adgre-  
gati. Petal. calycifor. coccinea.

12. *heterophyl-* E. inermis: fol. petiolat. difformibus: ovat-lan-  
*la.* ceol. pandurifor. serratis. *Syst. veg. ed. 14.*

*Tithymalus* &c. *Plum. ic. tab. 251. f. 3. Pluk.*  
*alm. tab. 112. f. 6.*

*In Amer. calidiore* h.

Caul. orgyal. & ultra, erectus, herbaceus, ramis

longis, rectis. Fol. *Atriplicis*, glauca. Fl. pedunculari.

13. *Cotinifolia*. E. fol. oppositis, subcordat. petiol. emarginatis, integerr. caul. fruticoso. *Syst. veg. ed. 14.*

*Tithymalus* &c. *Comm. hort. 1. tab. 15. Seb. thes. 1. tab. 46. f. 4. Pluk. alm. tab. 230. f. 3.*

*In Curassao* h.

Caul. 3-ped. & ultra, geniculat. fuscus. Ramii laterales e summis geniculis. Fol. bina-terna, longe petiol. tenuis, læte virent. insigni costâ prædita, minoribus intermixtis, arcuatis. Fl. terminal. conferti, luteo--virescent.

14. *Ocymoides*. E. inermis, herbecea, ramosa: fol. subcordatis, integerr. petiolo brevioribus: fl. solitar. *Syst. veg. ed. 14.*

*In Campesha*.

Caul. erectus, ramosissimus.

\*\*\* *Dichotomæ (umbella 2-fid. aut nulla)*.

15. *origanoides*. E. dichotoma: fol. rotundo--ovat. obtusis, serrulatis, trinerviis: panicul. terminal. caulibus simplicibus. *Syst. veg. ed. 14.*

*In Insula Adscensionis* 4.

*Planta refert it Origanum, ut p<sup>o</sup> intuitu pro illa sumeretur.* Caul. spitham. teres, articulatus. Fol. sessil. glabra.

16. *hypericifolia*. E. dichotoma; fol. oval-oblong. serratis, glabris: corymb. terminalibus; ramis divaricatis. *Syst. veg. ed. 14.*

*Tithymalus* &c. *Comm. præl. tab. 60. Sloan. Jam. hist. 1. tab. 126.*

*In India* ☉.

*Facies Hyperici.* Caul. erectiuscul. Fol. uno latere serrata, altero integra. Floscul. albi.

17. *maculata*. E. dichotoma; fol. oval-oblong. pilosis, serratis: fl. axillar. solitar. ramis patulis. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. hort. 2. tab. 186.*

*Tithymalus* &c. *Pluk. alm. tab. 65. f. 8.*

*In Amer. septentr.* ☉.

Caul. supini, dichotomi: ramis alternis, patentibus, supra purpurascentibus. Fol. opposita, breviter petiol. obtusa, vel acuta, trinervia, subtus pilosa, serrata, altero latere maxima parte integerr. dum tenera macula fusca nota-



ta. Fl. axillar. solitar. parvi, calyce rufo.  
Fruct. lævis. *Simil. priori.*

18. *hirta*. E. dichotoma; fol. ovatis, acuminat. ferrulatis:  
pedunc. axillaribus, capitatis: caulibus pilosis.  
*Syst. veg. ed. 14.*

*Tithymalus &c. Burm. Zeyl. tab. 104.*

*Efula &c. Rumph. amb. 6. tab. 23. f. 2.*

*In India ☉.*

Caul. herbacei, ramis procumbentibus. Fol. opposita, sessil. scabra. Pedunc. axill. Fl. ex singula ala alterni, globulosi.

19. *pilulifera*. E. dichotoma; fol. oval-oblon. ferratis: pedunculis axillaribus, bicapitatis: caul. erecto. *Syst. veg. ed. 14.*

*Tithymalus &c. Burm. Zeyl. tab. 105. f. 1. Pet. gaz. tab. 80. f. 14.*

*In India ☉.*

Planta minor, & tenerior priore. Caul. semiped. simplex, villis rufescentibus. Fol. opposita. Pedunc. alterni. Fl. forma prioris.

20. *hyssopifolia*. E. dichotoma; fol. linearibus, subcrenatis: fl. terminalibus, fasciculat. caul. erecto. *Syst. veg. ed. 14.*

*In America.*

21. *thymifolia*. E. dichotoma; fol. oval-oblon. ferratis: capitul. axillar. glomeratis, subsessilibus: caulibus procumbentibus. *Syst. veg. ed. 14.*

*Tithymalus &c. Pluk. alm. tab. 113. Burm. Zeyl. tab. 105. f. 3.*

*In India ☉.*

Facies E. *chamaefices*. Caul. rubens, villosus. Fol. opposita, obliqua, ferrulata, villosa. Fl. umbellæ axillar. Petal. crenulata, rubentia.

22. *parviflora*. E. subdichotoma; fol. oblong. glabris, sæpe ferratis: fl. rarioribus: caule erectiuscul. alterne ramoso. *Syst. veg. ed. 14.*

*Tithymalus &c. Burm. Zeyl. tab. 105. f. 2.*

*In India ☉.*

Caul. glaber, ramis sæpe viridibus. Fol. opposita, sæpe macula fusca. Pedunc. axill. Fl. parvi. Cal. purpur. Petal. alba.

23. *canescens*. E. dichot. fol. subrotund. integris, pilosis: fl. axillar. solitar. caulibus procumbentibus. *Syst. veg. ed. 14.*

*In Hispania ☉.*

Valde adfinis sequenti, sed tota undique albo--villosa. Fol. obsolete emarginata, & obsolete crenata. *Infusum in siphilitide*.

24. *Chamaesyce*. E. dichot. fol. subrotund. crenulatis, glabris: fl. axillar. caulibus procumbentibus. *Syst. veg. ed. 14. Clus. hist. 2. p. 187.*

*In Europæ australis &c. aridis* ☉.

Caul. depressus, ramuscul. alternis. Fol. opposita, subcrenulata, emarginata, maculata, basi antice angustiore. Cal. rufus. Petal. alba, crenata.

25. *Peplis*. E. dichot. fol. femicordat. integerr. fl. axillar. solitar. caulibus procumbentibus. *Syst. veg. ed. 14. Clus. hist. 2. p. 187. Cam. epit. 970.*

*In Narbonæ &c. maritimis* ☉.

Caul. teres, plerumq. sicuti & fol. rubellus. Fol. crassiuscula, glauca. Umbel. o. Petal. subrotund. albido--flavicantia, quandoq. rubra. Caps. glabra.

26. *polygonifolia*. E. fol. oppositis, lanceolat. obtusis, integerr. fl. axillar. solitar. caulibus procumbentibus. *Syst. veg. ed. 14.*

*In Canada, Virginia* ☉.

Statura, & facies *E. Chamaesyces*, at fol. ad basin ab altero latere lobo prominent, sed æqualia. Caul. dichotom. divaricati.

27. *graminea*. E. dichot. fol. lanceol-elliptic. petiolat. integerrim. caul. erecto; peduncul. dichotom. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. ed. pict. tab. 139. Obs. 1. tab. 31.*

*In Carthagenæ gramineis udis*.

Planta herbac. 2-3-pollic. lactescens. Fol. pauca, sesquipollic. nitida. Pedunc. terminal. erecti. Petal. alba. Caps. glabra, nitida.

28. *Ipécacuanhæ*. E. dichotom. fol. lanceolat. integerr. pedunc. axill. 1-fl. folia æquantibus: caul. erecto. *Syst. veg. ed. 14.*

*In Virginia, Canada* ☿.

Rad. repens. Caul. spitham. Fol. plerumq. opposita, lævia. Cal. crassus. Petal. exigua, viridia, apicibus flavis.

29. *portulacoides*. E. dichotoma; fol. ovalibus, retusis, integerr. pedunc. axillar. 1--fl. folia æquantibus: caul. erecto. *Syst. veg. ed. 14.*

*Tithymalus &c. Few. peruv. tab. 2?*

*In Philadelphia* ☿.

Caul. pedal. Fol. magnitudine *Portulacæ*, obtusa, obsolete emarginata, glabra.

30. *myrtifolia*. E. dichot. fol. subrotund. integerr. emarginat. subtus incanis: fl. solitar. caul. erecto. *Syst. veg. ed. 14.*

In *Jamaica* ☉.

\*\*\* *Umbella 3--fida*.

31. *Peplus*. E. umbel. 3--fida; dichotoma; involucc. ovatis: fol. obovat. integerr. petiolat. *Syst. veg. ed. 14. Lob. ic. 362. Fuchsf. hist. 603. Dod. pempt. 375. Tabern. 597.*

*Peplio. Matth.*

In *Europæ cultis oleraceis* ☉.

Caul. decumbens, pedal. ramis paucis, subruber: Fol. sparsa, crassiuscul. pallide virent. glaberrima. Petal. lunata corniculis acutis, e viridi albicantia. Caps. glabra.

32. *falcata*. E. umbel. 3-4-fid. dichotoma; involucc. subcordat. mucronatis: fol. lanceolat. obtusiuscul. (vel acutis). *Syst. veg. ed. 14. Jacq. Austr. 2. tab. 121.*

*Pithyusa. Barr. ic. 751.*

In *Europa australi* ☉.

Caul. spitham. suberectus, ramis pl. sæpe ab ipsa rad. Fol. sessil. inordinatim alterna, mucronata, basi attenuata; caulina, & ramea obverse lanceol. glauco--virentia. Involuc. generale foliol. duplo--triplo latioribus foliis: involucc. ovat. numquam cordata, subrotunda. Petal. disco purpur. cum utroq. cornu virente. Caps. glabra.

In *Autumno diversa omnino adparet*.

33. *exigua*. E. umbel. 3--4--5--fid. dichotoma; involuccel. lanceol. fol. linearibus. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 592. Dalech. hist. 1656. Magn. monsp. pag. 259. cum icone.*

In *collibus apricis* ☉.

Planta minima, & humillima. Caul. ramosiss. brachiatus, e fusco--pallide virens. Fol. pallida, fusco--virent. glabra, tenera; in pratis obtusa, in collibus acuta: caulina vel rara, etiam 3--dent. vel conferta. Petal. argutis corniculis lunata, albedo--virescent.

34. *tuberosa*. E. umbel. 3--fid. involuc. 4--phyll. caul. nudo: fol. oblong. (quandocq.) emarginatis. *Syst. veg. ed. 14.*



*Tithymalus* &c. *Burb. cent. 2. tab. 23. Burm. afr. tab. 4.*

*In Ægypto, & Æthiopia h.*

*Radix tuberosa. Caul. vix semiped. ad cuius divaricationem foliol. 2. Fol. fescunc. longa, semi lata, petiol. obtusa. Petal. herbac.*

33. *divaricata. E. umbel. 3-4-fid. caul. fruticoso, trichotomo. Syst. veg. ed. 14. Jacq. misc. 3.*

*Habitat . . . . .*

*Fol. ad caulem cruciatis, lingulatis; sub fl. cordatis, longe acuminatis.*

\*\*\*\*\* *Umbel. 4--fid.*

36. *Lathyris. E. umbel. 4-fid. dichotoma: fol. oppositis, integerr. lanceol. Syst. veg. ed. 14. Black. tab. 123.*

*Math. pag. 1259. Cam. epit. 968. Fuchf. hist. 454.*

*In Europa, ad agrorum margines ♂.*

*Altitudo fere humana. Planta glauca. Caul. apice ramosus, e viridi rufescens. Fol. sessilia, in mollem spinulam desinentia. Involuc. omnia basi cordata. Petal. lunata, lutea. Caps. lævis.*

37. *terraccina. E. umbel. 4-fid. dichotoma; fol. alternis, lanceol. mucronatis, retusis. Syst. veg. ed. 14. Allion. Corf. tab. 3?*

*Tithymalus &c. Barr. ic. 833.*

*In Hispania ☉.*

*Caul. herbac. ultra semiped. teres. Fol. alterna, obliqua, lævia, digiti magnitudine, margine scabriusculo. Involuc. foliol. oblong-ovatis, obtusis, fol. latioribus, vix serratis. Involucc. ovata, basi truncata. Petal. flavescent. bis tridentata. Fruct. glabri. Ex inferior. alis folior. ramuli steriles.*

38. *diffusa. E. umbel. 4-5-fid. dichotoma: caul. diffusissimo: fol. cuneiformibus, integerr. alternis. Syst. veg. ed. 14. Jacq. Misc. 2. qui prioris speciei synonymon ad hanc refert.*

*Habitat . . . . .*

*Caul. erectus, semiped. basi rubens, ramosissim. foliis totus, sicuti rami, imbricatus. Fol. subsessil. truncata, cum exiguo intermedio mucrone, plana, nec 3-dent. aut retusa. Umbellæ radii pluries 2-fid. sive dichotomi. Involuc. foliol. similia foliis, tot quot radii. In-*

volucellorum foliol. opposita, sessil. oblong. obtusa cum acumine, integerr. in superioribus divisionibus latiora, breviora, & sæpe retusa, quandoq. 2-3-dent. Fl. solitar. in dichotomiis, exigui, sessil. Pet. 4. flava, acute lunata, quorum 2. duplo latiora. Caps. glabra, sicuti tota planta, quæ lactescens. *Planta adulta diffusissima, ut diversa videatur a iuniore.*

39. *Apios*. E. umbell. 4-fida; 2-fid. involucc. reniformibus; primis obcordat. *Syst. veg. ed. 14.*  
Tithymalus &c. *Clus. hist. 2. p. 190.*  
*In Creta.*

Radix tuberosa. Rami steriles fol. lineari-lanceol. obtusis: floriferi vero subrotundo-ovatis. Involuc. universale 4-phyll. foliol. subrotundis, vix acutis.

\*\*\*\*\* *Umbella 5-fida.*

40. *genistoides*. E. umbell. 5-fid. 2-fid. involucc. ovatis; fol. linearibus, erectis: caul. frutescente. *Syst. veg. ed. 14.*

*Ad cap. b. Spei h.*

Frutex erectus, ramis alternis, strictis, simpliciss. brevioribus, etiam apice floriferis. Fol. parva, (min. reliquis, nec maiora E. *exiguus*) confertiuscula, integerr. glabra. Umbel. terminal. sessiles. Involuc. 4-phyll. foliol. lanceolat. longitudine umbell. 5-fidæ. Involucc. 2-phyll. ovato-rhomb. Petal. lunata. Caps. glabra.

41. *spinosa*. E. umbel. sub 5-fid. simpl. involucc. ovat. primariis 3-phyll. fol. oblong. integerrim. caul. fruticoso. *Syst. veg. ed. 14.*

Tithymalus &c. *Herm. Lugd. tab. 601.*

*In Creta, Gallo provinciæ &c. montibus maritimis h.*

Caul. inferne spinosi. Fol. sparsa, lanceol-oval. Fl. sæpius solitar. Petal. rotunda. Caps. verrucosæ.

42. *epithymoides*. E. umbell. 5-fid. 2-fid. involucc. ovatis: fol. lanceol. obrutis, subtus villosis. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. Austr. 4. tab. 344.*

Tithymalus &c. *Col. ceph. 1. tab. 51.*

*In Italia, Austria 24.*

*Accedit ad E. dulcem, sed fol. magis margine scabra, & subius villosa. Fruct. hispidi, setis subulatis adpersi. Rad. lignosa. Caul. pl. erecti, vix pedalis. simplic. molliter, denique pilosi. Fol. sparsa, sessil. patentia. Caul. fol. & involuc. sæpe rubedine tinguntur; cæterum tota planta livide rubet.*

43. *dulcis.*

*E. umbel. 5-fid. 2-fid. involuc. subovatis: fol. lanceol. obtusis, integerrim. Syst. veg. ed. 14. Jacq. Austr. 3. tab. 213.*

*Tithymalus &c. Barr. rar. ic. 840.*

*Pithyusa &c. Lob. ic. 358.*

*Elula. Riv. tab. 117.*

*In Italix, Helvetix &c. umbrosis, & sylvestris 24.*

*Lac mite: exsiccatione nigra evadit. Rad. nodosa. Caul. semi-sesquiped. subdichotom. basi ruber. Fol. sessil. subtiliter serrata, oris cartilagineis, quandoq. villosa. Involuc. foliiform. Involucc. subtilissime serrata. Fl. sessil. Petal. ampla, rotundata, integra, lutea. Caps. muricata, rubra.*

44. *carniolica.*

*E. umbel. 5-fid. radiis nutantibus: involuc. involuc. & fol. lanceolat. Syst. veg. ed. 14. Jacq. Austr. 5. tab. 14.*

*Tithym. pilosus. Scop. Fl. Carn. 1. tab. 15.*

*Circa Idriam, & in agro Pedemontano 24.*

*Lac non acre. Caul. pl. spitham. herbac. simpl. rariter subpilosi, alii floriferi, alii steriles. Fol. sparsim alterna, breviter petiol. aut sessil. obverse lanceol. obtusiuscula, integerr. patentiss. mollia. Radii 2-fid. in dichotomia quoque pedunc. emittunt. Petal. subrot. integra, lutea. Caps. verrucosa.*

45. *Pithyusa.*

*E. umbel. 4-5-fid. 2-fid. involuc. elliptic. fol. lanceolat: infimis involutis, retrorsum imbricatis. Syst. veg. ed. 14. Dalech. hist. 1652. Matth.*

*Tithymalus &c. Bocc. Sic. tab. 5. Moris. hist. 3. f. 10. tab. 1. f. 25.*

*In arenosis Italia &c. 24.*

*Caul. suffrutesc. pedalis. villosus. Fol. sessil. integerr. Petal. hemisphærica, fusco-rubra. Caps. echinata, spinis mollibus, rubellis.*

46. *portlandica.*

*E. umbel. 5-fid. dichotoma; involuc. subcordatis, concavis: fol. lineari-lanceolat. acutis, glabris, patentibus. Syst. veg. ed. 14.*



*Tithymalus* &c. *Barr. ic.* 822. *Ray. Sinops.* 3. *tab.* 24. f. 6.

*In Anglia* h.

Caul. fruticulosi, palm. glabri, teretes, hyeme rubri. Fol. alterna, subsessilia, crassiuscul. glauca, basi subtus rubra. Ramuli laterales, ex alis inferior. steriles, demum excrecentes, & caulem inumbrantes. Umbel. terminal. patentes. Involuc. foliiform. Involucc. mucronata. Fl. sessil: lutei. Fruct. glabri, angulis muricati.

47. *saxatilis*. E. umbel. 5-fid. 2-fid. involuc. & involuc. cordatis, obtusis. Fol. oblong. glabris. *Syst. veg. ed.* 14. *Jacq. Austr.* 4. *tab.* 345.

*In saxis montosis.*

Planta glabra, acris. Caulicul. unus, alterve, procumb. ramulis pl. adscendentibus, rosula terminatis foliosa. Fol. sessil. obtusa, multa, integerr. quandoq. subemarginata, glauca; summa quandoq. oblong-cordata. Involuc. & involuc. cum flavedine glauca. Fl. sessil. Cal. flavescent. Petal. sordide lutea.

48. *Paralias*. E. umbel. sub 5-fid. 2-fid. involuc. cordato-reniformibus: fol. sursum imbricat. *Syst. veg. ed.* 14. *Jacq. hort.* 2. *tab.* 188.

*Tithymalus* &c. *Dod. pempt.* 370. f. 1. 2. *Camer. epit.* 962. *Tabern. p.* 591.

*In Europæ arena maritima* u.

Planta glauca. Caul. ped-cubital. toti foliosi, quandoq. rubri. Fol. *Lini*, numerosa, sessil. imbricata, angusta, aristata, crassa, glabra: caulina linear. Involucc. flavescent. Petal. integra, herbida. Caps. glabra. *Var. fol. magis congestis.*

49. *aleppica*. E. umbel. 5-fid. dichotoma; involuc. ovat-lanceol. mucronat. fol. inferior. setaceis (dense stipatis). *Syst. veg. ed.* 14.

*Tithymal. cyparissius Alp. exot. tab.* 64.

*In Creta, Aleppo* u.

Caul. pl. semiped. Fol. super. Myrtifol. Petal. lutea.

50. *pinca*. E. umbel. 5-fid. dichotoma: involuc. cordatis: fol. confertis, linearibus, acuminat. capsul. læviuscul. *Syst. veg. ed.* 14.

*Habitat in agro Nicænsi* &c. ☉.

51. *segetalis*. E. umbel. 5-fid. dichotoma: involucc. cordatis, acutis: fol. lineari-lanceol. super. latioribus. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. Austr. 5. tab. 450.*  
*Tithymalus &c. Moris. hist. 3. f. 10. tab. 2. f. 3.*  
*In Mauritania, Russia, Italia* ☉.  
 Planta glaberr. luteo-virid. Caul. subped. simpl. gracilis, ad basin rubescens. Fol. plura, sparsa, acuta, glabra, flaccida. Rami etiam floriferi infra umbellam. Petal. subrotund. obtusa, lunata, citrina. Fruct. lævis, angulis scabris.
52. *helioscopia*. E. umbel. 5-fid. 3-fid. dichotoma: involucc. obovatis: fol. cuneiform. serratis. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 725.*  
*Tithymalus &c. Fuchs. hist. 811. Cam. epit. 963. Dod. purg. 145.*  
*In Europæ cultis* ☉.  
 Caul. erectus, inferne brachiat. ramis oppositis, pilosus, pallide virens. Fol. pauca, sparsa, crassiusc. glabra, infer. petiol. super. sessil. Stipul. minimæ. Umbellæ radii bis trifidi, dichotomi. Involuc. foliiform. Petal. integra, albido-flavescent. Fruct. lævis.
53. *ferrata*. E. umbel. 5-fid. 3-fid. dichotoma; involucc. 2-phyll. reniform: fol. amplexicaul. cordatis, serratis. *Syst. veg. ed. 14. Mont. in Zann. tab. 171.*  
*Tithymalus &c. Clus. hist. 2. p. 189.*  
*In Italia, Hispania &c.* ☉ 24.  
 Caul. flexilis, rubens. Fol. primum longa, angusta, glauca.
54. *verrucofa*. E. umbel. 5-fid. sub 3-fid. 2-fid. involucc. ovatis: fol. lanceol. serratis, villosis: capsul. verrucosis. *Syst. veg. ed. 14.*  
*Tithymalus &c. Moris. hist. 3. f. 10. tab. 3. f. 3.*  
*In Italia, Helvetia &c.* ♂.  
 Lac acris. Planta cespitosa, flavescent. Caul. decumbent. cubital. fusco-virent. parum ramosi. Fol. ovata, ferrata, pallide virent. nervo albo; iuniora subhirsuta, adulta calvescentia. Radii numquam 3-fid. sed bis 2-fid. Petal. rotunda, integra, flava. Fruct. etiam villosus,
55. *corollata*. E. umbel. 5-fid. 3-fid. dichotom. involucc. foliisq. oblong. obtusis: petal. membranaceis. *Syst. veg. ed. 14.*  
*Tithymalus &c. Pluk. mant. tab. 446. f. 3.*  
*In Virginia, Canada.*

- Caul. erectus, rubens, in pl. ramulos regulariter dispositos ad cacumen divaricatus. Fol. caulina lanceol. obtusa. Petal. peltiform. tenuia, nivea.
56. *corallo-ides*. E. umbel. 5-fid. 3-fid. dichotom. involucc. ovatis: fol. lato-lanceol. capsul. lanatis. *Syst. veg. ed. 14.*  
*In Sicilia, Mauritania &c. 24.*  
 Caul. pl. ulnar. simpl. erecti. Fol. alterna, sessil. obtusiusc. integerr. subtus villosa, margine sæpe rufescente. Involuc. 5-phyll.
57. *pilosa*. E. umbel. 5--fid. 3--fid. 2-fid. involucc. ovatis: petal. integris: fol. lanceol. subpilosis, apice ferrulatis. *Syst. veg. ed. 14. Gmel. Sib. 2. tab. 93. Scop. Fl. Carn. tab. 21.*  
*Tithymalus &c. Barr. rar. tab. 885.*  
*In Sibiria, & in Comitatu Nicaensi ☉.*  
*Habitus omnino E. palustris, sed paulo maior.*  
*Lac mite. Plantæ color luteo-viridis.* Caul. 3-ped. pilosi. Fol. alterna, sessil. lato--lanceol. utrinq. vix manifeste pilosa, apice ferraturis vix conspicuis, oris pellucidis, & rubris. Umbel. cum umbellul. lateralibus ita coacervatæ, ut primaria difficulter eruatur. Fl. laxi. Fruct. verrucosi, pilis albis adspersi. Rami steriles ex alis folior. inferiorum; ut ex summis alis pedunc. umbelluliferi. Color. luteo-virid.
58. *orientalis*. E. umbel. 5-fid. 4-fid. dichot. involucc. subrotund. acutis: fol. lanceolat. *Syst. veg. ed. 14.*  
*In Oriente.*  
 Caul. purpur. Fol. Salicis. Flos magnus.
59. *platyphyllos*. E. umbel. 5--fid. 3--fid. dichot. involucc. carina pilosis: fol. lanceolat. ferratis: capsul. verrucosis. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. Austr. 4. tab. 376.*  
*Tithymalus &c. Moris. hist. 3. f. 10. tab. 3. f. 1.*  
*Fuchf. hist. 813. Bauh. hist. 3. p. 670.*  
*In Europæ agris ☉.*  
 Lac acerrimum. Tota planta foetet. Caul. erectus, 1--3--ped. glaber, fusco--virens. Fol. remota, alterna, patent. glabra, carina villis rarissimis; infer. subpetiol. versus apicem latiora; super. basi emarginata, & supra basin ad latera deflexa: tenella macula rubra donata. Umbella omnium specierum diffusior. Involuc. lanceolat. involucc. ferrulata; partialia ovat--obl. reliqua ovato--cordata. Fl. magni. Petal. suborbicul. integra, lutea, per ætatem rubescent. Ex alis folior. umbellul. 3-fid.



\*\*\*\*\* *Umbel. multifida*.

60. *Efula*. E. umbel. multifida; bifida: involucc. subcordat. petal. subbicornibus: ramis sterilibus: fol. uniformibus. *Syst. veg. ed. 14.*  
*Tithymalus &c. Tabern. ic. 541.*  
*Efula. Riv. tetr. 227. Dalech. hist. 1653. Dod. pempt. 374. Black. tab. 163. f. 1. 2.*  
*In Europa 24.*  
 Lac acerrimum. Caul. 2--ped. ramosi, glabri. Fol. multa, angusta, cis finem latebent. sine lanceol. obtuso, glabra. Undique rami flori-feri axill. Umbella laxa. Umbel. caul. laterales dichotomæ. Cal. sessilis. Petal. emarginata, flavescent. cornicul. brevibus; *qua nota differt a sequenti*. Fruct. glaber.
61. *gerardiana*. E. umbel. multifida, dichotoma: involucc. subrotundis: petal. integerr. ramis nullis: fol. uniform. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. Austr. 5. tab. 436.*  
*In pratis arenosis, & ficcis.*  
 Planta glabra, lacte acri. Caul. subped. subere-ctus, inferne purpur. Fol. per totum caulem, sessil. sublinear. acuta, plana, integerr. glabra, glauca. Umbel. convexula. Involucra breviora, latiora fol. caulinis. Involucc. late subrotunda, sessil. plana, viridi-flavescent. Fl. sessil. Petal. ex flavo--fulcescent. subrotund. integerr. Caps. glabra.
62. *Cyparissias*. E. umbel. multifida; dichotoma: involucc. orbiculat--cordat. ramis sterilibus: fol. setaceis: caulinis lanceolat. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. Austr. 5. tab. 435. Black. tab. 163. f. 3.*  
*Tithymalus &c. Dalech. hist. 1644. Tabern. hist. 990.*  
*Titimalo Cyparissio. Matth.*  
*In Europæ locis ficcis 24.*  
 Caul. ped. toti foliosi, ramis supra medium patulis. Fol. plurima, sparsa, obtusa, subtus carinata, integerr. quandoq. breviora, rotundiora. Tota umbel. flavescens. Primo vere umbel. similis E. *Efulæ*; at umbella marcescente ramuli laterales fol. angustiss. filiformi-planis excresecunt, *Pinum* referentes. Petal. lunata.

63. *myrsinites*. E. umbel. sub 7-8-fid. bifida. involucc. subovata. fol. spatulatis, patentibus, mucronat. carnosiss, margine scabris. *Syst. veg. ed. 14. Clus. hist. 2. pag. 189.*

*In Calabria, Monspeli &c. 24.*

Planta glauca. Caul. multi, ped. deflexi, virides, inferne a casu folior. cicatrizati. Fol. infer. conferta, super. alterna, coriacea, concava; summa reflexa. Involuc. foliol. 7-9. ovatis, acutis, tenuioribus: involucc. 2-phyll. latiora, acuta, concava. Cal. non ferratus. Peral. flava, bicornia, apicibus teretibus, nientia. Caps. glabra.

64. *palustris*. E. umbel. multifid. subtrifida, bifida: involucc. ovatis: fol. lanceol. ramis sterilibus. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 866.*

*Esula &c. Riv. terr. 230. Dalech. hist. 1653. Dod. purg. pag. 158.*

*Tithymalus &c. Moris. hist. 3. f. 10. tab. 2. f. 1. In Europa ♂.*

Caul. 3-ped. ramosus, subruher. Fol. conferta, obtusa, ferrata, dilute virid. Rami axill. foliosi, florigeri. Petal. obtusa, integra, flava. Caps. verrucosa.

65. *hyberna*. E. umbella 6-fid. dichotoma: involucc. ovalibus: fol. integerr. ramis nullis: caps. verrucosis. *Syst. veg. ed. 14.*

*Tithymalus &c. Dill. elth. tab. 290. f. 374. Tabern. hist. 987.*

*In Austria, Sibiria &c. 24.*

Caul. fusco-virens: Fol. pallide virent. Involuc. viridi-fusca. Fl. ma. flavi.

66. *dendroides*. E. umbel. multifid. dichotoma: involucc. subcordatis: primariis triphyllis: caul. arboreo. *Syst. veg. ed. 14.*

*Tithymalus &c. Cam. epit. 965.*

*In Italia, Creta, insulis Stæchadum &c.*

Fol. sparsa, lanceol. angusta. Caps. glabra.

67. *amygdaloides*. E. umbel. multifid. dichotoma: involucc. perfoliat. orbiculat. fol. obtusis. *Syst. veg. ed. 14.*

*In Gallia, Germania, Pedemontio &c. ☉.*

*Similis sequenti.* Caul. herbaceus, fusco-virens. Fol. alterna, remota, tenuia (non coriacea, rigida.) lanuginosa, sordide virent. sempervirent. Umbellæ etiam laterales. Fl. ma. flavi.

68. *sylvatica*. E. umbel. 5-fid. bifida: involucc. perfoliat. subcordat. fol. lanceol. integerrim. *Syst. veg. ed.* 14. *Jacq. Austr. 4. tab.* 375.

*Tithymalus* &c. *Bauh. hist. 3. p.* 671. *Col. ecphr.* 2. *tab.* 57. *Morif. hist. 3. f.* 10. *tab.* 1. *f.* 3. *In Europa australi* h.

Caul. fruticosi, proliferi, crassi, villosi, rubri, cicatricibus sparsis. Fol. radical. in orbem disposita, superne latiora, mollia, apice tenuiter ferrulato, pilosa, sæpe purpurascens. perennia. Petala lunata, erosa, quandoq. virent. sed communiter purpur. apice ochroleuco.

69. *characias*. E. umbel. multifid. bifida: involucc. perfoliat. emarginatis: fol. integerr. caule frutescente. *Syst. veg. ed.* 14.

*Tithymalus* &c. 1. *Clus. hist. 2. p.* 188. *In Europa* u.

*Nimis adfinis E. sylvaticæ, & amygdaloidi. Var. caul. pubescente, & lævi: fol. vix manifeste pubescentibus, & reflexis, glabris: involucc. primis 2-part. reliquis perfoliatis: petalis integris, vel lunatis: fl. parvis: petal. rubris.*

*seguieri*.

E. glabra; umbella multifido-dichotoma; involuclis bifoliis, subcordatis: petalis bicornibus, ramis sterilibus: fol. lanceolat. acuminat. capsulis glabris.

*Tithymalus* &c. *Scop. Fl. Carn. tab.* 20.

*Tithymalus fol. brevibus aculeatis. Segu. ver. tab.* 3. *f.* 1.

*In Carniola, Pedemontio &c. passim in alveis fluminum* u.

*Non confundatur cum E. Pithyusa. Fol. lanceol. acumin. integerr: subtus glauca, non villosa. Umbel. laterales ad apicem caulis ita coacervatæ, & cum primaria confusæ sunt, ut ea difficulter discernatur. Radii semiped. longi, angulati, bisbifidi. Involucc. integerr. bifolia. Petal. 4. lunata, rubra.*

*linearis*.

E. dichotoma: fol. oppositis, linear. integerr. peduncul. solitar. *Retz. Obs. fasc.* 3.

*In Insula s. Crux dicta.*

Caul. teres, articulatus, nudus. Fol. biuncial. acumine parvo. Petal. integra. Caps. lævis videtur.

cunei-



- cuneiformis*. E. umbell. 4-fid. 2. fid. fol. cuneiformi-linear. 3-dent. *Allion. Fl. Cors. tab. 3.*  
*In Corsica.*
- articulata*. E. fol. linear. integerr. pedunc. 1-fl. *Burm. in Plum. am. tab. 251. f. 2.*  
*In America.*
- bombensis*. E. dichotoma: fol. oppositis, oblong. obtusis cum acumine, integerr. fl. axillar. solitar. caul. prostrato. *Jacq. amer. p. 151.*  
*In arenosis maritimis Carthagenæ ☉.*  
 Caul. herbac. ramosus; pedal. Fol. quadrilinear. crassiuscul. è rubro-virent. Fl. axillar. & in caulium dichotomia, solitar.
- obliterata*. E. umbell. trifida; fol. oblong. ferratis, altera baseos parte obliteratis. *Jacq. amer. p. 151.*  
*In arenosis maritim. Carthagenæ.*  
 Caul. hirsuti, lactescentes. Fol. apice attenuata.
- Belgradica*. E. caul. erecto: ramis alternis, dichotomis: fol. oppositis, oblong-acutis, ferrulatis; superior. semicircularibus, sessilibus: caps. axill. solitar. tuberculat. *Forsk. Æg.*  
*Ad pagum Belgradi prope Constantinopolim.*
- dichotoma*. E. fol. oppositis, sessil. lanceol. integris. *Forsk. Æg.*  
*In Ægypto.*  
 Caul. suberectus, spitham. dichotomus. Fol. parva, ovat-lanceol. quædam inferiora ma: margine denticulato, lata. Fl. axillar. solitar. sessiles, pedicello germinis violaceo, folior. longitudine. Caps. glabra.
- retusa*. E. umbel. 3-fid. dichotoma; involuc. lanceolat. fol. linear. retusis; denticulis inferior. minoribus. *Forsk. Æg. tab. 13.*  
*In Arabia 24.*  
 Caul. pl. erecti, spitham. annui, ramis nullis, præter umbellas; glabri, punctis rubris sæpe adpersi. Fol. alterna; summa pollic. infer. gradatim min. retusa cum acumine, ad apicem denticulato-ferrata; super. margine rubro, ad basin parum dilatata, dentata. Involuc. folis maius. Petal. 4-5. bicornia. Caps. glabra.
- obliquata*. E. involucc. lato-subcordat. obliquis. *Forsk. Æg.*  
*In Ægypto.*  
 Caul. spitham. Fol. linear. cuneiform. retusa,

- sparsa, integra, subemarginata. Umbell. dichotoma, 3-fid.
- fruticosa*, E. *Forsk. Æg.*  
In *Arabia* h.
- aculeata*, Sub-pedal, aculeata, multangula, crassitie 2-pollic.  
E. caul. aculeato, subtrigono; articulis subrotund. *Forsk. Æg.*  
In *Arabia*.
- granulata*, E. fol. oppositis, obovatis, sessilib. integerr.  
fl. axill. solitar. *Forsk. Æg.*  
In *Arabia*.
- triaculeata*, Planta parva. Caul. procumbent. dichotomi,  
villosi. Fol. breviss. obliqua subciliata. Fl. parvi, rubent. Caps. villosa.  
E. caul. tereti, 7-fusato: fl. ternis, sessilib. ex ala aculeorum. *Forsk. Æg.*  
In *Arabia* h.
- rosea*, Frutex diffusus, cubital. ramosus. Aculei terni,  
exterior. breviss. recurvi; intermedius pollic. subulatus, parenti-recurvus. Stam. 6. Pistil. non egreditur ad latus fl. ut in *Tithymalis*.  
E. dichotoma: fol. obovatis, basi obliquis, apice denticulat. caul. diffuso, depresso. *Retz. obs. fasc. 4.*  
In *India* or. arena mobili.
- peploides*, Rad. spitham. subtortuosa. Caul. in orbem diffusi,  
articulati. Fol. ad genicula opposita, breviter petiol. Fl. terminal. congesti; petala pulchre rosea. Caps. glabra.  
E. cymosa: fol. oblique cordat. acuminat. integerr. fl. axillar. solitariis: germin. ovatis, acutis. *Gou. fl. p. 174. n. 3. All. Fl. Ped.*  
*Peplis minor. Bauh. hist. 3. p. 670. Tabern. ic. 597.*  
In *Sabaudia*, ad sepes ☉.
- Nicænsis*, Dichotoma.  
E. glabra, caul. subsimplici: umbella (plerumq.) 5-fida, 2-fida: fol. ovatis: capsul. lævibus, non sulcatis. *All. Fl. Ped. tab. 69. f. 1.*  
In Comitatu *Nicænsi* u.
- Caul. pl. sublignosi, virides, etiam subrubentes, simpl. aut prope umbellam ramosi, sed rami sine involuc. universali. Fol. alterna, fere spatulata, apice subreflexo, ut emarginata videantur, firma, crassula, horizontalia. Umbellæ radii bis dichotomi, extrema divisione

biflora; in dichotomiæ axilla flos unus; in extremis ramis duo fl., luteus unus, alter viridis. Involucri universalis fol. ovata, spinulosa: partialium cordata, seu potius semicircularia. Fructus magni. Lac copiosum fundit.

*Taurinensis*, E. umbella 5-fid. 2-fida: caule ramoso: fol. lineari-lanceol. involucro universali 4-phylo, propendente. *All. Fl. Ped. tab. 83. f. 2.*

*In Pedemontio* ☉,

*Accedit ad E. segetalem, sed longe ramosior: fol. pallidius virentia, substantiæ minus firmæ. Involuc. universalis fol. latiora, & propendent. Tota planta ramis, & involucri radiis divaricata.*

*In E. segetali fol. agustiora, crassiora, confertiora, reflexa, subglauca. Umbella 5-fida, aut 6. radiorum.*

*cyathophora*. E. fol. iunioribus lyratis, sub fl. lanceolat. maculisque binis, coccinea una, alia alba notatis. *Scop. Delic. Insub. fasc. 3. tab. 3.*

*Habitat* . . . ☉ h.

*An E. heterophylla* Lin? *sed fol. non serrata.*

Caul. erectus, lesquiped. teres, substriatus, scaber, pubescens, ramosus, quandoq. fruticosus. Rami simplic. & subramosi. Fol. primi anni ima ovata; superiora lyrata, oblonga, sursum lateſcentia, ad basin in angulum utrimq. ducta. Alterius anni propagines fol. gerunt elliptica, minime sinuata. Foliol. sub fl. maculata. Pedunc. terminal. fasciculati, sæpius 3-fl. Cal. laciniato-dent. Caps. 3-locul. Sem. fusco-nigra.

*fimbriata*. E. fruticulosa, angulata; angulis aculeat. ad basin subnovenis: fl. terminalibus, fimbriatis, bracteatis. *Scop. Delic. Insub. fasc. 3. tab. 4.*

*In Aleppo* h.

Planta semiped. aphylla, subarticulata, carnosâ, ramosa, ramis obtusis, basi adtenuatis, heptagonis. Ex angulis aculei, dentibus similes, foliolo acuto, concavo, rufo terminati. Fl. dentibus interpositi, peduncul. 1-fl. ex incrassatis ramorum apicibus prodeuntes. Cal. luteo-virid. margine ciliatus, aut fimbriatus. Scutâ quina, rotunda, obtusa, crassa, patula, calyci insidentia.



735. VISNEA. Cal. 5-phyll. inferus. Cor. 5-pet. Stigm. 3.  
Nux 2-3-locul. seminfera.

1. *Mocanera*. V. Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.

*In sylvis montosis insularum Canariensium* H.

Frutex parvus. Caul. teres, subverrucosus. Fol. alterna, breviter petiol. erecta, elliptica, glaberr. venosa, ferrata, consistentia Lauri. Pedunc. axill. solitar. nudi, nutantes, 1-fl. Fl. parvi, lutei.

736. TACCA. *Leontices* sp. monente Vahl.

1. *pinnatifida*. T. Syst. veg. ed. 14. Forst. gen.

= *littoria*. Rumph. am. 5. tab. 114.

= *Sativa* l. c. tab. 112.

737. PALLA-*Ejst Calligonum polygonoides*, monente Vahl. Pall.  
SIA. ic. vol. 2. tab. 5.

## P E N T A G Y N I A .

738. GLINUS. Cal. 5-phyll. Cor. o. Nectaria fetis 2-fid.  
Capf. 5-angul. 5-locul. 5-valv. polysperm.

1. *lotoides*. G. caul. piloso: fol. obovatis. Syst. veg. ed. 14.  
*Burm. Ind. tab. 36. f. 2.*

*Aline &c. Bocc. Sic. tab. 11.*

*Portulaca &c. Barr. rar. tab. 326.*

*Ab Hispania in Asiam ad fossas, locis inundatis*  
⊙.

Caul. procumb. dichotomus, ad dichotomiam incrassatus. Fol. vix pollic. subquinata, alterna, petiolat. inæqual. villoso-hispida, integerr. albescent. Pedunc. axill. 1-fl. Cal. hispidus, luteus.

*Planta vulneraria.*

2. *diæamnoi-* G. caul. rigoso: fol. orbiculat. tomentosis. Syst.  
*des.* veg. ed. 14.

*Aline &c. Pluk. amalt. tab. 356. f. 6.*

*In India* H.

*setiflorus*. G. caulibus diffusis: fl. axillar. subsefil. capillatis. Forsk. Æg.

*In Arabia.*

Caul. surgentes, villoso-scabri, geniculis incrass.

fatis. Fol. verticillata, suborbicul. undulata. Petal. numerosa, linear. flava, apice in 3-4. fetas diviso.

*Ononides*. G. caul. glabro: fol. obovatis: verticillis numerosis, sessil. *Burm. Fl. Ind. tab. 36. f. 2.*

*In India.*

Est minor G. *lotoide*, & habitu differenti.

## DODECAGYNIA.

739. SEM-  
PERVIVUM. Cal. segmenta quot petala. Petal. 9-12. lanceol. acuta. Caps. tot, quot petal. polysperm. *Sedo ad fine. Fol. succulenta.*

1. *arboreum*. S. caul. arborescente, ramoso, lævi. *Syst. veg. ed. 14.*

*Sedum maius* &c. *Clus. hist. 2. p. 58.*

*In Lusitania, Creta &c. h.*

Caul. 2-cubit. subfuscus, sæpe radices filiform. emittens. Fol. in ramorum apice in orbem disposita, sessil. conferta, succulenta, obtusa, mucronata, circumferrata. Thyrsus terminal. racemis bipart. Racemi brachia ramosa, simplicia, recurva. Fl. alterni, oppositifol. pedicell. flaviss. Cal. 10-part. Petal. 10. flavo-pallescent. Stam. 20. Pistil. 10.

2. *canariense*. S. caule folior. ruderibus lacero: fol. retusis. *Syst. veg. ed. 14.*

*Sedum* &c. *Comm. hort. 2. tab. 95. Pluk. alm. tab. 314. f. 1.*

*In Canariis h.*

Caul. brevis, 6-unc. simpl. Fol. magna, radical. in orbem expansa, cochlearifor. mucrone parvo, subrotundo, rubro-virid. hirsutie argentea utrimq. obducta.

3. *rectorum*. S. fol. ciliatis: propaginibus patentibus. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 601. Black. tab. 366. -- Dod. pempt. 127.*

Sempervivo maggiore. *Matth.*

*In Europæ sedis, muris, & rupibus 24.*

Caul. cubital. foliosus, apice ramosus, ramis patulis, hirtus. Fol. radical. in orbem dispo-

sita, lingulata, acumin. succulenta, crassa; sæpe rubra. Fl. unilateral. Petal. intus purpur. extus subvirid. hirsuta.

4. *globiferum*. S. fol. ciliatis: propaginibus globosis. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. Austr. 5. tab. 42.*

*Sedum* &c. *Morisi hist. 3. f. 12. tab. 7. f. 18.*  
*In Austria, Pedemontii montosis 24.*

Caul. spitham. hirsutus, & pene hirtus, paniculat. 2-3-4. ramis florigeris. Fol. ovat--lanc. carnosa, e viridi glaucescent. ad basin rubentia. Fol. caulina ovat--lanceol. sessilia, supra planiuscula, subtus convexa, & villosa. Rosulæ multæ, patulæ, in adulta planta centro connivente; nonnullæ petiolat. e longis flagellis. Fl. grandes. Cal. hirsutus, hemisphær. Petal. 12--18. lineari--lanc. integra, calyc. triplo excedentia, patentiss. flava, subtus villosa, per oras villoso--ciliata, basi subrubent.

5. *arachnoideum*. S. fol. pilis intertextis: propaginibus globosis. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. Austr. 5. tab. 42. Knorr. del. 2. tab. S. 8. Col. ecphr. 1. tab. 291.*

*In alpinis Italia, Helvetiæ &c. 24.*

Rad. crassa, napiform. Caul. spitham. simpl. pubescens. Fol. oblonga, supra plana, subtus convexa: caulina alterna, sessil. lanceol. extrorsum obsolete rufescent. Fol. rosulæ contractæ, tela aranea intertextæ. Petal. 9. acumin. rubra, linea longitudinali saturiore. *Var. S. montani. Haller.*

6. *hirtum*. S. caule; petalorumq. apicibus hirtis. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. Austr. tab. 12. Mont. in Zann. tab. 153.*

*Cotyledon* &c. *Clus. 2. p. 63.*

*In Helvetia &c. 24.*

Vulgari minus. Caul. sub 6-unc. superne divisus in ramos paucos, patentes; hirsutus. Fol. ovat--lanc. acuta, carnosa, ciliis albis; radical. glabriora, caulina villosa. Fol. rosulæ multæ. Fl. sursum spectantes. Petal. subhirsuta, rosea; vel ochroleuca.

7. *montanum*. S. fol. integerr. propaginibus patulis. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. Austr. 5. tab. 41.*

*Sedum* &c. *Besl. cyst. vern. 6. tab. 8. f. 2.*

*In rupibus Helvetiæ &c. 24.*

*Differt ab Arachnoideo petal. longis, angustis,*



*villosis, semper aliter coloratis; ac defectu telæ aruncæ. Folior. fasciculi expansi, pilis destituti. Petal. patentiss. lineari--lanceol. villosa, rosea.*

8. *sediforme. S. fol. sparsis; inferior. teretibus: superior. depressis. Syst. veg. ed. 14. Jacq. hort. tab. 81. Habitat in Sabaudia ☉.*

*Planta glaberrima. Caul. 2-ped. erecti, ramosi. Fol. oblong. acumin. crassa, carnosæ, glauca, quandoq. rubent. in ramis junioribus confertim nascentia; in florentibus magis diffusa. Cymæ terminal. densæ. Petal. albida, seu ochroleuca.*

## NOVA GENERA.

### MONOGYNIA.

#### CULHAMIA.

*Perian. Cal. 6.*

*Cor. monop. campanul. semipollic. 5--fid. lacin. reflexis, lanceol.*

*Stam. Filam. nulla. Anth. 15. didymæ, flavæ, subglobosæ, ternatim positæ.*

*Pistil. Germ. hemisphæric. obsolete 5--lobum, villosum; pedicello elevatum. Styl. subulat. incurvus, villosus. Stigm. capitatum, flavicans.*

*Peric. Caps. 5. oblon. acumin. sesquipoll. patent. basi connatæ, supra sulco exaratae, villosæ, 1-locul. prorsus inanes, & veluti folliculatae.*

*Sem. ad utrumq. rimæ latus 5.*

1. *Culhamia. C. Forsk. Æg.*

*In Arabia h.*

*Arb. magna. Fol. in apice ramorum conferta; sparsa, 4-pollic. petiol. cordato--triloba, lobis ovatis, subrepanda, patent. glabra. Pedunc. axillar. racemoso--compositi, bracteati. Cor. ferruginea, lacin. virid.*

## T O P O B E A .

*Cal.* Perian. duplex ; exterius 1--phyll. 4--part. lacin. subrotun. acutis ; interius campanul. limbo expanso , 6 cuspidato .

*Cor.* Petal. 6. inæqual. ovata , subrotun. calyc. fauci inserta .

*Stam.* Filam. 12. incurva , plana , connivent. in tubum infra petal. disco circulari prominula , inserta . Anth. oblon. acutæ , primum incurvæ , dein erectæ , 2--locul.

*Pistil.* Germ. ovatum . Styl. longus , carnosus , ruber , versus petal. inferius declinatus . Stigm. capitatum , 6--sulcat.

*Peric.* Bacca spongiosa , 6--locul. fundo calyc. carnosio involuta : limbo cal. deciduo .

*Sem.* plurima , minutiss. in pulpa molli , edulii nidulantia .

*A. parasitica.* T. Aubl. Guian. tab. 189.

In Guiana b .

Frutex sarmentis longis , propendent. ramosis .

Fol. opposita , petiol. subcordata , acuta , serrulata , ad basin villosa , 5--nervia , supra virentia , subrus subrubentia . Fl. pl. axillar. penduncul. Cor. incarnata . Bacca rubra .

## A R I S T O T E L I A .

*Cal.* Perian. 1--phyllum , 5--part. concavo--erectum , villosum , lacin. lanceol. acutis , appressis .

*Cor.* Petal. 5. obverse ovata , obsolete repando--truncata , concava , latere subimbricata , erecta , sessil. receptaculo inserta , calyce vix longiora .

*Stam.* Filam. 15. Anth. lineares , 2--locul. luteolæ .

*Pistil.* Germ. superum , subrotun. 3--gonum . Styl. filiform. semitrifid. apice reflexus . Stigm. 3. simplic.

*Peric.* Bacca subglobosa , obtuse 3--gona , 3--locul. magnitudine Pisi , atropurpur. demum nigra .

*Sem.* 2. vel solitar. in singulo loculo , dura .

*Charact. essentialis.*

Cal. 5--part. Cor. 5--petal. Stam. 15. Germen superum . Stigm. 3. Bacca 3--locul.

Macqui .

A. Herit. Stirp. nov. fasc. 2. tab. 16.

Macqui Cilenfibus.

*In Chile* ꝑ.

Frutex parvus. Caul. erectus, 1-2-cubit. griseus, tubercul. pallidioribus adſperſus, brachiatus, ramis ramuloſis. Gemmæ oblongæ, acutæ, adpreſſæ, pubeſcentes. Fol. oppoſita, petiol. oblongo--ovata, acumin. ſerrata, patent. vel ſubdependent. acumine ſubintegro, inferne trinervia, venoſa, coſta ſubtus prominente rubicunda, ſupra vix prominula; glabra, ſicca, viridia, plana, 3. poll. longa, 15-18. lin. lata. Juniora nitida, læte virid. ſubviſcoſa. Petioli patentiff. rubelli, foliis ter breviores. Stipul. binæ, minutiff. dein nultæ. Pedunc. terminal. & axillar. ex ſummis alis, racemoſi, nutantes, patuli, pubeſcentes, bractæati, 8-9. lin. longi. Fl. globoſi, herbac. pedicellati, cernui, 1--2 lin. longi, & lati. Bract. minutæ, anguſtiſſ. villoſæ.





# CLASSIS XII.

## ICOSANDRIA.



### MONOGYNIA.

740. *Cañus*. Cal. superus, 1--phyll. tubulat. imbricatus. Cor. multiplex: petal. conniventia inter. ma. Stam. plurima. Bacca oblon. umbilicata, 1--locul. polysper. Planta carnosâ, succulenta.
743. *Eugenia*. Cal. superus, 4--part. Petal. 4. oblon. Drupa 4-angul. 1--sperm. Nux subrotun.
741. *Philadelphus*. Cal. superus, 4-5--part. Petal. 4--5. magna patentia. Caps. 4--5--locul. polysper. cal. per medium cincta, carnosâ, membranacea.
742. *Psidium*. Cal. superus, 5-fid. segment. ovatis. Petal. 5. calyci inserta, patentia, concava. Bacca 1--locul. polysper.
744. *Myrtus*. Cal. superus, 4-5-fid. Petal. sub 5. ovata. Bacca Olivæform. coronata, umbilicata, 2-3--locul.
745. *Punica*. Cal. superus, campanulat. 5-fid. coloratus. Petal. 5. erecto-patula. Pomum magnum, 10--locul. polysperm. segmentis cal. coronatum.
746. *Amygdalus*. Cal. inferus, semi-5-fid. Petal. 5. oblon. villosa. Drupa nuce compressa, poris perforata, in quo differt a *Pruno*.
747. *Prunus*. Cal. inferus, campanulat. 5-fid. Petal. 5. subrotun. Drupa rotunda, vel oblon. nucleo integro, futuris prominulis.
749. *Chrysobalanus*. Cal. inferus, 5-fid. Petal. 5. patent. plana. Drupæ nucl. plerumq. 5-sulc. 5-valv.
748. *Plinia*. Cal. inferus, parvus, 4--5--part. planus. Petal. 4--5. ovata, patent. Drupa supera, magna, globosa, fulcata.
750. *Sonneratia*. Est *Rhizophora calceolaris*, monente Vahl.

### DIGYNIA.

751. *Cratægeus*. Cal. superus, 5-fid. concavus. Petal. 5. concava. Bacca infera, subrotun. umbilic. 2--sperm.

TRIGYNIA.

752. *Sorbus*. Cal. superus, 5-fid. Petal. 5. concava, patent.  
Bacca infera, globosa, umbilic. 3-sperm.  
753. *Sesuvium*. Cal. inferus, 5--part. coloratus. Cor. o. Capsf.  
ovat. circumscissa, 3--locul. polysper. Sem.  
margine rostello aucta.

PENTAGYNIA.

756. *Tetragonia*. Cal. superus, 4--5--part. coloratus, persistens,  
segment. ovatis, revolutis. Cor. o. Drupa  
infera, 4-5-gona, 4-5-locul.  
754. *Mespilus*. Cal. superus, 5-fid. Petal. 5. subrotun. concava.  
Bacca infera, subrotun. umbilic. Sem. 5. ossea.  
755. *Pyrus*. Cal. superus, 5-fid. Petal. 5. subrotunda. Pomum  
inferum, umbilicat. 5-locul. polysper.  
757. *Mesembrianthemum*. Cal. superus, 4-5-fid. Flos stellatus. Petal. nu-  
merosa, linearia. Capsf. infera, carnosae, po-  
lylsper. Fol. carnosae, succulenta. Pleræq. sp.  
pentagynæ sunt.  
758. *Aizoon*. Cal. inferus, conicus, 5--part. lacin. lanceol--  
acutis. Cor. o. Capsf. supera, 5-locul. 5-valv.  
polysper.  
*Essentia generis sita est in staminibus per phalan-  
ges sinibus calyc. insertis; tribus communiter  
ubique adproximatis.*  
759. *Spiræa*. Cal. 5-fid. inferus. Petal. æqualia, 5. patentia,  
plana. Capsf. pl. congestæ, polyspermæ, 2-valv.

POLYGYNIA.

760. *Rosa*. Cal. urceolat. collo coarctatus, 5-fid. carnosus,  
semipinnat. aut ab uno tantum latere appen-  
diculatus. Petal. 5. Fructus pulposo-coriaceus,  
umbilicat. coloratus, 1-locul. Sem. plura, his-  
pida, calyc. interiori lateri adfixa. Fol. im-  
pari-pinnata.  
761. *Rubus*. Cal. 5-fid. expansus, persistens. Petal. 5. ere-  
ctiuscul. rotundata. Stam. breviora. Bacca con-  
stans acinis succulentis, 1-sper. rotundatis.  
764. *Tormentilla*. Cal. 8-fid. laciniis alternis minoribus. Petal. 4.  
cordata, patentia, plana. Sem. 8. nuda, sub-  
rotun. receptac. parvo, exsucco adfixa.

766. *Dryas*. Cal. 5--10--fid. expansus, lacin. æqual. Petal. 5--8. expansa, emarginata. Sem. plurima, caudata, arista lanata.
762. *Fragaria*. Cal. 10--fid. expansus. Petal. 5. subovata, expansa. Sem. plurima supra receptacul. baccatum, ovatum, decidua.
763. *Potentilla*. Cal. 10--fid. lacin. alterne minoribus, deflexis. Petal. 5. Sem. plurima, nuda, subrotund. receptac. parvo, exsucco adfixa.
765. *Geum*. Cal. 8-10--fid. Petal. sub 5. Sem. plurima, arista caudata.
767. *Comarum*. Cal. magnus, 10--fid. ruber, lacin. alternis minor. Petal. 5. calyce triplo min. Receptac. feminum ovat. spongiosum, carnosum, persistens.
768. *Calycanthus*. Cal. 1--phyll. urceolat. corollinus, squarrosus, coloratus. Cor. o. Styli plurimi, stigmat glanduloso. Sem. plurima, caudata, intra calyc. succulentum.

\* *Spiræa Filipendula*.

*Ulmaria*.

\* *Phytolacca icosandra*.

## MONOGYNIA.

740. CACTUS. **C**AL. superus, 1--phyll. tubulat. imbricatus. Petal. multa, conniventia; interiora maiora. Stam. plurima. Stigma capitatum, multifidum. Bacca oblong. umbilicata, 1--locul. polysperm. Planta carnosæ, succulenta.

\* *Echinomelocacti*, subrotundi.

1. *mamillaris*. C. subrotund. tectus tubercul. ovariis, barbatis. Syst. veg. ed. 14. Herm. par. tab. 136. Ficoides &c. Comm. hort. 1. tab. 55. Bradl. Succ. 3. tab. 19. Pluk. alm. tab. 29. f. 1. In Amer. calidioris rupibus h. Conf. *Melocactus minimus* &c. Plum. ic. 201. f. 1. Ficoides &c. Pluk. alm. tab. 29. f. 2. Laefcit ut *Euphorbia*.



Planta semiped. caudice, & fol. quasi orbata; primum sphærica, dein teres, super. parte plana, intus pl. longis tubercul. obsita; substantia intus col. herbido, pallente. Spinæ stelliform. in apice, e quarum interstitiis fl. oriuntur albido--virescent. Fruct. per maturitatem rubri. Sem. nigra.

2. *Melocactus*. C. subrotund. 14-15-angular. *Syst. veg. ed. 14.*  
Echino--melocactus. *Clus. exot. tab. 92. Bradl.*  
*Succ. 4. tab. 32.*

In *Amer. calidiore* h.

Figura Echinum refert. In apice gerit corpus discoideum, convexum, villosum, cum spinis aurantiaci col. e quo fl. prodeunt. Fruct. col. *Mali Persici*.

*Var. 14--angul. spinis longis, recurvis albidis.*

==== *15--angul. spinis creberrimis, latis, recurvis.*

==== *15--angul. spinis erectis, angulis in spiram contortis.*

*\*\* Cerei credi, stantes per se.*

3. *Pitajaya*. C. erectus, triangular. *Syst. veg. ed. 14.*

In *Carthagenæ fruticetis maritimis*.

Planta 8-10-ped. Fl. diamet. semiped. pulcherr. albidus, nocturni, vix odori. Fruct. ovi gallinacei mole, & fig. coccinei, nitidi, pulpa candida, eduli.

4. *heptagonus*. C. erectus, oblong. 7-angular. *Syst. veg. ed. 14.*

In *America* h.

Maximus. Spinæ fuscæ. Fl. purpurasc.

5. *tetragonus*. C. erectus, longus, (plerumq.) 4-angular. angulis compressis. *Syst. veg. ed. 14.*

In *Curassao, Amer. calidiore* h.

Minor priore. Anguli fere membranac. Spinæ longiss. Fl. subvirid. Fruct. rotundi, spinosi.

6. *hexagonus*. C. erectus, longus, (plerumq.) 6-angular. angulis distantibus. *Syst. veg. ed. 14. Knorr. del. 1. tab. f. 7.*

*Cereus Surinamensis. Eph. N. C. tab. 7. 8. Bradl.*  
*Succ. 1. tab. 1.*

*Habitat Surinami* h.

Altissimus, firmus. Spinæ stelliform. albæ, vel fuscæ. Petal. alba. Fruct. obtusi, atro-purpur.

7. *pentagonus*. C. erectus, sub 5--angular, longus, articulatus. *Syst. veg. ed. 14.*

In *America*.

Internodii pedal. Spinarum **acervi** absq. ullō manifestō tomento.

8. *repandus*. C. erectus, longus, octangul. angulis compressis, undatis; spinis lana longioribus. *Syst. veg. ed. 14.*

Cereus &c. *Trew. Ehret. tab. 14.*

*In Amer. calidiore h.*

Planta gracilior, apice attenuato. Flos magnus, albus. Fruct. extus luteus, intus niveus.

9. *lanuginosus*. C. erectus, longus, sub 9-angular. angulis obsoletis: spinis lana brevioribus. *Syst. veg. ed. 14.*

Cereus &c. *Herm. par. tab. 115.*

*In Curassao h.*

Planta alta. Fructus non spinosus, extus ruber, lanugine flavescente.

10. *peruvianus*. C. erectus, longus, suboctangul. angulis obtusis. *Syst. veg. ed. 14.*

Euphorbii &c. *Lob. ic. 2. p. 25.*

*In Jamaica, Peru apricis, aridis maritimis h.*

Planta in conum terminans obtusum. Anguli superne inermes. Spinæ stelliformes, ad verticem confertæ. Fl. superne satis frequentes, sessil. solitarii. Petal. cordiform. alba. Stylus prominens, longiss. Fruct. magnus, ovat--oblong. atro--purpur.

11. *Royeni*. C. erect. articulatus, 9--angular. articulis subovatis; spinis lanam æquantibus. *Syst. veg. ed. 14.*

*In America h.*

Planta gracilis, colore glauco, spinosiss. Spinæ flavæ. Lanugo albo--palescens ad trunci fastigium inter spinas. Fl. herbacei. Fructus magnitudine *Nucis Juglandis*, ruber, non spinosus.

\*\*\* *Cerei repentes, radiculis lateralibus.*

12. *grandiflorus*. C. repens, sub 5--angular. *Syst. veg. ed. 14. Knorr. del. 1. tab. f. 6.*

Cereus &c. *Mill. ic. tab. 90. Trew. Ehret. tab. 31. 32. E. N. C. 1752. v. 9. app. tab. 11. 12. 13. Volk. hesp. tab. 134.*

*In Jamaica, vera Cruce h.*

Planta longiss. scandens. Spinulæ setacæ, stelliform. Flos magnus, albus, occidente sole se explicans, odore *Vanillæ*; inapertus conum obtusum formans, spinul. subtiliss. cinctus.

13. *flagelliformis*. *C. repens*, 10-angularis. *Syst. veg. ed. 14. Kniph. cent. 1. tab. 12. Knorr. del. 1. tab. f. 8.*

*Cereus* &c. *Ehret. sel. 2. f. 2. Trew. Ehret. tab. 30.*

*Ficoides* &c. *Pluk. alm. tab. 158. f. 6.*

*In Amer. calidiorē*  $\frac{1}{2}$ .

Caul. pedal. veluti cylindrici, angulis etiam obsoletis, & punctis echinatis confertis, ut difficile appareant; articulati, subflavi. Spinæ flavo--rubent. Fl. coccinei. Fruct. exigui, rubentes.

14. *parasiticus*. *C. repens*, teres, striatus, muticus. *Syst. veg. ed. 14.*

*Opuntia* &c. *Plum. ic. 197. f. 2.*

*In America.*

Planta parva, fruticosa, & ramosa, ramulis articulatis & gracilibus. Fl. parvi, in apice ramulorum. Fruct. ad instar conuli obtusi, & quasi truncati.

15. *triangularis*. *C. repens*, triangularis. *Syst. veg. ed. 14. Ad. helv. 5. tab. 2.*

*Cereus* &c. *Bradl. succ. 1. tab. 3. E. N. C. 1752. v. 9. app. tab. 10. f. 14. & 1754. v. 9. app. tab. 3.*

*Ficoides* &c. *Pluk. alm. tab. 29. f. 2.*

*Melocactus* &c. *Plum. ic. 199. 200?*

*b. C. triangul. foliosus. Jacq. Amer. tab. 181. f. 65.*

*In Brasilia, Jamaica &c.*

Planta magna. Spinæ breves, latiores, quasi aduncæ, Flos magnus, speciosus, ample sese extendens, albus. Fruct. violaceus, sapore præstantiss.

*Var.* Fructus multo maior, nitide coccineus. Pulpa candida, subdulcis, insipida, edulis. Sem. atra, nitida.

\*\*\*\* *Opuntia compressa, articulis proliferis.*

16. *moniliformis*. *C. articulato-prolifer*; articulis glomeratis, globosis, spinosis. *Syst. veg. ed. 14.*

*Melocactus* &c. *Plum. Sp. ic. 198.*

*In Amer. calidiorē*  $\frac{1}{4}$ .

Planta compressa. Spinæ solitar. raro geminæ, longæ, subulatæ, acutæ. Fl. in summis articulis sessiles, tubo longo, squamoso, stylo longiss.



17. *Opuntia*. C. articulato-prolifer, laxis; articulis ovatis, spinis setaceis. *Syst. veg. ed. 14. Knorr. del. 1. tab. f. a. Mill. ic. 191. Bauh. hist. 1. p. 154. Fico Indiano. Matth.*  
*In America, nunc in Hispania, Italia &c. ad rupes 24.*  
 Planta compressa. Fl. e margine folior. erumpunt. Petal. lutea. Fruct. maturus pyriformis, ruber.
18. *Ficus indica*. C. articulato-prolifer, articulis ovato-oblongis; spinis setaceis. *Syst. veg. ed. 14.*  
*In Amer. calidiore 24.*  
 Planta compressa, ramosa. Fol. longa, & lata. Petal. dilute lutea.
19. *Tuna*. C. articulato-prolifer; articulis ovato-oblongis; spinis subulatis. *Syst. veg. ed. 14. Knorr. del. 2. tab. O.*  
*Tuna &c. Dill. elth. tab. 295. f. 338.*  
*Opuntia &c. Sloan. Jam. hist. 2. tab. 244. f. 1.*  
*In Jamaica, & Amer. calidiore h.*  
 Planta compressa. Fol. oblong-rotunda. Spinæ ferociss. flavescentes. Petal. lutea.
20. *cochenillifer*. C. articulato-prolifer; articulis ovato-oblong. subinermibus. *Syst. veg. ed. 14. Knorr. del. 2. tab. O. 1.*  
*Tuna mitior &c. Dill. elth. tab. 297. f. 383.*  
*Ficus indica &c. Pluk. alm. tab. 281. f. 383.*  
*Opuntia &c. Sloan. Jam. hist. 2. tab. 8. f. 1. 2.*  
*In Jamaica, & Amer. calidiore h.*  
 Planta 6-ped. compressa. Fol. infer. pedal. palmum lata; media, & super. longitudine, & latitudine fere æqual. Spinulæ tenues, nigricantes. Petal. rubra. Fruct. virid. tubercul. pallide fuscis.
21. *curassavicus*. C. articulato-prolifer; articulis cylindrico-ventricosus, compressis. *Syst. veg. ed. 14. Knorr. del. 2. tab. O. 2.*  
*Opuntia &c. Bradl. succ. 1. tab. 4.*  
*Ficus indica &c. Comm. hort. 1. tab. 56. Pluk. alm. tab. 281. f. 3.*  
*In Curassao h.*  
 Planta parva. Articuli vix uncial. Spinæ crebræ, solitar. flavæ. Petal. sulphurea, apicibus albidis.

22. *Phyllanthus*. *C. prolifer*, ensiformi--compressus, serrato-repandus. *Syst. veg. ed. 14.*

*Cereus* &c. *Dill. elth. tab. 64. f. 74. -- Pluk. alm. tab. 247. f. 5.*

*In Brasilia, Surinamo &c. h.*

Fol. maiora cubitalia, 2. unc. lata; cætera palmar. dodrant. incisuris ad instar *Ceterach*, sed magis rigida, virid. avenia. Petal. herbaceo-albicant. Fruct. 8-angul. dilute puniceus.

23. *Pereskia*: *C. caul. arboreo*, tereti: aculeis geminis, recurvis: fol. lanceol-ovatis. *Syst. veg. ed. 14. Dill. elth. tab. 227. f. 294.*

*Malus* &c. *Comm. hort. 1. tab. 70.*

*Portulaca* &c. *Pluk. alm. tab. 215. f. 6.*

*In Jamaica &c. M.*

Planca 4-5-cubit. ramosa. Fol. alterna, breviter petiol. sat ure virent. nitida. Fl. axill. conferti, albi. Fructus foliosus, flavesceus.

24. *portulacifolius*. *C. caul. arboreo*, tereti, spinoso: fol. cuneiform. retusis. *Syst. veg. ed. 14.*

*Opuntia* &c. *Plum. Sp. ic. 197. f. 1.*

*In Amer. calidiore h.*

Caul. aphyll. Fol. per ramos tenellos alterna; inter quæ Spinæ subsolitar. subulatæ. Fl. in summis ramulis solit. raro gemini. Petal. cordata, plana. Fruct. subrotundi, subangul. non foliosi, ut in priore.

*spinosissimus*. *C. articulato-prolifer*, articulis obliquis: spinis longiss. subulatis, & setaceis. *Martyn. Hort. cantabric.*

*Habitat*

Rectus, altus, articul. vix proliferis, maxime oblongis, compressis. Spinæ longiss. tenues, setarum pedicillis intermixtæ.

*americanus*. *C. (Cereus) 8--angular. spinis albicantibus. Bradl. succ. tab. 12.*

*In America.*

Cacumen lanuginosa congerie spinarum est præditum.

741. *PHILADELPHUS*. Cal. superus, 4-5-part. Petal. 4-5. magna, pa-

*1. coronarius*. P. fol. subdentat. *Syst. veg. ed. 14. Du-Ham. arb. 2. tab. 83.*

Frutex &c. *Clus.* 1. p. 55.

*In Italia, Germania* h.

Frutex 6-pedal. Fol. opposita, ovato-lanceol.  
Fl. in summis ramulis racemosi, albi, odori. *Var. fl. pleno.*

2. *inodorus*. P. fol. integerrim. *Syst. veg. ed. 14. Catesb. car. 2. tab. 84.*

*In Carolina* h.

Frutex 16-20-ped. ramosus. Fol. opposita, pyriformia. Fl. in summis ramulis 2-3. albi, inodori.

742. PSIDI- Cal. superus, 5-fid. segmentis ovatis. Petal.  
UM. 5. concava, patentia. Bacca 1-locul. polysper.

1. *pyriferum*. P. fol. lineatis, obtusiusc. pedunculis 1-fl. *Syst. veg. ed. 14.*

Guaiaba &c. *Trew. ehret. tab. 43. Comm. hort. 1. tab. 63. Mer. Surin. tab. 19.*

Cuiavus &c. *Rumph. amb. 1. tab. 47.*

Pela. *Hort. mal. 3. tab. 34.*

*In Indiis* h.

Planta 7-12-ped. ramis numerosis, junioribus 4-gonis. Fol. opposita, breviter petiol. ovata, obtusa, integerr. glabriusc. Pedunc. solitar. breves, 1-fl. Cor. candida, odora. Fruct. ovi gallinacei magnitudine, subrotund. vel oblong. glaber. *Affatus editur cum Saccharo; siccus sapore Rubi idæi.*

2. *pomiferum*. P. fol. lineatis, acuminat. pedunc. 3-fl. *Syst. veg. ed. 14.*

Guaiava &c. *Pluk. alm. tab. 193. f. 4.*

Cuiavus &c. *Rumph. amb. 1. tab. 4. Merian. Surin. tab. 57.*

Malacca &c. *Hort. mal. 3. tab. 35.*

*In Indiis* h.

*Habitu convenit cum priore. Fruct. col. pallidior, subsulphur: sapore acido, ac nullo discriminatur.*

3. *decaasper-* P. fol. ovatis, acuminat. planis: pedunc. 1-fl.  
*-mum.* bracteatis. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*

*In Tahiti* h.

Frutex glaber. Fol. parva, petiol. integerr. venosa, non lineata. Pedunc. axill. sericei. Fl. parvi, albi. Cal. sericeus. Bacca parva, globosa, torulosa, calyc. persistente coronata.



*Cuiavillus*. P. fol. lineatis, ovat-lanceol. pedunc. sub 2-fl.  
*Burm. Ind. Rumph. Amb. 1. tab. 49.*

*In India* h.

Fol. sicca, ferrugineo-tomentosa.

*grandiflorum*. P. fol. ovatis, acuminat. fructu parvo, 4-locul.  
*Aubl. Guian. tab. 190.*

*In Caienna* h.

Arb. 10-pedal. superne ramosa, ramis sparsis.

Fol. opposita, subpetiol. integerr. glabra. Fl.

axill. oppositi, solitar. pedunculati, odori.

Cor. alba. Fruct. non edulis.

*aromaticum*. P. fol. ovatis, acuminat. fructu cerasiformi,  
 dulci. *Aubl. Guian. tab. 191.*

*In Cayenna, & Guiana* h.

Arb. 5-ped. superne ramosa. Fol. breviter pe-

tiol. integerr. glabra. Fl. axill. oppositi, so-

litar. Petal. alba.

743. EUGENIA. Cal. superus, 4-part. Petal. 4. oblonga. Drupa  
 4-angul. 1-sper. Nux subrotun.

1. *malaccensis*. E. fol. integerr. pedunc. lateralibus, ramosis.  
*Syst. veg. ed. 14.*

*Jambosa &c. Rumph. amb. 1. tab. 37. 38.*

*Nati-Schanibu. Hort. mal. 1. tab. 18.*

*In India* h.

Arb. Fol. opposita, breviter petiol. maiora se-

quenti, minus oblong. crassa, glabra, nitida,

fusco-virid. subtus dilutiora. Fl. purpuro-rub-

bri, inodori. Fruct. pyriformis, ma. sequen-

ti, albus ex una parte, ex altera rubescens.

Caro succulenta, alba, odore, & sapore vi-

noso, grato.

2. *Jambos*. E. fol. integerr. peduncul. terminalibus, ramo-  
 sis. *Syst. veg. ed. 14.*

*Jambosa &c. Rumph. amb. 1. tab. 39.*

*Malacca-Schambu. Hort. mal. 1. tab. 17.*

*In India* h.

Arb. procera, ramis densis, transversim sparsis.

Fol. opposita, breviter petiol. oblong-angusta,

acumin. spithamæa, latitudine 2-pollic. crassa,

viridi-fusca, nitida, glabra. Pedunc. 3-5-fl.

Petal. viridi-albicant. Fruct. oblong. flavus,

sapore grato.

3. *Pseudopsidium*. E. fol. integerr. pedunc. 1-fl. pluribus, laterali-  
 bus, & terminalibus. *Syst. veg. ed. 14. Jacq.*

*amer. tab. 93. ed. pict. tab. 140. O ij*

*In Martinica* h.

Arb. 20-ped. simil. *Pyro europæo* iuniori. Fol. opposita, breviter petiol. lanceol-ovat. apice acuminato, & falcato, 3-4-pollic. læte virent. nitida. Pedunc. adgregati. Petal. alba. Fruct. globosi, rubro-coccinei.

4. *uniflora*. E. fol. integerr. cordat-lanceol. pedunc. lateralibus, solitari. 1-fl. *Syst. veg. ed. 14. Mish. gen. tab. 108.*

*Myrtus* &c. *Tilli-pis. tab. 44.*

*In India* h.

Fol. *Myrti*, recurva, subodora. Flos albus. Fruct. mollis, leviter sulcatus, suave rubens, odoratus.

5. *corinifolia*. E. fol. ovatis, obtusis, integerr. pedunc. 1-fl. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. Obs. 3. tab. 53.*

*In Caienna* h.

Rami iuniores angulati. Fol. multa, opposita, subpetiol. rarius emarginata, coriacea, nitida. Pedunc. axill. 1-2-3. Fructus globosi.

6. *acutangula*. E. fol. crenatis: peduncul. terminalibus: pomis oblong. acutangulis. *Syst. veg. ed. 14.*

*Butonica* &c. *Rumph. amb. 3. tab. 115.*

*Tsiera* &c. *H. Mal. 4. tab. 7.*

*In India* h.

Fol. *Hippocastani*, ad ramorum apices, obverse ovata, acutiusc. Racemi longiss. Fl. parvi, purpur.

7. *racemosa*. E. fol. crenatis: racemis longiss. pomis ovatis, 4-angulis. *Syst. veg. ed. 14.*

*Butonica* &c. *Rumph. amb. 3. tab. 116.*

*Samsiravadi*. *H. Mal. 4. tab. 16.*

*In India* h.

Arbor vasta. Fol. ad ramorum apices, spitham. & ultra, palmum lata, brevibus, & atro-purpureis petiolis innixa, oblong-acum. crassa, serrata, supra atro-virid. nitida, odora. Petal. e viridi-albentia.

- aquatic.* E. fol. integerr. pedunc. 4-fl. pomis 5-locularibus. *Burm. Ind. Rumph. amb. 1. tab. 38. f. 2.*

*In India*.

- montana.* E. fol. ovatis, acutis: fl. terminalibus: fructu parvo, albo, punctis rubris notato. *Aubl. Guian. tab. 195.*

*In Guiana* h.

Arbuseul. 6-ped. superne ramosa, ramis rectis, & undiq. sparsis. Fol. opposita, subsessil. integerr. foraminulata, glabra. Fl. terminal. racemosi; racemuli oppositi, bracteati, 3-fl. Petal. 4. alba, rubris venis variegata.

*Coumste.*

E. fol. latis, ovatis, acumin. fl. racemosis: fructu albo. *Aubl. Guian. tab. 196.*

*In Caribæis h.*

Arb. 15-ped. superne ramosa. Fol. subpetiol. integerr. glabra, foraminulata. Fl. terminal. racemulis 3-fl. Cor. alba. Bacca orbiculata, alba. Sem. subrotund. alba pellicula tectum.

*Mini.*

E. fol. lanceol. fl. racemosis: fructu parvo, alborubro variegato. *Aubl. Guian. tab. 197.*

*In Caienna, & Guiana h.*

Arbuse. 6--ped. superne ramosa. Fol. opposita, subsessil. integerr. glabra, foraminulosa, supra virid. subtus pallida. Fl. axillar. & terminal. racemulis oppositis, 3-fl. bracteati. Cor. alba. Bacca subrotunda.

*Snemariensis.* E. fol. ovatis, acumin. fl. axillar. & terminalibus congestis, sessil. fructu rubro, 3-sperm. *Aubl. Guian. tab. 198.*

*In Caribæis h.*

Frutex ped. ramosus, ramis 8-ped. Fol. opposita, subsessil. integerr. glabra, supra atrovirid. subtus pallide virent. Cor. alba, ex rubro variegata. Bacca subrotund. rubra.

*latifolia.*

E. fol. amplissim. ovatis, acutis: fructu Olivæform. nigro. *Aubl. Guian. tab. 199.*

*In Guiana h.*

Frutex 7--ped. caulibus pl. Fol. opposita, subpetiol. integerr. rigida, glabra, foraminulosa. Fl. axill. pl. pedunculati, bracteati. Cor. alba, marginæ incarnato.

*tomentosa.*

E. fol. ovatis, subsessil. fl. racemosis. *Aubl. Guian. tab. 200.*

*In Guiana h.*

Fruticul. 3-4-ped. Caul. pl. ramosi, tomentosi. Fol. opposita, subvirid. tomentosa. Fl. exigui, in racemis axillar. oppositis. Cal. villosus. Petal. alba. Bacca 1-locul.

*Guianensis.*

E. fol. ovatis, obrusiuscul. subpetiolat. pedunc. solitar. 2-3-fl. fructu monosperm. *Aubl. Guian. tab. 201.*

*In Guiana h.*



Fruticul. 3-4-ped. Caul. pl. ramosi. Fol. opposita, integerr. glabra, foraminulosa. Fl. axill. longe peduncul. bracteati. Petal. concava, alba. Bacca subrotund. rubra.

*undulata*. E. fol. ovat--oblong. acumin. fructu parvo, Olivæformi, rubro. *Aubl. Guian. tab. 202.*

*In Caribæis* h.

Frutex 3-ped. superne ramosus. Fol. opposita, & subopposita, subpetiol. undulata, integerr. glabra, foraminulata. Fl. pl. axillar. breviter pedunculati, bracteati. Cor. alba, margine incarnato.

*Arivoa*. E. fol. crassis, ovat-oblong. acutis. *Aubl. Guian. In Caribæis* h.

*Differt a priore fol. crassior. minus acumin. & fructu nigro.*

*Carthagenensis*. E. fol. integerr. peduncul. axillar. ramosis. *Jacq. am. tab. 173. f. 53.*

*In Carthagenæ sylvaticis* h.

Arbusecula erecta, 3-ped. & ultra, ramosa. Fol. 4--pollic. breviter petiol. opposita, coriacea, ovata, acumine obtuso, graveolent. Pedunc. comm. breves, multifl. Cal. rubescens. Petala obovata, candida, leviter odora. Fruct. Pisi magnitudine, globosi, primum rubentes, dein atrii.

744. MYRTUS. Cal. superus, 5--fid. sive 4--fid. Petal. 5-4. ovata. Bacca Olivæform. coronata, umbilicata, 2-3-locul.

1. *communis*. M. fl. solitar. involucro 2-phyll. *Syst. veg. ed. 14.*

a. *M. romana*. *Mill. ic. tab. 184. f. 1.*

b. *M. tarentina*.

*M. min. vulgar. Bauh. pin. Garid. Aix. tab. 67.*

c. *M. italica*.

*M. fol. ovato-lanceolat. acutis, ramis rectioribus. Mill. dict. n.º 5.*

d. *M. bætica*. *Black. tab. 114.*

e. *M. lusitanica*.

*M. sylvestris, fol. acutiss. Clus. hist. 1. p. 66. f. 1.*

f. *M. belgica*.

*M. latifolia. Bauh. pin. 469.*

g. *M. mucronata*.

*M. fol. minimis, & mucronatis. Bauh. hist. 469. Clus. hist. 1. p. 67.*

*In Europa australi, Asia, Africa; sylvis apricis* h.

Planta fruticosa. Fol. Buxo acutiora, opposita, subfessil. ovat--acumin. lævia, suture viridia, odora. Petal. alba.

2. *brasiliana*. M. fl. folitar. pedunculis nudis: petalis subciliat.

*Syst. veg. ed. 14. Plum. ic. 207. f. 1.*

Myrti folio &c. *Sloan. Jam. hist. 2. tab. 87. f. 3.*

Arbor &c. *Comm. hort. 1. tab. 89.*

*In Brasilia h.*

*Ad Eugenia genus spectat.* Planta 20-ped. ramis dichotomis. Fol. opposita, petiol. ovata, obtusa, glabra, luteo--virid. Petal. 4-5. lacero--ciliata, obverse ovata, reflexa, concava, pallide albicant. Stam. sub 40.

3. *biflora*. M. pedunc. bifloris: fol. lanceolat. *Syst. veg. ed. 14.*

*Caryophyllus &c. Brown. Jam. tab. 25. f. 3.*

*In Jamaica.*

Fl. axillar. Involuc. minimum.

4. *angustifolia*. M. pedunc. umbellatis: fol. lineari-lanceol. subfessilibus. *Syst. veg. ed. 14.*

*Phylliræa &c. Burm. afr. tab. 83. f. 2.*

*Ad cap. b. Spei h.*

*Simil. priori.* Arbusc. ramis teretibus, ramulis 4-gonis, glabris. Fol. (*Phylliræa angustifolia*) integerr. glabra. Pedunc. laterales, breves, oppositi. Petal. subrotund. Stam. multa, erecta, seracea.

5. *lævis*. M. pedunc. umbellatis: fol. ovatis, acuminatis. *Syst. veg. ed. 14. Thumb. Jap.*

*In Japonia h.*

*Valde adfinis Cratogeomys lævis, & villosa.* Caul. fruticosus, glaber. Rami, & ramuli erecti, alterni. Fol. pollic. & ultra, e gemmis alternis solitaria-bina-terna, petiolata, acute ferrata, venosa, patent. inæqual. utrimq. glabra.

6. *lucida*. M. pedunc. sub 3-fl. fol. subfessil. lanceolat. attenuatis. *Syst. veg. ed. 14.*

*Habitat Surinami h.*

Fol. singulari structura ex ovato--admodum attenuata in apicem lanceol. Fl. pentapet.

7. *Cumini*. M. pedunc. multifi. fol. lanceol--ovatis. *Syst. veg. ed. 14.*

*Jambosa &c. Rumph. amb. 1. tab. 41.*

*In Zeylona h.*

Arb. ramis cinereis. Fol. opposita, petiol. minus acuta, integerr. glabra. *Cuminum olet.*

8. *dioica*. M. pedunc. trichotomo-paniculat. fol. oblong. fl. dioicis. *Syst. veg. ed. 14.*  
*In America* h.  
 Fol. opposita, lanceol--ovata, crassa. Pedunc. axillar. & terminal. Petal. pauca.
9. *Chytraculia*. M. peduncul. dichotomis, paniculat. tomentosis: fol. terminalibus geminis, subovatis. *Syst. veg. ed. 14. Brow. Jam. tab. 187. f. 2. Pluk. phyt. 247. f. 2.*  
*In Jamaica* h.  
*Differt a seq. fl. copiosioribus: ramis, petiolis, pedunculisq. pube ferruginea, quam inde deponit.*
10. *Zuzygium*. M. peduncul. multifl. ramis dichotomis: fol. terminalibus geminis, subovatis. *Syst. veg. ed. 14. Brow. Jam. tab. 7. f. 2.*  
*In Jamaica* h.  
 Rami albi. Fol. glabra. Pedunc. oppositi.
11. *zeylanica*. M. peduncul. multifl. fol. subpetiol. ovatis. *Syst. veg. ed. 14. Herm. Lugd. tab. 435.*  
*In Zeylona* h.  
 Fol. opposita, obtusiusc. margine reflexo. Panícula composita, 3-fid. Baccæ molliuscul. nivæ.
12. *androsæmoides*. M. peduncul. trifido--multifl. fol. sessil. subovalibus. *Syst. veg. ed. 14.*  
*In Zeylona* h.  
 Fol. palmar. opposita, obtusa, glabra.
13. *caryophyllata*. M. peduncul. trifido--multifl. fol. obovat. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. Obs. 2. tab. 25.*  
*Caryophyllus* &c. *Pluk. alm. tab. 55. f. 3.*  
*In Zeylona* h.  
 Arb. coma pyramidali, longiss. Fol. multa, opposita, breviter petiol. Laurinis fol. breviora, coriacea, læte virent. nitida, odora. Fl parvi. Petal. cum rubore albertia. Baccæ rotundæ, Pisi magnitudine.
14. *Pimenta*. M. fol. alternis. *Syst. veg. ed. 14. Sloan. Jam. hist. 2. tab. 191. f. 1.*  
*Caryophyllus* &c. *Pluk. alm. tab. 155. f. 4.*  
*Piper jamaicense*. *Black. tab. 355.*  
*In India* h.  
 Fol. subpetiol. ovato--lanceol. crassa. Corymb. laterales, compositi, 2-fidi. Cal. fl. superus, 4-part. fructus vero inferus, 4--dent. Bacca oblong. 2--sperm.



- Cotinifolia*. M. fol. alternis, ovatis. *Burm. in Plum. amer. tab. 208. f. 1.*  
*In America*.
- saligna*. M. spicis terminalibus: baccis sessil. urceolatis: fol. lineari-lanceol. integerr. *Burm. Ind. Rumph. amb. 2. tab. 17. f. 2.*  
*In India*.  
 Fol. Salicis angustissima.
- triflora*. M. fol. alternis: pedunc. 3-fl. *Jacq. amer. tab. 183. f. 59.*  
*In Carthagenæ sylvis* h.  
 Arb. alta, habitu similis *Lauro nobili*. Fol. 8--pollic. alterna, petiol. coriacea, oblonga, basi attenuata, integerr. emarginata, nitida, supra sature virid. subtus cinerea, trita odorem spirantia aromaticum; & graveolentem. Pedunc. semipollic. sæpius terni. Cal. e viridi-albescens. Cor. candida, odore *Hyacinthi orient.*  
 M. fol. linearibus: fl. axillar. geminis, pedunculat. *Burm. in Plum. amer. tab. 207. f. 2.*
- laurinus*. M. peduncul. racemosis, bracteolat. fol. ovat--lanceol. ferrulat. glabris. *Retz. Obs. fasc. 4. Burm. Zeyl. tab. 62.*  
*In Zeylona* h.  
 Arb. Cerasi effigie, ramis superioribus rubris. Fol. alterna, remota, venosa. Pedunc. axill. Petal. alba.  
*Ex arbore colligitur resina odorata, utilis ad Paralyfin.*
745. PUNICA. Cal. superus, campanulatus, 5-fid. coloratus. Petal. 5. erecto-patula. Pomum magnum, multilocul. segmentis cal. coronatum, polysperm.
1. *Granatum*. P. caul. arboreo: fol. lanceol. *Syst. veg. ed. 14. Black. tab. 97. & 145. Ludw. cæ. tab. 13.*  
*In solo cretaceo* h.  
 Arbusc. 10-ped. spinis rectis. Fol. alterna, petiol. integerr. nervo medio conspicuo, nitida, glabra. Fl. 1-2-3. sessil. Petal. pulchre rubent. Fructus coccineo-lureus.
2. *nana*. P. caul. fruticoso: fol. linearibus. *Syst. veg. ed. 14. In Anthillis* h.  
 Altitudo 5--ped. Fol. breviora.  
 Floret tota æstate.

746. AMYG- Cal. inferus, semi 5-fid. Petal. 5. oblong. villosa.  
DALUS. Drupa nuce poris perforata; in quo differt a  
Pruno.

1. *Persica*. A. folior. serraturis omnibus acutis: fl. solitar.  
sessilibus. *Syst. veg. ed. 14. Black. tab. 101.*  
*Ludw. ed. tab. 194. Knorr. del. 1. tab. P. 1.*

b. *Nucipersica* &c.

*Habitat* . . . . h.

Arb. pumila. Fol. longa, acuminata, e gemma  
terminali, nec infra fl. Fl. gemmales. Cor.  
dilute rubescens. Fruct. subrotund. mollis,  
cuticula villosa. *Var. fl. pleno.*

2. *communis*. A. folior. serraturis infimis glandulosis: fl. sæpius  
geminis, sessilibus. *Syst. veg. ed. 14. Ludw.*  
*ed. tab. 177.*

b. *A. sativa*. *Mill. ic. tab. 28. f. 1. Knorr. del. 1.*  
*tab. M. 1.*

c. *A. anara*. *Black. tab. 105.*

Mandorle. *Matth.*

*In Mauritaniæ sepibus, Pedemontii, Helvetiæ &c. h.*  
Altitudo mediocris. Fol. alterna, petiol. longa,  
angusta, acumin. dentata, lævia, albescent,  
Fl. axill. gemmales, carnei.

3. *pumila*. A. fol. venoso-rugosis. *Syst. veg. ed. 14. Herm.*  
*Lugd. tab. 409. Pluk. phyt. 11. tab. 4.*  
*In Africa h.*

Arbuse. vix 2-ped. ramis atro-purpur. Fol. petiol.  
lanceol. serrulata. Fl. ad gemmas sæpius bini,  
sessil. Cal. rufescens. Petal. acumin. Stipul.  
linear. profunde ferratæ. *Var. fl. pleno.*

4. *nana*, A. fol. basi attenuatis, *Syst. veg. ed. 14. Duham.*  
*arbr. fruit. 1. tab. 3. Pluk. alm. tab. 11. f. 3.*  
*Armeniaca &c. Amm. ruth. tab. 30.*

*In Calmuckia h.*

Caul. pedal. Radix repens. Fol. lanceol. ferrata,  
lævia, in petiolos desinentia. Fl. sessil. 2--3.  
simul, rubri.

747. PRUNUS. Cal. inferus, 5--fid. Petal. 5. Drupæ nux.  
futuris prominulis, non foraminosa.

1. *Padus*. P. fl. racemosis. fol. deciduis, basi subtus biglan-  
dulosis. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 205.*  
*Cerasus racemosa &c. Tabern. 988.*

*In Europæ sylvis, & ad sepes locis collinis &c. h.*  
Frutex 10-ped frondosus, cortice rubente. Fol.  
ex ovato-utrinq. acuminata, acute, & minute

crenata, lævia, subtus dilutiora, supra profunde venosa, nervis, venis atro col. tinctis. Racemi longi, foliosi, intra fol. Pedunc. simpl. racemosi, expansi, basi foliosi. Cal. dentibus reflexis ora lacera. Petal. subovata, ferrulata, ut in sequent. nec emarginata ut in *Ceraso*, plerumq. albida, raro rubra. Fructus parum pulposus, niger, dulcis, subnauseosus. Sem. odoratum, Perfici sapore.

2. *virginiana*. P. fl. racemosis: fol. deciduis, basi antice glandulosis. *Syst. veg. ed. 14.*

*Cerasus* &c. *Catesb. Car. 2. tab. 94.*

*In Virginia, Carolina* h.

Arb. facie P. Padi, sed fol. minus subtus reticulata, & fere glabra. Petal. orbiculata, nec obovata. Fructus quadruplo ma. rubri, dein nigri.

3. *canadensis*. P. fl. racemosis: fol. deciduis, eglandulosis, lato-- lanceol. rugosis, utrimq. pubescentibus. *Syst. veg. ed. 14.*

*Cerasus* &c. *Pluk. alm. tab. 58. f. 4.*

*In Amer. septent.* h.

Rami læves. Fol. minus rigida quam in reliquis, in petiolum desinentia, argute ferrata.

4. *lusitanica*. P. fl. racemosis: fol. sempervirentibus, eglandulosis. *Syst. veg. ed. 14. Mill. ic. tab. 106. f. 1.*

*Lauro-cerasus* &c. *Dill. elth. tab. 159. f. 193.*

*In Lusitania, Pennsylvania* h.

Altitudo humana, & ultra. Fol. alterna, oblonga, mucronata, crenata, crassa, rigida, nitida, venosa, subtus pallidiora. Racemi axillar. fol. longiores. Fl. albi. Fruct. atro--rubent.

5. *Lauro-cerasus*. P. fl. racemosis: fol. sempervirent. dorso biglandulosis. *Syst. veg. ed. 14. Black. tab. 512. Clus. hist. 1. pag. 4. Cam. hort. 1. tab. 23. Duham. arb. 1. tab. 133.*

*In Trapezunte* h.

Arb. arbuscula. Fol. alterna, petiol. *Lauro* simil. lanceol.-ovata, integerr. nitida, glaberr. pulchre virent. Racemi axillar. pyramidal. Fl. albi. Fruct. ex cœrul.-rubescens.

6. *elliptica*. P. fl. racemosis: fol. ellipticis, ferratis. glabris. *Syst. veg. ed. 14. Thamb. Jap.*

*In Japonia* h.



Arb. Rami, & ramuli alterni, nodosi, rugosi, glabri, albo--punctati. Fol. in ramulis adgregata, sparsa, digital. breviter petiol. obtusiuscula, patent. venosa. Fl. pauci. Drupa oblonga, magnitudine passulæ.

7. *paniculata*. P. fl. paniculat. patulis: fol. ovatis. *Syst. veg. ed. 14. Thumb. Jap.*

*In Japonia* h.

Arb. glabra. Rami, & ramuli alterni, erecti. Fol. sparsa, 1-2-pollic. & ultra, petiol. acuta, serrata, venosa, glabra, inæqual. Petio'i erecti, lineares. Panicula ampla, patentiss. Petal. alba.

*Differt a P. Mahaleb, cui quod immodo similis, panicula ma. & patentiss. fl. min. fol. magis oblongis, inferne attenuatis, acuteq. serratis.*

8. *Mahaleb*. P. fl. terminal. corymbosis: fol. ovatis (variis). *Syst. veg. ed. 14. Jacq. Austr. tab. 227. Dukam. arb. 1. tab. 55. Match.*

*In Italia, Helvetia &c.* h.

Arb. 6--ped. diffusa, ramis longis, rectis, nudis. Fol. ex orbiculari-acumin. *Betula*, aut *Populi* nigræ, multa etiam cordis forma, nitida, superne profunde albido--virid. pulchre venosa sunt, petiol. conduplicata, crenata, odora. Stipul. crenatæ, dentibus fuscis. Corymb. convexus. Bract. breviss. obtusiss. serratæ. Cal. plicato--scaber. Petal. ovata, patula, alba, odora, exigua. Anth. luteæ. Fruct. Pisiform. nigricant. amari, succo purpur. pertinaciter tingente.

9. *Armeniaca*. P. fl. sessilibus: fol. subcordat. *Syst. veg. ed. 14. Black. tab. 281. Bauh. hist. 1. p. 176. Knorr. del. 1. tab. A. 2.*

*Habitat in silvis, & sylvaticis* h.

Arbor ramosa. Fol. alterna, longe petiol. acuminata, nitida, vernantia convoluta. Fl. in ultimis ramulis alterni. Petala obovata, obtusiss. concava, patent. alba.

10. *sibirica*. P. fl. sessilibus: fol. ovato-oblong. *Syst. veg. ed. 14. Armeniaca &c. Amm. ruth. tab. 29.*

*In Sibiria* h.

Frutex raro 2. cubitos superans, facie *Betulam* nascentem referens. Fol. alterna, longe mucronata. Rami inferne nudi. Fl. ad exortum

& in alis ramorum, parvi, albi. Fructus exsuccus, flavo-rubent.

11. *pumila*. P. fl. subumbellat. fol. angusto-lanceol. *Syst. veg. ed. 14.*

*Cerasus* &c. *Mill. ic. tab. 89. f. 2.*

*In Canada* h.

Frutex statura *Amygdali nanæ*. Rad. repens. Rami virgati, purpurascens. Fol. subtus glauca, seu pallida. Pedunc. terni e gemmis lateralibus. Fruct. minor, ruber, præcocior.

12. *Cerasus*. P. umbellis subpedunculat. fol. ovato-lanceol. conduplicatis, glabris. *Syst. veg. ed. 14. Black. tab. 449 Duham. arb. 2. tab. 56.*

*In Europæ sylvis montium, & collium* h.

Fol. tactu viscida, nitentia. Stipul. dentatæ.

Bract. 3-fid. ferratæ, intermedia foliacea.

Gemmæ terminales foliosæ; laterales floriferæ.

*Hanc Ceraso cultæ originem dedisse videtur.*

13. *avium*. P. umbellis subpedunculat. fol. ovato-lanceol. conduplicat. subtus pubescentibus. *Syst. veg. ed. 14. Black. tab. 425. Ludw. ed. tab. 108.*

*In Europa boreali* h.

Arb. procera, cortice albo. Fol. longe petiol. ex lata ellipsi acumin. mucrone producto, lanceol. ferratæ, tenuia, supra glabra, glandula 1-2. in petioli apice amant duplicari, ut partem pronam abscondant. Pedunc. longi; umbella subtriflora. Involuc. 4-phyll. Calyc. segmenta reflexa, sæpe colorata. Petal. subcordata, albo rosea. Bacca parva, rubra, tandem nigra, edulis. *Var. fl. duplici.*

14. *pensilvanica*. P. umbellis sessilibus: fol. ovato-lanceol. ramulis pallide punctatis. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*

*In America septent.* h.

Facies *Pruni Cerasi*, sed ramuli punctis albidis adspersi, ut in *P. Virginica*. Fol. *Pruni Cerasi*, lanceol.-ovata, ferrulata, lævia, basi glandulis 2. sæpe rubris. Fl. *P. Cerasi min.*

15. *domestica*. P. peduncul. subsolitar. fol. lanceolat-ovatis, convolutis: ramis muticis. *Syst. veg. ed. 14. Black. tab. 309.*

*Pruna. Matth.*

*In Europæ australis locis elevatis* h.

Arbor mediocris magnitud. Fol. alterna, petiol.

- ferrata, subhirsuta; vernantia convoluta. Fl. racemosi 1-2-3. Gemmæ floriferæ aphyllæ. Petal. cava, albo-virid. *Dantur pl. var.*
16. *infinita*. P. pedunc. geminis: fol. ovatis, convolut. subvillois: ramis spinescent. *Syst. veg. ed. 14. Blak. tab. 305. Du-ham. arb. 2. tab. 41.*  
*In Germania, Helvetia &c. h.*  
 Altitudo prioris. Rami in hortis innocui. Fol. ferrata, supra subglabra. Stipul. acutæ, ciliatæ. Bacca rotunda, domestica duplo min. nigra, vel ex luteo-alba.
17. *spinosa*. P. pedunc. solitar. fol. lanceol. glabris: ramis spinosis. *Syst. veg. ed. 14. Blak. tab. 494. Tabern. ic. 992.*  
*Pruno selvatico. Matth.*  
*In Europæ sepibus h.*  
 Arbuscula. Fl. ante fol. prodeunt, solitar-bini, odori. Petal. patula, alba. Fruct. ovati, atro-cœrul. tandem nigri, sapore austero.
18. *aspera*. P. fl. terminalibus, solitar: fol. ovatis, ferratis, asperis. *Syst. veg. ed. 14. Thumb. Jap.*  
*Muk-no-ki. Kæmph. am. exot. fasc. V. p. 799.*  
*In Japonia h.*  
 Rami, & ramuli teretes, punctati. Fol. 2-pollic. alterna, petiol. acumin. patent. venosa, sub-tus pallida. Drupa magnitud. piperis, edulis, globoso-ovata, cœrul. Nux triquetra. Nucleus albidus.
19. *japonica*. P. pedunc. solitar. fol. ovatis, acuminat. glabris: ramis inermibus. *Syst. veg. ed. 14. Thumb. Jap.*  
*In Japonia h.*  
 Caul. fruticosus, glaber. Rami, & ramuli alterni, erecti, rugosi, cinerei. Fol. pollic. alterna, petiol. patent. duplicato-ferrata, venosa, utrimq. glabra. Stipul. 2. suprafoliac. fetacæ. Drupa magnitudine Pisi.
20. *glandulosa*. P. pedunc. solitar. fol. oblong. glanduloso-ferratis: ramis inermibus. *Syst. veg. ed. 14. Thumb. Jap.*  
*In Japonia h.*  
 Caul. fruticosus, glandulosus, glaber. Rami striati, ramulosi, cinerei. Fol. unguicul. sparsa, petiolata, patent. subtus venoso--reticulata. Petioli breves. Fl. sparsi Petala incarnata. *Differt a P. pumila, fol. acutis, tenuissime ser-*



*ratis, subtusq. concolor. nec obtusis, subintegris, & glaucis.*

21. *incisa*. P. pedunc. solitar. fol. ovatis, inciso-ferratis, villosis: ramis inermibus. *Syst. veg. ed. 14. Thumb. Jap.*

*In Japonia h.*

Arb. orgyal. debilis. Rami, & ramuli alterni, flexuosi, patentes, cinerei. Fol. ex apicibus ramulorum plura, sub florescentia vix unguicular. brevissime petiol. Petal. incarnata. *Differt a P. institia, pedunc. solitar: ramis inermibus: fol. inciso-ferratis. A P. spinosa, ramis inermibus: fol. ovatis, pilosis, inciso-ferratis.*

22. *tomentosa*. P. pedunc. solitar: fol. ovatis, subtus tomentosis. *Syst. veg. ed. 14. Thumb. Jap.*

*In Japonia h.*

Arb. ramosa. Rami erecti, glabri. Ramuli alterni, patuli, tomentosi. Fol. subpollic. alterna, petiol. acuta, ferrata, venosa, patent. supra villosa. Petioli semilineam longi, tomentosi. Drupa magnitudine Pisi.

748. PLINIA. Cal. 5-4-part. Petal. 5-4. Drupa supera, sulcata.

1. *crocea*. P. fl. pentapetal. *Syst. veg. ed. 14. Plum. gen. ic. 225.*

*In America h.*

Arb. Fol. abrupte pinn. foliol. sub 12. ovat-lanceol. integerr. Fl. sessiles, sparsi per ramos nudos, seniores. Fructus edulis, luteus.

2. *pedunculata*. P. fl. pedunculat. polyandris. *Syst. veg. ed. 14.*

*Habitat*

Arb. Fol. Myrtina, opposita, sessil. ovat-acum. integerr. rigida, lævia. Fl. subumbellati. Petal. 4-8. subovat. Bacca subrotund. magnitudine Pomi, 8-torulosa, 1-locul. calyc. 4-dent. umbilicata, rubra, sapida. Sem. unicum, subglobosum. *Differt a priore fl. pentapet. & drupa rubra.*

749. CHRYSO-BALANUS. Cal. 5-fid. Petal. 5. Drupæ nux 5-sulcata, 5-valv.

1. *leuco*. C. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. amer. tab. 94. & ed. picta tab. 141.*

Guaiera. *Maregr. bras. tab. 2. f. 4.*

Frutex &c. *Catesb. car. 1. tab. 25?*

a. l. fructu ex albo--rufescente. Plum. gen. ic. 158.

b. C. Brown. Jam. tab. 27. f. 5.

In Amer. meridion. ð.

Arbuse. 3--10--ped. ramosa, cortice ferrugin. punctis leucophæis. Fol. 2--pollic. alterna, breviter petiol. ovat---subrotunda, obtusa, integerr. coriacea, nitida. Racemi axillar. & terminal. breves, ramosi, laxi. Fl. Pruniform. parvi, albidi. Fructus subpollic. subrotundi, integerr. vel sulcati, rubri, purpur. flavi, albidi, nigri, sapore Pruni domesticæ, sed facile corruptibiles.

750. SONNERATIA. Est Rhizophora calceolaris; monente Vahl.

## DIGYNIA.

751. CRATÆGUS. CAL. 5--fid. Petal. 5. Bacca infera, 2--4--sperma.

1. Aria. C. fol. ovatis, incis, serratis, subtus tomentosis. Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 302.

Sorbus &c. Crantz. austr. 1. fasc. 1. tab. 2. f. 2. Aria. Dalech. hist. 202.

b. C. svecica. Fl. Dan. tab. 301.

In Europæ frigidis; b. in Svecia, Anglia ð.

Arb. magna, cortice rubente, splendente. Fol. inæqualiter serrata, nervosa, firma, supra læte virid. nitida, quandoq. maculata; b. semipinnatifida. Fl. corymbosi. Calyc. & fructus lanati. Petal. ovata, alba. Bacca ovata, 2--locul. rubra, dulcis.

2. terminalis. C. fol. cordatis, 7--angulatis: lobis infinis divaricatis. Syst. veg. ed. 14. Jacq. Austr. 5. tab. 443. Fl. Dan. tab. 798. Bauh. hist. 1. p. 63. Du--ham. arbr. 1. tab. 79. Lob. ic. 2. p. 100.

In Europa ð.

Arb. magna. Fol. alterna, longe petiol. subtus tomentosa. Fl. corymbosi, male olentes. Petal. ovata, ex albo--palescent. Fruct. col. ferrugin. punctul. albis adpersus, edulis, & gratus, minor Sorba sativa, 2--locul. 4--spermos.

3. cocci-

3. *coccinea*. C. fol. cordatis, repando-angulat. ferratis, glabris. *Syst. veg. ed. 14.*  
*Mespilus &c. Mill. dict. tab. 179. Angl. hort. tab. 13. f. 1. Pluk. alm. tab. 46. f. 4.*  
*In Virginia, Canada h.*  
 Rami adspersi punctis vagis. Spinæ axillar. validæ, patentiss. e rudimentis ramorum. Fol. alterna, cuneato-ovat. Stipul. linear. Pedunc. corymbosi, pubescent. Fruct. coccinei. *Var. sine spinis.*
4. *viridis*. C. fol. lanceol-ovat. subtrilobis, ferratis, glabris: caule inermi. *Syst. veg. ed. 14.*  
*In Virginia h.*  
*Var. prioris.*
5. *punctata*. C. fol. obovat. basi attenuatis, ferratis, glabris: caule inermi. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. Austr. 1. tab. 28.*  
*In Amer. septentr. h.*  
 Arb. 10-ped. ramis diffusis, spinosis. Fol. acuta, duplicato-ferrata, utrimq. glaberr. Stipul. linear. ciliato--ferratæ, caducæ. Racemi compositi; partialibus plerisque 3--fid. Fruct. Aurantio--rubelli, cum punctis fuscis.
6. *Crus galli*. C. fol. lanceol-ovat. ferratis, glabris: ramis spinosis. *Syst. veg. ed. 14.*  
*Mespilus &c. Mill. dict. tab. 178. f. 2. Hort. Angl. tab. 13. Pluk. alm. tab. 46.*  
*In Virginia h.*  
 Fol. ovalia, basi cuneata, nitida. Spinæ longæ, duræ. Fl. corymbosi. Fruct. magni, rubri.
7. *tomentosa*. C. fol. cuneiformi-ovat. subangular. ferratis, subtus villosis: ramis spinosis. *Syst. veg. ed. 14.*  
*Mespilus &c. Trew. chret. tab. 17. Pluk. phyt. 100. f. 1.*  
*In Virginia h.*  
 Fol. *Grossulariæ*. Spinæ longæ, angustæ. Fruct. lutei.
8. *indica*. C. fol. lato-lanceol. ferratis: caule inermi: corymbis squamosis. *Syst. veg. ed. 14.*  
*In India h.*  
 Arb. magna. Fol. petiol. obtuse ferrata, crassiuscula. Corymbi terminal. bracteis subulatis.
9. *Oxyacantha*. C. fol. obtusis, subtriandris, ferratis. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. Austr. 3. tab. 292. f. 2. Fl. Dan.*



tab. 634. Black. tab. 149. Knorr. del. I. tab. S.  
Dod. pempt. 751.

In Europæ sepibus h.

Arbuse. diffusa, difformis, spinosa. Fol. glabra, nitida, quandoq. integra, apice retuso. Fl. corymbosi. Petal. alba, odora, margine crispato. Bacca rubra, umbilico nigro. *Var. inermis*: & altera fl. pleno.

10. *monogyna*. C. fol. subtrifid. acutis: fl. monogynis. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. Austr. tab. 292. f. 1. Barr. ic. 563.*

In Austria &c. h.

Fol. glaberr. magisq. nitentia, quam in C. *Oxyacantha*. Pedunc. nullis villis pubescunt. Lacinia calyc. reflexæ. Styl. unicus.

11. *Azarolus*. C. fol. obtusis, subtrifidis, subdentatis. *Syst. veg. ed. 14.*

*Mespilus aronia*. Bauh. hist. I. p. 67.

b. *Mespilus* &c. Poch. orient. tab. 85.

Colitur in hortis h.

Arb. Fol. alterna, petiol. laciniis latis. Pomum subrotund. rubrum, vel luteum. *Differt ab Oxyacantha sola magnitudine, cum omnia sint quadruplo ma.*

12. *maura*. C. fol. oblongis, apice dentatis. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*

In Mauritania h.

*Statura, & facies C. Oxyacanthæ*. Frutex cortice cinereo. Spinæ in meo (Lin. fil.) nullæ. Fol. obtusa, lævia, 3-4. dentibus acutis. Fl. corymbis ramosis, similes *Oxyacanthæ*.

13. *villosa*. C. fol. oblong. acuminat. ferratis, villosis: fl. umbella composita. *Syst. veg. ed. 14. Thumb. Jap.*

In Japonia h.

Caul. fruticosus. Fol. 2--pollic. alterna, petiol. venosa. Petioli vix unguicul. Fl. terminal. Fruct. villosus.

14. *lævis*. C. fol. ovatis, acuminat. glabris, ferratis: fl. umbella subsimpl. *Syst. veg. ed. 14. Thumb. Jap.*

In Japonia h.

Caul. fruticosus, glaber. Rami, & ramuli alterni, patent. cinerei. Fol. e gemmis alternis, 3-4-pollic. inæqual. petiolat. patentissima, plana, tenuia. Fl. terminal. patentiss. Petal. 5. lineas longa, ovata, integra, alba. *Differt a*

*priore, fol. magis in medio latis, magisq. utrimq. adtenuatis; fl. adgregatis, nec solitar. umbel. subsimpl.*

15. *glabra*. C. fol. oblong. acutis, glabris, ferratis: fl. panicula composita. *Syst. veg. ed. 14. Thumb. Jap.*

*In Japonia h.*

Arb. Rami, & ramuli subverticillati, patentes, striati, glabri. Fol. sparsa, digital. patentiss. margine parum reflexo, perennant. venosa, subtus pallidiora. Petioli patentes, angulati. Panicula subsaffigiata. Petal. patent. obovata, obtusa, integra, basi villosa, alba.

## TRIGYNIA.

752. SORBUS. C. Al. 5-fid. Petal. 5. Bacca infera, 3-sperm.

1. *aucuparia*. S. fol. pinnatis, utrimq. glabris. *Syst. veg. ed. 14. Black. tab. 173. Crantz. Austr. tab. 1. f. 4. Du-ham. arb. 2. tab. 73. Bauh. hist. 1. p. 62.*

*In Europæ frigidioribus h.*

Arbor humilis, erecta, ramosa. Fol. imparipinn. 8-iuga: pinnæ semisessil. lanceol. ferratæ, basi integerr. Pedunc. umbellati, ramosi. Cal. conicus, lanuginosus. Petal. exigua, subrotunda, cava, patula, alba, odora. Bacca ovata, rubra, vel e luteo-rufescens, acida, non edulis. *Var. fol. extremis confluentibus.*

2. *hybrida*. S. fol. semipinn. subtus tomentosis. *Syst. veg. ed. 14. Lin. dec. tab. 6. Fl. Dan. tab. 391.*

*In Thuringia, Gotlandia h.*

*Statura, & foliatura aliquatenus Crat. Ariæ. Flores, corymbus, & pistil. 3. S. aucupariæ. Sapor medius inter acidum, & dulcem.*

3. *domestica*. S. fol. pinnatis, (iunioribus) subtus villosis. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. Austr. 5. tab. 447. Crantz. Austr. tab. 2. f. 3. Black. tab. 174. Lob. ic. 2. pag. 106.*

*In Europæ calidioribus h.*

Arbor vasta, comosa. Foliol. sub 7-iuga, opposita, sessil. acute serrata. Fl. ramei, subco-

rymboſi. Petal. albida. Bacca pyriform. per  
maturitatem ſubfuſa, loculis 5.

753. SESUVI- Cal. coloratus, 5-part. Cor. o. Capſ. ovata, 3-  
UM. locul. circumſciſſa, polyſperma.

1. *Portulaca*- S. *Jacq. am. tab. 95. ed. 2. picta tab. 142.*

*ſtrum*, *Portulaca* &c. *Herm. par. tab. 212. Pluk. alm.*  
*tab. 216. f. 1. Plum. ic. 223. f. 2.*

*Hallimus* &c. *Rumph. amb. 5. tab. 72. f. 1.*

*In Indiæ maritimis* ☉.

Planta ſucculenta. Caul. procumbenti-erecti, diſ-  
fuſi, ramoſi, craſſi, glabri. Fol. ſeſquipollic.  
oppoſita, ſemiamplexicaul. ovali--oblunga, a-  
cuta, integerr. craſſa, ſupra craſſiſcula, ſub-  
tus convexa, glabra, avenia. Pedunc. axillar.  
1-fl. Fl. inodori, extus glauco--virent. iatus  
candidi, roſei, purpur. Capſula circa medium  
horizontaliter dehifcens.

## PENTAGYNIA.

754. MESPILUS. **C**Al. 5-fid. Peral. 5. Bacca infera, 5--  
ſperma.

1. *Pyracantha*. M. ſpinofa, fol. lanceol--ovat. crenatis; calyc.  
fructus obtuſiſ. *Syſt. veg. ed. 14.*

*Rhamnus* 3. *Lob. ic. 2. p. 182.*

*Uva Urſi*. *Dalech. hiſt. 164.*

*In Italiæ, Gallo--provincia ſepibus* †.

Arbuſc. Fol. glabra. Fl. racemoſi, e luteo--  
ſubrubri. Baccæ rubræ.

2. *germanica*. M. inermis; fol. lanceolat. ſubtus tomentofiſ: fl.  
ſolitar. ſeſſil. *Syſt. veg. ed. 14. Black. tab. 154.*  
*Ludw. eâ. tab. 38.*

b. M. maior. *Du-ham. arb. frut. 1. tab. 3.*

*Nefpolo* 2. *Matth.*

*In Europa australi* †.

Arbuſc. ramis villoſiſ. Fol. ovali--lanceol. ad  
apicem ſerrata, ſubvilloſa, petiolis breviff.  
canaliculat. Cal. hirsutus, bractæ longitudine  
cor. Petal. magna, ſubrotunda, dilatata, e-  
marginata, undulata, alba, aut dilute rubent.  
Bacca ſubrotunda, hirsuta, ruſcens.



3. *arbutifolia*. M. inermis; fol. lanceol. crenatis, subtus tomentosis. *Syst. veg. ed. 14.*

Sorbus &c. *Herm. Lugd. tab. 669.*

*In Virginia* h.

Arbuse. similis M. *Chamæespilo*, 2-3-cubit. & ultra, ramosa. Fol. arbutiform. Fl. in summis ramulis subumbellati, candidi, *Sorbo Aucupariæ* similes, sicuti & baccae: sed minores.

4. *Amelanchier*. M. inermis; fol. ovalibus, serratis, carinatis, subtus hirsutis: fructu globofo, multiloculari. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. Austr. 3. tab. 300. Mill. ic. 178. f. 1. Barc. ic. 527.*

*Vitis idæa* 3. *Clus. hist. 1. p. 75.*

*In Italia, Helvetia &c. h.*

*Adfinis maxime duobus sequent. Frutex 3-7-ped. Fol. e gemmis plura; in ramulis elongatis alterna, petiol. ovata, vel ovalia, obtusa. Fl. 4-10. odori. Cal. villosus. Petal. plana, integerr. vel emarginata, supra lanuginosa, ochroleuca. Bacca sphaerica, primum virid. dein rubra, tandem coeruleo-nigricans. Tենella est villosa-tomentosa.*

5. *Chamame-spilus*. M. inermis; fol. oblongo-ovalibus, acutis, serratis, glabris: fl. corymbofo-capitatis: fruct. ovato, 2-locul. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. Austr. 3. tab. 231.*

Sorbus &c. *Crantz. Austr. tab. 1. f. 3.*

*Cotoneaster. Clus. hist. 1. p. 63.*

*In alpinis Italicis, Austriacis &c. h.*

Frutex humilis, cubital. & paulo altior, prostratus, distortus, & flexuosus, ramis fuscescent. Fol. alterna, petiol. nitida, supra sat virent. subtus cum virore pallent. tenera lanata, lanceol. vel ovalia. Stipul. magnæ, longæ, rubentes, deciduæ. Cyma densa, non ampla, intra fol. veluti abscondita. Cal. sæpe purpurea tinctus. Petal. erecta, obverse ovata, rosea. Baccae subrotundo-ovat. nitidæ, ex aurantio-rubent. vel nigræ, alba lanugine oblitæ. *Dentes cal. tubo suo breviores; in Amelanchier tubo longiores. Flos digynus recentioribus Botanicis adparet.*

*Ad Cratægum spectat.*

6. *canadensis*, M. inermis; fol. ovato-oblong. acutiuscul. serratis, glabris. *Syst. veg. ed. 14.*

*Pyrus Botryapium*. *Lin. Suppl.*

*In Canada, Virginia* h.

*Simil. M. Amelanchier. Tenera lanata, adultior nuda. Rami elongati.*

7. *japonica*. *M. inermis*; fol. oblong. obtusis, apice ferratis, subtus tomentosis. *Syst. veg. ed. 14. Thumb. Jap.*

*Bywa. Kämpf. am. exot. Fasc. V. p. 800.*

*In Japonia* h.

*Arb. excelsa, vasta. Rami crassi, nodulosi, ramulis similibus, tomentosis. Fol. spitham. alternata, subpetiol. obtusa, inferius adtenuata, erecta, apice recurvo, nervis parallelis, supra læte virid. glabra, subtus cinereo-tomentosa, nervo medio crasso. Fl. in apice ramulor. spicati. Spica composita, tomentosa. Squamæ, seu bractæ ovatæ, obtusæ, tomentosæ. Bacca ovata, Cerasi magnitudine, subtoment. flava, sapore acido-dulci, fere Pomi.*

8. *Cotoneaster*. *M. inermis*: fol. ovatis, integerr. subtus tomentosis. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 112. Crantz. Austr. fasc. 1. tab. 2. f. 1.*

*Chamæmespilus &c. Clus. hist. 1. p. 60.*

*In Europæ alpihus* h.

*Frutex humilis, difformis, distortus, cortice atro-purpur. splendente. Fol. superne ex nigro-virid. lævi tomento perfusa, quandoq. apice incisa. Fl. laterales fol. breviores, conferti, cernui, stipula rubra donati. Petal. brevia, subrotunda, alba, pallida linea ornata. Bacca exsucca, rubra, insipida.*

*Xanthocarpus*. *M. spinosa*; fol. subuneifor. crenatis: fl. solitar. laciniis calycinis subfoliaceis, inciso-ferratis longis, reflexis: fruct. subturbinat. punctato-verrucosis. *Lin. Suppl.*

*In Amer. septentrionali* h.

*Fruticulus spinosus, rigidus. Fol. sesquipollic. crassiusc. subtomentosa; petiol. breviss. P. den- culi ex apice ramulor. solitar. tomentosi. Bractæ 2-3. Fruct. magnitudine Pruni insititiæ, pallide luteus.*

*Phanopyrum*. *M. spinosa*; fol. cordatis, 3-5-7-fid. ferratis, glabris: fl. corymbosis, segmentis calyc. de-

ciduis: fruct. depresso-globosis, late umbilicatis; nucibus apice denudatis. *Lin. Suppl.*

*In Amer. septentrion. h.*

Arb. medioc. magnitudinis. Rami spinosi, albo-maculati. Fol. magnitudine *Betulae albae*, acumin. Bract. minimae, solitar. subulatae, deciduae. Fl. *Crataegi Oxyacanthae* paulo min. Fruct. magnitudine *Ribesios*, rubri, coccinei. Florescentia ferotina, & ultima huius generis.

755. PYRUS. Cal. 5-fid. Petal. 5. Pomum inferum, 5-locul. polysperm.

1. *communis*. P. fol. ferratis, laevibus: fl. corymbosis. *Syst. veg. ed. 14. Black. tab. 453.*

*In Europa h.*

Arb. spinosa. Fol. ovat-lanceol. Pedunc. axillar. longi. Petal. alba, vel albo-purpur. Fruct. obverse conicus.

2. *Pollueria*. P. fol. ferratis, subtus tomentosis: fl. corymbosis. *Syst. veg. ed. 14. Knoop. Pomolog. 2. tab. 4. Bauh. hist. 1. p. 59.*

*In Germania h.*

Fol. ovata, superne pubescent. Petioli tomentosi. Corymb. elongatus, tomentosus. Fl. numerosi, priore multo minores.

3. *Malus*. P. fol. ferratis: umbellis sessil. *Syst. veg. ed. 14.*

*M. sylvestris. Black. tab. 178.*

*M. rubelliana. Black. tab. 141.*

*In Europa h.*

Habitus expansus. Fol. praecipue subtus, villosa, brevius mucronata, minus manifeste ferrata, quam *Pyrus comm.* Petal. rosea, odora.

4. *baccata*. P. fol. ferratis: pedunc. confertis: pomis baccatis. *Syst. veg. ed. 14.*

*Crataegus &c. Ann. ruth. tab. 31.*

*In Sibiria, Dauria h.*

Arb. ramis laevibus. Fol. *Corni*, ovata, argute ferrata, utrimq. laevia. Petioli longitudine fol. basi adnectentes stipulas 2. lineari-lanceol. Pedunc. axillar. conferti, simpliciss. 4. filiform. 1-fl. Petal. maiuscula, ovalia, concava, alba. Bacca magnitudine *Ribesios nigri*, subrotunda, rubra. Cal. minutus, deciduus.

5. *coronaria*. P. fol. ferrato-angulosis, umbellis pedunculat. *Syst. veg. ed. 14.*

*In Virginia.*



Fol. *Mali*, sed magis glabra, & argutius ferrata. Cal. glaber, intus tomentosus. Fl. odori.

6. *Cydonia*. P. fol. integerr. fl. solitar. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. Austr. 4. tab. 342. Ludw. ed. tab. 56. Black. tab. 137. Du-ham. Arb. arbusc. 1. tab. 83.*

Cotogno. *Matth.*

*Colitur in Europæ hortis h.*

Habitus humilior. Cal. expansus, ferratus, villosus. Petal. ampla, obtusiss. carnea. Pomum oblong. vel subrotund. flavum, lanugine obsitum.

7. *nivalis*. P. fol. integerr. fl. corymbosis. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. Austr. 2. tab. 107.*

*In marginibus sylvarum montosarum h.*

Arb. medioc. magnitudinis. Fol. breviter petiol. obverse ovata, obtusiusc. cum parvo acumine, apice obsolete crenata, supra virid. cum pilis albis, subtus tomento incana. Fl. elegantes, sub 12. odori. Cal. valde tomentosus. Petal. ampla, ovata, obtusiss. Fruct. depresso-subrotund. purpuro-virens.

8. *salicifolia*. P. fol. lineari-lanceol. canis, subtus albo-tomentosis: fl. axillar. solitar. subsessilibus. *Syst. veg. ed. 14. Linn. Suppl. Pallas. it. 3. tab. N. f. 3. P. sylv. orient. T. C.*

*In Dauria h.*

Arb. orgyal. & ultra facie *Mali sylv.* ramosiss. Fol. circa turiones quasi fasciculatim conferta, in spinescentibus ramulis alterne sparsa, integerr. *Salicis arenariæ* simil. Fl. parvi.

9. *japonica*. P. fol. cuneatis, glabris: fl. solitar-binis. *Syst. veg. ed. 14. Thumb. Jap.*

*In Japonia h.*

Suffrutex, vel arbuscul. interdum arbor, tota glabra. Rami, & ramuli alterni, flexuosi, cinerei. Fol. in ramulis, e singula alterna gemma plura, pollic. inæqual. subpetiol. obtusa, interdum emarginata, supra nervosa, sature virid. subtus reticulata, pallida, patent. glabra. Fl. in ramulis alterni, subpeduncul. Petal. purpuro-incarnata. Pomum magnitudine Juglandis, subglobosum, glabrum.

*spinosa*.

P. ramulis mucronat. fol. oblong. *Forsk. Suppl. Æg.*

*In Natolia h.*

Arb. magna. Spinæ laterales minores. Fol. petiol. utrimq. glabra, sæpe obtusa, sesquipollic. digito angustiora, supra nitida.

*Hadiensis*. P. fol. ternatis, lanceolat. integris, rugosis, venis subtus griseis. *Forsk. Æg. Arab.*

*In Arabia* h.

Cum *Cydonia* europæa vix potest conciliari.

756. TETRA- Cal. 4-5-part. Petal. o. Drupa infera, 5-4-gon-  
GONIA. na, 5-4-locul.

1. *fruticosa*. T. fol. linearibus. *Syst. veg. ed. 14. Mill. ic. tab. 263. f. 2.*

*Tetragonocarpus* &c. *Comm. hort. 2. tab. 103.*

*Evonymo* &c. *Seb. thes. 2. tab. 11. f. 8.*

*In Æthiopia* 24.

Caul. ramosi, primum virides, dein fusci. Fol. succulenta, virid. in alis foliola plurima, seu ramorum rudimenta. Fl. in racemum terminalem digesti, seu solitar. breviter peduncul. lutei.

2. *herbacea*. T. fol. obovato-lanceol. *Syst. veg. ed. 14. Mill. ic. tab. 263. f. 1.*

*Tetragonocarpos* &c. *Comm. hort. 2. tab. 102.*

*In Æthiopia* h.

Rad. crassa, spithamam longa, subflava. Caul. humifusi. Fol. inordinata, crassa, succulenta. Fl. longe peduncul. lutei.

3. *jvæfolia*. T. erecta, glabra: fol. petiolat. ovat-lanceol. ferratis: petal. deciduis. *Syst. veg. ed. 14. Linn. Suppl.*

*Cercodia erecta*. *Comm. Gott. 1780. tab. 1. ubi male ramus erectus.*

*Haloragis alata*. *Jacq. misc. Austr. 2.*

*In nova Zeelandia* h.

Suffrutex 2-ped. ramosus, erectus, paniculat.

Caul. 4-gon. ruber. Rami oppositi. Fol. pollicar. horizontaliter opposita, inæqualiter serrata, ferraturis pungentibus, plana, scabra, venosa. Stipul. nullæ. Fl. in apice ramorum, axillar. parvi, teneri, pedunculati, viridi-rubicundi. Pedunc. post efflorescentiam reflectuntur intra folia. Petal. 4. lanceol. medio dilatata, patentiss. caduca. Pericarp. album. Nux nigrescens.

Cum Stam. sint tantum 8. & petal. 4. caduca, hinc ab hoc genere removenda.

4. *hirsuta*. T. herbacea, hirsuta, procumbens: fol. ovatis, villosis: fl. axillar. ternis, sessil. *Syst. veg. ed. 14. Linn. Suppl.*

*Ad cap. b. Spei.*

5. *spicata*. T. herbacea, glabra, erecta: fol. inferioribus ovatis; supremis lanceol. glabris: fl. racemosis. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*

*Ad cap. b. Spei.*

6. *expansa*. T. herbacea, ramis expansis, elongatis: fol. parabolicis: fl. plerumq. solitar. fruct. cornuto. *Syst. veg. ed. 14. Comm. Gout. 1783. tab. 5. Scop. ded. Inf. fasc. 1. tab. 14. Pallas. hort. Demidof. cum icone.*

T. cornuta. *Banck. in litt.*

*Habitat . . . ☉.*

Caul. 1-pl. pedal. erecti, basi ramosi, ramis patulis, tuberculosis. Fol. alterna, crassiuscula, tuberculosa. Petioli canaliculati, patuli, sensim dilatantur in paginam ex obtusis angulis convergentem, cuius ambitus undulatus, & subsinuatus. Fl. axill. solitar. sessil. aut breviter peduncul. Cal. granis lucidis adpersus. E basi singuli dentis surgit lamella petaliform. subovata, luteo-virid. granulata. Fruct. 4-gonus, 4-cornis, niger.

7. *japonica*. T. fol. subcordat. ovatis, punctatis: fl. axillar. solitar. *Syst. veg. ed. 14. Thumb. Jap.*

*In Japonia.*

Tota planta succulenta, glabra. Caul. herbaceus, decumbens, pedal. simpl. angulatus. Fol. 2-pollic. alterna, petiolata, acuta, subangulata, integra. Petioli breves, sensim in folium dilatati. Fl. peduncul. Drupa magnitudine Pisi.

- cristallina*. T. fol. ovatis, cristallino-papillofis: fl. axillari-bus. *Herit. Stirp. nov. fasc. 4. tab. 39.*

*In Limæ arenosis ☉.*

Planta spithamea, tota papillosa, cristallina. Rad. ramosa. Cotyled. 2, sessiles, oblong. obtusæ, carnosæ, subtus rubellæ. Caul. suberectus, vix pedal. teres, crassitie calami, ramosus. Rami imi tantum oppositi, apice dichotomi, patuli. Fol. alterna, inferiora bina opposita, sessil. acuta, integerr. trinervia, subcarnosa, mollia, patent. læte virid. conco-



lora, summa sensim minora, 18-30. lin. longa, 10-15. lin. lata. Fl. solitar. raro verticaliter bini, supero ab ala remoto, axillares, erecti, subsessiles, fulvi, 4. lin. lati. Pedunc. teretes.

757. MESEMBRIANTHEMUM. Cal. 5-fid. Petal. numerosa, linearia. Caps. infera, carnosae, polysperm. *Folia carnosae, succulentae.*

\* *Cor. albis.*

1. *nodiflorum*. M. fol. alternis, teretiuscul. obtusis, basi ciliat. *Syst. veg. ed. 14.*

Kali &c. *Morif. hist. 3. f. 5. tab. 33. f. 7. Col. echpr. 2. tab. 73. Alp. Æg. tab. 127.*

*In Ægypto, Neapoli, locis arenosis ☉.*

Tota planta papulosa. Caul. diffuso-decumbens. Petal. angustiss. sed plana, basi connata, alba.

2. *crystallinum*. M. fol. alternis, ovatis, papulosis, undulatis. sessilibus: calyc. late ovatis, acutis, retusis. *Syst. veg. ed. 14. Dill. elth. tab. 180. f. 221.*

*Ficoides &c. Bradl. succ. 5. tab. 15. f. 48.*

*In Africa ☉.*

Planta magnitudine varia, tota vesiculis pellucidis prædita. Caul. primum erectus, digital. fol. oppositis. Ramuli horizontal. longiss. prostrati, oppositi, alterne ramosi. Fol. apice purpur. inferiora lata. Petal. albidia.

3. *copticum*. M. fol. semiteret. distinctis, papulosis: fl. axillar. subsessilibus: calyc. 5-fid. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. hort. 3. tab. 3.*

Kali III. *Alpin. Ægypt. tab. 128.*

*In Ægypto ☉.*

Statura, & magnitudo M. *nodiflori*. Caul. brevis, herbaceus, trichotom. ramosissim. ramis rubent. inferne aphyllus. Fol. opposita, terminalia, nulla in internodiis longitudine internodior. Fl. in divaricatione ramorum, solitar. sessiles. Cal. corolla longior. Petal. minuta, erecta, ovata, sub 14. pallida. Caps. turbinate, retusa, angulis ciliatis, compressis.

4. *geniculiflorum*. M. fol. semiteret. distinctis, papulosis: fl. axillar. sessilibus: calyc. 4-fidis. *Syst. veg. ed. 14. Dill. elth. tab. 205. f. 261.*

*Ficoides* &c. *Bradl. Succ. 5. tab. 17. f. 34. Pet. gaz. tab. 78. f. 3.*

*Ad cap. b. Spei* H.

Caul. rectus, teres, articulatus, iunceus, e cinereo-subfuscus, papulosus. Fol. sesquipollic. lanceolato-linear. infima connata, e viridi--argenteo nitore prædita, caduca. Petal. subalbida. Styli 4. Fruct. 4-locul.

5. *noctiflorum*. M. fol. semicylindric. distinctis, impunctatis: fl. pedunculat. calyc. 4-fid. *Syst. veg. ed. 14. Knorr. del. 1. tab. G. 8. Dill. elth. tab. 206. f. 262. & b. f. 263.*

*Ad cap. b. Spei* H.

Caul. ramosus, ob folior. gravitatem quaquaversum sparsus, tortuosus, lævis, spadiceus. Fol. cruciata, lævia, glauco--virent. Fl. axillar. interdium clausi, per noctem expansi, odori. Petal. angusta, intus alba, extus è phœnic--purpurasc. Styl. 4. Fruct. 4-locul.

6. *splendens*. M. fol. subteretibus, distinctis, congestis, recurvis, impunctatis: calyc. terminalibus, digitifor. *Syst. veg. ed. 14. Dill. elth. tab. 204. f. 260.*

*Ficoides* &c. *Bradl. Succ. 1. tab. 6.*

*Ad cap. b. Spei*.

Caul. punctis albidis in ramis non ultimis. Fol. triquetro--teretiufcula, apice patula, acuta; axillar. vero incurva: omnia conferta, breviora, nitida. Fl. ante, & post meridiem expansi. Cal. erectus, muticus. Petal. angusta, flavescenti-albida.

7. *umbellatum*. M. fol. subulatis, connatis, scabrido-punctatis, apice patulo: caul. erecto: corymbo trichotomo. *Syst. veg. ed. 14. Dill. elth. tab. 208. f. 256.*

*Ficoides* &c. *Herm. par. tab. 166. Bradl. Succ. 4. tab. 34. Pluk. phyt. 117. f. 1.*

*Ad cap. b. Spei* H.

Caul. lignosus, sesquiped. ramis oppositis. Petal. angusta, alba, odora.

8. *expansum*. M. fol. planiuscul. lanceolat. impunctatis, patentibus, distinctis, oppositis, alternisque, remotis. *Syst. veg. ed. 14. Knorr. del. 2. tab. M. 3. Dill. elth. tab. 182. f. 223.*

Ficoides &c. *Pet. gaz. tab. 78. f. 10. Bradl. Succ. 3. tab. 16.*

*Ad cap. b. Spei 24.*

*Simil. M. tortuoso: differt caulibus ramosioribus; altius surgentibus; ramis mollioribus: fol. la-rioribus, tenuioribus, viridioribus, non fasciculatis, sed cruciatis. Fl. ampli. Petal. intus luteola, extus albida, dilutissima flavedine adspersa.*

9. *Tripolium. M. fol. alternis, lanceolat. planis, impunctat. caulibus laxis, simplicibus: calyc. pentagonis. Syst. veg. ed. 14. Dill. elth. tab. 179. f. 220. Ficoides &c. Bradl. Succ. 5. tab. 47. Pluk. mant. tab. 329. f. 4.*

*Ad cap. b. Spei ♂ 24.*

*Cauliculi pl. 3-4. triental. reclinati. Fol. radical. humifusa, Tripolio simil. bina ad genicula inferiora; terna--quaterna ad superiora, linea albida per medium excurrente. Petal. angusta, candida.*

10. *calamifor-me. M. acaule: fol. subteret. connatis, adscendent. impunctatis: fl. octogynis. Syst. veg. ed. 14. Mill. ic. tab. 176. f. 1. Dill. elth. tab. 186. f. 228.*

*Ficoides &c. Bradl. Succ. 2. f. 19.*

*Ad cap. b. Spei 24.*

*Fol. quamvis basi connata recta, tamen sæpe horizontaliter patent. apice recurva, punctato-scabrida, digitum circiter longa, adparent potius rotunda, etsi triquetra, decussatim conferta, sature virid. nebula glauca, & punctis multis parvis virid. adspersa, mucrone obtuso, viridi, vel purpur. Petal. ampla, angusta, candida.*

11. *apetalum. M. fol. lineari-sublanceol. subtus muricatis: caul. prostratis. Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*

*Ad cap. b. Spei.*

*Planta rota papulosa. Caul. herbacei, teretes, rubent. Fol. succulenta, opposita, supra canaliculata, subtus semicylindr. obtusa. Pedunc. breves, 1-fl. Cal. foliol. inæqual. Petal. 24. distantia, breviss. setacea, alba, quasi totidem filamenta.*

12. *criniflorum. M. fol. ovatis: scapis 1-fl. Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*

*Ad cap. b. Spei.*



Planta magnitudine *Bellidis perennis*. Fol. petiol. punctis cryſtallino--papillois. Scap. pollicar. Cal. profunde 5--ſid. Petal. 5. oblonga, pedicellata, alba.

13. *cordifolium*. M. fol. cordatis, obtuſis: caulibus proſtratis. *Syſt. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*

*Ad cap. b. Spei.*

Caul. herbacei, ped. al. Fol. oppoſita, oppoſitionibus remotis, petiol. pollicar. Fl. laterales, alterni, ſolitar. pedicellati, forte albi. Cal. foliol. oppoſitis; ma. ovatis, reliquis minorib.

\*\* *Cor. rubicundis.*

14. *bellidiflorum*. M. acaule; fol. triquetris, linearibus, impunctatis; apice trifariam dentatis. *Syſt. veg. ed. 14. Knorr. del. 1. tab. G. 5. a. n. 1. Dill. elth. tab. 189. f. 233.*

*Ad cap. b. Spei 4.*

Fol. conferta, decuſſata, 1-2-unc. ſupra plana, ſubtus dorſo ſubacuto; humiſuſa, vel modice erecta, ſature glauca. Fl. e mediis alis prodeunt, primum candidi, ſplendentes, dein pallidiores, purpureo--albi, linea purpurea utrimq. ſtriati.

15. *deltoides*. M. fol. triquetris, deltoidibus, dentatis, impunct. diſtinctis. *Syſt. veg. ed. 14. Knorr. del. 1. tab. G. 5. b. n. 1. Dill. elth. tab. 195. f. 246.*

*Ficus &c. Volk. heſp. 224. f. 5.*

- b. M. *Dill. elth. tab. 196. f. 247. Knorr. del. 1. tab. G. 5. b. n. 2.*

- y. M. *Dill. elth. tab. 195. f. 243. 244.*

*Ad cap. b. Spei h.*

Caul. frutiſoſus, 2--ped. & ultra. Fol. apice obtuſe acumin. baſi attenuata. Pedunc. 2--phyll. 1-fl. Cor. dilute purpuraſc. odore *Oxyacanthæ*. Stam. erecta in conum, alba. Anth. flavæ.

16. *barbatum*. M. fol. ſubovatis, papuloſis, diſtinctis, apice barbatis. *Syſt. veg. ed. 14. Mill. ic. tab. 176. f. 3. Dill. elth. tab. 190. f. 234.*

*Ficoides &c. Pet. gar. tab. 17. f. 6. Bradl. Succ. 1. tab. 5. 15. Volk. heſp. tab. 124. f. 6.*

- b. M. *Dill. elth. tab. 190. f. 235.*

- y. M. *Dill. elth. tab. 190. f. 236.*

*Ad cap. b. Spei h.*

Caulic. procumbent. Fol. teretia, papillis minimis tecta. Cal. foliolis apice barbaris, æque ac fol. plantæ. Petal. minima, cuspidata, purpuro--violac. interiora, quæ cingunt flamina, alba.

17. *hispidum*. M. fol. cylindric. papulosis, distinctis: caule hispido. *Syst. veg. ed. 14. Mill. ic. 176. f. 3. Dill. elth. tab. 214. f. 278.*

b. M. *Dill. elth. tab. 214. f. 280. 279. Knorr. del. tab. 2. M. 5.*

y. M. *Dill. elth. tab. 215. f. 281.*

Ficoides &c. *Bradl. Succ. 4. tab. 35.*

Ficus &c. *Volk. hesp. tab. 224. f. 2.*

*Ad cap. b. Spei h.*

Caul. frutescens, 1-2-ped. villis reflexo-patent. Fol. obtusa, fere glauca. Pedunc. valde dorsum scaber. Cal. muticus. Flos odoratus, simillim. priori, e violaceo sature purpur.

18. *villosum*. M. fol. pubescent. connatis, impunctatis: caule piloso. *Syst. veg. ed. 14.*

*Ad cap. b. Spei h.*

Caul. 2--sesquiped. lignosus, filiformis, inferne cinereus; in medio purpur. superne viridis, articulatus, pubescens, villis vix extantibus. Fol. linear. semiteret. canaliculato--plana, opaca, margine, præcipue versus basin, villis adperso. *Simile M. tenuifol. sed fol. non punctata.*

19. *scabrum*. M. fol. subulat. distinctis, subtrus undiq. punctato--muricatis: calyc. muticis. *Syst. veg. ed. 14. Dill. elth. tab. 197. f. 251.*

*Ad cap. b. Spei h.*

Caul. procumbent. frutescentes. Fol. ad genicula plura, triquetra, patent. latere super. lævia, glauca, minoribus intermixtis. Fl. solitar. vel pl. sed pauci. Petal. e violac-purpur. dein pallescentia.

20. *emarginatum*. M. fol. subulat. congestis, subscabris: calyc. spinosis: petalis emarginatis. *Syst. veg. ed. 14. Dill. elth. tab. 197. f. 250.*

Ficoides &c. *Pet. gaz. tab. 77. f. 3.*

*Ad cap. b. Spei.*

Caul. frutescens, procumbens, ramis tortuosis, pendulis. Fol. incurva, glauco--sature virid. punctulis veluti crispa. Fl. pl. Petal. e purpuro-viride violac. exteriora ma.

21. *uncinatum*. M. articulis caulinis terminatis fol. connatis, acuminat. punctatis, subtus dentatis. *Syst. veg. ed. 14. Dill. elth. tab. 193. f. 239.*  
 Ficoides &c. *Bradl. Succ. 3. tab. 27. 26. Burm. Afric. tab. 26. f. 3.*  
 b. M. *Dill. elth. tab. 193. f. 240.*  
 Ficoides &c. *Bradl. Succ. 5. tab. 46.*  
*Ad cap. b. Spei h.*  
 Fol. brevica, obsolete trigona, conica, acuta, reflexa, sub apice 1-3. dentibus reflexis. Pedunc. axill. foliosi. Petal. dilute purpur.
22. *spinofum*. M. fol. tereti-triquetris, punctatis, distinctis: spinis ramosis. *Syst. veg. ed. 14. Dill. elth. tab. 208. f. 265.*  
 Ficoides &c. *Bradl. Succ. tab. 39.*  
*Ad cap. b. Spei h.*  
 Caul. cubital. & ultra, frutescent. valde ramosi. Spinæ ad apices ramorum, laterales, triplices, 2-3-fid. Fol. opposita, oblonga, glauca, cum punctis viridibus, minoribus intermixtis. Fl. parvi. Petal. dilute violac-purpur.
23. *tuberosum*. M. fol. subulat. papulosis, distinctis, apice patulis: rad. capitata. *Syst. veg. ed. 14. Dill. elth. tab. 207. f. 264.*  
*Ad cap. b. Spei h.*  
 Caul. præ cæteris arboreus, crassus, solidus, firmus. Rami seniores interdum spinosi. Fol. ovata, teretia, apice reflexo. Petal. dilute rubra.
24. *tenuifolium*. M. fol. subfiliform. distinctis, glabris, internodio longioribus: caulibus procumbent. *Syst. veg. ed. 14. Dill. elth. tab. 201. f. 256.*  
 Ficoides &c. *Bradl. Succ. 1. tab. 9. Moris. hist. 3. f. 12. tab. 8. f. 6.*  
*Ad cap. b. Spei h.*  
 Caul. pl. filiform. lignosi. Rami ex singulis alis superior. Fol. opposita, pugionem referentia, gracilia, glaberr. Pedunc. longi. Fl. ampli, coccinei, speciosi, multis petalis superioribus meridie expansi, diutius durantes.
25. *stipulaceum*. M. fol. subtriquetris, compressis, incurvis, punctatis, distinctis, congestis, basi marginatis. *Syst. veg. ed. 14. Dill. elth. tab. 209. f. 267. 268.*  
*Ad cap. b. Spei h.*



*Simile M. noctiflora, sed differt fol. maioribus, fere papillofis, non connatis, nec ramis adnatis. Caul. florens rigidus, subgriseus. Fol. linear. carnosa, lateribus valde compressis, mucronata. Fl. subcorymb. purpur. Stam. lutea.*

26. *crassifolium*. M. fol. semicylindr. connatis, impunctat. apice triquetris: caule repente, semicylindrico. *Syst. veg. ed. 14. Knorr. del. 2. tab. M. 4. Dill. elth. tab. 201. f. 257.*

*Ficoides &c. Bradl. Succ. 4. tab. 38.*

*Ad cap. b. Spei 4.*

Caulicul. palm--dodrant. Fol. glabra, subnitida, virid. Fl. solitar. peduncul. parvi. Petal. e purpure--violac. cito marcescentia.

27. *glomeratum*. M. fol. teretiuscul. compressis, punctatis, distinctis: caule paniculato, multisl. *Syst. veg. ed. 14. Dill. elth. tab. 213. f. 274.*

*Ad cap. b. Spei 5.*

Caul. diffusus. Fol. trigona, angulis obtusis, glauca, punctis diaphanis. Ramulorum rudimenta ex alis, fol. confertiss. incurvis. Cal. laciniis apice membranaceis, sub apice spina patula. Cor. purpur. M. *deltoidis*.

28. *loreum*. M. fol. semicylindr. congestis, recurvis, basi interiore gibba connatis: caule pendulo. *Syst. veg. ed. 14. Dill. elth. tab. 200. f. 255.*

*Ad cap. b. Spei 4.*

In solo libero humi repunt lora, & denuo radices agunt. Fol. longa, 1-2--unc. Flos ex alis folior. infimis rami, pedunc. brevi. Cal. æqualis, mediocris. Petal. lanceol--linear. purpur. Stam. albida.

29. *filamentosum*. M. fol. æquilateri-triuetris, acutis, subpunctat. vix connatis; angulis scabris: ramis hexagonis. *Syst. veg. ed. 14. Dill. elth. tab. 211. f. 273.*

*Ad cap. b. Spei 4.*

Caul. prostrati, 2--cubit. superne purpur. Fol. satis crassa. Fl. sessiles, pentagyni. Petal. parva, subulata, nec lanceol. obsolete violac.

30. *falcatum*. M. fol. acinaciform. impunctat. connatis, angulo carnali scabris: petalis lanceolat. *Syst. veg. ed. 14.*

*Ad cap. b. Spei.*

Fructus præ cæteris baccatus.

31. *forficatum*. M. fol. acinaciform. obtusis, impunctat. connatis, apice spinosis: caule ancipiti. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. hort. 1. tab. 26.*

*Ad cap. b. Spei 24.*

Caul. fruticosus, debilis, glaber. Fol. fasciculatim ramos ornant, cymbæform. obsolete punctata. Flos terminal. solitar.

\*\*\* *Cor. luteis.*

32. *edule*. M. fol. æquilateri--triquetris, acutis, strictis, impunctat. connatis; carina subferratis: caule ancipiti. *Syst. veg. ed. 14. Dill. elth. tab. 212. f. 272.*

Ficoides &c. *Herm. Lugd. tab. 245. Moris. hist. 3. f. 12. tab. 7. f. 1.*

*Ad cap. b. Spei, in maris arenosis litoribus, ut M. umbellatum; reliquæ sp. ad montium latera, & rad. 24.*

Caul. humifusi, 2-3-cubit. Fol. crassitie digiti, longa, viridia; carina cartilaginea, scabra, nitida. Flos amplus, luteus. Fructus quandoq. Fici magnitudine, viridis, pulposus, saporis dulcis, aquosi.

33. *bicolorum*. M. fol. subuatis, punctatis, lævibus, distinctis: caule frutet. cor. bicoloribus. *Syst. veg. ed. 14. Mill. ic. tab. 177. f. 1. Dill. elth. tab. 202. f. 258.*

Ficoides &c. *Herm. Lugd. tab. 249. Moris. hist. 3. f. 12. tab. 6. f. 4. Bradl. Succ. 1. tab. 7.*

*Ad cap. b. Spei h.*

Fruticul. 1-2-ped. & ultra, parum ramosus. Fol. gracilia, virid. non glauca, veluti subaspera. Fl. pl. in extremis ramulis. Cal. tuberculat. Petal. angusta, cuspidata, extus purpur. intus flava, apice extus purpur.

34. *ferratum*. M. fol. tubulat. triquetris, punctat. distinctis; angulo carinali retrorsum ferratis. *Syst. veg. ed. 14. Dill. elth. tab. 192. f. 238.*

*Ad cap. b. Spei h.*

Caul. sesquicubit. lignosi, parum ramosi. Fol. longa, e viridi-glauca. Fl. ampli. Petal. obtusa, integra, lutea.

35. *micans*. M. fol. subcylindric. papulosi, distinctis: caule scabro. *Syst. veg. ed. 14. Knorr. del. 1. tab. G. 5. Dill. elth. tab. 215. f. 282.*

Ficoides &c. *Pet. gaz. tab. 7. f. 9. Bradl. Succ. 1. tab. 8.*

*Ad cap. b. Spei h.*

Caul. procumb. 1-2-ped. ramis multis, geniculatis brachiatus. Fol. unc. longa, micis argenteis adspersa. Papillæ exsiccatæ asperæ persistunt. Fl. ampli, reflexi. Petal. extus dilute rubescent. intus phœniceo-lutescent.

36. *glaucum*. M. fol. triquetris, acutis, punctatis, distinctis; calycin. foliol. ovato-cordat. *Syst. veg. ed. 14. Dill. elth. tab. 196. f. 248.*

Ficoides &c. *Morif. hist. 3. f. 12. tab. 6. f. 3. Bradl. Succ. 4. tab. 37. Herm. Lugd. tab. 248.*

*Ad cap. b. Spei h.*

Caul. cubit. & ultra, lignosi, erectiusculi, ramis longis, tortuosis. Fol. vix connata, mucronata, apice compresso, rore glauca, punctis sparsis, vix sensibilibus, non scabra, nisi carina. Fl. peduncul. ampli, pallide flavi, extus lævi rubedine mixti. Petal. angust., cuspidata.

37. *corniculatum*. M. fol. triquetro--semicylindr. scabrido--punctat. supra basin linea elevata connatis. *Syst. veg. ed. 14. Dill. elth. tab. 199. f. 253. 254.*

Ficoides &c. *Pet. gaz. tab. 77. f. 12.*

b. M. *Dill. elth. tab. 198. f. 252.*

Ficoides &c. *Bradl. Succ. tab. 40.*

*In Africa 4.*

Ramuli pl. subprocumbent. intervallis brevibus. Fol. longiora, cornus taurini instar inflexa, quæ nota a cæteris differt. Fl. *Taraxaci*, sed pallidiores, stria media e puniceo--purpurasc. Fl. decagyni.

38. *tortuosum*. M. fol. planiuscul. oblongo--ovat. subpapillofis, confertis, connatis; calyc. 3--phyllis, bicornibus. *Syst. veg. ed. 14. Dill. elth. tab. 181. f. 222. Bradl. Succ. 2. tab. 16.*

*Ad cap. b. Spei 4.*

Caul. brevis, ramis inæqual. humifusis, fusco--lutescent. ramulis oppositis, tortuosis. Fol. fasciculata, in medio latiora, e luteo--virent. Fl. argenteo--flavescent. Cor. calyce brevior. Pistil. 4--gon.

39. *pomeridianum*. M. fol. planiuscul. lato--lanceol. lævibus, subciliatis, distinctis: caule peduncul. germinibusq. hirtis. *Syst. veg. ed. 14. Lin. dec. tab. 13.*



Ficoides &c. *Seb. musf.* 1. p. 29. f. 5.

*Ad cap. b. Spei* ☉.

Caul. herbac. palmar. teres, subdichotom. pilis albis. Fol. prima terna, reliqua opposita, periolo basi dilatato, subcarnosa, patentia. Pedunc. terminal. Cal. reliquis ma. basi albo-viscosus, intus fusco-membranac. Petal. linear. acuta, sulphur. intimis setaceis umbilicum fl. obtegentibus instar cancelli. Stam. lutea. Floret horis pomerid. 1-6.

40. *veruculatum*. M. fol. subtriquetro-cylindric. acutis, connatis, arcuatis, impunctatis, distinctis. *Syst. veg. ed.* 14. *Dill. elth. tab.* 203. f. 259.

*In Africa* h.

Planta erecta. Caul. 1-2-ped. lignosus, purpurasc. quandoq. cinereus. Fol. pellucida, glauca, apice purpur. Fl. conferti, parvi, odoratiss. Petal. vix calyc. longiora, latiuscula, obtusa, subident. Fol. alia min. fasciculata.

41. *papulosum*. M. fol. oppositis, spathulat-oblong. papulosis: fl. pedunculat. calyc. linearibus. *Syst. veg. ed.* 14. *Lin. Suppl.*

M. *Aitonis*. *Jacq. hort.* 3. tab. 7.

*Habitat* . . . ☉.

Caul. brevis: rami oppositi, patentiss. sesquiped. inferiores procumbent. Fol. subseffil. crassa, succulenta, integra, plana, subundulata; floralia singularia, punctulis nitidis adspersa. Pedunc. solitar. in ramulorum progressu, oppositifol. Petala multa, linear. acuta, intus carnea, extus rubra. *Differt a M. crystallino*, cui papulis crystallinis simillim. caul. gracilior; fol. oppositis, angustioribus: calycinis lacin. subulat. nec ovatis, latissimis: cor. valde mi. lutea, cum in illo magna, alba.

42. *pinnatifidum*. M. fol. pinnatifid. *Syst. veg. ed.* 14. *Lin. Suppl.*

*Ad cap. b. Spei* ☉.

Planta pulchra, singularis, tota adspersa micis vesicularibus; versus autumnum tota rubra. Caul. herbac. depressus, dichotomus, sanguineus. Fol. opposita, oblonga: lobi laterales utrimq. 3. obtusi; lobus terminal. impar maior, acutior. Basis fol. dilatata, tamquam orta e stipula lata. Fl. axillar. ramorum solitar. peduncul. parvi, flavi.

43. *rostratum*. M. acaul. fol. semicylindric. externe tuberculatis, connatis. *Syst. veg. ed. 14. Dill. elth. tab. 186. f. 229.*

*Ad cap. b. Spei 24.*

Fol. latiuscula, glauca, tuberculis albis obsita : quæ in centro posita, *Ardeæ* rostrum referunt. Fl. sessil. lutei.

44. *ringens*. M. acaul. fol. ciliato-dentatis, punctatis. *Syst. veg. ed. 14. Mill. ic. tab. 77. f. 2. Dill. elth. tab. 188. f. 231.*

Ficoides &c. *Bradl. Succ. 2. tab. 17.*

*b. M. felinum. Dill. elth. tab. 187. f. 220. Knorr. del. 1. tab. G. h. n. 1.*

Ficoides &c. *Martin. cent. tab. 30.*

*Ad cap. b. Spei 15.*

Fol. opposita, crassa, obtuse triquetra, supra plana, subtus obtusa, apice latiore, aculeis dentiform. pallide glauca. Pedunc. 1-2-3. superne incrassati. Fl. satis ampli, aurei, apice puniceo, extus ex flavo-rubescens.

45. *dolabriforme*. M. acaule; fol. dolabriform. punctatis. *Syst. veg. ed. 14. Dill. elth. tab. 191. f. 237.*

Ficoides &c. *Bradl. Succ. 1. tab. 10.*

*Ad cap. b. Spei 24.*

Planta minor M. falcato, per ætatem dodrantal. Fol. triquetro-acinaciform. incurva, glaucosature virid. terminalia cruciata. Fl. dilute flavescent.

46. *difforme*. M. subacaule; fol. difform. punctatis, connatis. *Syst. veg. ed. 14. Mill. ic. tab. 176. f. 2. Dill. elth. tab. 194. f. 241. 242.*

Ficoides &c. *Pluk. alm. tab. 325. f. 4.*

*Ad cap. b. Spei 15.*

Planta procumbens. Fol. conferta, triquetro-teretia, ad basin latiora, uno opposito semper minore, læte virent. nitida. Fl. e fol. fasciculati, magni. Petal. obtusa, integra, sature lutea.

47. *albidum*. M. acaule; fol. triquetris, integerrim. *Syst. veg. ed. 14. Dill. elth. tab. 189. f. 232.*

Ficoides &c. *Bradl. Succ. 5. tab. 43.*

*In Æthiopia 24.*

Fol. inferiora oblique iacent. reliqua surrecta, longa, rigida, nitida, glauca, ad basin flavescent. Flos amplus, sulphureus.

48. *linguiforme*. M. acaule; fol. linguiform. altero margine craf-  
fioribus, impunctatis. *Syst. veg. ed. 14. Knorr.*  
*del. 1. tab. 5. tab. G. 6. n. 2. Dill. elth. tab.*  
*182. f. 224.*  
*b. M. Knorr. del. 1. tab. G. 7. n. 2. Dill. elth.*  
*tab. 184. f. 224.*  
*c. M. Dill. elth. tab. 185. f. 226.*  
*d. M. Knorr. del. 1. tab. G. 7. n. 1. Dill. elth.*  
*tab. 185. f. 227.*  
*Ad cap. b. Spei 24.*  
Fol. distiche opposita, seu imbricata; altero in-  
tra alterum posito duplici serie. Fl. e centro  
sessil. vel pedunculati, magni, flavi. Cal. 4-  
part. Fl. decagyni.
49. *pugioniforme*. M. fol. confertis, alternis, longissim. subulatis,  
triquetris, impunctatis. *Syst. veg. ed. 14. Dill.*  
*elth. tab. 210. f. 249.*  
*Ficus &c. Bradl. Succ. 2. tab. 14.*  
*Ad cap. b. Spei 5.*  
Caul. frutescent. 2-3-ped. apice ramosi, ramis  
ternis. Fol. in apice ramorum, ad exortum  
ramulorum florentium apice uncinata. Pedunc.  
longi. Fl. in hoc genere maximi, pallide fla-  
vi, decagyni. Fruct. conicus, striatus.

50. *capillare*. M. fol. connatis, teretibus, papulosis: caule  
erecto: ramulis filiform. glabris, 1-fl. *Syst.*  
*veg. ed. 14. Lin. Suppl.*  
*Ad cap. b. Spei.*  
*Cum cor. color non memoretur extra ordinem hic*  
*adposuimus.*
758. AIZOON. Cal. 5-part. Cor. o. Caps. supera, 5-locul.  
5-valv. *Essentia generis sita est in staminibus*  
*per phalanges sinibus calyc. insertis; tribus com-*  
*muniter ubique adproximatis.*
1. *canariense*. A. fol. cuneiformi-ovatis: fl. sessilibus. *Syst. veg.*  
*ed. 14.*  
*Glinus crystallinus. Forsk. Æg. ic tab. 14.*  
*Ficoides &c. Niss. Ad. 1711. tab. 13. f. 1.*  
*Kali &c. Pluk. alm. tab. 303. f. 4. Volh. no-*  
*rimb. tab. 236.*  
*In Canariis ☉.*  
Planta tota prostrata. Caules e centro pl. exe-  
unt, 3-pollic. rigidi, quasi saccharati. Rama-



breves, alterni. Fol. alterna, petiol. quandoq. obtusa, saccharata. Fasciculi fol. min. axillar. Fl. terminal.

2. *hispanicum*. A. fol. lanceolat. fl. sessilibus. *Syst. veg. ed. 14. Dell. elth. tab. 117. f. 143.*

*In Hispania, Africa* ☉.

Caul. humifusi, palmar. dodrantal. ramis dichotom. Fol. crassa, & succulenta, virid. Soli exposita miculæ argenteæ adparent. Ad divaricationum angulos capitula oblonga, quæ Sole meridiano stellæ ad instar expanduntur. *Ornithogali fig. & colore. Var. capensis caul. foliisq. hirsutis; at pagina supertore minus.*

3. *lanceolatum*. A. fol. lanceolat. fl. paniculatis. *Syst. veg. ed. 14. In Africa.*

Fol. subtus hirsuta.

4. *sarmentosum*. A. fol. linear. filiformibus: panicula dichotoma, fl. solitar. pedunculat. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*

*Ad cap. b. Spei.*

Caul. prostrati, sarmentosi, pedal. Fol. opposita, remota, basi aproximata, lævia, latiuscula. Fl. in ultimis axillis alterni.

5. *paniculatum*. A. hirsutum; fol. lanceol. ramis erectis: fl. sessilibus. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*

*Ad cap. b. Spei.*

6. *perfoliatum*. A. tomentosum; fol. connatis, obovatis, crysallino-punctatis: fl. pedunculat. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*

*Ad cap. b. Spei.*

7. *Glinoides*. A. hirsutum, herbac. procumbens: fol. ovatis: fl. distinctis, sessilibus. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*

*Ad cap. b. Spei.*

8. *secundum*. A. hirsuto-canum, herbaceum, procumbens: fol. ovatis: fl. sessilibus, imbricatis, secundis. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*

*Ad cap. b. Spei.*

9. *fruticosum*. A. fruticosum, erectum, g'abrum: fol. lanceol. fl. sessilibus. *Syst. v g. ed. 14. Lin. Suppl.*

*Ad cap. b. Spei.*

10. *rigidum*. A. fruticosum, procumb. tomentosum: fol. ovatis: fl. remotis, sessilibus. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*

*Ad cap. b. Spei.*

759. SPIRÆA. Cal. 5-fid. Petal. 5, æqualia. Caps. pl. congestæ, 2-valv.

\* *Fruticosa*.

1. *lævigata*. S. fol. lanceol. integerrim. sessilibus: racemis compositis. *Syst. veg. ed.* 14.  
*S. altajensis*. Nov. *Act. Petrop. Vol.* XV. *tab.* 29. f. 2. *Pallas. It.* 2. *tab.* T.  
*In Sibiria* h.  
 Frutex ramis teretibus. Fol. alterna, sessil. obtusiusc. mucronata, læviss. Racemi terminal. solitar erecti: racemuli bracteati. Fl. alterni, albi.
2. *Salicifolia*. S. fol. lanceolat. obtusis, ferratis, nudis: fl. duplicato-racemosis. *Syst. v g. ed.* 14. *Gmel. Sib.* 3. *tab.* 39. *Duham. arb.* 2. *tab.* 75.  
*In Sibiria, Tartaria &c.* h.  
 Frutex parvus. Caul. pl. fusci. Fol. 5. pollic. longa, sescunc. lata, alterna, profunde serrata, venosa, satore virid. subnitida, subtus: dilutiora, minoribus intermixtis. Fl. axillar. & terminal. in thyrsus confertum dispositi, rubelli.
3. *tomentosa*. S. fol. lanceol. inæqualiter ferratis, subtus tomentosis: fl. duplicato-racemosis. *Syst. veg. ed.* 14.  
*Ulmaria &c. Pluk. alm. tab.* 311. f. 5.  
*In Philadelphia* h.  
 Differt a priore fol. magis profunde, & inæqualiter ferratis, subtus valde tomentosis, adeoq. crassius: racemo terminali composito, densiore, longiore: fl. magis rubris; & cor. octuplo minoribus. *Fruct. villosi*.
4. *callosa*. S. fol. lanceol. acutis, ferratis, subvillosis: panicula fastigiata, decomposita. *Syst. veg. ed.* 14. *Thumb. Jap.*  
*In Insula Nipon Japoniæ* h.  
 Caul. fruticosus, ramosus. Rami, & ramuli alterni, erecti, villosi, purpurasc. Fol. alterna, petiol. elliptica, ferraturis remotis; inferior: villosa, præsertim nervis; supra virid. subtus glauca, erecta, nervosa, sesquipedal. Petioli lineam longi, basi extus callo utrimq. glabro, rubente. Fl. rubri. Pedunc. & pedicelli villosi.

*Differt a S. tomentosa*, foliis villosis, nec tomentosis: fl. paniculatis. *A S. Salicifolia*, fol. petiol. ellipticis, acutioribus, longioribus; serraturis folior. remotis: panicula fastigiata, nec spicata: fol. subtus, caule, & pedunc. villosis.

*An S. japonica*. Lin. Suppl.?

5. *hypericifolia*. S. fol. obovatis, integerrim. umbellis sessilibus; Syst. veg. ed. 14. Pluk. alm. tab. 218. f. 5.

*In Canada* h.

Planta parva. Pedunc. pl. ex una gemma, simpl. æqual. 1-fl. Petal. alba.

6. *chamædrifolia*. S. fol. ovatis, (plerumq.) inciso-ferratis, glabris: umbellis pedunculat. Syst. veg. ed. 14. Jacq. h. rt. 2. tab. 140.

*S. Ulmifolia*. Scop. Fl. Carn. tab. 22.

*In Sibiria*, Carniola h.

Caul. pl. fruticosi, ramis flexuosis, purpur. Fol. vix pollicar. a medio ad apicem ferrata, alterna, breviter petiol. terna-quaterna-quina, obtusa, vel acuta, rugosa, subtus pallida. Racemi densi. Col. ex flavo-viresc. Petal. subrotunda, patentiss. obsolete emargin. alba.

7. *incisa*. S. fol. ovatis, inciso-5-part. ferratis: umbellis terminalibus. Syst. veg. ed. 14. Thumb. Jap.

*In Fukona* h.

Caul. erectus, fruticosus, ramosiss. Rami, & ramuli alterni, flexuosi, patentes, cinerei. Fol. unguicular. petiol. patent. acuta, villosa, subtus pallida. Cor. parva, albida.

8. *crenata*. S. fol. oblongiuscul. apice (plerumq.) ferratis: corymbis lateralibus. Syst. veg. ed. 14. Barr. rar. tab. 564.

*In Hispania*, Gallia &c. h.

Frutex laxus, ramis ramulosis. Fol. 1-fescunc. pollicem fere lata, ovat-oblon. frequentia, alterna petiol. erecta, flavo-virid. Corymbi albi, totum fruticem sua copia niveum reddentes.

9. *argentea*. S. fol. cuneiform. sericeis, apice ferratis, lineatis, subplicatis, racemis compositis. Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.

*In nova Granada* h.

Frutex ramis erectis, striatis, ramulis brevibus. Fol. alterna, petiol. lanceol. Racemi terminal. Fl. congeneribus min. Var. fol. ovatis, latioribus: fl. pleno.



10. *triloba*. S. fol. lobatis, crenatis: umbell. terminalibus.  
*Syst. veg. ed. 14.*

*In Sibiria* h.

Frutex ramis teretibus. Fol. alterna, petiol. subrorun. obtusa, lævia. Pedunc. numeroſi, æquales. Petal. alba. Stam. cor. breviora.

11. *opulifolia*. S. fol. lobatis, (profunde) ferratis: corymbis terminalibus. *Syst. veg. ed. 14.*

*Evonymus* &c. *Comm. hort. 1. tab. 87.*

*In Virginia, Canada* h.

Altitudo humana. Frutex cortice cinereo. Fol. longe petiol. subtus dilutiora. Fl. albi antes cum aliqua rubedine mixti. Fruct. subinflatus.

12. *Sorbifolia*. S. fol. pinnatis: foliol. uniform ferratis: caul. fruticoso: fl. paniculatis. *Syst. veg. ed. 14.*  
*Amm ruth. 264.*

*In Sibiria uuginosis* h.

Altitudo humana. Frutex ramosus. Fol. *Sorbi* simil. opposita, oblong. utrimq. acuta, laxè crenata, crenis subtiliter serratis, supra sarure virid. subtus pallidiora, venosa. Fl. terminal. Petal. parva, alba.

## \*\* Herbaceæ.

13. *Aruncus*. S. fol. supradecompositis: spicis paniculatis: fl. dioicis. *Syst. veg. ed. 14.*

Barba Capræ. *Cam. hort. tab. 9.*

*In Italia, Austria &c. dumetis, & sylvis collinis* 24.

Caul. quandoq. 6-ped. Fol. opposita, sicca, ex ovali in acumen producta, serrata. Panicula magna, ex spicis longis conflata. Petal. luteo-alba. Caps. subdisperma. Odor gratus. *Spica androgyna in horto Ludwigtano. Hall.*

14. *Filipendula*. S. fol. interrupte pinnat. foliol. lineari-lanceol. interrupte--serrat. glaberr. fl. cymis. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 635. Ludw. ed. tab. 60. Black. tab. 457. Cam. epit. 608.*

*Filipendula. Matth.*

*In Europæ pasuis* 24.

Rad. tuberosa pendula. Caul. cubital. & ultra, subnudus. Fol. alterna: foliol. tenuiter dissecta. Petal. albida, extus rubent. Stam. multa, apicibus luteis. *Var. minor.*

15. *Ulmaria*, S. fol. interrupte pinnat. foliol. ovatis, biserra-

tis, subtus canis: fl. cymosis. *Syst. veg. ed.*  
14. *Fl. Dan. tab.* 547. *Black. tab.* 465. *Ludw.*  
*ed. tab.* 23.

Regina prati. *Dud. pempt.* 57.

In *Europæ pratis uliginosis, humentibus* 24.

Altitudo humana. Caul. angulatus, ramis subru-  
bris. Fol. alterna, foliol. extremo ma. trilo-  
bato, subtus subalbida. Cal. coloratus. Petal.  
subalbida. Odor gratus: *Var. fl. pleno.*

16. *lobata.* S. fol. pinnat. impari, lateralibusq. lobatis, bi-  
ferratis: fl. cymosis. *Syst. veg. ed.* 14. *Jacq.*  
*hort.* 1. *tab.* 88. *Pallas it.* 3. *tab.* Q. f. 1.  
*Hill. Hort. Kevenf. tab.* 7.

In *Sibiria* 24.

*Simil. priori, sed herba inodora, at radix odora-*  
*ta. Fructus Filipendulæ, sed non contortus Ul-*  
*maria.* Caul. pl. erecti, sesquiped. Foliol. op-  
posita, subpetiol. lobis lanceolat. acute ferra-  
tis, leviter incis. Foliol. nonnulla minima,  
sæpe petioli comm. inferiorem partem occu-  
pant. Stipul. variæ. Cymæ compositæ, pa-  
tent. Petal. rubra.

17. *palmata.* S. fol. palmat. ferratis: panicula supradecompo-  
sita. *Syst. veg. ed.* 14. *Thumb. Jap.*

In *Insula Nipon* 24.

Caul. erectus, striatus. Fol. alterna, petiol. in-  
ciso-5-7-lobata, palmar. glabra, subtus pal-  
lida, venoso-reticulata. Lobi oblongi, acu-  
minati, acute, & duplicato-ferrati. Fl. ter-  
minal. albi, vel rubri.

*Differt a S. Opulifolia, cui fol. proxime accedit,*  
*fol. 5-7-lobat. ferraturis acutis: panicula decom-*  
*posita: caule herbaceo.*

18. *trifoliata.* S. fol. ternatis, ferratis, subæqualibus: fl. sub-  
pedunculat. *Syst. veg. ed.* 14. *Mill. ic. tab.*  
256.

*Ulmaria &c. Pluk. tab.* 236. f. 5.

In *Virginia, Canada* 24.

Caul. pl. lignosi, ramosi, atrorubent. glabri.  
Fol. alterna, breviter petiol. 2-unc. oblong-  
elliptica, acuta, virid. rugosa, superiora ses-  
sil. Petal. longa, angusta, acuta, alba.

*Aquilegifolia.* S. *Pallas. It.* 3. *tab.* P. f. 3.

In *Dauria* 24.

*Statura S. crenata*, inter quam, & *S. lobatam* media. Fol. per ramulos sparsa, in petiolum longiuscul. producta, ovat-cuneiform. glauca, glabra; inferiora subintegra, summa trilobato-incisa, lobis acutis. Umbellæ terminal. sessil. alternæ, 4--12--fl. Hinc rami terminal. quasi spicati, fl. fasciculat. Petal. alba, vix ma. *S. crenata*.

## POLYGYNIA.

760. ROSA. **C**Al. urceolat. 5-fid. semipinnat. aut ab uno tantum latere appendiculatus. Petal. 5. Fruct. pulposo--coriaceus, 1--locul. Sem. plurima, hispida, calycis interiori lateri adfixa.

\* *Germinibus subglobosis*.

1. *Eglanteria*. R. germin. globosis, depressis, pedunculis glabris: caule aculeis sparsis, rectis: foliolis acutis, petiolis scabris. *Syst. veg. ed. 14. Tabern. ic. 1087.*

R. lutea. J. B. tab. 2. p. 47.

R. bicolor. Jacq. hort. 1. tab. 1. mera variet. solo degenerans. Petala supra miniata, subtus sulphurea.

b. R. lutea multiplex. Knorr. del. 1. tab. R. 1. R. In Germania, Anglia; in hortis vulgatiss. h. Fol. utrimq. glabra, odoratissima. Foliol. ovata, ferrata. Petal. lutea.

2. *rubiginosa*. R. germin. subglobosis, petiolisque aculeat. aculeis recurvis: fol. subtus rubiginosis. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. Austr. 1. tab. 50.*

R. sylvest. odorata. Dod. Pempt. 187.

In Germania, Helvetia h.

Habitus R. caninæ, a qua differt fol. obtusioribus, minus nitentibus, odoratis. Aculei cinerascetes. Petal. exigua, obverse cordat. incarnata, cum ungue albo. Rami læves, sed aculei sparsi, maiores, recurvi. Fol. septeno-pinn. ovata, acuta, sparsa, subtus atomis resinosis, purpurascens. Peduncul. aculeis minutiss. Var. fl. albo, & pleno. Germen rarius aculeolis,



præfertim basi. Fruct. aurantiacus. Odor totius plantæ quasi pomorum.

*Obs. R. eglanteria differt caule altiore, aculeis rectis: fl. magnis, luteis, inodoris.*

3. *cinnamomea*. R. germin. globosis, pedunculisq. glabris: caule aculeis stipularibus: petiolis subinermibus. *Syst. veg. ed. 14. Bauh. hist. 2. p. 39.*

*R. saxatilis &c. Cam. epit. 99.*

*In Europa australi h.*

Caul. ruber subinerm. Fol. 3--4--iuga. Foliol. subrotund. simpliciter dentata, nervis villosis. Pedunc. sæpe 1-fl. Petal. sat ure rubra, odora.

4. *arvensis*. R. germin. globosis, pedunculisq. glabris: caule, petiolisq. aculeat. fl. cymosis. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 398.*

*In Anglia, Svecia, Pedemontio, ad oras sylvarum h.*

Petal. alba.

5. *pimpinellifolia*. R. germin. globosis, pedunculisq. glabris: caule aculeis sparsis, rectis; petiol. scabris: foliol. obtusis. *Syst. veg. ed. 14.*

*In Europa? h.*

Frutex humilis. Foliol. minima, 9-11-iuga. Cal. non pinnatus. Petal. magnitudine *R. caninæ*, alba, rubore lævi mixta. Stipul. ferratæ. Fructus niger.

6. *spinosissima*. R. germin. globosis, glabris: peduncul. plerumq. hispidis: caule, petiolisque aculeatiss. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 398.*

*R. campestris &c. Clus. hist. 1. p. 116.*

*In Europæ locis alpinis, saxosis, apricis h.*

*Videtur var. prioris.* Frutex parvus, totus spinosiss. Caul. aculeis subulatis, rectis, horizontalibus, confertissim. inæqualibus. Foliol. septena-novena, minuta, obovata, dentata, sat ure virid. Petal. odora, alba, basi flavescent. quandoq. rosea, vel variegata. Fruct. niger.

7. *rugosa*. R. germin. globosis, glabris: caule, petiolis, pedunculisq. aculeatis: fol. subtus tomentosus. *Syst. veg. ed. 14. Thumb. Jap.*

*In Japonia h.*

Caul. fruticosus. Rami subtomentosi, aculeis albis. Fol. impari-pinn. 4-iuga. Foliol. pollic. ovata, obtusa cum acumine, ferrata, petiol. tomentosus. Fl. solitar. Cal. extus hirsutus, intus tomentosus.

8. *carolina*. R. germin. globosis, hispidis; peduncul. subhispidis: caule aculeis stipularibus; petiolis aculeatis. *Syst. veg. ed. 14. Dill. elth. tab. 245. f. 316.*

*In Amer. septentr. h.*

Frutex humilis. Caul. lævis, aculeis tantum stipular. 2. Foliol. 7. oblong--ovata, ferrata, glabra, subtus pallidiora. Pedunc. pl. ramosi. Cal. foliolis indivisis, subtus hispidis. Flos ferotinus. Petal. obcordata, rubicunda, min. R. *sylv. canina*.

9. *villosa*. R. germin. globosis, pedunculisq. hispidis: caule aculeis sparsis; petiol. aculeat. fol. tomentosis. *Syst. veg. ed. 14.*

R. *pomo spinoso* &c. *Bauh. hist. 2. p. 38.*

*In Europæ locis subalpinis, apricis h.*

*Simil. R. Eglanteria, sed fol. uberius villosa.*

Caulis lævis, aculeis sub genicula 2-4. adproximatis. Fol. sæpe quinque, ovata, obtusa, margine spinis crassis, capitatis. Stipul. prælongæ, tomentosæ. Fl. 1-2-3. parvi, breviter peduncul. rubri. Fructus magnus, niger.

10. *sinica*. R. germin. subglobosis, glabris: peduncul. aculeat. hispidis: caule, petiolisq. aculeatis: calycin. foliol. lanceol. subpetiolat. *Syst. veg. ed. 14.*

*Habitat . . . . .*

11. *sempervirens*. R. germin. globosis, pedunculisq. hispidis: caule, petiolisq. aculeat. fl. subumbellatis. *Syst. veg. ed. 14. Dill. elth. tab. 246. f. 318. Clus. hist. 2. app. ult.*

*In Germania h.*

Caul. sarmentosi. Spinæ rubescent. Fol. plerumq. 2--raro 3--iuga. Foliol. 2. infer. min. impar. maximum, nitida, glabra, supra saturæ, subtus dilute virid. Fl. terni--quaterni, satis ampli. Petal. cordata, nivea.

*\*\* Germinibus ovatis.*

12. *centifolia*. R. germin. ovatis, pedunculisq. hispidis: caule hispido, aculeato; petiol. inermibus. *Syst. veg. ed. 14. Knorr. del. 1. tab. R. regn. Bot. Clus. hist. 1. pag. 114.*

*Habitat . . . . . h.*

Fol. omnium spec. maxima, 3-4-iuga, glabra. Pedunc. longi, germina, & cal. strigis crispis

obtus, globulo resinoso terminatis. Flos quasi tornatus.

13. *gallica*. R. germin. turbinatis; pedunculisq. hispidis: caule petiolisq. hispido-aculeat. *Syst. veg. ed.* 14.

R. *rubra*, *multiplex*. *Du-ham. arbr.* 2. *tab.* 53.

R. *rubra fl. semipleno*. *Bauh. hist.* 2. p. 34.

b. R. *gallica*, *versicolor*. *Milt. dict.* *tab.* 221. f. 2. In *Europa* h.

Frutex pedal. parum aculeatus, spinulis pl. dense congestis, ætate incurviusculis versus apicem obitus, inferne ramosus. Fol. vaginant. quinata. Foliol. ovata, acumin. ferrata, subtus pallide virid. quandoq. maculata. Costa rubella, spinulis minutiss. obita. Fl. magni, rubri, seu albi, vel variegati.

14. *pumila*. R. germin. ovatis, hispidis: petiolis, pedunculisq. hispidis: caul. superne aculeatiss. *Syst. veg. ed.* 14. *Lin. Suppl. Jacq. Austr.* 2. *tab.* 198.

R. *suavifolia*. *Fl. Dan.* *tab.* 870?

In *collibus siccioribus* h.

Caul. semi-fetquiped. subsimpl. inferne inermis.

Foliol. plerumq. quina, subovata, quandoq. obverse ovata, vel magis subrotunda, obtusa, vel acuta, duplicato-ferrata, supra virent. & glabra, subtus pallent. & villosa. Flos sæpe solitar. valde suaveolens. Petal. integra, vel varie emarginata, ad ungues alba, col. rubro, vel carneo, raro puniceo.

15. *alpina*. R. germin. ovatis, (plerumque) glabris: peduncul. petiolisq. hispidis: caul. inermi. *Syst. veg. ed.* 14. *Jacq. Austr.* 3. *tab.* 279.

Rosa *rubello* &c. *Bauh. hist.* 2. p. 39.

In *alpihus Helvetiæ, Austriæ, Italiæ* h.

Caul. 1-4--pedal. plerumq. nudus. Foliol. 2-3--plerumq. 4-iuga, subsessil. ovata, glabra, biferrata. Stipul. lanceol. ferrulatæ. Flos magnus. Cal. simpl. Petal. obcordata, emarginata, sature, vel dilute purpuro-rubra. Fruct. propendent. ut in *R. pendulina*, a qua differunt pedunculis numquam, nec in culta planta, glabris.

16. *canina*. R. germin. ovatis, pedunculisq. glabris: caule, petioli q. aculeatis. *Syst. veg. ed.* 14. *Fl. Dan.* *tab.* 555. *Blak. tab.* 8. *Ludw. eccl. tab.* 70. *Dod. pempt.* 187.

In *Europa*, ad *sepes*, & *vias ubique* h.



Frutex 6--ped. incurvus: internodiis aculeis 2. alternis. Petioli aculeati. Foliol. 7-9. impari ma. acutiuscula, nuda, subtus glauca. Stipulæ magnæ, petiolatæ, in 2 auriculas fissæ. Cal. tomentosus. Petal. biloba, incarnata, vel omnino alba. Fruct. coccineus.

17. *collina*. R. germin. ovatis, fere glabris; pedunculis, petiolisq. glandulosis, hirsutis: caul. aculeato. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. Austr. 2. tab. 197.*

*In collibus* h.

*Habitus* R. *caninæ*, sed fol. magis crassa, minusq. nitida, subtus constanter hirsuta. Foliol. quinarum septena, ovata, vel magis subrotunda, supra atro-virent. & glabra, subtus subincana, argute serrata, venis, & margine villosis. Petal. obverse cordata, & odora, carnea, vel dilutiora.

18. *indica*. R. germin. ovatis, pedunculisq. glabris: caul. subinermis: petiolis aculeatis. *Syst. veg. ed. 14. Pet. gaz. tab. 35. f. 11.*

*In China* h.

Rami raro armati una, alterave spina tenuissima. Foliol. quina, serrata, extimo duplo ma. supra glabra, subtus tomentosa. Pedunc. simplic. longi, nudi. Cal. incisus, lævis. Fruct. magnitudine *Sorbi aucupariæ*.

19. *pendulina*. R. germin. ovatis, glabris; peduncul. cauleq. hispidis: petiol. inermibus: fructibus, pendulis. *Syst. veg. ed. 14. Dill. elth. tab. 245. f. 317.*

*In Europa* h.

Frutex 2-cubit. caulibus pl. Fol. 5-6-iuga, supra glauco-virid. subtus albescent. Fl. ampli, dilute rubri.

20. *alba*. R. germin. ovatis, (plerumq.) glabris, peduncul. hispidis: caul. petiolisq. aculeat. *Syst. veg. ed. 14. Knorr. del. 1. tab. R. 6.*

R. *fativa*. r. *Dod. pempt. 186.*

- b. R. *alba*, fl. pleno. *Bcsl. ejst. vern. 6. tab. 3. f. 1. Black. tab. 73.*

*In Europa, ad sepes in collibus* h.

Rami diffusi, stolonibus similes. Foliol. septena, oblong. supra saturate virid. subtus incana, pubescent. Pedunc. 1-2 fl. Petal. magna, odora, alba, apicibus luteis.

*multiflora*. R. germin. ovaris; caule, petiolisq. aculeatis: peduncul. inermibus, villosis. *Syst. veg. ed. 14. Thumb. Jap.*

*In Japonia* h.

Frutex erectus, ramosus. Rami erecti, aculeati, purpur. Aculei sparsi, recurvi. Fol. alterna, petiol. pinnata. Foliol. opposita, raro alterna, sessil. ovata, ferrata, supra virid. glabra, subtus pallida, villosa. Fl. terminales, paniculati, magnitudine fl. *Rubi*. Panicula decomposita, patens. Cal. villoso--albus. Petal. alba. Germ. villosum.

*sylvestris*. R. spinis recurvis: fol. septenis, glabris: Cal. tomentoso, segmentis subpinn. tubis longis, barbatis. *Hall. hist. 1002.*

*In Helvetia* h.

*Distincta a R. canina*. Habitus humilis. Flos inodorus.

*pyrenaica*. R. germin. ovaris, pedunculisq. hispidis, coloratis: petiol. hispido--aculeat. calyc. omnino foliosis. *Gouan. Illust. tab. 19.*

*In Pyrenæis* h.

*Differt a R. alpina*. Frutex 1-2-pedal. ramis apice 1-fl. Foliol. 5-7. ovata, aut cuneiformi--truncata, duplicato--ferrata, glabra; summa ma. Petioli hispidi. Stipulae valde decurrentes, apice divergentes, scabrae, ciliatae. Bractae ovatae, lanceol. ciliatae, stipulis duplo ma. Petala intense rubra, biloba, aut emarginata.

*maialis*. R. germin. globosis, peduncul. petiolisq. inermibus: caule aculeis geminis, axillaribus: calyc. integris, spathulatis. *Herman. Dissert. de Rosa pag. 8.*

*In hortis frequens, parum aestimata ob fl. parvos, debilissime odoros* h.

*Videtur diversa a R. cinnamomæ*. Rami aculeos ad ramulorum, & petiolor. bases tantum habent binos--ternos. Petioli inermes, hirti, dilatati in stipulas ferratas. Foliol. 5-7. oblong. ultra dimidium ferrata, supra glabra, subtrus hirta, utrimq. venosa. Pedunc. solitar--bini--terni, nudi, glabri. Cal. intus, & margine hirtus. Flos parvus, plenus, pallide ruber.

*virginiana*. R. cal. lacin. semipinnat. germine globofo, pedunculoq. glabro. *Herm. diff. de Rosa*.  
*Rosa omnium minima vulgo*.

*In Virginia* h.

Frutex exiguus. Caul. spinis flexilibus. Foliol. quina-septena, orbiculata, truncata, profunde dent. glabra. Flos uncial. albus.

*fatida*. R. calycis foliol. semipinnat. pomo globofo, inermi: folior. dentibus dentatis. *Herm. diff. de Rosa*. *Atl. Fl. Ped.*

*R. lutea simplex*. *Bauh. pin.*

*In collibus* h.

761. RUBUS. Cal. 5-fid. Petal. 5. Stam. brevia: Bacca composita ex succulentis acinis, 1--sperm.

\* *Frutescentes*.

1. *idaus*. R. fol. quinato-pinnat. ternatisq. caul. aculeato; petiolis canaliculat. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 788. Black. tab. 289. Knorr. del. 2. tab. R. 1. Matth.*

*In Europæ lapidosis, montanis* h.

Frutex 6-ped. ramis subspinosis. Fol. ex ovato-longe lanceol. duplicato--dentata, molliora, subtus tomentosa. Pedunc. sub 5-fl. Cal. tomentosus. Cor. flaccida, albescent. Fruct. ruber, villosus. *Variet. non spinosa; & altera fructu albo*.

2. *occidentalis*. R. fol. ternis, subtus tomentosis: caule aculeato: petiol. teretibus. *Syst. veg. ed. 14. Dill. elth. tab. 287. f. 319.*

*In Canada* u.

Caul. nebula coerul. obductus. Petioli aculeis recurvis. Fol. ovata, inciso--ferrata, intermedio pedicellato: lateralia sæpe angulata. Fruct. niger, vel ruber, magis acidus, & gratus priore, sapidiss. fere *R. arctici*.

3. *hispidus*. R. fol. ternatis, nudis: caule, petiolisq. hispidiss. strigis rigidulis. *Syst. veg. ed. 14.*

*In Canada* u.

Caul. viticulis longis, procumbent. lignosis. Fol. inciso--ferrata, intermedio pedicellato. Pedunc. etiam hispidi.

4. *parvisolius*. R. fol. ternatis, subtus tomentosis: caul. hirto; petiolisque aculeis recurvis. *Syst. veg. ed. 14. Rumph. amb. 5. tab. 47. f. 1.*



*In India* h.

Caul. fruticosi, teretes, tomentosi. Fol. venosa.

Fl. in racemum digessi. Cal. tomentosus.

3. *jamaicensis*. R. fol. ternatis, subtus tomentosis; caule, petiolis, foliisq. pubescent. recurvato-aculeat. Syst. veg. ed. 14. Sloan. Jam. 2. tab. 213. f. 1.

*In Jamaica, proximisq.* h.

*Differt a priore, caule non incano, sed in iunioribus pubescente.* Fol. inciso-ferrata. Var. fl. pleno, albo.

6. *triphyllus*. R. fol. ternatis, subtus tomentosis: foliol. ovatis, incisif, dentatis: ramis, petiolis, pedunculisq. villosis, aculeatisq. Syst. veg. ed. 14. Thunb. Jap.

*In Japonia* h.

Caul. fruticosus, aculeat. glaber. Rami flexuosi-erecti, teretes, aculeati, villon. Fol. petiol. foliol. subangulata, supra glabra. Fl. in ramulis terminalibus subpaniculati. Cal. tomentosus, hispida.

7. *cæsius*. R. fol. ternatis, subnudis; lateralibus bilobis: caule aculeato, tereti. Syst. veg. ed. 14.

R. minor. Dod. pempt. 742.

*In Europæ dumetis* h.

Caul. debilis, decumbens, vimineus, inter strigositatem adpersus aculeis tenuiss. recurvis. Foliol. subtus non tomentosa, sed sæpe pubescent. impari ma. Pedunc. 1-3-fl. aculeati, villis rubris. Fruct. nigro-cærul.

8. *fruticosus*. R. fol. quinato--digitatis, ternatisq. caul. petiolisq. aculeatis. Syst. veg. ed. 14. Black. tab. 45.

Rovo. Math.

*In Europæ sepibus* h.

Frutex spinosus. Caul. subangulat. Foliol. oblong. acumin. vel utrimq. virid. vel subtus alba, & tomentosa. Fl. subracemosi. Cor. subpurpur. Var. inermis = fl. semipleno = pleno = fructu albo.

9. *canadensis*. R. fol. digitat. denis---quinis---ternatisq. caule inermi. Syst. veg. ed. 14. Mill. ic. tab. 223.

*In Canada* h.

Caul. subpurpur. Foliol. lanceol. utrimq. nuda, argute serrata, tenuissima. Stipul. linear. acutæ. Bract. lanceolatae.

10. *odoratus*. R. fol. simplic. angulato--palmar. caule inermi, R. ij

multifol. multifi. *Syst. veg. ed. 14. Mill. ic. tab. 223. Corn. Canad. tab. 150.*

*In Canada* 24 h.

Altitudo humana. Caul. ramosus. Fol. 3--5--angulata, acuta. Peduncul. hirsuti. Petal. magna, rubra.

11. *moluccanus*. R. fol. simplic. cordatis, sublobat. caule decumbente, aculeato. *Syst. veg. ed. 14. Rumph. amb. 5. tab. 47. f. 2.*

*In Amboina* h.

Caul. quandoq. scandens inter arbuta. Rami hirsuti, aculeati. Fol. alterna, petiol. obtusa, ferrata, subtus venosa, cinereo-tomentosa. Fl. sparsi, axillar. & terminales; solitar. & racemosi. Pedunc. tomentosi, aculeati. Cal. extus tomentosus. Petal. calyce breviora. Styli flaminibus longiores. Germina hirsuta.

12. *palmatus*. R. fol. cordat. palmato-trilobis, glabris: caule, petiolisq. aculeatis. *Syst. veg. ed. 14. Thumb. Jap.*

An *R. microphyllus*. *Lin. Suppl.?*

Ki Itfigo. *Kamph. am. exot. Fasc. 5. p. 787.*

*In Japonia* h.

Caul. erectus, 2-3-ped. frutescens. Rami patuli, flexuosi, purpur. aculeati. Fol. e gemmis plura, petiol. patent. pollic. & ultra. Lobi sæpe simplic. raro subdivisi, intermedio longiore, lanceolati, acuminati, acute, & inæqualiter ferrati. Petioli longitudine folior. inæqual. capillar. aculeis recurvis. Fl. inter fol. solitar. pedunculati. Cal. villosus. Petal. maiuscula, unguicul. alba.

13. *villosus*. R. fol. simplic. cordat. acutis, aculeat. caul. erecto, petiolisq. aculeat. *Syst. veg. ed. 14. Thumb. Jap.*

An *R. corchorifolius*. *Lin. Suppl.?*

*In Japonia* h.

Caul. fruticosus, tomentosus. Fol. pollic. petiol. sublobata, ferrata, villosa, venosa, nervo dorsali aculeato. Fl. axillar. solitar. peduncul.

*Differt a R. hispido, fol. simplicibus, nec ternatis. A R. moluccano, fol. oblongo-ovatis, acutis: caul. fruticoso, erecto.*

14. *incisus*. R. fol. simplicibus, cordatis, incis, glabris: caul. erecto, aculeato. *Syst. veg. ed. 14. Thumb. Jap.*

*In Japonia.*

Caul. frutescens, purpur. glaber. ramosus. Fol. e gemmis plura, pollicar. petiol. ovata, rotundata, raro acuta, sublobata, ferrata, nervosa, inermia. Petioli patentes, recurvato-aculeati. Fl. axillar. pedunculati, solitar. Cal. extus glaber, intus albo-tomentosus. *Differt a R. Moluccano, caule erecto, folisque glabris.*

15. *japonicus*. R. fol. simplic. cordatis, oblongis, duplicato-ferrat. caule suffruticoso, inermi. *Syst. vg. ed. 14.*

*In Japonia h.*

Frutex humilis. Caul. erectus, angulatus, parce ramosus. Fol. alterna, petiol. acuminata, utrinq. lævia. Pedunc. terminal. solitarius, filiform. longitudine cor. Flos magnitudine *Fragariæ*. Cal. parvus. Petal. subrotunda, alba.

16. *trifidus*. R. fol. simplic. inciso-trifidis, glabris: caule inermi. *Syst. veg. ed. 14. Thumb. Jap.*

*In Japonia u.*

Caul. subimpl. flexuoso-erectus, purpur. glaber. Fol. petiol. cordata, subrotunda, utrinq. glabra, fere palmar. Fl. e gemma cum fol. solitar. peduncul. Cal. albo-tomentosus.

**\*\* Herbacei.**

17. *saxatilis*. R. fol. (plerumque) ternatis, nudis: flagellis repantibus, herbaceis. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 134. Clus. pann. 115. 116.*

*In Europæ collibus lapidos, & pratis subhumidis h.*

Caul. humilis, prostratus, hirsutus. Fol. *Ulmi*, circumferrata, subtus glabra, vel pilis raris; quandoq. simplicia, inferior. triloba. Pedunc. 1-multifl. Fl. exigui. Acini pauci, distincti, rubri.

18. *arcticus*. R. fol. ternatis: caule inermi, 1-fl. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 488. Fl. Lapp. tab. 5. f. 2. Buxb. cent. 5. tab. 26. mala.*

*In Bothnia Sveciæ. Sibiria, Canada u.*



Caul. palmar. Fol. alterna, petiol. Foliol. rhombæa, ferrata. Cor. purpur. Fructus fusco-rubens, fragrans, omnium europæorum suavissimus.

19. *chamæmoros*. R. fol. simplic. lobatis: caule inermi, 1-fl. *S. fl. veg. ed. 14. Fl. Lapp. tab. 5. f. 1.*

*Morus norvegica*. *Fl. Dan. tab. 1. Till. aboens. tab. 150.*

*In Sveciæ, Sibiria, Dania præluibus uliginosis* 24.

Caul. palm. adspersus villis capitatis, basi squamis amplexicaulibus, ovatis, purpur. Fol. alterna, petiol. 5-loba, inæqualiter ferrata, rugosa, plicata, supra virid. pilis capitatis. Fruct. maturus flavus, seu pallide rufus.

20. *Dalibarda*. R. fol. simplic. cordatis, indivisis, crenatis: scapo aphylo, 1-fl. *Syst. veg. ed. 14.*

*In Canada* 24.

Rad. repens. Stolones repentes, herbacei. Fol. *Viola*, obrusa, venosa, pilis raris adspersa, subtus nuda. Petiol. longitudine fol. pilosi. Cor. alba. Sem. 5. ovata, nuda.

*sanctus*.

R. fol. ternatis, simplicibusque, subtus tomentosis: caule, petiolisq. aculeis recurvis. *Schreb. dec. 1. tab. 8.*

R. *creticus*, *triphyllus*, fl. parvo. *T. Cor.*

*In Creta, Palæstina.* 24.

662. FRAGARIA. Cal. 10-fid. Petal. 5. Receptacul. seminum ovatum, haccatum, deciduum.

1. *vesca*. F. flagellis reptantibus. *Syst. veg. ed. 14. Sabb. hort. 4. tab. 44. Black. tab. 77. Ludw. cat. tab. 136. Knorr. del. 1. tab. E. 1. Marth.*

b. F. muricata. *Fol. hirsuta.*

c. F. arborea, fl. herbaceo. *Zan. hist. tab. 78. f. 1.*

d. F. *chiloensis*, fructu maximo &c. *Dill. elth. tab. 120. f. 146.*

*In Europæ sylvestris* 24.

Caulis fert partim ramulos floridos, partim longe reptat. Fl. ternata; radicalia petiol. caulina sessil. foliol. ovat-lanceol. ferrata, hirsuta, nervis parallelis, subtus albida. Pedunc. florigeri breves, 1-fl. in summo caule conferti. Petal. alba. Fruct. ovatus, pulpa mol-

li, esculenta. *Var. fl. pleno* = *sexu distincta* = *fruct. rubro, vel albo.*

2. *monophylla*. F. fol. simplicibus. *Syst. veg. ed. 14.*

*Habitat* . . .

*An var. prioris? Folium enim primum ternatum est, sed scapus longior. Cal. incisus. Petal. min.*

3. *sterilis*. F. caul. decumbente: ramis floriferis laxis. *Syst. veg. ed. 14. Moris. hist. 3. f. 2. tab. 19. f. 5. Lob. ic. 698.*

*In Italia, Helvetia &c. 24.*

Habitus durior. Floret præcocius. Surculi depressi, crassi, tecti stipul. lanceol. ferrugin. Fol. ternata, obovata, ferrata, retusa, laxiora, pilosa, sericea, subtus albida, petiolis valde pilosis. Caul. floriferi decumbent. filiform. longiores, & magis lanuginosi, fol. raris, minoribus. Flagella nulla. Fl. solitar. peduncul. Petal. alba, magis emarginata. Fruct. siccus, non edulis.

763. POTEN- Cal. 10-fid. segment. alternis minoribus. Petal.  
TILLA. 5. Sem. plurima, subrotund. nuda, receptaculo parvo, exsucco adfixa.

\* *Fol. pinnatis.*

1. *fruticosa*. P. fol. pinnat. caule fruticoso. *Syst. veg. ed. 14. Pentaphylloides &c. Moris. hist. 3. f. 2. tab. 23. f. 5. Hortul. angl. tab. 54. Du-ham. arb. 2. tab. 20. Walth. hort. tab. 17. Amm. ruth. tab. 17. 1. f. 1.*

*In Anglia, Oelandia, Sibiria &c. in montibus h.*  
Caul. 2-pedal. erectus, ramosus, fusco-virens. Fol. digitato-quinata. Foliol. integerr. læte virent. sicca. Stipul. amplexicaul. ovatae, membranac. argute emarginatae. Fl. multi, magni, flavi. Sem. olivaceo-fusca.

2. *Anserina*. P. fol. pinnat. ferratis: caul. repente: pedunc. 1-fl. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 544. Argentina. Black. tab. 6. Dod. dempt. 600. Potentilla. Math.*

*In Europæ pascuis argillosis, montanis 24.*

Flagella repentia. Foliol. lanceol. subtus argentea, lucida, minoribus intermixtis. Fl. axillar. peduncul. Petal. patent. rotunda, flava.

3. *sericea*. P. fol. bipinnat. utrinq. tomentosis; segmentis

paralellis, adproximat. caulibus decumbentibus. *Syst. veg. ed. 14.*

*In Sibiria 24.*

*Habitus folior. P. anserinæ argenteæ, est minima. Caul. & fructificat. P. vernæ. Radix squamis fol. ruderibus, nigris vestita. Pinnul. sub 13. ovatæ, prætinato-pinnatifid. Pedunc. pilosif. Caul. absque sarmentis, nec repentes: in medio folio unico min. magisq. divaricato instructi; in quorum apice fl. aliquot, alterni, peduncul. lutei.*

4. *multifida*. P. fol. bipinnat. segmentis integerr. distantibus, subtus tomentosis: caul. decumbente. *Syst. veg. ed. 14.*

*Pentaphylloides &c. Amm. ruth. tab. 16. Buxb. cent. 1. tab. 49. f. 1.*

*In Italia. Helvetia, Sibiria &c. 24.*

*Caul. pedal. simpl. foliosus. Fol. radical. longe petiol. Stipul. strictæ, subhirsutæ. Cal. hirsutus. Petal. profunde cordata, lutea, sulphur.*

5. *fragarioides*. P. fol. pinnatis, ternatisq. extimis ma: flagellis reptantibus. *Syst. veg. ed. 14. Gmel. Sib. 3. tab. 34. f. 2.*

*In Sibiria 24.*

*Facies Fragariæ sterilis. Rad. subtuberosa. Fol. sericea, petiolis pilosis, ex 3-5-7. pinnul. Foliol. opposita, ovata, serrata.*

6. *rupestris*. P. fol. pinnatis, ternatisq. caul. erecto: flagellis nullis. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. Austr. 2. tab. 114.*

*Pentaphylloides &c. Moris. hist. 3. f. 2. tab. 20. f. 1.*

*Quinquefolium &c. Clus. hist. 2. p. 107. n. 5.*

*In montibus 24.*

*Caul. sesquiped. herbaceus, strictus, dichotomus. Fol. obscure virent. firma. Foliol. infer. utrimq. 3. cum impari: caulina media ex binis: summa ternata, & subsessilia. Stipul. exiguæ, lanceol. Fl. multi. Petal. subrotund. patula, aurea, vel alba. Fruct. Fragariæform.*

7. *bifurea*. P. fol. pinnat. subæqualibus: foliol. oblongis, subbifid. extimis confluentibus. *Syst. veg. ed. 14. Gmel. ii. 3. tab. 27. f. 1.*

*In Sibiria 24.*

*Caul. procumb. in lætiori loco dodrant. Fol.*



angusta, & nervosa, supra intense virid. subtus pallidiora, quandoq. utrimq. glauca. Flos flavus.

8. *pimpinelloi-* P. fol. pinnat. foliol. subrotund. dentatis, æquales.  
libus: caul. erecto. *Syst. veg. ed. 14.*

*Pentaphylloides* &c. *Buxb. cent. 1. tab. 48.*

*In Armenia saxosis 24.*

*Habitus, & fol. Pimpinellæ. Petala lutea.*

9. *pensylvani-* P. fol. inferioribus pinnat. superioribus ternatis:  
*ca.* foliol. inciso-ferratis: caule erecto, pubesc.

*Syst. veg. ed. 14. Jacq. hort. 2. tab. 189.*

*In Canada 24.*

Caul. sesquiped. hirsutus. Foliol. inferior. oblonga, obtusiusc. lineata, mollia, villosa; extimis 3. connatis, ma. interiora mi. alterna. Caulina subdigitata, ut in *P. recta*, sed pinnatifid. Petal. vix calyce ma. obverse ovata, emarginata, lutea. *Habitus P. rectæ.*

10. *supina.* P. fol. pinnat. caule decumbente, dichotomo.  
*Syst. veg. ed. 14. Jacq. Austr. 5. tab. 406.*

*Gmel. it. 1. tab. 27. f. 2.*

*Pentaphyllum* &c. *Pluk. alm. tab. 106. f. 7. Clus. hist. 2. p. 107.*

*Pentaphylli* &c. *Ambros. phyt. tab. 414.*

*In Germania, Austria &c. ☉.*

Caul. subpedal. supra rubent. hirsuti. Fol. ramea ternata: foliol. oblonga, vel ovata, obtuse ferrata, subtus pallidiora. Stipul. ferratæ. Pedunc. 1-fl. Petal. obtusiss. flavescentia.

**\*\* Fol. digitatis.**

11. *recta.* P. fol. (infimis) septenatis, lanceolatis, ferratis, utrimq. subpilosis: caule erecto. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. Austr. 4. tab. 383.*

*Quinquefolium alterum. Dod. pempt. 116.*

*In Europa 24.*

Planta iunior pilosa. Caul. 1-3-ped. purpur. Fol. infer petiol. summa quinata, subsessil. Foliol. obtusa, profunde dentata. Rami dichotomi, e summo caule veluti corymbosi. Stipul. vaginant. Petal. ampla, obverse cordata, aurea.

12. *argentea.* P. fol. quinatis, cuneiform. incisis, subtus tomentosis: caul. erecto. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 865.*

*Pentaphyllum* &c. *Cam. epit.* 760.

*Quinquefolium petræum* &c. *Tabern.* 122.

*Cinquefoglio bianco.* *Matth.*

*In Europæe ruderatis* 24.

Caul. fruticosus, non diffusus, & parum ramosus. Fol. caulina ima petiol. Stipul. subtus tomentosæ. Fl. umbellati. Cal. tomentosus. Petal. subrotund. lutea.

13. *intermedia*. P. fol. radicalibus quinatis; caulinis ternatis; caul. erectiusculo, ramulosis. *Syst. veg. ed.* 14.

*In Helvetia* 24.

Media inter P. *argenteam*, & *novergicam*, si radix non esset perennis, & fol. subradical. quinata. Cæterum fol. inferiora alterna; super. opposita. Foliol. obovat. inciso-serrata, non tomentosa, serraturis novem. Fl. paniculati.

14. *hirta*.

P. fol. septenatis, quinatisq. cuneiform. incilis, subtus pilosis: caule erecto, hirta. *Syst. veg. ed.* 14. *All. Fl. Ped. tab.* 71. f. 1.

*Habitat Monspelii, in Parnæis, Silesia &c.* 24.

Caul. erectus. Fol. caulina 5. foliol. alterna, sublinear. dentibus 3--5. supra obscure virent. glabra, nitida. Ad divisiones ramorum stipul. profunde 2--fid. quibus insident fol. primum ternata, dein simplicia, sed dentibus acutioribus instructa. Caul. pedunc. & calyc. valde pilosi. Petal. lutea, cordata, emarginata.

15. *stipularis*. P. fol. septenatis, sessilibus, stipulæ dilatatæ insidentibus. *Syst. veg. ed.* 14. *Gmel. Sib.* 3. *tab.* 37. f. 2.

*In Sibiria* 24.

Rad. grumosa. Caul. adscendens, filiform. lævis, apice divisus. Stipul. solitar. amplexicaul. emarginatæ. Foliol. 9-8. lineari-lanceol. subferrata, glabra. Petal. subemargin. flava.

16. *opaca*.

P. fol. radicalibus (sæpe) quinatis, cuneiform. ferratis; caulinis suboppositis; ramis decumbentibus, filiform. *Syst. veg. ed.* 14.

*Quinquefolium* IV. &c. *Clus. hist.* 2. p. 106. f. 106.

*In Italia, Helvetia &c.* 24.

Caul. multi, pedal-cubital. ramosi, subhirsuti, sæpe rubent. Fol. radical. longe petiol. etiam septena, nempe extremo profunde 2-fido, retusa: caulina ex 2. lanceolat. stipulis ternata,

- petiol. suprema tantum incisa. Pedunc. longi,  
1-fl. Fl. magni. Petal. cordata, lutea.
17. *verna*. P. fol. radicalibus quinatis-ternatis. acute serratis, retusis; caulinis ternatis: caul. declinato. *Syst. veg. ed. 14. All. Fl. Ped. tab. 24. f. 2.*  
*Fragaria* &c. *Cratz. Austr. tab. 1. f. 1.*  
*Pentaphyllum* &c. *Tabern. ic. 123.*  
*Pentaphyllum* &c. *Barr. ic. 709.*  
*In Europæ pascuis siccis montanis frigidioribus* 24.  
Variabilis plantula magnitudine fol. numero dentium, hirsutis; pene etiam calva est. Caul. pl. superne laxè ramosi. Fol. radical. petiol. medio ma. sericea. Stipul. magnæ, biaures, ovat--lanceol. Fl. in summis ramulis solitar. Cal. valde hirsutus, intus flavus, extus purpureo. Petal. cordata, lutea, quandoq. macula fulva ad basin.
18. *aurea*. P. fol. radicalibus quinatis, acuminatis, serratis; caulinis ternatis: caule declinato. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 114.*  
*Quinquefolium* 3. &c. *Clus. hist. 2. p. 105.*  
*In alpidibus Italiæ, Helvetiæ &c.*  
*Differt a priore, quod maior magisq; pilosa, præcipue calyce: quod fol. floralia magis evidenter opposita. Var. fl. pleno.*
19. *astracantha*. P. fol. radicalibus, & caulinis infimis quinatis: caulibus basi procumbent. dichotom. villosis. *Syst. veg. ed. 14. Jaq. ic. rar.*  
*In Astracan.*  
Primo anno fol. radicalia; subsequis caul. pl. adscendent. pedic. teretes; in pedunculos paniculatim solutos. Fol. inferiora petiolata, hirsutula, cum stipula auriculata; foliol. sessil. obtusis, inciso-serratis. Caulina superiora, & ramea ternata, foliol. æqualibus, & incis. Summa ad peduncul. opposita, sessil. 3-loba, vel potius stipulæ 3-lob. Pedunculi breves, 1-fl. C l. hirsutus. Petal. flava. Anth. luteæ.
20. *canadensis*. P. fol. quinatis, villosis: caule adscendente, hirsuto. *Syst. veg. ed. 14.*  
*In Canada* 24.  
*Habitus Fragariæ.* Caul. digital. ramosus, rarioribus fol. Fol. radical. Foliol. obovata, acute serrata, petiolis albo--hirsutis. Cor. lutea.



*Simil. P. vernæ, a qua differt fol valde pilosis, subrotund. argute ferratis; & caule valde hirsuto.*

21. *alba.* P. fol. quinatis, apice conniventi-ferrat. caulibus procumbent. filiform. receptacul. (plerumque) hirsutis. *Syst. veg. ed. 14. Jacq Austr. 2. tab. 115.*

*Pentaphyllum maius &c. Clus. hist. 2. p. 105. In alpibus 4.*

Caul. breves, nigricant. raro foliosi, 1-2-3-fl. Fol. longe petiol. radicalia ampla. Foliol. obverse lanceol. supra glaberr. late virent. subtus pallidiora, sericeo villo pubescent. Petal. obverse cordata, nivea.

22. *caulescens.* P. fol. (infinis) quinatis, apice conniventi-ferratis: caulibus decumbent. multisl. receptacul. hirsutis: petalis oblongis. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. Austr. 3. tab. 220.*

*In alpibus 4.*

*Similis priori.* Cauliculi 3-6 unc. foliosi, ramosi, quandoq. nutantes. Fol. radical. petiol. retusa, pene ovata, ora sericea, & splendente: caulina pleraq: ternata, cum stipulis: summa aut nulla, aut simplicia. Cal. hirsuti, purpur. Petal. angusta, alba.

23. *Clusiana.* P. fol. quinatis, apice conniventi-ferratis: caulibus decumbent. multisl. receptacul. hirsutis: petal. subrotund. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. Austr. 2. tab. 116.*

*In Austria 4.*

*Differt a priore petal. tantum subrotund. idcirco separanda non est.*

24. *nitida.* P. fol. (infinis) subternatis, tomentosis, conniventi-tridentat. caulibus 1-fl. receptacul. lanatis. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. Austr. 5. tab. 25.*

*Heptaphyllum &c. Bocc. mus. 2. tab. 9.*

*In monte Baldo &c. 4.*

*Adfinit duabus prioribus.* Cespes magnus. Caul. pl. semiprocumb. 1-2-pollic. sericei. Foliol. obovat. aut oblong-ovata. acutiuscul. sericeo-toment. apice tantum dentata: folium superius quandoq. simplex, ovat-acutum, integerr. Flos magnus, speciosus. Petal. subcord. rosea.

25. *valleria.* P. fol. (radicalibus) subseptenatis, obovat. ferratis, tomentosis: caul. erecto. petalis ca-

lyc. brevioribus : receptacul. lanatis. *Syst. veg. ed. 14. All. Fl. Ped. tab. 24. f. 1.*

*In alpinis Valderianis, & Vinadenfibus* 24.

Tota planta sericeo-incana, caulibus, & petiolis evidenter subhirsutis. Rad. crassa, rubra, multiceps. Hæc capita porrigunt innumera fol. longe petiol. & caul. pl. suberectos, aut aliquantulum reclinatos. Fol. ex ampla stipula petiolata, petiolis hirsutis. Foliol. obovata, serrata, firma, venosa, & subtus nervosa. Caul. plerumq. palmares, subnudi, apice ramosi, fl. corymbum sustinentes. Fol. caulina quinati, & stipulis brevius hamatis infidentia. Fol. ad originem ramorum ternata. Petal. dilutissime sulphurea, aut alba, conniventi plerumq. calyce minora.

26. *reptans*. P. fol. quinati: caule repente: pedunc. 1-fl. *Syst. veg. ed. 14. Sabb. hort. 4. tab. 45. Black. Ludw. ed. tab. 116.*

*Quinquefolium* &c. *Fuchs. hist. 624.*

*Cinquefoglio*. *Matth.*

*In Europæ apricis argillosis* 24.

Caul. purpurasc. Fol. longe petiol. etiam septena. Foliol. crenata, villosa. Stipul. 2. trifoliata. Pedunc. axillar. sulcati. Col. segment. alternis, ovato-lanceol. Petal. magna, cordata, flava.

\*\* *Fol. ternatis*.

27. *monspeliensis*. P. fol. ternatis: caule erecto, ramoso: pedunc. supra genicula enatis. *Syst. veg. ed. 14. Pentaphylloides* &c. *Moris. hist. 3. f. 2. tab. 20. f. 2.*

*Habitat Monspelii* ☉.

Caul. pl. pedal. dichotomi. Fol. petiol. Foliol. obverse ovata, obtuse, & æqualiter serrata. Stipul. semicord. Pedunc. 1-fl. Petal. integra, lutea.

28. *norvegica*. P. fol. ternatis: caule dichotomo: pedunc. axillaribus. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 171. Quinquefolium* &c. *Loef. prujf. tab. 70.*

*In Norvegiæ &c. agris* ☉.

Omnium minima. Caul. 1-unc. Fol. radical. petiolat. paucis, sed magnis dentibus prædita, lanceol. hirsuta, non sericea: caulina ex 2.

- stipulis. Fl. terminal. pauci. Petal. cordata, venosa, lutea.
29. *nivea*. P. fol. ternatis, incis, subtus tomentosis: caule adscendente. *Syst. veg. ed. 14. Gunn. norv. tab. 3. f. 1. Gmel. Sib. 3. tab. 36. f. 1.*  
*In arboribus Lapponiæ, Sibiria.*  
*Statura P. vernæ, sed fol. P. argenteæ, at terna, & latiora, magisq. hirsuta, subtus tomentosa, nivea. Caulic. duri. Flos speciosus. Petal. cordata, lutea.*
30. *grandiflora*. P. fol. ternatis, dentatis, utrimq. subpilosis: caule decumbente, fol. longiore. *Syst. veg. ed. 14. Gmel. Sib. 3. tab. 35. f. 1. 2. Scop. Fl. Carn. tab. 22.*  
*Fragaria &c. Vaill. parif. tab. 10. f. 1.*  
*In Helvetia, Pyrenæis, Sibiria &c.*  
 Caul. adscendent. ped. ramosi, foliosi, rufescent. Fol. utrimq. concoloria; primordialia longepetiol. pene rotunda, obtusa, rotunde crenata; adulta tenuiora, acutiora, hirsuta, 3-fid. Cal. villosus, segmentis lanceol. Flos magnus. Petal. emarginata, lutea.
31. *subacaulis*. P. fol. ternatis, (apice) dentat. utrimq. tomentosis: scapo decumbente. *Syst. veg. ed. 14. Gmel. Sib. 3. tab. 37. f. 2. Garid. prov. tab. 37.*  
*Heptaphyllum &c. Bocc. mus. tab. 9.*  
*In Gallo-provincia, Sibiria &c. &c.*  
 Fol. cuneiform. obtusa, rugosa, pilosa, coriacea. Stipul. latæ, acutæ, pilosæ. Scap. vix 2 unc. fol. sæpe longior, 2-1-fl. Petal. magna, lutea, basi flava, emarginata. Stam. lutea.
- 
- dentata*. P. fol. pinnat. foliol. oblong. profunde serratis; exterioribus adproximat. caul. erecto. *Forsk. Æg.*  
*In Arabia.*  
 Caul. ped. Fol. 4-iuga, exter. ma. sesquipollis. Stipul. erectæ, obliquæ, ovat-lanceol. Fl. peduncul. flavi.
- Terglovensis*. P. *Hacquet. Fl. alp. Carniol. tab. 4. f. 2.*  
*In Carniola &c.*  
*Similis P. nutiæ. Caul. pl. suberecti, pollic. una cum fol. & calyce tomentosi, aut dense villosi, glaucescent. Fol. radical. plurima, ternata, subamplexicaul. in inferiore parte mem-*



branac. cæterum petiol. Foliol. subsessil. oblong. ovata, obtusa, integerr. plerumq. plicata: superiora ternata, aut simplicia, cum stipul. brevioribus, lanceol. Flos terminal. solitar. magnus, speciosus, odoratus. Cal. segment. alterne ma. Petal. subcordata, leviter emarginata, pallide rosea.

*rubens.*

P. fol. quinatis, & septenatis (*angustis, cuneiformibus*): caul. suberecto: petal. parvis, cordatis. *Vill. prosp. All. Fl. Ped.*

*In calidioribus collibus, in vineis, & ad vias locis apricis saxosis, & argillaceis Liguria, Montisferrati, Austria &c.*

Caul. pl. flexuosi, nitidi, altera parte rubentes, longis pilis instructi. Fol. splendide, & obscure virentia, glabra, subtrus in costa pilosa. Stipul. amplexicaul. Foliola profunde dentata. Fol. sub ramis ternata, cum stipulis simpliciter 2-fidis. Rami in apice dichotomi. In dichotomia flos longe pedunculatus. Cal. hirsutus. Flos magnus, luteus. Petal. calyce maiora.

764. TOR- Cal. 8-fid. lacinijis alternis minoribus Petal. 4.  
MENTILLA. Sem. 8. nuda, rotunda, receptaculo parvo, exsucco adfixa.

1. *erecta.* T. caule erectiusculo: fol. sessilibus. *Syst. veg. ed. 14. Sabb. hort. 4. tab. 46. Black. tab. 445. Fl. Dan. tab. 589. Ludw. ed. tab. 174. Knorr. del. 2. tab. 1. Matth.*

*In Europæ pascuis siccis* ♀.

Rad. tuberibus constans. Caul. a 2. unc. ad pedem alti. Foliol. plerumq. 7. petiolo communi innixa, dura, sature virent. venosa, glabra. Pedunc. axillar. 1-fl. Petal. obcord. lutea.

2. *repens.* T. caul. repente: fol. petiolat. *Syst. veg. ed. 14. Pentaphyllum &c. Plot. oxf. tab. 9. f. 5. In Anglia* ♀.

Caul. radicans. Foliol. pallide virent. duriora, glabra. Petal. flava.

765 GEUM. Cal. 10-fid. Petal. sub 5. Sem. arista geniculata.  
1. *virginianum.* G. fl. nutantibus: petalis cal. minoribus: fructibus globosis; aristis uncinatis, nudis: fol. (superioribus) ternatis. *Syst. veg. ed. 14.*

*G. laciniatum. Murray. Comm. nov. Gout. 1774. tab. 2. An G. canadense. Jacq. Hort. tab. 175?*

Caryophyllata &c. *Herm. par. tab. 111.*

*In Virginia, Sibiria 4.*

Fol. inferiora pinnata, laciniata, lacin. linearibus. Stipul. exiguae, incisae. Pedunc. supra incrassati. Petal. calyce breviora, angusta, luteo--alba.

2. *urbanum*. G. fl. erectis: fructibus globosis, villosis; aristis uncinatis, nudis: fol. infimis lyratis. *Syst. veg. ed. 14. Sabb. hort. 4. tab. 43. Black. tab. 253. Ludw. ecc. tab. 36. Fl. Dan. tab. 672.*

Caryophyllata. *Dod. pempt. 137. Mauh.*

*In Europæ umbrosis 4.*

Rad. aromatica. Caul. cubit. apice ramosus, villosus, multifl. Fol. radical. stipul. magnis, dentatis, pinnula impari ma. super. 3--loba. Petal. lutea.

3. *canadense*. G. fl. erectis: seminibus hirsutis: aristis nudis: fol. omnibus pinnatis; pinnis cuneiform. incis. *Syst. veg. ed. 14. Murr. Comm. Gott. 1774. tab. 4.*

*In Canada.*

*Differt a G. canadensi. Jacq. Hort. 2. tab. 175. quod petala alba, sem. corpore suo, & ad uncinum aristæ pilosa habet.*

4. *japonicum*. G. fl. erectis: fructibus hirsutis, aristis nudis: fol. subtrilobis. *Syst. veg. ed. 14. Thumb. Jap.*

*In Japonia.*

Caul. ped. & ultra, erectus, teres, apice, & parum ramosus, flexuosus, hirsutus. Rami breviss. alterni, subtomentosi. Fol. pollic. alterna, petiol. subrotunda, dentata, mollia, villosa. Petiol. tomentosi. Stipul. 2. foliaceae, ovatae. Fl. in apice caul. & ramorum, solitar. Cal. lacin. alternis. Petal. longitudine calyc. Sem. ovata, pilis griseis hirta: aristæ uncinatae.

5. *rivale*. G. fl. nutantibus: fructu oblongo; aristis plumosis, tortis. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 722.*

Caryophyllata &c. *Lob. ic. 694.*

*In Europæ pratis subhumidis 4.*

Caul. erectus, cubit. apice ramosus, subpurpur. Fol. interrupte--pinn. subhirsuta. Pinnulae latiores. Cal. purpur. Petal. 6-7 lata, emarginata, connivent. venosa, rubella. *Ludit fl. ex latere proliferis; fl. pleno; luteo.*

6. *hybrida*.

6. *hybridum*. G. fl. nutante; calyc. folioso, cor. polypetalam  
excedente. *Jacq. ic. rar. tab. 6.*

*Habitas* . . .

Rad. horizontal. Fol. radical. plura, longe petiol. subpinn. pinna terminali maxima, ovata, plerumq. 3-loba, ferrato-dent. reliquis pinnulis parvis, alternis, sessilibus, ovat-lanceol. dentatis. Caul. 1-pl. spirham. vel simplic. & aphylli; aut ramosi, & foliosi. Stipul. magnæ, foliaceæ, oblongæ, profunde, & inordinate simul incisæ, lobis oblongis, ferrato-dent. Flos magnus. Calyx cor. ma. 8-10-12-fid. Petal 8-10-12. obovato-subpeduncul. apice repando-emarginata, erecto-patent. primum pallide straminea, rubro striata, dein magis rubentia, & saturatius striata. *Videtur hybridum a patre G. montano; matre G. rivali.*

7. *montanum*. G. fl. inclinato, solitario: fructu oblongo; aristis erectis, villosis. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. Austr. 4. tab. 373.*

Caryophyllata *montana*. *Cam. epit. 727. Matth.*

b. Caryophyllata *alpina* &c. *Barr. rar. 399.*

*In alpinis Italiae, Helvetiae &c. 24.*

Caul. 3-unc-ped. simpl. 1 fl. Fol. cordata, obtusa, incisa, crenata, hirsuta, pinna extrema ma. Flos plerumq. solitar. magnus, patens. Petal. etiam septena, emarginata, subrotunda, lutea. *Melius G. alpinum.*

8. *reptans*. G. fol. uniform. incis, alternis minoribus: flagellis reptantibus. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. Austr. 5. tab. 22.*

Caryophyllata &c. *Barr. rar. tab. 400. Bocc. mus. tab. 128.*

*In Helvetiae &c. montibus 24.*

Scapi vix fol. longiores, rubri, 1-fl. bracteati. Flagella longa, rubra. Fol. pinnata, 5-6-iuga, hirsuta, pulposa. Pinnul. primæ parvæ; ultimæ minores, subcuneiform. 3-5-fid. Flos magnus. Petal. emarginata, lineata, flava.

766. *DRYAS*. Cal. 5-10-fid. Petal. 5-8. Sem. caudata, pilosa. Convenit cum *Geo*, calyce, & fructu: differt petalis pl. quam 5.

1. *anemonoides*. D. pentapetala, fol. pinnatis; pinnis omnibus distinctis. *Syst. veg. ed. 14. Pallas. it. 3. tab. E. c. f. 4.*

*Tom. III.*

S



*Caryophyllata pentaphyllæ*. Bauh. hist. 2. p. 398.  
quoad solam fig.

*Anemone pusilla*. Nov. comm. Petrop. P. 1. tab.  
19. f. 2. 3.

In *Camjchaika* 24.

Scapus filiform. quandoq. fol. unico, ternato,  
sessili donatus. Stolones decumbent. apice fron-  
descientes, lignosi. Foliol. 7-9. oblongo-linear.  
fere cuneiform. glabra, superne obtuse ferra-  
ta; inferiora min. Stipul. filiform. angustiss.  
Cal. 10-fid. Petal. subrotunda, obtusa, pa-  
tentia, alba.

2. *geoides*. D. pentapetala; fol. pinnat. pinnis extimis con-  
fluentibus. Syst. veg. ed. 14. Pall. it. 3. tab. V.  
f. 1. Jacq. hort. App. tab. 68.

Habitat . . .

*Similis G. reptanti*. Rad. sapore Caryophylli aro-  
matici. Fol. radical. pinnata, utrimq. hirsuta;  
foliol. inæqual. superne incisa, obtusa, exte-  
riora ma. Pedunc. radical. erecti, vel adscen-  
dentes, hirsuti, 2-3-fl. His fol. pauca, par-  
va, distantia, sessil. lanceol-acuta. Cal. semi-  
10-fid. extus pilosus, lacin. alternis breviss.  
Petal. 5. subrotun. ampla, integra, patent.  
flava.

3. *oëopetala*. D. fol. simplicibus. Syst. veg. ed. 14.  
Leucas. Fl. Dan. tab. 31. --- Clus. hist. 2.  
p. 351.

In *Europæ alpibus* 24.

Planta cespitosa. Scapus dodrant. aphyllus, (in  
alpibus dilute rubens) hirsutus. Fol. cordat-  
ovata, crenata, dura, subtus tomentosa. Pe-  
dunc. 1-fl. Flos patulus. Cal. stellatus, nigris  
villis adspersus. Petal. raro 5-6-10. plerumq.  
8. lutea, vel aba. Fructus arcuatus; pilosus.

767. COMA- Cal. 10-fid. Petal. 5. calyce min. Receptaculum  
RUM, seminum ovatum, spongiosum, persistens.

1. *palustre*. C. Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 636.

Pentaphyllum &c. Cord. hist. 95.

Quinquefolium quartum. Dod. pempt. 167.

Quinquefol. palustre. Cam. epit. 762.

In *Europæ uliginosis* 24.

Planta decumbens, rubra. Caul. cubital. apice  
multifl. Fol. non ut in *Pentaphyllo* ab eodem  
puncto orta, sed 2-pinnat. impari ma. pinnae

quinæ-septenæ, ellipticæ, acutæ, serratæ. Stipul. ovat-lanceol. Cal. lacin. 5-7. alternema. obscure purpureis. Petal. parva, calyce breviora, ligulata, rubra. Stam. rubra.

768 CALY- Cal. 1-phyll. urceolatus, squarrosus, foliol. colorat. Cor. calycina. Styli plurimi stigmat glanduloso. Sem. plurima, caudata, intra calycem succulentum.

1. *fleridus*. C. petalis interioribus longioribus. *Syst. veg. ed. 14.*

Butneria &c. *Duham. arb. 1. tab. 45.*

Bastaria &c. *Mill. ic. tab. 60.*

Beureria &c. *Ehret. pict. tab. 13.*

Frutex &c. *Catesb. Car. 1. tab. 46.*

*In Carolina h.*

Frutex 8-10-ped. cortice aromatico, ramosus.

Fol. opposita, ovata. Fl. laterales, solitar.

Cal. segmentis reflexis. Petala crassa, rigida, sordide rubentia.

2. *præcox*. C. petal. interioribus minutis. *Syst. veg. ed. 14.*

Obai, seu Robai. *Kamph. am. exot. tab. 879.*

*In Japonia h.*

Frutex surculis inordinate ramosis. Fol. opposita, breviter petiol. inferne adtenuata, oblongo-acumin. venosa, tenuia, subaspera, subtus dilute virent. Fl. ante fol. prodeunt, breviter peduncul. dilute flavi.

## NOVA GENERA.

### MONOGYNIA.

#### TOUROULIA.

**P** Cal. Erian. 1-phyll. turbinat. 5-dent. denticul. subrotund. acutis. Bract. 2. oppositæ ad basin.

Cor. Petal. 5. subrotund. concava, in orbem expansa, calycis intra divisuras inserta.

Stam. Filam. numerosa, intra petal. calyc. in-

ferta. Anth. 2--locul. lobulis basi divaricatis.

*Pistil.* Germ. inferum, calyc. fundo adnatum. Styl. nullus. Stigm. oblong. striatum.

*Peric.* Bacca carnosa, orbicul. tota striata, compressa, denticul. calyc. coronata, 7-locul. sapore acido.

*Sem.* solitar. oblonga, angulata, extus convexa, villosa, ferruginea.

1. *Guianensis*. T. *Aubl. Guian. tab.* 194.

*In Caribæis* h.

Arb. 40-50-ped. superne ramosa, ramulis sparsis.

Fol. opposita, petiol. impari-pinn. Foliol. 4-iuga, opposita, sessil. dentata, super. ma. Stipul. 2. breves, flavæ, ad basin petioli. Fl. terminal. racemosi. Bract. geminæ, flavæ.

Petal. flava. Bacca ex rubro-flavescentes.

### C A T I N G A.

*Cal.* Perian. minimum, 1-phyll. 4-dent. denticul. acutis.

*Cor.* . . . .

*Stam.* Filam. numerosa, calyci inferta.

*Pistil.* Germ. inferum.

*Peric.* Drupa globosa, vel ovata, Aurantii, aut Citri forma, extus vesiculis numerosis, dissepiment. 1-locul.

1. *moschata*. C. fol. ovat-oblong. acuminat. fructu Aurantii forma. *Aubl. Guian. tab.* 203. f. 1.

*In Caribæis* h.

Arb. procera, ramosa, ramis undiq. sparsis, declinatis. Fol. opposita, quandoq. subalterna, longe acumin. foraminulata. Fruct. axillar. racemosi, globosi, odore moschato.

2. *aromatica*. C. fol. ovat-oblong. acuminat. fructu Citriform. Ocymi odore. *Aubl. Guian. tab.* 203. f. 2. 3.

*In Caribæis* h.

Differt a priore fig. fructus ad Citrum accedente, & odore Ocymi.

### R A V E N S A R A.

*Cal.* Perian. parvum, truncatum.

*Cor.* Petal. 6. semilineam longa, ovalia, subto-ment. & potissimum intus.



*Stam.* Filam. 6. ad basin petalor., & cætera 6. cum petalis alternatia, brevia. Anth. subrotund.

*Pistil.* Germ. parvum. Styl. brevis. Stigm. pubescens.

*Peric.* Drupa magnitudine Cerasi. Nucleus coriac. aromaticus.

*Sem.* ut in *N. Juglandi*.

1. *aromatica*. *R. Sonnerat. Voyag. aux Ind. &c. 2. tab. 127.*

*In Coromandeli*  $\S$ .

Arb. trunco crasso, pyramidali, cortice rufescente, & aromatico. Lignum durum, album, fibris rufescentibus. Fol. alterna, petiol. ovalia, plerumq. obtusa, raro acuta, utrimq. glabra, supra virid. subtus glauco-albentia, firma, nervo longitudinali. Fl. panicula ad ramorum apicem, quorum una terminalis; cæteræ 2. in axill. extremorum folior. Fl. minutiss. Fruct. solitar. Sem. odore aromatico; sapore acri, caustico.

## POLYGYNIA.

### PARINARI.

*Cal.* **P**eriant. 1-phyll. turbinatum, 5-part. lacin. ovatis, acutis, rigidis.

*Cor.* Petal. 5. ovata, acuta, parva, inæqual. intra calyc. lacinias inserta.

*Stam.* Filam. 14. capillar. infra petala calyci inserta, 7. sterilia, 7. fertilia. Anth. subrotund. 2-locul.

*Pistil.* Germ. ovatum, villosum. Styl. cylindrac. hirsutus. Stigm. obtusum, crassiuscul.

*Peric.* Drupa magna, ovata, compressa, 1-locul. cortice crasso, carnoso, fibroso: putamen osseum, compressum, durissimum quasi lapideum, rugosum, striatum, 2-locul.

*Sem.* 1-2. oblong. ovata, amygdalina, sapore dulci.

1. *montana*. P. fol. ovatis, acuminat. magno fructu. *Aubl.*  
*Guian. tab. 204. 205.*

*In Caribæis h.*

Arb. 80-ped. superne ramosa, ramulis villosis, rufescent. Fol. integerr. subtus albo-tomentosa. Stipul. 2. latæ, ad basin petiolor. semiamplex. Fl. terminal. racemosi, peduncul. tomentosis, incanis. Cal. tomentosus, nitens. Cor. alba. Drupa fulva, glabra. Nucleus dulcis, edulis.

2. *campestris*. P. fol. cordatis, acutis: fructu parvo. *Aubl.*  
*Guian. tab. 206.*

*In Guiana h.*

Arb. 30-40-ped. superne ramosa, ramulis villosis, candicantibus. Fol. alterna, subseff. supra virid. subtus tomentosa. Stipul. 2. semiamplexicaul. villosæ. Fl. axillar. & terminal. racemosi. Cor. ut in priore. Drupa e fusco-virens.

## COUEPIA.

*Cal.* Perian. 1-phyll. fauce tumida, limbo 5-part. laciniis inæqual. subrotund.

*Cor.* . . .

*Siam.* Filam. plurima. Anth. minimæ, ovat. 2-locul.

*Pistil.* Germ. ovat. pedicellat. Styl. longus, filiform. Stigma acutum.

*Peric.* Drupa sicca, ovata, cortice crasso, coriaceo, fibroso.

*Sem.* unicum, testa fragili inclusum.

1. *Guianensis*. *C. Aubl. Guian. tab. 207.*

*In Caribæis h.*

Arb. 60 ped. superne ramosiss. Fol. alterna, petiolis rufescent. villosis, ovata, acuta, integerr. undulata, glabra. Fl. terminal. Drupa ovata, cinerea, sulcata. Sem. amarum.

## MOQUILEA.

*Cal.* Perian. 1-phyll. turbinatum, concavum, 5-dent. denticul. acutis, intus villosum.

*Cor.* Petal. 5. subrotunda, in orbem expansa, calyc. infra divisuras inserta.

*Stam.* Filam. numerosa (40), tenuia, cor. longiora. Anth. oblon. obtusæ, 2-locul. versatiles, intra petal. calyc. insertæ.

*Pistil.* Germ. unicum, hirsutum. Styl. lateralis, longitudine filamentor. inferne villosus, superne incurvus, glaber. Stigm. obtusum.

*Peric.* . . . .

*Sem.* . . . .

1. *Guianensis*. M. Aubl. *Guian. tab.* 208.

In *Guiana* h.

Arb. 30-ped. & ultra, costis pl. inferne quasi suffultus, superne ramosus. Fol. alterna, breviter petiol. ovat-oblon. acumin. integerr. rigida, glabra. Fl. axillar. & terminal. racemosi. Cor. alba.

C R E N E A.

*Cal.* Perian. 1-phyll. concavum, 4-part. lacin. subrotun. acutis.

*Cor.* 4-petal. Petal. subrotun. calycis intra divifuras inserta.

*Stam.* Filam. 14. oblonga, intra petala calyci inserta. Anth. subrotun. 2-locul.

*Pistil.* Germ. orbiculatum, calyc. fundo adnatum. Stylus longus. Stigm. oblong. crassiuscul.

*Peric.* Caps. 5-locul. calyce obvoluta.

*Sem.* plurima, minutiss.

1. *maritima*. C. Aubl. *Guian. tab.* 209.

In *Guiana* h.

Caul. pl. 2-ped. nodosi, 4-goni, angulis alatis. Fol. opposita, subsessil. ovata, glabra. Fl. axill. corymbosi, bracteati. Stam. in flore expanso, ad latus declinantia. Cor. alba.

C A S S I P O U R E A.

*Cal.* Perian. 1-phyll. turbinat. 4-5-dent. denticul. acutis.

*Cor.* 5-petal. Petal. ovata, tenuissime laciniata, patent. calyc. fundo inserta.

*Stam.* Filam. 18. Anth. oblong. incumbent. 2 locul.

*Pistil.* Germ. minimum, subrotun. Styl. longus, villosus. Stigm. obtusum.

*Peric.* . . . .

*Sem.* . . . .

S iv



1. *Guianensis*. C. Aubl. *Guian.* tab. 211.

*In Guiana* h.

Arb. 5-ped. superne ramosa. Fol. ad nodos opposita, subsess. ovata, acuta, integerr. glabra. Stipula minima. Fl. axillar. cespitosi, sessil. bracteati. Cor. alba.



## CLASSIS XIII.

## POLYANDRIA.



## MONOGYNIA.

\* *Monopetali*.

769. *Maregravia*. Cal. 6-phyll. imbricat. Cor. 1-petal. conico-ovata, undiq. clausa. Bacca globosa, multilocul. multivalv. polysperma.
770. *Ternstroemia*. Cal. 1-phyll. 5-part. Cor. 1-pet. globosa, campanulata. Bacca exsucca, evalv. 2-locul.
771. *Alstonia*. Cal. imbricat. Cor. 1-petal. 8-10-fid. lacin. alternis.

\* *Tripetali*.

772. *Trilix*. Cal. 3-phyll. segment. ovat. acutis, patentibus, planis. Cor. 3-pet. petal. lanceol. acutis, calyce minoribus.

\* *Tetrapetali*.

773. *Rheedia*. Cal. 0. Cor. 4-petal. Caps. Citriform. 3-sperm. 1-locul.
788. *Mammea*. Cal. 2--phyll. segment. concavis. Cor. 4--pet. Petal. subrotunda, concava. Bacca maxima, globosa, stylo acumin. 1-locul. Sem. 4. callosa.
779. *Papaver*. Cal. 2--phyll. segment. concavis. Cor. 4-raro 5-petal. Petal. magna, subrotun. plana. Caps. magna, ovata, multi-locul. sub stig. persistente poris dehiscens. Sem. plura, septis adfixa.
778. *Chelidonium*. Differt a Papavere fructu siliquoso.
774. *Capparis*. Cal. 4-phyll. coriaceus ex 3 fol. angustis, 4 maiore, cavo, deorsum verso. Petal. 4. magna. Stam. longa. Bacca carnosae, varia, pedicellata, corticosa, 1 locul. polysper.
775. *Azaea*. Cal. 4-phyll. segmentis concavis, deciduus. Cor. 4--petal. Petal. sub 4-gon. utrimq. acumin. decidu. Bacca ovata, 1--locul. sicca. Sem. gemino ordine, semiorbiculata.

282 POLYANDRIA MONOGYNIA.

781. *Cambo-* Cal. 4--phyll. segment. concavis. Cor. 4--pet.  
*gia* . Petal. oblon. concava . Pomum subrotun. 8--  
angul. 8-sperm. Sem. solitar.
791. *Calophyl-* Cal. 4-phyll. coloratus . Cor. 4-pet. Petal. sub-  
*lum* . rotun. concava . Drupa magna , globosa . Nu-  
cleus subglobosus .
792. *Sparrma-* Cal. 4-phyll. Cor. 4-pet. reflexa . Nectaria plura  
*nia* . torulosa . Caps. echinata , angulata , 5-locul.
793. *Vallea* . Cal. 4-5-phyll. Cor. 4-5-petal. Pet. 3-fid. Caps.  
2-locul.
790. *Grias* . Cal. cyathifor. 4--fid. lacin. laceris . Petal. 4.  
coriacea , concava . Drupa magna , basi , &  
apice acumin. 1-sperm. Nucleus 8-sulcat.
806. *Caryo-* Cal. superus , 4-phyll. duplicatus . Cor. 4-petal.  
*phyllus* . minor calyce . Petal. subrotun. crenata . Bacca  
infera , 1-sperm. umbilicata . *Ad Eugenia genus*  
*spectat* .
- \* *Pentapetali* .
803. *Loofa* . Cal. 5--phyll. Cor. 5-petal. Caps. semi--infera ,  
femi-trivalv. 1-locul. polysper.
802. *Mentze-* Cal. 5-phyll. Cor. 5-petal. patens . Caps. infera ,  
*lia* . cylindrica , 3-valv. 1-locul. polysper.
801. *Vateria* . Cal. parvus , 5-fid. Cor. 5--petal. ovata . Caps.  
coriacea , turbinata , 3-valv. 1-locul. 3-sperm.
786. *Sloanea* . Cal. 5-phyll. deciduus . Cor. 5-petal. Stam. ex-  
teriora sterilia , foliacea . Stigm. perforatum .  
Bacca magna , echinata , corticosa , dehiscens ,  
polysper.
807. *Cistus* . Cal. 5-phyll. foliol. 2. minoribus . Cor. 5-petal.  
expansa . Caps. subrotun. 3-valv. 1-5-locul.
809. *Corcho-* Cal. 5-phyll. deciduus , longitudine cor. segment.  
*rus* . erectis , lanceolat. angustis . Cor. 5-pet. Petal.  
erecta , obtusa . Caps. cylindrica , plurivalv.  
sub 5-locul.
783. *Sarrace-* Cal. infer. 3-phyll. super. 5-phyll. Cor. 5-petal.  
*nia* . Petal. ovata , inflexa . Caps. subrotun. 5-locul.  
Stigma clypeatum .
794. *Tilia* . Cal. 5-part. coloratus , deciduus . Cor. 5-petal.  
Caps. globosa , coriacea , 5-valv. 5-locul. basi  
dehiscens . Bractea oblonga , pedunculos multifi.  
substinens .
795. *Cleyera* . Est *Ternströmia meridional*. monente Vahl.
796. *Myristi-* Cal. campanulat. 5-fidus . Cor. 5-petala . Bacca  
*ca* . carnosa , 1-sperm. Membrana reticularis , sic-  
ca , inter baccam , & semen .



789. *Ochna*. Cal. 5-phyll. Cor. 5-petal. Petal. patent. unguibus elongatis. Baccæ 5. 1-sper. receptac. magno, subrotundo, carnosio adfixæ.
782. *Muntingia*. Cal. 5-part. concavus. Cor. 5 petal. Petal. subrotun. patent. Bacca globosa, 5--locul. umbilicata, 1-polyperm.
798. *Elæocarpus*. Cal. 5-part. segment. lanceol. Cor. 3--5--petal. lacera. Anth. apice 2-valv. filis cirrhosis terminatæ. Drupa nucleo crispo.

\* *Delphinium Consolida; Aiakis; Aconiti*.

\* *Hexapetali*.

480. *Argemone*. Cal. 3-phyll. Cor. 4-5-6--pet. Caps. ovata, spinosa, semivalv. 1--locul. Differt a *Papavere caps. semivalvata*.
804. *Lagerstræmia*. Cal. campanulat. 6--fid. Cor. 6-pet. Petal. conferta, crispa. Stam. multa, quorum 6. exteriora crassiora, petalis longiora.
205. *Thea*. Cal. parvus, 5-6-phyll. Petal. 6-9. magna, concava. Caps. 3--cocca. Sem. globosa, solitar. Pertinet ad *Polyandriam trigyniam*.
799. *Lecythis*. Cal. imbricat. 6-phyllus. Cor. 6-petal. Petal. 4. superior. subrotun. 2. infer. oblon. ma. Stam. nectario lingulato connata. Caps. lignosa, pulposa, circumscissa, polyperm.

\* *Oðopetali*.

776. *Sanguinaria*. Cal. 2-phyll. Cor. 8-pet. Petal. oblon. expansa. Caps. ovata, 1-locul. polyperm.

\* *Enneapetali*.

776. *Podophyllum*. Cal. 3--phyll. Cor. 9--pet. Petal. plicata. Bacca ovata, stigmate coronata, 1-locul.

\* *Thez*.

\* *Decapetuli*.

785. *Bixa*. Cal. 5-dent. Cor. duplex, 5-petal. Caps. 2-valv. 1-locul.

\* *Polypetali*.

784. *Nymphaea*. Flos magnus. Cal. intus coloratus, 4--5-phyll. persistens. Cor. polypetal. Bacca magna, truncata, corticosa, multilocul. polysperma.

\* *Apetali*.

787. *Trewia*. Cal. superus, triphyll. lacin. reflexis. Cor. o. Caps. 3-cocca.
808. *Prockia*. Cal. 3-phyll. segment. ovat. præter foliola 2. bafeos. Cor. o. Bacca 5-angul. 5-locul.
797. *Lætia*. Cal. 5 phyll. Cor. o, seu 5-petala. Fruct. globosus, 3-valv. 1-locul. polysperm. Sem. arillo pulposo.
810. *Segue-  
ria*. Cal. 5-phyll. Cor. o. Caps. 1-sperm. ala magna terminata, alulisque lateralibus.
800. *Delima*. Cal. 5-phyll. segment. obtusis. Cor. o. Bacca magna, acumin. 2-valv. 2-sper.

## DIGYNIA.

814. *Calligo-  
num*. Cal. 5-phyll. segment. oblon. concavis. Cor. o. Styl. o. Fruct. echinato-uncinat. 1-sperm.
813. *Forher-  
gilla*. Cal. truncat. integerr. Cor. o. Germ. 2--fid. Caps. 2-locul. Sem. solitar. ossea.
812. *Curatella*. Cal. 4-5-phyll. segment. subrotun. concavis; infimo petaliform. Cor. 4-5-pet. calyci simillima. Styl. 2. Caps. 2-part. locul. 2-sperm.
811. *Pæonia*. Cal. 5-phyll. inæqual. segmentis rotundat. concavis. Petal. 5. magna, subrotun. concava, æqual. Ovaria bina-terna. Caps. ovat. reflexæ, patent. 1-locul. polysper. stigmate oblong. persistente instructæ. Sem. colorata.

## TRIGYNIA.

815. *Delphini-  
um*. Cal. o. Pet. 5. radiata; supremum in conicum calcar abit. Nect. in centro fl. extans, sessile, 1-2-phyll. fructificationem recondens. Filam. exeunt a membrana latiuscula, cuius apici adhærent.
816. *Aconitum*. Cal. o. Pet. 5. infer. 4. orbiculata; 5. m supremum cucullatum, quasi galeatum. Nectar. 2. peduncul. recurva. Siliquæ 3-5. Sem. angulosa, vel rugosa.

\* *Reseda Luteola*. \* *Corchorus*.

## TETRAGYNIA.

819. *Cimicifu-* Cal. 4-phyll. segment. concavis. Cor. nectar. 4.  
*ga.* urceol. Caps. 4. Sem. squamosa.  
 817. *Tetrace-* Cal. 6-phyll. patens, persistens, segment. subrotun.  
*ra.* alternis brevioribus. Caps. 4. 1-locul. 1-sperm.  
 818. *Caryocar.* Cal. coloratus, 5-part. segment. obtusis, conca-  
 vis, deciduis. Cor. 5--pet. Petal. 5. magna,  
 ovalia, concava. Styli sæpius 4. Drupa maxi-  
 ma, sphaerica, nucleis 4. fulcis reticulatis.

## PENTAGYNIA.

820. *Aquile-* Cal. o. Petal. 5. expansa, æqualia, ovata, pla-  
*gia.* na. Nectar. 5. corniculata, inter petala. Caps.  
 5. distinctæ. Fol. umbelliferarum more divisa.  
 821. *Nigella.* Cal. o. Petal. 5. ovata, expansa æqualia. Nectar.  
 5. trifida, intra cor. Caps. 5. connexæ. Fol.  
*capillacea.*  
 822. *Reaumu-* Cal. 5-phyll. Cor. 5-petal. Nectar. 10. adnatis,  
*ria.* ciliatis. Caps. 5-locul. 5-valv. polysper.  
 823. *Brathys.* Cal. 5-phyll. Cor. 5-petal. Nectar. o. Caps. 1-  
 locul. polysperm.

\* *Aconitum Anthora*; *variegatum*.

## HEXAGYNIA.

824. *Stratio-* Spatha 1-2-phylla. Cal. 3-fid. Petal. 3. cordata.  
*tes.* Bacca intra spatham, 6-locul.

## POLYGYNIA.

844. *Houtuynia.* Cal. 4-phyll. Cor. o. Stam. mixta pistillis.  
 845. *Hydra-* Cal. o. Petal. 3. ovata. Bacca composita acinis  
*flis.* 1--sperm.  
 835. *Atrage-* Cal. 4-phyll. Petal. 10-12. Tubæ pilosæ, sericeæ.  
*ne.* Sem. plurima arcuata, aristata.  
 836. *Clematis.* Cal. o. Petal. 4-raro 5-6-oblon. obtusa, rigida,  
 venosa. Styli subulati. Sem. plurima, ovata,  
 stylo instructa adunco, aut plumoso.  
 837. *Thali-* Cal. o. Petal. 4 5. caduca. Germ. plura, pedi-  
*trum.* cellata, stigmate simpl. instructa evadunt. caps.  
 striatæ, aut alatæ. Fol. *Umbelliferarum* more  
*divisa.*  
 841. *Isopyrum.* Cal. o. Cor. 5-pet. Petal. ovata, patentia, de-  
 cidua. Nectar. 3-fida, tubulata. Caps. arietini-  
 næ, polysperm.



842. *Helleborus*. Cal. o. Petal. 5-plura, magna, obtusa, concava, persistent. Nectar. plura, bilabiata, tubulata. Caps. pl. erectiuscul polysper. distinctæ.
843. *Caltha*. Cal. o. Petal. 5. patent. plana, ovata, decidua. Caps. pl. polysperm. bicarinatæ.
834. *Anemone*. Cal. o--3--hd Petal. 6-9. erecto--patula. Sem. plurima placentæ comm. fixa. *Involucrum quandoq; pro calyc.*
830. *Michelia*. Cal. truncatus, 3-phyll. lacin. lanceolat. Petal. 15. lanceol. Baccæ glomeratæ, globosæ, 4-sperm.
840. *Trollius*. Cal. o. Petal. sub 14. conniventia. Nectar. plura, plana, basi perforata, linear. inter petala, & stam. Caps. plurimæ, ovatæ, polysperm.
825. *Wintersia*. Cal. 3-lobus. Cor. 6--12-petal. Germ. clavata. Bacca obovata.
833. *Unona*. Cal. 3-phyll. Cor. 6-petal. Baccæ pl. pedicellatæ, 2-sperm.
831. *Uvaria*. Cal. 3--phyll. planus. Petal. 6. sessil. lanceol. Baccæ numerosæ, pendulæ, pedicellatæ, 4--sperm. receptaculo longo adfixæ.
832. *Annona*. Cal. parvus, 3-phyll. Petal. 6. cordata, interiora 3. min. Bacca magna, subrotund. cortice squamato, polysperm. *Similis Magnolia, sed fructus mollis, carnosus.*
828. *Liriodendron*. Cal. 3-phyll. lacin. petaliformibus. Petal. 9 erecta, oblon. Sem. plurima, lanceol. imbricata in strobilum.
829. *Magnolia*. Cal. 3-phyll. lacin. petaliform. Petal. 9. oblong. Capitulæ imbricatæ, 2--valv. Sem. baccata, pendula, renifor.
826. *Dillenia*. Cal. magnus, 5--phyll. lacin. concavis. Pet. 5. magna, coriacea. Caps. pl. connatæ, pulpa repletæ, polysper.
839. *Ranunculus*. Cal. 5--phyll. deciduus. Petal. sæpe 5. obtusa, rigida. Intra ungues fovea mellifera (in quod essentia Generis). Sem. plura, nuda, apice reflexo, in capitulum congesta.
827. *Illicium*. Cal. 6-phyll. Pet. sub 27. in triplicem ambitum digesta, oblong. expansa. Caps. pl. in orbem digestæ, ovatæ, compressæ, 2-valv. 1-sperm.
838. *Adonis*. Cal. coloratus, 5-phyll. Pet. 5-plura, oblong. nitida. Sem. plurima, angulara, corticata, receptac. longo adfixa. *Fol. capillacea.*

\* *Phytolacca icosandra*.

\* *Nigella nonnulla*.

## MONOGYNIA.

769. MARC-**C**AL. 6-phyll. imbricatus. Cor. 1-petal. calyp-  
GRAVIA. triform. Bacca multilocul. polysperm.  
1. *umbellata*. M. Jacq. *Amer. tab.* 96. ed. 2. *pic. tab.* 143.  
*Plum. gen. ic.* 173. Brown. *Jam. tab.* 26.  
Phyllitidi &c. Sloan. *Jam. hist.* 1. *tab.* 28. f. 1.  
*mala*.  
*In Amer. calidiore* h.  
Planta fruticosa, parasitica, repens, ramis pen-  
dulis. Fol. varia, disticha, alterna, petiol.  
ovat-lanceol. integerr. Umbel. simpl. peduncul.  
numerolis, in orbem positis, æqualibus, ho-  
rizontaliter patentibus. Fl. adscendent. nudi,  
cor. calyceque caducis. Discus umbellæ glan-  
dulis nectariferis, sessil. sæpius 5. erectis, for-  
ma cor. rigentis galeæ, seu supremi petal.  
Aconiti, ore ambitum respicientibus. Recep-  
tacul. post casum fl. integrum, nec 5-lobum.  
Sem. & pulpa coccinea.
770. TERN-**C**AL. 1-phyll. 5-part. Cor. 1-petal. 5-6-part. Bacca  
STROMIA. exsucca, evalv. 2-locul.  
1. *meridiona-* T. *Syst. veg. ed.* 14. *Lin. Suppl. Mutif. Amer.*  
*lis.* Vol. I. *tab.* 9.  
*Taonabo dentata.* Aublet *Guian. tab.* 227.  
*In nova Granada* h.  
Arb. ramis determinatis, ramulosis. Fol. alterna,  
subpetiol. coriacea, perennia, ovalia, obtusa,  
subemargin. margine subrecurvato, integerr.  
avenia. Stipul. nullæ. Pedunc. axillar. cernui.  
Cal. rigidus, fere cartilagineus. Cor. 5-raro-  
6-partita, primum globosa; dein campanulata.  
Bacca sicca. Sem. sanguinea, sericea.
771. ALSTONIA. Cor. 1-petal. 8-10-fid. laciniis alternis.  
1. *theeformis.* A. *Syst. veg. ed.* 14. *Lin. Suppl.*  
*In Amer. meridion.* h.  
Frutex glaberr. *Thee Boheæ habitu similis fol.*  
*calycibusq. imbricatis, situ foliorum &c.* Fol.  
alterna, breviter petiol. adproximata, ellipti-  
ca; obtusiuscula, a medio ad apicem obtuse  
ferrata, rigida, venosa. Stipul. nullæ. Fl.  
axillar. 3--4. sessil. Cal. margine membranac.  
Cor. patens, alba.

*Fol. siccata, & masticata salivam tingunt viridescentem & saporem Theë omnino reddunt. An usui Theë inservire possent?*

772. TRILIX. Cal. 3-phyll. Cor. 3-petal. Bacca 5-locul. polysperm.

1. *lutea*. T. Syst. veg. ed. 14.

*Habitat Carthagenæ Americæ h.*

Frutex biorgyal. ramosissim. Rami teretes, scabriusculi. Fol. alterna, petiol. subpeltata, cordat-ovat. acumin. serrata, venosa, pubescent. Petiol. teretes, glabri. Pedunc. plerumq. terminal. pedicell. alternis, 1-fl. Fl. lutei non 2 cor. sed ab anth.

773. RHEEDIA. Cal. 0. Cor. 4-petal. Bacca 3-sperm.

1. *lateriflora*. R. Syst. veg. ed. 14. Plum. gen. tab. 257.

*In America h.*

Arb. ramis articulatis, compressis, lævibus, pubescent. Fol. opposita, petiol. lanceol. integerr. crassa, nervosa, glabra; petiolis brevibus, pubescent. Pedunc. axill. subterni, 3-fid. 3-fl. Petal. obovata, concava, patentia, lutea.

774. CAPPA-RIS. Cal. 4 phyll. coriaceus, ex tribus fol. angustis; quarto maiori cavo, deorsum verso. Petal. 4. patentia. Stam. longa. Bacca corticosa, peduncul. 1-locul. polysperm.

1. *spinosa*. C. pedunc. 1-fl. solitar. stipul. spinosis: fol. annuis: caps. ovalibus. Syst. veg. ed. 14. Black. tab. 417. Ludw. ed. tab. 107. Bauh. hist. 2. pag. 63.

b. C. fol. acuto. Bocc. fis. tab. 42. f. 3.

Cappari. Matth.

*In Europæ austral. muris, & Orient. ruderalis h.*

Caul. fruticulos. spinosus. Fol. alterna, petiol. suborbicul. integerr. vel emarginata, dura, nitida. Pedunc. axillar. Cor. alba. Stam. purpur. Var. *inermis* in Arabia. Forsk.

2. *zeylanica*. C. pedunc. 1-fl. solitar. stipul. spinosis: fol. ovatis, utrimq. acutis. Syst. veg. ed. 14.

*In Zeylona h.*

*Qui fructum obtinent, dicant, an vari t. sit prioris.*

3. *horrida*. C. pedunc. axillaribus, binis: stipul. aculeat. ramis flexuosis: fol. ovat-lanceol. mucronat. glabris: Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.

*In Zeylona h.*

Arb. rigida, aculeis binis stipularibus ab exortu folior.



folior. rubicundis . Fol. petiol. stipula terminata . Pedunc. axill.

4. *sepiaria* . C. pedunc. umbellatis : stipulis spinosis : fol. ovato-emarginatis , annuis . *Syst. veg. ed. 14.*  
Arbuscula &c. *Pluk. alm. tab. 338. f. 3.*  
*In India h.*

Rami teretes . Spinæ stipular. geminæ , breves , recurvæ , nigræ . Fol. subpetiol. nuda . Umbellæ simplic. breviter pedunculatæ .

3. *frondosa* . C. pedunc. umbellatis : fol. passim confertis . *Syst. veg. ed. 14. Jacq. amer. tab. 104. ed. picta tab. 153.*  
*In Carthagenæ , & Domingo sylvaticis h.*

Arbusc. 7-20-ped. Fol. sæpe pedâl. petiolo lato-lanceol. acuta , undulata , integerr. subcoriacea , nitida . Cor. virid. vel purpur. Caps. atro-purpur. nitida , fundo albedo .

6. *ferruginea* . C. pedunc. umbellatis : fol. lanceol. subtus tomentosis , persistent. fl. octandris . *Syst. veg. ed. 14. Jacq. amer. tab. 100. ed. 2. picta tab. 149.*

Cratæva &c. *Brown. Jam. tab. 28. f. 1.*

*In Jamaicâ h.*

Arbuscula 10--ped. Rami ferrugin. scabriusculi . Fol. petiol. integerr. Unbel. simpl. Cor. albidâ , & purpur.

*Pertinet ad Cratævam . Hompton. Journal. des Sçavans . 1785.*

7. *Baducca* . C. pedunc. 1--fl. fol. ovat--oblong. determinate confertis , nudis , perennant. *Syst. veg. ed. 14. Plum. ic. 37. f. 2.*

Breynia &c. *Brown. Jam. tab. 27. f. 2. H. Mal. 6. tab. 57.*

*In Indiis h.*

Planta arborea . Fol. 7--10. alterna , longe petiol. utrinq. glabra , venis obsolete , præcipue subtus , reticulata . Fl. ut in sequenti . Caps. longe peduncul. ovata , obtusa , pendula .

8. *cynophallo-phora* . C. pedunc. terminal. multifl. fol. ovalibus , obtusis , perennantibus : glandulis axillaribus . *Syst. veg. ed. 14. Jacq. amer. tab. 98. ed. 2. picta tab. 145. Plum. ic. 73. f. 1.*

Breynia &c. *Brown. Jam. tab. 27. f. 1.*

*In Amer. meridion. h.*

*Variat habitu , ramis , & fol.* Arbusc. 12--ped. Fol. 3-pollic. alterna , petiol. sæpius oblong. crassiuscula , glabra . Pedunc. breves , 2-4--fl.

Fl. speciosi, patentes, odoratiss. Petal. candida, vel cum virore mixta. Fruct. longissim. filiquosus, pendulus, inflatus, e viridi-purpur. 2-valv.

9. *pulcherri- ma*. C. peduncul. racemosis: fol. oblong. obtusis: fruct. subbaccatis. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. amer. tab. 106. ed. 2. picā tab. 155.*

*In declivibus montium Carthagenæ Amer. h.*

Arb. etiam 12--ped. Fol. alterna, breviter petiol. coriacea, integerr. nitida. Racemus semiped. Fl. pulchri. Petal. ex flavo-albescent. suaviss. Bacca subrotund. e viridi--fusca, carne fætidissima.

10. *linearis*. C. peduncul. subracemosis: fol. linearibus. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. amer. tab. 102. ed. 2. picā tab. 151.*

*In arenosis collibus Carthagenæ Americæ.*

Capf. brevis, glabra, ad semina torosa. Sem. pauca, subreniformia.

11. *Breynia*. C. peduncul. racemosis: fol. oblong. perennant. calycibus, pedunculisq. tomentosis: fl. octandris. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. amer. tab. 103. ed. 2. picā tab. 52.*

*Breynia &c. Breyn. ic. 13. Pluk. phyt. tab. 221. f. 1.*

*In America h.*

Arb. sub 10--ped. superne ramosa. Fol. alterna, petiolis tomentosis, magnitudine varia, integerr. pallide virent. supra nitida, subtus scabra. Fl. terminal. racemosi, albi, odori, quandoq. fasciculum densum efformantes.

12. *hastata*. C. pedunc. multifl. fol. hastato--lanceol. nitidis: *Syst. veg. ed. 14. Jacq. amer. tab. 174. ed. 2. picā tab. 14.*

*In Carthagenæ sylvis h.*

Frutex infirmus; ramis paucis longiss. Fol. alterna, petiolat. coriacea, rigida. Racemi terminal. Petal. purpur. subodora. Capf. 2-valv.

13. *flexuosa*. C. peduncul. terminalibus, congestis: fol. oblong. obtusis, glabris, persistent. ramis flexuosis. *Syst. veg. ed. 14.*

*In Jamaica h.*

Fol. C. *Breyniæ* angustiora, nutantia. Pedunc. breves. Fruct. longus.

14. *filiquosa*. C. pedunc. multifl. compressis: fol. lanceol-oblon.

acumin. persistent. subtus punctatis. *Syst. veg.*  
ed. 14.

Planta forte &c. *Pluk. phytol.* 327. f. 6.

In Jamaica h.

*Simil. priori. Fol. supra nitida, subtus pulvere  
ferrugineo adspersa, valde acumin.*

15. *grandis.* C. corymbis terminalibus: fol. ovat-acutis, gla-  
bris: fruct. globofo. *Syst. veg. ed. 14. Lin.*  
*Suppl.*

In Zeylona h.

Arbor magna, cana. Fol. alterna, integerr. Fl.  
luteo-albidi. Fruct. ma. globosi.

*Carandas.* C. pedunc. sub 3-fl. fol. oppositis, ovatis, acu-  
minat. spinis bifurcatis. *Burm. Ind. Rumph.*  
*amb. 7. tab. 25.*

In India.

*Dahl.* C. spinis axillar. 2. brevibus, oppositis: fol. 2-  
pinnat. pinnis 2-3-iugis; foliol. ovali-oblong.  
obtusis, 4--iugis. *Forsk. Suppl. Æg.*

In Arabia.

*oblongifolia.* C. fol. ovali-oblong. obtusis cum acumine, pe-  
rennant. *Forsk. Æg.*

In Arabia.

Peduncul. terminal. racemosi, teretes. Stam.  
pistillo breviora. Caps. peduncul.

*Mithridatica.* C. fol. alternis, pendulis, lineari-lanceol. *Forsk.*  
*Æg.*

In Arabia.

*Eustachiana.* C. pedunc. multifl. fol. ovatis, acumin. utrimq.  
nitidis: fructibus glabris. *Jacq. amer. ed. 2.*  
*piç. tab. 146.*

In sylvis Insulæ S. Eustachii h.

Habitus C. *cynophallophoræ*, at fol. 4-pollic. sem-  
per ovata, acumin. & minus crassa. Fl. vix  
pollic. Cor. purpur. inodora.

*verrucosa.* C. pedunc. multifl. fol. oblong. acut. utrimq. ni-  
tidis: fructu verrucoso. *Jacq. amer. tab. 99.*  
*ed. 2. piç. tab. 148.*

In Carthagenæ sylvis h.

Habitus *Cynophallophoræ*, sed fol. semper oblong.  
& acuta. Cor. patens, & candida. Caps. ses-  
quipollic. oblonga, viridis, nitida.

*comosa.* C. pedunc. multifl. coma subrotunda, densa.  
*Jacq. amer. p. 160.*



*In Domingo inundatis* h.

Fruct. erectus, 3-ped. ramis numerosis, diffusis.

Fol. ut in *C. octandra*. Coma diametro sub 5-ped. Fl. ut in illa, sed odori. Fruct. simil.

*C. Breynia*, at tenuior.

*jamaicensis*. C. pedunc. multifi. fol. oblong. emarginat. subtus tomentosis: cor. erectis. *Jacq. amer. tab. 101.*

*In Jamaica* h.

Arbusc. erecta, 10-ped. ramosa, comosa. Rami iuniores subtomentosi, cinerei; seniores glabri, nigricant. Fol. 2-pollic. alterna, petiol. coriacea, obtusiss. supra læte virid. nitida, subtus tomentosa, cinerea. Pedunc. terminal. & subaxill. sub 5-fl. tomentosi, cinerei. Fl. fere pollic. sordide albidu, odori.

*tenuifiliqua*. C. racemis erectis, simplic. fol. deciduis: fruct. filiquosis. *Jacq. amer. tab. 105. ed. 2. pict. tab. 154.*

*In Carthageria* h.

Arbusc. erecta, 8-15-ped. parum ramosa. Hyeme fol. spoliatur; dein ex apice ramulor. prodeunt racemi erecti, 6-7-pollic. Dein fol. semiped. alterna, petiol. lanceol. acumin. tenuia, integerr. nitida, tandem oblong-ovata, obtusa, vel acumin. Fl. e viridi-albicant. inodori. Fruct. 6-7-pollic. virides. Caro mollis, albicans, subpellucida.

*nemorosa*. C. fol. acuminat. fl. racemosis: fructu baccato. *Jacq. Amer. tab. 181. f. 69. ed. 2. pict. tab. 154.*

*In Carthageria sylvis* h.

Arb. erecta, 20-ped. ramosa. Fol. alterna, petiol. ovat-acumin. integerr. coriacea, supra nitida, subtus tomentosa. Fruct. oblong-ovatus.

775. ACTÆA. Cal. 4-phyllus, deciduus. Cor. 4-petal. utrimq. acumin. decidua. Bacca 1-locul. sicca. Sem. femiorbicul.

I. *spicata*. A. racemo ovato: fructibus baccatis. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 489. Black. tab. 565.*

Chrystophoriana. *Clus. hist. 2. p. 86. Dod. pempt. 402.*

*In nemoribus Europa* 24.

Caul. sesquicubit. ramosus, geniculat. spongiosus. Fol. circumscript. triangulari, alterna, 2-pinn.

nitida, glabra. Foliol. 5. integra, infer. petiol. superiora sessil. racemi axillar. apice foliosi, ovati. Petal. parva, alba, rombæa, plano-membranac. Baccæ nigræ. *Var. baccis albis, vel rubris in America.*

2. *racemosa*. A. racemis longiss. fructibus siccis. *Syst. veg. ed. 14. Chrystophoriana &c. Dill. elth. tab. 67. f. 78. Pluk. amalth. tab. 383. f. 3.*

*In Florida, Virginia &c. 24.*

Caul. 6-ped. simpl. Fol. petiol. pinnata. Foliol. 5. Fl. terminal. pedunc. trichotomis. Petal. minima, pedicellata, acumine setaceo, gibba, crassa.

3. *japonica*. A. spicis longiss. foliol. incis, palmatis, indivis. *Syst. veg. ed. 14. Thumb. Jap.*

*In Japonia 24.*

Planta herbacea, tota, glabra. Fol. petiol. ternata. Foliol. petiol. simplicia, cordata, 5-7-lobata, subtus pallida, palmam longa, & lata. Spica palmar-spitham. Cal. & cor. caduca. *Differt a priore, foliol. indivis, nec pinnat. foliol. cordatis, æque latis ac longis, nec oblongis; fl. sessilibus &c.*

776. SANGUINARIA. Cal. 2-phyll. Cor. 8-petal. Siliqua ovat. 1-locul.

1. *canadensis*. S. *Syst. veg. ed. 14. Dill. elth. tab. 252. f. 326. Chelidonium &c. Moris. hist. 3. 1. 3. tab. 11. f. 1. b. S. maior. Dill. elth. tab. 252. f. 325. Var. fl. pleno. Dill. elth. tab. 252. f. 326.*

*In Amer. Septentr. 24.*

Planta lactescens succo fulvo *Chelidonii*. Rad. carnosa, Fol. radicale in sinu foveat infantiam fl. more *Osmundæ Lunariæ*, & est folium unicucullatum, petiolatum, subrotund. lobatum, sinibus profundis, angustis. Scap. brevis, subrubens, 1-fl. e singula gemma radice bivalvi. Flos veluti *Cyclamini*, albus.

777. PODOPHYLLUM. Cal. 3-phyll. Cor. 9-petal. Bacca 1-locul. coronata stigmate.

1. *peltatum*. P. fol. peltatis, lobatis. *Syst. veg. ed. 14. Trew. ehret. tab. 29.*

*Anapodophyllum &c. Catesb. car. 1. tab. 24.*

*Aconitifolia &c. Mentz. pug. tab. 11.*

*In Amer. Septentr. 24.*

Rad. tuberculata, alba, late serpens. Caul. 5-

6-unc. rotundus, firmus, albus, bifariam divisus, in cuius apice fol. Napelliform. Flos axillar. pedunculat. Petal. rotunda, concava, subplicata, alba. Fruct. flavus, parum rubescens. P.<sup>o</sup> anno profert caulem 1-fol. 3.<sup>o</sup> vero caulem bifurcatum cum quolibet fol.

2. *diphyllum*. P. fol. binatis, femicordatis. *Syst. veg. ed. 14.*  
*In Virginia h.*

*An Sanguinaria sp? cum fol. unicam binatum, & scap. aphyll. radicalis, & caps. oblonga.*

Fol. radical. petiol. binata, ut in *Hymenaea*, integerr. glabra. Scap. 1-fl.

778. CHELIDONIU. Cal. 2-phyll. Cor. 4-petal. Siliqua linear. Ex apice lato filamentorum, oritur aliud filament. subtilissimum, breve, cui anth. superimponitur.

1. *maius*. C. peduncul. umbellatis. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 676. Black. tab. 91. Knorr. del. 1. tab. S. 23. Fuchsf. hist. 865.*

*Chelidonio maggiore. Matth.*

*In Europa ruderatis ☉.*

Caul. cubit. ramosus, flavo-virens. Fol. alterna, sessil. 2-3-lobata, lobis subrotund. subvillosa, subtus glauca, succo flavo scatentia. Pedunc. axillar. Petal. aurea. *Var. fol. quernis, incis. seu laciniatis: fl. pleno.*

2. *Glaucium*. C. peduncul. 1-fl. fol. amplexicaul. sinuatis: caule glabro. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 585. Knorr. del. 1. tab. R. 19.*

*Papaver corniculatum &c. Clusf. hist. 2. p. 91.*

*Papavero cornuto. Matth.*

*In Europa, & Virginia arenosis ☉.*

Planta glauca, hispida. Caul. prostrati, latissime brachiati, læves. Fol. magna, crassa, succosa, scabriuscula; radical. pinnatifid. caulina lobata. Fl. magni, flavi. Siliquæ scabræ.

3. *corniculatum*. C. peduncul. 1-fl. fol. amplexicaul. pinnatifid. caul. hispido. *Syst. veg. ed. 14.*

*Papaver cornutum. Clusf. hist. 2. p. 91.*

*Habitat in Hungaria, Austria, Monpelii &c. ☉.*

Planta virid. Fol. omnia pinnatifid. Fl. rubro-lutei. Siliquæ hispidæ.

4. *hybridum*. C. pedunc. 1-fl. fol. pinnatifid. linearibus: caule lævi: siliquis trivalvibus. *Syst. veg. ed. 14. Hill Hort. Kevenf. cum fig.*

*Papaver corniculatum &c. Clusf. hist. 2. p. 92.*

*In Europa australi ☉.*



Caul. erectus, sesquiped. ramosus, fragilis. Fol. crassiuscul. duriora, sature virid. Petal. purpuro-violac.

5. *japonicum*. C. pedunc. 2-fl. fol. petiolat. pinnatis, ovatis. *Syst. veg. ed. 14. Thumb. Jap.*

*In Japonia.*

Caul. herbac. erectus, debilis, striatus, glaber. Fol. alterna. Foliol. 3-5. opposita, breviter petiolulata, acuta, incisa, inæqualiter serrata, serraturis ciliatis, glabra, subtus pallida, 1-sesquipollic. pinna ultima ma. Fl. axillar. solitar. peduncul. Cor. lutea.

- dodecandrum*. C. fol. petiolat. 2-pinnatifid. fl. solitar. dodecandris: siliquis hispidis. *Forsk. Æg.*

*In Arabia* ☉.

Caul. suberect. semi-spitham. ramosus, lanato-hispidus. Fol. radical. longe petiol. subovata, laciniis ovatis, seta terminatis. Stipul. nullæ. Fol. caulina ma. petiol. alato stipulata. Pedunc. axillar. & terminal. 1-fl. Cal. hirsutus. Petal. violac. Siliqua 4-gon.

779. PAPA-VER. Cal. 2-phyll. Cor. 4-petal. patens. Caps. multilocul. sub stigmate persistente, poris dehiscens. Sem. plura, septis affixa.

\* *Caps. hispidis.*

1. *hybridum*. P. caps. subglobosis, torosis, hispidis: caul. folioso, multifi. *Syst. veg. ed. 14.*

*Argemone &c. Moris. hist. 3. f. 3. tab. 14. f. 9. Lob. ic. 276.*

*In Europa australi* ☉.

Caul. erectus, ped. ramosus, pallide virens. Fol. laciniata, rigida, sicca, cinereo-virent. caulina ternato--pinnatifid. Fl. min. coccin. Caps. fuscae.

2. *Argemone*. P. capsul. clavatis, hispidis: caule folioso, multifi. (piloso). *Syst. veg. ed. 14.*

*Argemone &c. Lob. ic. 276. Moris hist. 3. f. 3. tab. 14. f. 10.*

*In Europæ campis arenosis* ☉.

Caul. ped. & ultra, rubescens. Fol. pinnata, pinnis inæqualibus, 2-3-fid. glauca, sicca, sordida, rigida. Cal. pilis raris. Fl. min. coccinei,

3. *alpinum*. P. caps. hispida: scapo 1-fl. nudo, hispido: fol. 2-pinnat. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. Austr. 1. tab. 83. Segu. ver. 1. tab. 4. f. 4. Cipp. 2. tab. 6. f. 4.*

P. *Burseri*. *Crantz. Austr. tab. 6. f. 4.*

*Argemone minor* &c. *Dalech. hist. 1714.*

P. *nudicaule*, *Dill. elrh. tab. 224.*

*In Helvetia, Austria &c. 24.*

Fol. plurima, dense, & imbrication nascuntur cum scapis axillaribus. Fol. longis petiol. purpur. ciliatis, sulcatis innixa, 2-pinnatif. desinunt in pinnas exiguas, 2-3-fid. vel. simplices, lacin. lanceolat. glaucis. Scapi semiped. villosi. Petal. magna, in albis austriacis semper nivea; cæterum alba, basi flava.

4. *nudicaule*. P. capsulis hispidis: scapo nudo, hispido, 1-fl. fol. simplic. pinnato-sinuat. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 41.*

P. *erraticum* &c. *Dill. elrh. tab. 224. f. 291.*

*In Sibiria ♂.*

*Adfin. priori cor. alba, & lutea; an cultura solum diversum? Pedunc. & calyces pilosi. Petala magnitudine varia.*

**\*\* Capsulis glabris.**

5. *rhocas*. P. capsulis glabris, globosis: caule piloso, (plerumq.) multifi. fol. pinnatifid. incis. *Syst. veg. ed. 14. Black. tab. 2. 560. Ludw. ed. tab. 17. Knorr. del. 1. tab. R. 14. Dalechamp. hist. 439.*

Papavero erratico. *Matth.*

*In Europæ arvis, agris ☉.*

Planta villosa. Caul. erectus, ramosus. Fol. pallide virent. Cor. coccinea, cum macula nigra; in locis saxosis alba. *Var. fl. pleno.*

6. *dubium*. P. capsul. glabris, oblongis: caul. multifi. setis durioribus adpressis: fol. pinnatifidis, incis. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. Austr. tab. 25? cum petal. constanter rubra, & integra esse deberent.*

*Argemone* &c. *Moris hist. 3. f. 3. tab. 14. f. 11.*

*Inter segetes Europæ ☉.*

*Differt a priore, propagatione; fol. tenuius incis; cal. toto hirsuto.*

7. *somniferum*. P. calycibus, capulisq. glabris: fol. amplexicaul. *Syst. veg. ed. 14. Black. tab. 482. 483.*

*In Europæ australioris ruderalis ☉.*

Planta glabra. Caul. cubital. brachiatus. Fol. magna, glauca, lactescentia. Fl. magni, albi-di, vel dilute purpurei, cum macula nigra.

*Var. sem. albo, nigro; fl. cristatis &c.*

8. *cambrieum*. P. capsul. glabris, oblongis: cau'e multifi. lævi: fol. pinnatis, incis. *Syst. veg. ed. 14. Dill. elth. tab. 223. f. 240.*

*Argemone &c. Moris. hist. 3. f. 3. tab. 14. f. 12.*

*In Cambria septentrion. nemoribus 24.*

Caul. pedal. ramosus, pallidus, fragilis. Fol. cinereo-virent. mollia, flaccida. Fl. ma. flavi. Stigm. 5-6. distincta. Caps. oblonga, inferne angustior, apice subrostrata, olivacea.

9. *orientale*. P. caps. glabris: caulibus 1-fl. scabris, foliosis: fol. pinnat. ferratis. *Syst. veg. ed. 14. Knorr. del. tab. R. 14. a. Tourn. it. 3. tab. 127. Comm. rar. tab. 34.*

*In Oriente ☉.*

Planta hirsuta. Caul. pl. 3-4-pedal. Fol. magna, longe petiol. Flos magnus, ruberrimus. Stam. nigricant. Stigm. 16. Caps. oblong.

780. ARGE- Cal. 3-phyll. Cor. 6-pet. Caps. semi-valvata, in  
MONE. *quo potissimum differt a Papavere.*

1. *mexicana*. A. caps. 6-valvul. fol. spinosis. *Syst. veg. ed. 14. Merian. Surin. tab. 24.*

*Papaver spinosum. Bauh. prod. tab. 92. Clus. hist. 2. p. 93. Moris. hist. 3. f. 3. tab. 14. f. 5.*

*In Mexico &c. ♂.*

Caul. pedal. & ultra. Fol. laciniata, spinula terminata, albis venis notata. Petal. lutea, vel lactea. Caps. magna, 3-gona, 3-locul. in 3. spinas desinens.

2. *armeniaca*. A. caps. 3-valvibus. *Syst. veg. ed. 14.*

*In Armenia.*

Fol. Hypecoi. Fruct. minimus.

3. *pyrenaica*. A. capsul. 4-valvibus: caul. nudo. *Syst. veg. ed. 14. In Pyrenæis.*

*Habitus Papav. alpini.*

781. CAM- Cal. 4-phyll. Cor. 4-petal. Pomum 8-locul. Sem.  
BOGIA. folitar.

1. *Gutta*. C. *Syst. veg. ed. 14. Black. tab. 392.*

*Coddam--pulli. Hort. mal. 1. tab. 24.*

*Carpapuli. Bauh. hist. 1. p. 137.*

*In India ☿.*

Arb. procera, densis frondibus late sparsis. Fol.



opposita, breviter petiol. ovalia, crassa, venosa, fusco-virent. subtus dilutiora, nitent. Fl. in apice ramorum, solitar. breviter pedunculati, flavescent. vel incarnati. Fructus grandes, rotundi, 8-9-10. striati, per maturitatem albescentes. Sem. cœruleo--nigra.

782. MUN- Cal. 5-part. Cor. 5-petal. Bacca 5-locul. 1-pot-  
TINGIA. lysperm.

1. *Calabura*. M. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. amer. tab. 107. & ed. 2. pichia tab. 158. Plum. gen. ic. 205.*

*Calabura alba*. Pluk. mant. tab. 152. f. 4.

Loti arboris &c. Sloan. Jam. hist. 2. tab. 194. fig. 1.

In Jamaica h.

Arbuscula 12-ped. infirma, ramis longis, villosis. Fol. 4-5-pollic. alterna, breviter petiol. disticha, oblong-acumin. basi altera oblitterata, ferrata, villosa, viscida. Pedunc. axillar. villosi. Fl. binati. Cal. cinereus. Petal. alba. Bacca globosa, umbilicata, transversim scissa, roseo-flavescent.

783. SARRA- Cal. duplex, 3-phyll. & 5-phyll. Cor. 5-petal.  
CENIA. Caps. 5-locul. Stylo stigmate clypeato.

1. *flava*. S. fol. strictis. *Syst. veg. ed. 14. Catesb. car. 2. tab. 69.*

*Bucanephyllum* &c. Pluk. amalt. tab. 376. f. 5. bona.

Thuris &c. Bauh. hist. 1. p. 307. Dalech. hist. 1754.

In Amer. septentr. udis 24.

Caul. rectus, elatior. Fol. 1-3-ped. recta, ex angusta basi in conicam inversam figuram sese dilatantia, tubulosa, apice inflexo ad tubum, nervis longitudinalibus, rectis. Pedunc. radical. longi. Fl. terminal. solitar. penduli. Petal. longitudinaliter convoluta, pallide lutea.

2. *purpurea*. S. fol. gibbis. *Syst. veg. ed. 14. Mill. ic. tab. 241. Catesb. car. 2. tab. 70.*

*Bucanephyllum* &c. Pluk. amalt. tab. 376. f. 6. In Amer. septentr. udis 24.

Radix obliqua, fusca. Fol. primordial. 2-3-unc. humifusa, in semicircularem formam abeuntia, plana, coriacea. Alia fol. statim proveniunt 10--12. palmaria, & ultra, cucullata, intus venis atropurpur, parte suprema lata, subro-

tund. subtus hirsutie molli pubescent. Scapus  
e folior. centro pedal. rectus. Flos terminal.  
solitarius, cernuus. Petal. linguiform. obtusa,  
sature purpur. sericea. Caps. semiunc. in latum  
pentagonum, 2-uncial. expansum.

784. NYM- Cal. 4-5-phyll. persistens. Cor. polypetal. Bacca  
PHÆA. truncata, multilocul. polysper.

1. *lutea*. N. fol. cordato-ovat. integerr. calyce 5-phyll.  
petalis ma. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 603.*  
*Black. tab. 497. 499. 500. Knorr. del. 2. tab.*  
N. 1. *Cam. epit. 635. Matth.*

*In Canada, & Europa aquis dulcibus* 24.

Rad. flavescens. Fol. sequenti min. minus ro-  
runda. Petal. sulcata, crenata, lutea, sequenti  
min. Fruct. ovato-conicus, disco coronatus.

2. *alba*. N. fol. cordato-orbiculat. integerr. calyc. 4-fid.  
*Syst. veg. ed. 14. Gmel. Sib. 4. tab. 72. Fl.*  
*Dan. tab. 602. Black. tab. 498. 499. Knorr.*  
*del. 2. tab. N. Cam. epit. 634.*

*Nimfea bianca. Matth.*

*In Europa, & Amer. aquis dulcibus* 24.

Rad. extus subatra. Fol. priore ma. Petal. multa,  
magna, alba. Fruct. sphaericus.

3. *Lotus*. N. fol. cordatis, dentat. *Syst. veg. ed. 14.*  
*Lotus aegyptia. Alp. exot. tab. 213. 216. 218.*  
*220. 222. 226.*

*Ambel. Hort. mal. 11. tab. 26.*

*In calidis India, Africa, America* 24.

Habitus N. *alba*. Caul. fistulosus. Fol. suborbi-  
cul. peltata, primum integra, supra nervosa.  
Petal. ex albo, & viridi purpur. Fruct. super-  
ne 10. hamis, seu corniculis incurvis.

4. *Nelumbo*. N. fol. peltatis, orbiculat. undique integris. *Syst.*  
*veg. ed. 14.*

N. *indica* &c. *Herm. par. tab. 205.*

N. *fabifera* &c. *Pluk. alm. tab. 322. f. 1. optima.*

*Taratti. Rumph. amb. 6. tab. 73.*

*Tamara. H. Mal. 11. tab. 30. & 31.*

*In India, Russia* 24.

Flos magnus *Nymphaea alba*. Cor. coeruleo-purpur.  
Bacca turbinata.

---

*Nouchali*. N. fol. ovalibus, subpetiolat. integerr. *Burm. Ind.*  
*Habitat Coromandeli.*

- Rad. alba, magnitudine Pugni. Fol. petiol. incurva. Petal. cœrul. Fruct. viridis. Sem. rubra.
785. BIXA. Cal. 5-dent. Cor. 10-petal. Caps. hispida, 2-valv.  
 1. *Orellana*. B. *Syst. veg. ed. 14. Pluk. alm. tab. 209. f. 4. Comm. hort. 1. tab. 33.*  
 Urucu. *Sloan. Jam. hist. 2. tab. 181. f. 1.*  
*In Amer. calidiore, ad fossas, & fontes h.*  
 Caul. usque sesquiped. griseo-fuscus. Fol. 4-5-unc. longa, 3. lata, alterna, petiol. cordiform. mucronata, læte virent. cum nervo medio, ex quo venulæ complures oriuntur. Fl. racemosi, albi, vel dilute incarnati. Caps. tumida, acuminata, matura rufescens. Sem. conica, colore miniato, dein obscure rubra.
786. SLOANEA. Cal. 5-phyll. deciduus. Cor. 5-pet. Stigm. perforatum. Bacca corticosa, echinata, polysperm. dehiscens.  
 1. *dentata*. S. fol. cordat-ovatis, denticulat. stipul. ferratis. *Syst. veg. ed. 14. Plum. ic. 244.*  
*In Amer. merid. h.*  
 Arb. medioc. vel frutex altus, ramis erectis, longis, laxis, varie, & rare dispersis. Fol. in apice ramulor. spitham. alterna, subsessil. supra rugosa, subtus tomentosa, pilosa. Fl. in racemo opposito infimo folio, constante ex ramulis alternis, ex quorum apice 3-4. prodeunt, pedunculati.
2. *emarginata*. S. fol. oblong. integerr. emarginatis. *Syst. veg. ed. 14.*  
*Anona &c. Catesb. Car. 2. tab. 87.*  
*In Carolina h.*  
 Arb. parva. Fol. in apice ramorum. Fruct. compressus, scaber, fuscus, acumine longo.
- 
- sinemariensis*. S. fol. subrotund. integerr. fructu parvo, aculeis hispidis. *Aubl. Guian. tab. 212.*  
*In Caribæis h.*  
 Arb. 40-50-ped. superne ramosa. Fol. ampla, alterna, longe petiol. subovat. rigida, glabra, subpendula, fere emarginata. Stipul. 2. deciduæ. Fl. axillar. corymbosi, peduncul. Caps. oblong. 3-4-gona, 4-5-valv. 4-5-locul. Sem. pulpæ molli, rubra obvoluta.
787. TREWIA. Cal. superus, 3-phyllus. Cor. 0. Caps. 3-cocca.  
 1. *nudiflora*. T. *Syst. veg. ed. 14.*



Canfchi . *H. mal.* 1. tab. 42.

*In Malabaria arenosis* h.

Arb. procera . Fol. spithamam , & ultra longa ,  
duos fere palmos lata , longe petiol. ovat--  
acumin. mollia , tenuia , fature virid. subnitent.  
Fl. axillar. racemofi , dilute virid. Caps. plano-  
rotunda , ftriata , etiam matura viridis .

788. MAMMEA . Cal. 2-phyll. Cor. 4-petal. Bacca maxima ,  
4-fper.

1. *americana* . M. flaminibus flore brevioribus . *Syst. veg. ed.* 14.

*Jacq. amer. tab.* 181. f. 82. *ed.* 2. *pid. tab.* 248.

*Plum. ic.* 170.

Mamay . *Bauh. hift.* 1. p. 172. *Dalech. hift.* 1836.

*Malus perfica* &c. *Sloan. Jam. hift.* 2. tab. 217.  
f. 3.

*In Jamaica , Hispaniola* h.

Arb. alta , coma ampla , pyramidali . Fol. 5-8--  
pollic. oppofita , breviter petiol. ovalia , obo-  
vata , obtufa , integerr. firma , coriacea , niti-  
da , ftriis paralellis tranfverfum notata . Pedunc.  
ramei , breves , 1--fl. Petal. candida , odora .  
Bacca subrotunda , 3-4-gona , magnitudine ca-  
pitis infantis , cortice coriaceo , fufco--flave-  
fcente , amaro , ficuti pulpa feminum , fed caro  
gratiff. fapore *Perfici* .

2. *afiatica* . M. flaminibus flore longioribus . *Syst. veg. ed.* 14.

*Mali Perfici* &c. *Sloan. Jam. p.* 124?

*In Java* h.

Arb. magna , fæpius procumbens . Fol. pedalia ,  
obovata , feu oblonga , lævia . Pedunc. 1--fl.  
Fruët. 4-gon.

789. OCHNA . Cal. 5-phyll. Cor. 5--petal. Baccæ 1--fperm.  
receptaculo subrotundo , magno adfixæ .

1. *fquarrosa* . O. racemis lateralibus . *Syst. veg. ed.* 14.

*Japotapita* . *Burm. Zeyl. tab.* 56.

b. *Arbor* &c. *Pluk. alm. tab.* 263. f. 1. 2.

*In India : b. in Africa* .

Arbuscula ramis parum divifis . Fol. in ramulis  
superior. alterna , oblonga , cum venis tranf-  
verfalibus ; glaberrima , inftar *Cinnamomi* .

2. *Japotapita* . O. racemis terminalibus . *Syst. veg. ed.* 14.

*Japotapita* &c. *Plum. amer. ic.* 153.

*In Amer. merid.* h.

Planta fruticofa . Fol. fparfa , fubfeffil. lanceol--  
ovata , vel folum ovata , fubtiliter ferrata ,

- venosa. Petal. lutea. Fruct. cœruleo-ruber,  
ex 2 baccis Olivæformibus, sapore *Myrtilli*.
790. GRIAS. Cal. 4-fid. Cor. 4-petal. Stigma sessile, cruciatum.  
Drupa nucleo 8-fulcato.
1. *cauliflora*. G. *Syst. veg. ed. 14.*  
Palmis affinis &c. *Sloan. Jam. hist. 2. tab. 217.*  
f. 1. 2.  
In *Jamaica* h.  
Arbor. Fol. magna, 3-pedal. obovata. Fl. sparsi.  
Petal. pallide lutea. Fructus magnus, simill.  
*Achras*, sed sapore minus grato.
791. CALOPHYLLUM. Cal. 4--phyll. coloratus. Cor. 4--petal. Drupa  
globosa.
1. *Inophyllum*. C. fol. ovalibus. *Syst. veg. ed. 14.*  
Arbor &c. *Pluk. alm. tab. 147. f. 3.*  
Bintangor &c. *Rumph. amb. 2. tab. 71.*  
Ponna &c. *Hort. mal. 4. tab. 38.*  
In *India* h.  
Arb. præalta, ramis longis, lateq. diffusis. Fol.  
*Nymphaea* simil. spithamam longa, palmum lata,  
opposita, petiol. densa, crassa, dentata, gla-  
bra, supra atro-virid. subtus dilutiora, striis  
transversis distantibus exarata. Racemi termi-  
nal. longe peduncul. Cor. alba. Drupa glabra,  
rufescens.
2. *Calaba*. C. fol. ovatis, obtusis. *Syst. veg. ed. 14. Jacq.*  
*amer. tab. 165. ed. 2. pict. tab. 249.*  
Inophyllum &c. *Burm. Zeyl. tab. 60.*  
Thierou-ponna. *Hort. mal. 4. tab. 39.*  
In *Indiis* h.  
Arb. procera, a terra ramosa. Fol. 4--pollic.  
opposita, breviter petiol. ovata, vel obovata,  
oblonga, obtusa, integra, emarginata, firma,  
nitida, striis paralellis transversis. Pedunc.  
axillar. pollic. simpl. laxi, sub 7-fl. Petal. can-  
dida, odora, antheris luteis. Fruct. viridis.  
Caro pauca, duriuscula, viridis, primo dulcis,  
dein amaricans, sicuti in priore.
- 
- Akara*. C. fol. ovatis, acuminat. fl. terminalibus, pani-  
culatis. *Burm. Ind. Hort. mal. 5. tab. 8.*  
In *India*.  
*Tetracera* sp. monente *Vahl.*
- foulatti*. C. fol. oblong-ovat. lineatis, glaberr. fl. latera-  
libus, pedicellat. *Burm. Ind.*  
In *Java*.

792. SPARR-*Cal.* 4-phyll. *Cor.* 4-petal. reflexa. Nectar. plura,  
 MANIA. torulosa. *Caps.* angulata, echinata, 5-locul.  
 1. *africana*. *S. Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*

*In Africa* h.

*Herba similis Triumphettis, seu Commerstoniae.*

Frutex ramis alternis, erectis, pilosis, teretibus. Fol. alterna, longe petiol. dependentia, cordata, ovata, acumin. sublobata, serrata, 9-nervia, utrinq. hispida. Stipul. laterales, erectæ, subulatæ, pilosæ. Pedunc. oppositifol. erecti, pilosi, terminati in umbellam more Geraniorum, involuc. breviss. polyphylo, subulato. *Cal.* pilosus, simpl. non aristatus. Petal. arcte reflexa, flava. *Caps.* fusca. Sem. nigra.

793. VALLEA. Num. partium fructificationis plerumq. quaternarius; variat quinarius. Petal. 3--fida. *Caps.* 2-locul.

1. *stipularis*. *V. Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl. Mutis. amer. V. 7. tab. 10.*

*In nova Granada sub temperie frigida* h.

Arbor 2-orgyal. Fol. alterna, petiol. cordata, integerr. subtus subtomentosa. Stipul. amplexicaul. reniformes, maiusculæ, integerr. Panicula trifaria, ramorum terminalis. Fl. sanguinei.

794. TILIA. *Cal.* 5-part. *Cor.* 5-petal. Capsula coriacea, globosa, 5-locul. 5-valv. basi dehiscens. Bractea oblonga pedunculum multifi. sustinens.

1. *europæa*. *T. fl. nectario destitutis. Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 553. Black. tab. 469. Ludw. ed. tab. 48. Knorr. del. 1. tab. L. 11.*

*Tilia femina. Matth.*

*In Europæ pratis, & montanis Sylvis* h.

Arb. Fol. alterna, petiol. prima laciniata; reliqua cordato-ovata, serrata, subhirsuta. Stipulæ ligulatæ, membranac. subalbidæ. Pedunc. e medio stipularum, sub 4-fl. *Cal.* coloratus. Petal. ex albo-lutea. Baccæ subnigræ.

*Var. fol. exiguis, glabris, firmulis: fructu minimo. Tilli Pis. tab. 49. f. 9.*

= *fol. maximo.*

2. *americana*. *T. fl. nectario instructis. Syst. veg. ed. 14.*

*In Virginia, Canada* h.

Fol. priore maiora, sed similia.



795. CLEYERA. *Est Ternstroemia meridional.*

796. MYRISTICA. Cal. campanulat. 5-fid. Cor. 5-petal. Bacca carnosa, 1-sperm. Membrana reticularis, sicca, inter baccam, & semen.

1. *officinalis*. M. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*

*Nux myristica mas. Rumph. amb. 2. tab. 5. Sonnerat Voyag. tab. 116. 117. 118.*

*Virola sebifera. Aubl. Guian. tab. 345. Thumb. Act. Stockl. 1782. tab. 1. ad monoeciam amandat.*

*In insula Banda h.*

Arbor. Fol. alterna, petiol. ovata, acuta, integerr. glabra, venosa; subtus albida. Pedunc. axillar. 1-fl. cernui. Fl. parvi. Fruct. magnitudine, & figura *P. ri comm.* minores, luteo-virescent. glabri.

797. LÆTIA. Cal. 5-phyll. Cor. 5-petal. seu o. Fructus 3-gon. 1-locul. Sem. arillo pulposo.

1. *apetala*. L. fl. apetalis. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. amer. tab. 108. ed. 2. pict. tab. 159.*

*In America h.*

Arb. 20-ped. Fol. sesquipollie. alterna, petiol. ovalia, vel obovato-obtusa, ferrulata, quandoq. emarginata, nitida. Pedunc. axillar. 3-fl. Fl. albi, facie, magnitudine, & odore *Oxyacanthæ*. Fructus carnosus.

2. *completa*. L. fl. petaloideis, completis. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. amer. tab. 183. f. 60. ed. 2. pict. tab. 261. f. 42.*

*In America h.*

Arb. 20-ped. ramosa. Fol. alterna, petiol. subovat. oblongiuscula, obtusa, dentato crenata, quandoq. emarginata, rugosa, glabra. Pedunc. axillar. tomentosi. Fructus flave-rubellus.

798. ELÆO-CARPUS. Cal. 5-phyll. Cor. 4-petal. lacera. Anth. apice 2-valv. Drupa nucleo crispo.

1. *monogynus*. E. fol. alternis, oblongis, ferratis: racemis axillaribus. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl. Burm. Zeyl. tab. 40.*

*Ganirus. Rumph. amb. 3. tab. 101.*

*Perin-kara. Hort. mal. 4. tab. 24.*

*In India h.*

Arbor. Fol. in apice ramorum, alterna, breviter petiol. ovali-oblonga, obtusiuscula, obtuse ferrata,

ferrata, glabra, venosa. Racemi axill. solitar. simplices, laxi. Fl. breviter pedunculati, nutantes. Cal. 3-part. acutus. Petal. quandoq. 3. unguiculata. Drupa ovalis, nucleo lapideo.

2. *Dicera*. E. tetragynus: fol. oppositis, ovatis, duplicato-ferratis: racemis lateralibus, oppositis. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*

*Dicera ferrata. Forst. gen.*

*Habitat* . . . .

Structura fl. convenit cum priore; at differt stylis 4: fructu baccato, 4-locul. loculis 2-sperm.

- copalliferus*. E. fol. integris. *Retz. Obs. fasc. 4.*

*In Zeylona h.*

Arb. Fol. magna, coriacea, ovata, nervis transversis. Fl. paniculati.

*Resinam Copal dictam fundit: huius vero pl. sunt species.*

799. LECY- Cal. 6-phyll. Cor. 6-petal. Nectar. ligulatum, THIS. staminiferum. Pericarpium circumscissum, polysperm.

1. *Ollaria*. L. fol. sessil. cordat-ovar. subintegerr. *Syst. veg. ed. 14.*

*Jacapucaya. Marcgr. bras. 128. Pis. bras. 135.*

*In Indiis h.*

Arb. vasta. Fol. in apice ramorum, alterna, sessilia, subundulata, firma, glabra, fusco-virid. Fl. terminales, spicati, alterni, pedicellati, horizontales, subnutantes. Bract. ovatae, concavae, deciduae. Petal. alba, inferius pallida. Nectarium luteum. Fruct. magnus, lignosus, basi subrotund.

*Natura fructu ollas producit, ut in Cucurbita, & Crescentia lagenas.*

2. *minor*. L. fol. petiolat. lanceolat. ferratis. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. amer. tab. 103. ed. 2. picta tab. 160.*

*In Carthagenæ sylvis h.*

Arb. 60-ped. ramosa. Fol. plerumq. semipedal. alterna, petiol. subdisticha, lanceol-oblonga, acumin. ferrata, glabra. Racemi terminal. Fl. magni, leviter odori. Cor. & nectar. candidum. Fruct. diametro 2-pollic. durissimi, fusci, ollulam cum operculo referentes.

*Hoc genus pertinet ad Monadelphiam.*

*Tom. III.*

V

*grandiflora*, L. fol. ovatis: fl. peduncul. crassis. *Aubl. Guian. tab. 283.*

*In Caribæis h.*

Arb. 30-ped. superne ramosa, ramis sparsis. Fol. alterna, petiol. acuta, undulata, integerr. rigida, glabra. Fl. axill. aut terminal. quandoq. supra truncum, & ramos, spicati. Cal. intus rubens. Cor. durissima. Sem. maxima, membrana rufa.

*amara*,

L. fol. ovat-lanceol. acuminat: fructu parvo; nucleo amaro. *Aubl. Guian. tab. 286.*

*In Guiana h.*

Arb. 10-ped. superne ramosa, ramis rectis, & horizontalibus: ramulis pendulis, & foliosis. Fol. alterna, petiol. ovat-oblon. acuta, integerr. rigida, glabra. Fl. axillar. & terminal. spicati, breviter peduncul. Cor. mediocris, flava. Caps. oviformis, testa fragili, operculo intus 4. fossulis excavato. Sem. oblon. angulata, membranacea. Nucleus amarus.

*parviflora*,

L. fol. ovat-lanceol. acumin. fructu parvo, 2-locul. operculo cum appendice lignosa, intus producta. *Aubl. Guian. tab. 287.*

*In Guiana h.*

Frutex 3-ped. ramis sparsis, & declinatis. Fol. alterna, petiol. integerr. rigida. Fl. terminal. spicati, paniculati. Cor. parva, sulphurea, odora. Caps. parva, subovat. sublignosa, 2-locul. Sem. solitaria, oblonga, striata, angulosa. Nucleus amarus.

*Zabucajo*,

L. fol. lanceol-oblong. acuminat. fructu magno: nucleo eduli. *Aubl. Guian. tab. 288.*

*In Caribæis h.*

Arb. 60-ped. superne ramosa, ramis undique sparsis. Fol. alterna, petiol. integerr. rigida, glabra. Fl. racemosi. Cor. ampla, 6-fid. laciniis inæqual. albis, margine incarnato. Caps. magna, lignosa, ovata, duriss. Sem. oblonga, crassa, angulata. Nucleus dulcis.

*idatimon*,

L. fol. ovat-lanceol. acuminat: fruct. parvo, 4-locul. *Aubl. Guian. tab. 289.*

*In Caribæis h.*

Arb. 60-ped. superne ramosa, ramis sparsis. Fol. alterna, petiol. integerr. rigida, glabra.



Fl. axillar. & terminal. spicati. Pedunc. breves, crassi, rubri. Cor. 6-fid. laciniis inæqual. connivent. lateralibus, imbricatis; incarnata. Discus limbo erecto, fornicato, desinens in corpus carnosum, obtusum, rectum, lamellis oblong. imbricatum. Caps. subovata, acuta, depressa, margine prominente circa medietatem cincta. Opercul. intus 4. foveis excavatum. Sem. solitar. parva, angulata, nucleo amaro.

*lutea.* L. fol. lanceol. oblong. acuminat: fl. parvo. *Aubl. Guian.*

*In Guiana.*

*Var. huius arboris reperitur, quæ fl. luteis tantum differt.*

800. DELIMA. Cal. 5-phyll. Cor. o. Bacca 2-sper.

1. *sarmentosa*, D. Syst. veg. ed. 14. *Burm. Ind. tab. 35. f. 1.*

*In Zeylona h.*

Arb. sarmentosa. Fol. *Fagi*, alterna, petiol. ovata, plicata, ferrata, nervosa, scabra. Panicul. axillar. laxa, nuda, subvillosa. Fl. peduncul. Fruct. ovat. acumin. 2-valv.

*Ad Tetracera genus spectat, monente Vahl.*

801. VATERIA. Cal. 5-fid. Cor. 5-petal. Caps. 3-valv. 1-locul. 3-sperm.

1. *indica*. V. Syst. veg. ed. 14.

*Poenoe. Hort. mal. 4. tab. 15.*

*In India h.*

Arb. 60-ped. ramis longis, late diffusis. Fol. petiolis crassis, cinereis ramulis adhærentia, oblong-rotunda, acumin. spithamam longa, palmum, & ultra lata, crassa, densa, glabra, nitida, supra virid. subtus e viridi-flavescent. Fl. circa ramulos teneriores glomerati. Cal. albicans. Petal. crassa, candida. Fruct. oblongo-rotund. cortice atropurpur. 3-sulcatus.

802. MENTZELIA. Cal. 5-phyll. Cor. 5-petal. Caps. infera, cylindr. polysperm.

1. *aspera*. M. Syst. veg. ed. 14. *Plum. ic. 174. f. 1.*

*In America h.*

Planta erecta, suffruticosa, ramis alternis. Fol. subsessil. panduræform. oblong-acumin. ferrata, hispida. Fl. axillar. solitar. sessiles. Capsul. truncata, exsucca, hispida.

803. LOOSA. Cal. 5-phyll. Cor. 5-petal. Caps. semi-infera,

femitrivalv. 1-locul. polysperm. *Adfinitate Mentzelie accedit.*

1. *hispida*. L. *Syst. veg. ed. 14.*

L. *urens*. Jacq. *Obs. 2. tab. 38.*

Ortiga &c. *Fewil. peruw. 2. tab. 43?*

In Peru ☉.

Planta in ramos patulos subdivisa, aculeis rigidis, nitentibus, subfuscis, *Urticæ* ad instar urentibus armata. Caul. ex albo-virens, lineolis subfuscis adpersus. Fol. inordinate alterna, petiolata, pinnatifida, obtusa, aspera, laciniis ipsis pinnatifid. dentato-sinuatis; summa sinuata. Rami extremi laxissime racemosi. Pedunc. e regione, vel ad latera petiolor. solitarij. Petal. flava. Nect. alba, punctis rubris, viridibusq.

804. LAGER-STREUMIA. Cal. campanulat 6-fid. Cor. 6-pet. crispa. Stam. multa; horum 6. exter. crassiora, petalis longiora.

1. *indica*. L. *Syst. veg. ed. 14.*

Tsin-Kin. *Rumph. amb. 7. tab. 28.*

In China ☿.

Arb. *Punica* magnitudine. Rami alterni, flexuosi, patentes, subangulati, rigidi. Fol. opposita, quandoq. alterna, subsessil. integerr. glabra. Fol. ramorum oblong. ramulorum ovata, obtusa, nervosa, rigidula, semi-1-pollic. Thyrsus terminalis, latus, pedicellis 3-fid. seu 3-fl. Petala incarnata, longe unguicul. mesenterij instar crispa. Caps. ovata.

*Var. ma: Havanensis* habet fol. coriacea, supra subrugosa, subtus glabra, ovat-oblong. 5-8 pollic. longa, 2. & ultra lata. Fl. plus duplo ma.

805. THEA. Cal. 5-6-phyll. Cor. 6-9-petal. Caps. 3-cocca. Pertinet ad Polyandriam trigyniam.

1. *Bohea*. T. fl. hexapetalis. *Syst. veg. ed. 14 Am. acad.*

7. tab. 4. Hill. *exot. tab. 22. Black. tab. 352.*

Kamph. *Jap. tab. 606. ic. bona. Bart. ad. 4.*

tab. 1. Bont. *jav. tab. 88. Barr. rar. tab. 904.*

Letson. *diff. Lugd. 1769. tab. 1. f. 1. 2, Breyn. cent. 112. ic. 17. tab. 3.*

Evonymo &c. *Pluk. alm. tab. 88. f. 6.*

In Japonia, China ☿.

Truncus humanam plerumq. altitudinem attingens, ramis vagis. Fol. alterna, elliptica,

obtusiuscula, consistent. lævia, obtuse ferrata, nitida, subtus venosa, 2-pollic. breviter periol. Pedunc. axill. alterni, solitar-bini, curvati, 1-fl. ad apicem incrassati. Petal. subrotunda, concava, alba. Sem. solitaria, globosa, introrsum angulata. *Icon Coaklei est omnium optima.*

2. *viridis*. T. fl. enneapetal. *Syst. veg. ed. 14.*

*T. sinensis. Black. tab. 351.*

Fol. longiora priore.

806. CARYO-PHYLLUS. Cal. duplicatus, 4-phyll. Cor. 4-petal. Bacca infera, 1-sperma.

1. *aromaticus*. *Syst. veg. ed. 14. Black. tab. 338. Pluk. alm. tab. 155. f. 1. Clus. exot. 16. Rumph. amb. 2. tab. 1. 2. 3.*

*In Moluccis, solo aridissimo h.*

Arb. elegans, altitudine *Cerasi*, *Laurum* referens, coma pyramidali, ramosa. Fol. Lauriformia, sed angustiora, longiora, opposita, cum subsequenti pari cruciata, petiol. acumin. undata, integerr. supra obscure virid. per ætatem cum maculis obscuris, nitida, subtus flava. Fl. terminal. racemosi. Cal. longus, fuliginosus. Petala cœrulea, odora. Fructus semunc. longi, ovati, umbilicati, instar clavi, 4-goni, rugosi, rubro--nigricantes. *Ad Eugeniæ genus spectat, monente Vahl.*

*Utatur in culinis calyce cum fructus embrione.*

807. CISTUS. Cal. 5-phyll. foliol. 2. minoribus. Cor. 5-petal. Capsula 1-locul. 3-valv. aut 5-locul.

\* *Exstipulati, fruticosi.*

1. *capensis*. C. arborescens, exstipulatus: fol. ovat-lanceol. petiolat. trinerviis, denticulat. utrimq. nudis. *Syst. veg. ed. 14.*

*Ad cap. b. Spei h.*

*Differt a sequentibus folior. denticulis.*

2. *villosus*. C. arborescens, exstipulatus: fol. ovat. petiolat. hirtis. *Syst. veg. ed. 14.*

*C. mas, maior. Duham arb. 1. tab. 64. Dalech. hist. 222.*

*In Italia, Hispania h.*

Fol. rugosa, utrimq. virid. & pubescent. Pedunc. 1-fl. cum geniculo.



3. *populifolius*. C. arborescens, exstipulatus: fol. cordat. lævibus, acuminat. petiolat. *Syst. veg. ed. 14.*  
*Ledum latifolium* 2. *maius*. *Clus. hist. p. 78.*  
 & *minus* l. c.

*In Lusitania* h.

Planta ramis, & fol. pilosa, etiam pilosissima calyce: adultior ramis, & fol. nuda. Caul. 2-cubital. ramosi. Fol. carnosae, rudia, supra virid. subtus albida. Petal. alba, absque macula, margine purpurasc. Stam. lutea. Cal. ante explicationem triquetri. *Var. omnium suis partium exilitate.*

4. *laurifolius*. C. arborescens, exstipulatus: fol. oblong-ovat. petiolat. trinerviis, supra glabris, petiolis basi connatis. *Syst. veg. ed. 14.*

*Cistus ledon*, *latifolium* &c. *Bauh. hist. 2.*

*Ledon* 1. *latifolium*. *Clus. hist. 1. p. 77. hist. 156.*

*In Hispania* &c. h.

Caul. arborescens, ramis pilosis. Fol. acuta, utrimq. viridia. Petiol. basi purpurasc. Pedunc. longiss. subumbellati. Bract. caducae. Petala alba, ungue violac.

5. *ladaniferus*. C. arborescens, exstipulatus: fol. lanceolat. supra lævibus: petiol. basi coalitis, vaginantibus. *Syst. veg. ed. 14.*

C. *Ledon* 1. &c: *Glus. hist. 1.*

b. C. *ledon* &c. *Comm. hort. 1. tab. 20.*

*In Hispania*, *Lusitania* collibus h.

Planta incana. Altitudo humana. Rami lignosi, nigri. Fol. digitum transversum lata, subtus albescent. pellucido liquore adspersa, odora. Cor. magna, magnitudine *Papaveris somniferi*, alba. Stigma sessile, absque stylo. Germ. torulis 10.

6. *monspeliensis*. C. arborescens, exstipulatus: fol. lineari-lanceolat. sessil. utrimq. villosis, trinerviis. *Syst. veg. ed. 14.*

*Ledum*. *Dalech. hist. 230.*

b. *Ledum* 5. *Clus. hist. 1. p. 79.*

*In Gallia Narbonensi*, regno *Valentino*, & *Pedemontio* h.

Fol. margine reflexo, subtus albida, viscosa, basi vaginant. odore forti, subtus reticulata; suprema basi latiora. Racemus longe peduncu-

lat. sæpe bifidus. Cal. margine præsertim, ciliatus. Cor. alba.

7. *salvifolius*. C. arborescens, exstipulatus: fol. ovatis, petiolat. utrimq. subhirsutis. *Syst. veg. ed.* 14.

C. *femina*. *Clus. hist.* 1. p. 70.

In Italia, Helvetia &c. h.

Frutex humilis. Rami, fol. & fl. oppositi, Rami lanuginosi, rubelli. Fol. obtusa, subtiliter ferrata, non viscosa. Pedunc. lateral. solitarii, 1-fl. Cal. coloratus, lacin. 3. exterioribus cordatis. Petal. alba, unguibus luteis. Caps. subrotund. 5-gona, villosa.

8. *incanus*. C. arborescens, exstipulatus: fol. spathulat. rugosis, tomentosis; inferioribus basi vaginantibus, connatis. *Syst. veg. ed.* 14.

C. *mas* 2. *Clus. hist.* 1. p. 69. *hisp.* 197.

In Hispania, Gallia Narbonensi, comitatu Nicaensi &c.

Rami villosi. Fol. minime nervosa, in mucronem desinent. disco parum flexuoso. Cal. pilosus, lacin. subcordatis. Petal. emarginata, seu obcordata, integerr. concava, purpur.

9. *creticus*. C. arborescens, exstipulatus: fol. spatulato-ovat. petiolat. enerviis, scabris; calycinis lanceolat. *Syst. veg. ed.* 14.

C. *ladanifera* &c. *Buxb. cent.* 3. tab. 64. f. 1.

Ladanum creticum. *Alp. exot. tab.* 88.

In Creta, Syria h.

Tota planta odora. Caul. plerumq. oppositi, aut pl. Fl. terminal. Petala purpur.

10. *albidus*. C. arborescens, exstipulatus: fol. ovat-lanceol. tomentosis, incanis, sessil. trinerviis. *Syst. veg. ed.* 14.

C. *mas* 1. *Clus. hist.* 1. p. 68.

C. *mas* 4. &c. *Bauh. hist.* 2. p. 3.

In Gallia Narbonensi, Hispania, Pedemontio, ad rupes secus mare h.

Differt a C. *incano*, cui similis, ramis tomentosis; nec pilosis: fol. pallidioribus, mollibus, horizontalibus, sessilibus, lato-lanceol. subtriner. Cal. non hirti, lacin. exterioribus longioribus: lateribus reflexis. Pedunc. ex apice ramorum pl. Petal. purpur. non emarginata, margine subcrenato, planiuscula.

11. *crispus*. C. arborescens, exstipulat. fol. lanceol. undulat. trinerv. pubescentibus, *Syst. veg. ed.* 14.

*C. ladanifera*. Black. tab. 197.

*C. mas* 3. Clus. hist. 1. p. 69.

In Lusitania, & comitatu Nicæensi h.

Ramuli, pedunc. & calyc. tenui lana adspersi.

Caul. pl. pedal. & ultra, supini. Fol. incana. Calyc. lanceol. Petal. ex rubro-purpur.

12. *halimifolius*. *C. arborescens*, exstipulatus: foliol. 2. calycin. linearibus. Syst. veg. ed. 14.

*C. fol. Halimi* 1. 2. Clus. hist. 1. p. 71.

b. *C. fruticosus* &c. Mill. ic. tab. 290.

In Lusitania maritimis h.

Caul. cubital. Fal. Halimi, opposita, sessil. obtusa, vel mucronata, avenia, utrimq. incana. Petal. lutea.

13. *Libanotis*. *C. arborescens*, exstipulatus: fol. linear. revolutis: fl. umbellatis. Syst. veg. ed. 14. Barr. ic. 294.

In Hispania h.

Frutex habitu *Rosmarini*. Caul. nudus, purpurasc. Fol. opposita, sessil. lævia, marginibus baseos hirsuta, ad apices ramorum adproximata. Fol. floralia breviora, ovata, plana. Pedunc. terminal. Cal. ovati, viscid. Pet. lutea.

\*\* *Exstipulati, suffruticosi*.

14. *umbellatus*. *C. suffruticosus*, exstipulat. procumb. fol. oppositis, linearibus: fl. umbellatis. Syst. veg. ed. 14.

Ledon X. Clus. hist. 1. p. 81.

In Gallia, Hispania h.

Caul. fruticosus, pedal. ramulis nigricantibus. Fol. Thymiform. Umbellæ pedunculatæ.

15. *lævipès*. *C. suffruticosus*, exstipulatus, ascendens: fol. alternis, fasciculat. filiform. glabris: peduncul. racemosis. Syst. veg. ed. 14. Jacq. hort. tab. 158. Ger. prov. tab. 14. Pluk. alm. tab. 84. f. 6.

Habitat *Monspeli* &c. h.

Caul. pl. lignosi, glauci. Fol. glauca. Fasciculi fol. min. axillar. Pedunc. terminal. Pedicelli longi, remoti, glabri Petal. ovata, crenulata, lutea.

16. *calycinus*. *C. suffruticosus*, exstipulatus, erectus fol. linearibus: pedunc. 1-fl. calycibus 3-phyll. Syst. veg. ed. 14.



*C. humilis* &c. *Pluk. alm. tab. 83. f. 6.*

*In Europa australi* h.

*Simil. C. fumanæ.* Fruticul. ped. ramis oppositis, rubescentibus. Fol. opposita, lævia, subtus obtuse carinata; ex axillis foliol. conferta. Petala flava, vix margine rubro.

17. *syriacus.* *C. suffrutic. exstipulatus, erectus; fol. lanceolatis: fl. racemosis. Syst. veg. ed. 14. Jacq. misc. 3.*

*Habitat*

18. *Fumana.* *C. suffruticos. exstipulat. procumbens: fol. alternis, linear. margine scabris: pedunc. sub 1-fl. Syst. veg. ed. 14. Jacq. Austr. 3. tab. 252.*

*C. minor* &c. *Barr. ic. 285.*

*Chamæcisus 6. Clus. hist. 1. p. 75.*

*b. Helianthemum* &c. *Bauh. hist. 2. p. 18.*

*In Gallia, Helvetia* &c. h.

Fruticul. humilis, ped. l. tortuosus. Caul. pl. fusci. Fol. multa, subsemiunc. sparsa, sessilia, crassa, carinata, curva, integerr. minute punctata. Pedunc. prope terram. Cal. villosulus. Petal. calyce non longiora, flava.

19. *canus.* *C. suffruticos. exstipulatus, procumbens: fol. oppositis, obovat. villosis, subtus tomentosis: fl. subumbellatis. Syst. veg. ed. 14. Jacq. Austr. 3. tab. 277. All. Fl. Ped. tab. 45. f. 3.*

*Chamæcisus 3. Clus. hist. 1. p. 74.*

*Chamæcisus fol. myrti* &c. *Bauh. hist. 2. p. 18.*

*In Gallia Narbonensi, Hispania* &c. h.

Planta subincana. Caul. breves, glabri, superne rubentes. Fol. petiol. supra magis albis, & raris pilis adspersa. Cal. purpurasc. Petal. fature flava. Caps. ovata.

20. *italicus.* *C. suffruticos. exstipulatus: fol. oppositis, hispidis; inferior. ovatis; superior. lanceolat. ramis patentibus. Syst. veg. ed. 14.*

*Helianthemum* &c. *Barr. rar. tab. 366.*

*In Italiæ rupibus* h.

Frutex caule erecto, spitham. ramis oppositis, longioribus, patentibus, subdeflexis, rufis. Fol. super. subsessil. Racem. terminalis. Cal. hispidus. Petal. vix emarginata, pallida.

*C. alpestris, incanus, marifolius, italicus sunt to-*  
*tidem var.*

21. *marifolius.* *C. suffruticos. exstipulatus: fol. oppositis, ob-*

long. petiolat. planis, subtus incanis. *Syst. veg. ed. 14.*

*Helianthemum* &c. *Barr. rar. tab. 441.*

*Habitat Massilia, Verona &c. h.*

Caul. ramosus. Fol. ad terram conferta; lanceol. supra glabra, vel oval. subtus subpilosa, semper subtus dense tomentosa, & incano-alba: caulina pauca, & exigua. Fl. breviter peduncul. & exigui. Cal. tomentos. Petal. flava. *Varietas C. cani.*

22. *roseus*. *C. suffruticos. exstipulatus, procumb. fol. oppositis, oblong. ad oras revolutis, utrimq. subincanis. Syst. veg. ed. 14. Jacq. hort. 3. tab. 65.*

An *C. roseus* *All. Fl. Ped. tab. 45. f. 4?*

*Habitat*

Caul. ramosus. Fol. opposita, breviter petiol. integerr. Racemi terminal. erecti. Petal. patentiss. integra, rosea, ad ortum flava. Caps. subrotund.

23. *anglicus*. *C. suffruticos. exstipulat. procumb. fol. oppositis, oblong. revolutis, pilosis: fl. racemosis. Syst. veg. ed. 14.*

*Helianthemum* &c. *Bauh. hist. 2. p. 18.*

*In Anglia h.*

Caul. vix semiped. obliquus, totus scaber. Fol. *Hyssopi*, utrimq. virid. Fl. albi, nutantes, sub anthesi erecti.

14. *elandicus*. *C. suffruticos. exstipulat, procumbens: fol. oppositis, oblongis; petiolis ciliatis: petal. subemarginat. Syst. veg. ed. 14. Jacq. Austr. 4. tab. 399.*

*C. alpestris. Scop. Fl. Carn. 2. tab. 23. All. Fl. Ped. Crantz. Austr. tab. 6. f. 1.*

*In rupibus Gallia, Helvetia &c. h.*

Caul. subsemiped. fusci, superne atro-purpur. Fol. quandoq. lanceol. integerr. supra saturne, subtus dilute virent. margine pilosa, nec incana. Racemi terminal. pauciss. villosi. Cal. lineatus, pilosus. Petal. obverse ovata, lutea. Caps. ovata, hirsuta, nutans. *Planta per aetatem calvescit.*

\*\*\* *Exstipulati, herbacei.*

25. *Tuberaria*. *C. perennis, exstipulat, fol. radical. ovatis, tri-*

nerviis, tomentosis; caulinis lanceolat. glabris: summis alternis. *Syst. veg. ed. 14.*

*Helianthemum* &c. *Buxb. cent. 3. tab. 63. Bauh. hist. 2. p. 12.*

*In Gallo-provincia, Hispania, Pisis, in Comitatu Nicænsi* 24.

Caul. pedal. & ultra, inferne tantum tomentosus, subruher. Fol. fere unc. longa, semunc. lata, incana lanugine pubescentia; caulina opposita, vel subopposita. Caul. bifariam dividitur, ac dein trifariam.

26. *guttatus*. C. herbaceus, exstipulat. fol. oppositis, lanceol. trinerviis: racemis ebracteatis. *Syst. veg. ed. 14.*

*Helianthemum* &c. *Col. ecphr. 2. tab. 77.*

*In Italia, Gallia* &c. ☉.

Caul. erectus, palmar. ut tota planta, pilis patentibus. Fol. sessil. oppositionibus 3-4. Racemus filiform. Flos, & fruct. erecti; deflorati fl. penduli. Fl. alterni, sessiles. Cal. foliol. 2. patulis, ciliatis. Petal. alba, ad basin maculâ purpurea, vel carnea.

27. *canadensis*. C. herbaceus, exstipulat. fol. omnibus alternis, lanceolat. caule adscendente. *Syst. veg. ed. 14.*

*In Canada* 24.

*Facies C. Helianthemis, sed. folia alterna.*

\*\*\*\* *Stipulati, herbacei.*

28. *ledifolius*. C. herbaceus, stipulat. erectus, glaber: fl. solitar. subsess. fol. ternato-oppositis. *Syst. veg. ed. 14.*

*C. annuus* &c. *Lob. ic. 2. p. 118.*

*Habitat Monspeli, & in Comitatu Nicænsi* ☉.

Caul. cubit. & ultra. Fol. & stipulæ eiusdem fere magnitudinis. Fol. oblonga, rugosa, pilosa; inferiora rotundiora. Pedunc. breviss. oppositifol. Cal. corolla longior, lacin. 3. erectis, 2. patulis. Cor. albicans. Caps. longitudine calyc.

29. *salicifolius*. C. herbac. stipulat. patulus, villosus: fl. racemosis, erectis; pedicellis horizontalibus. *Syst. veg. ed. 14.*

*C. annuus* 1. *Clus. hist. 1. p. 76.*

*Helianthemum* &c. *Segu. ver. 3. tab. 6. f. 3. optima.*

*In Lusitania* &c. ☉.



Caulicul. 1-pl. palm. Fol. opposita, minoribus intermixtis; inferiora subovata. *Maiorana* simil. super. oblonga, lanceol. Fl. 4-5. alterni, sessiles. Petal. citrina, fugacia. Caps. calyce longior.

30. *niloticus*. C. herbaceus, stipulatus, erectus, subtomentosus: fl. racemosis, solitariis, sessil. oppositifoliis. *Syst. veg. ed. 14.*

*In Ægypto* ☉.

Caul. sublignosus, ped. teres. Rami radicales, adscendent. breviores: caulini versus apicem, pauci, erecti, alterni. Fol. opposita, petiol. elliptica, patula, subtomentosa, venosa. Stipulae quaternae, ensiform. persistent. Racemus terminalis, erectus, strictus. Fl. alterni, stipulati. Petal. lutea. *Simillimus* C. *ledifolio*, *multoties maior, nec lavis*.

31. *egyptiacus*. C. herbaceus, stipulat. erectus: fol. lineari-lanceol. calyc. inflatis, cor. maioribus. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. Obs. tab. 68.*

*In Ægypto* ☉.

Caul. solitar. Fol. opposita, breviter petiol. crassiuscula, nitida. Pedunc. solitar. Fl. cernui. Petala breviss. inclusa, lutea.

\*\*\*\*\* *Stipulati, suffruticosi*.

32. *squamatus*. C. suffruticosus, stipulatus; fol. obtectis squamis orbiculat. *Syst. veg. ed. 14. Barr. ic. 328. Bocc. nusf. 2. tab. 64.*

*In Hispania* ☿.

Suffrutex spitham. ramis erectiuscul. inferne 4-gonis. Fol. opposita, aut tria utrimq. petiol. ovali-lanceol. crassiuscula. Stipul. minutiss. racemosae. Pedunc. conferti, teretes, unilaterial. contorti.

33. *Lippii*. C. suffruticos. stipulat. erectus: fol. alternis, oppositifq. lanceolat. scabris: spicis secundis. *Syst. veg. ed. 14.*

*In Ægypto* ☿.

Caul. pubescens, albicans, 2-fid. seu parce ramosus. Rami infra bifurcaturam caulis, laterales, simpl. albi. Fol. petiol. elliptico-lanceol. obtusiuscula, patentia, subtus canescent. Stipul. angusto-lanceol. erectae. Racemi oppositifol. Fl. sessiles. Petal. flava, vix calyc. maiora.

34. *surrejanus*. C. suffruticosus, stipulatus, procumbens: fol. ovat-oblong. subpilosis: petalis lanceolat. *Syst. veg. ed.* 14.

*Helianthemum* &c. *Dill. elth. tab.* 143. f. 174.

*In Angliæ comitatu Surrejano* h.

*Simil.* C. *Helianthemo*, excepto fl. Fl. capitati, Petala stellatim expansa, striis rubris picta.

35. *nummularius*. C. suffruticosus, stipulat. fol. inferioribus orbiculat. superioribus ovat. *Syst. veg. ed.* 14.

*Helianthemum* &c. *Bauh. hist.* 2. p. 20.

*Habitat Monspelii* h.

Caul. cubit. ramosi, hirsuti. Fol. breviter petiol. pilosa: minor. intermixtis. Petal. lutea.

36. *canariensis*. C. suffruticosus, stipulat. fol. subovat. alternis, & oppositis: racemis erectis. *Syst. veg. ed.* 14. *Jacq. misc.* 2. ic. rar. tab. 16.

*Habitat*

Caul. fruticosi, erecti, aut adscendent. Spitham. teretes, scabri, ramosi. Fol. petiolat. obtusa, integerr. crassula, villoso-scabriuscula, plana, glauca. Stipul. linear. vel lanceol. Racemi oppositifol. & terminal. multifi. fl. secundis, recurvatis. Bract. linear. Cal. villosulus, foliol. exterioribus linearibus; interioribus ovatis, acutiuscul. pallidis cum striis hirsutulis, partim virentibus, partim purpur. Pet. subrot. obtusa, patentiss. lutea. Caps. triangular. subrotund. obtusa, villosa. Sem. fusca.

37. *foetidus*. C. suffruticos. stipulat. procumbens: stipul. lanceolat. fol. oblongis, scabris. *Syst. veg. ed.* 14. *Jacq. misc.* 2. ic. rar. tab. 18.

*Habitat*

Odor *Bryonix*. Planta villis scabris obsita. Fol. opposita, petiolat. oblong--lanceol. acutiuscul. vel obtusiora, integerr. subrevoluta, virentia. Racemi terminal. longi. Petal. rotundata, alba, raro ochroleuca, ad basin lutea.

38. *serpyllifolius*. C. suffruticos. stipulatus: fol. oblong. calyc. lævibus. *Syst. veg. ed.* 14.

*Chamæcistus* &c. *Bauh. hist.* 2. p. 17.

*In alpibus Austriæ* &c. h.

*Videtur ad C. alpestrem pertinere.*

Caul. repentes, subrubent. Fol. serpylliform. hirsuta, nigricant. Fl. terni-quaterni. Petal. aurea, odora.

39. *glutinosus*. C. suffruticos. stipulatus: fol. linearibus, oppositis, alternisque: peduncul. villosis, glutinosus. *Syst. veg. ed. 14.*  
*Chamæcistus* &c. *Barr. rar. tab. 415. ic. 328.*  
*Hedanthemum* &c. *Bauh. hist. 2. p. 19.*  
*In Europa australi* h.  
 Caul. pl. dodrant. superne nudi, pubescenti-villosi. Fol. terna-quaterna, superior. semper alterna, magisque villosa. Racemus paucifl. villoso-glutinosus. Petal. parva, lutea.
40. *thymifolius*. C. suffruticos. stipulatus, procumbens: fol. ovali-linear. congestis, brevissim. oppositis. *Syst. veg. ed. 14.*  
*Chamæcistus* &c. *Barr. ic. 444.*  
*In Gallia Narbonensi, Pedenontio, Hispania* h.  
 Fol. incana, brevissime pilosa.
41. *pilosus*. C. suffruticosus, stipulat. erectiuscul. fol. linear. subtus bifulcatis, incanis: calyc. lævibus. *Syst. veg. ed. 14. All. Fl. Ped. tab. 45. f. 1. 2.*  
*Chamæcistus* 4. *Clus. 1. p. 74.*  
 b. *Helianthemum fl. albo* &c. *Bauh. hist. 2. p. 17.*  
 c. *Helianthemum, seu Cistus humilis* &c. *Bauh. hist. 2. p. 20.*  
 d. *C. omnino candicans* &c. *Bauh. hist. 2. p. 16.*  
*In Gallia* &c. h.  
 Caul. erectiuscul. Bract. solitar. ad latera pedicellorum. Fl. albi, sulphur. rosei. *Var. fol. latioribus, vix revolutis; & angustioribus, utroque latere revolutis, sæpius candicantibus: ad quam var. refertur C. mutabilis* *Jacq. ic. rar. tab. 17.*  
*Ad hanc speciem facile omnes sp. parvas albo fl. etiam C. apenninum referunt nonnulli, & C. polifolium.*
42. *racemosus*. C. suffruticos. stipulat. fol. lanceolat-linear. subtus (lævissime) tomentosus. *Syst. veg. ed. 14. Barr. rar. ic. 293.*  
*In Hispania* h.  
 Caul. statura *Rosmarini*, vix tomentosus. Fol. longiuscula. Stipul. linear. Racemi terminal. longiss. secundi. Calyc. angulati, læves.
43. *angustifolius*. C. suffruticosus, stipulat. diffusus: fol. lanceolat. calyc. hirsutis. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. hort. 3. tab. 53.*  
*Habitat* . . .



Planta iunior villosa, & incana. Caul. ab ipsa basi ramosus. Fol. opposita, breviter petiol. lanceol-oblonga, acutiuscula, integerr. aspera. Racemi terminal. erecti, multifi. Petal. flava, ad basin fulva. Caps. ovat. hirsuta.

44. *Helianthemum*. C. suffruticos. procumb. stipulis lanceolat. fol. oblong. revolutis, subpilosis. *Syst. veg. ed. 14.*  
*Fl. Dan. tab. 101.*

An. C. *serpyllifolius*. Crantz. *Austr. fasc. 3. tab. 6. f. 3.?*

*Helianthemum* &c. *Tabern. 1062.*

*Chamæcistus* &c. *Læfl. pruss. tab. 8.*

*In Europæ pascuis siccis* h.

Caulic. breves. Fol. opposita, breviter petiol. sicca, pilis raris adspersa. Fl. terminal. conferti, breviter pedunculati. Petal. suborbicul. integerr. flava, vel alba anulo receptaculum ambiente sæpius fulvo. Racemus ante florescentiam nutans. *Var. fol. latioribus: & fl. pleno.*

45. *mutabilis*. C. suffruticos. stipulat. procumb. stipul. lanceolat. fol. oblong. glabris, planis. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. ic. rar. tab. 17.*

*Habitat*

Caul. plurimi, ramosiss. fusci, ramisq. multis, subpedalibus. Fol. opposita, petiolat. obtusisc. integerr. virent. Stipul. utrimq. geminæ, erectæ. Racemi terminal. longi, erecti. Cal. lacin. 2. linearibus: 3. ovatis, concavis, pallidis, cum striis virentibus. Pet. obverse ovat. Caps. triangul-subrotun. villosula. *Ludit fl. ochroleucis, qui frequentiores sunt; & roseis in eadem planta.*

46. *hirtus*. C. suffruticosus, stipulat. fol. ovato-angustis; calyc. (subalbicantibus) hispidis. *Syst. veg. ed. 14.*  
*Helianthemum* &c. *Barr. rar. tab. 488.*

*Ledon 8. Clus. hist. 1. p. 80.*

*In Hispania, Narbona &c. h.*

Caul. cubital. Fol. *Rosmarini*, margine revoluti, supra lucide-virid. subtus candicant. Petal. aurea. *Nullibi hirta est.*

47. *apenninus*. C. suffruticos. stipulat. patulus: fol. lanceol. hirtis. *Syst. veg. ed. 14.*

*Helianthemum* &c. *Tabern. ic. 1062. Mentz. pug. f. 3.*

*In Apenninis Italiæ montibus* h.

- Var. C. pilosi*. Frutex ped. ramoſo-patulus.
48. *polifolius*. *C. ſuffruticoſ. ſtipulat. procumb. fol. oblong-  
ovat. incanis, calyc. lævibus: petaliſ ferratiſ.*  
*Syſt. veg. ed. 14. Pluk. alm. tab. 23. f. 6.*  
*Chamæciſtus &c. Ray. angl. 4. tab. 274. f. 2.*  
*Helianthemum &c. Dill. elth. tab. 145. f. 172.*  
*In Anglia &c. h.*  
Caul. pl. palmar inferne ſubfuſci; ſuperne inca-  
ni. Fol. crebra, margine inflexo, in hortos  
translata canitiem amittunt. Fascicul. axillar.  
folior. min. Fl. *C. Helianthem*i, ſed albi. *Var.*  
*C. pilosi*.
49. *arabicus*. *C. ſuffruticoſ. ſtipulat. fol. alterniſ, lanceol.*  
*planis, lævibuſ. Syſt. veg. ed. 14.*  
*In Arabia h.*  
Caul. diffuſuſ, ped. Fol. tenella ſubpubeſcent.  
Stipul. 2. minimæ. Pedunc. ex aliſ ſuperiori-  
buſ ſolitar. Capſ. craſſa, nutanſ.
- 
- grandifloruſ. C. fol. lanceolat. utrimq. villoſiſ, acuminat. ſti-  
puliſ cal. longioribuſ. Scop. Fl. Carn. tab. 25.*  
*Segu. ver. Suppl. tab. 6. f. 1.*  
*In Carniola &c. h.*  
Caul. ſuffruticoſ. ſemiped. villoſuſ. Fol. uncial.  
Fl. racemoſi. Pedunc. & calyc. villoſiſ. Pe-  
tal. rotunda, flava.  
*Videtur var. C. Helianthem*i; ſicut *C. anguſtiſol.*  
*hiſpanicuſ & ſerpylliſol.*
- ſtipulatuſ. C. fruticuſuſ; fol. confertiſ, ovalibuſ, tomen-  
toſiſ, breviter petiolat. margine revolutiſ.*  
*Fork. Æg.*  
*In Arabia h.*  
Fruticul. totuſ villoſo-tomentoſuſ. Caul. pro-  
cumb. Fol. parva. Pedunc. terminal. racemo-  
ſi. Cal. 2. laciniſ anguſtiſſ. Cor. obtuſa, pa-  
tenſ, flava.
- mediuſ. C. arboreſc. exſtipulat. fol. cordato-lanceol. ru-  
goſo-ſcrobiculat. denticulat. Pourr. All. Fl.*  
*Ped.*  
*In agro Nicænſi h.*  
Caul. rubenteſ, viſcoſi. Fol. petiolat. ovato-lan-  
ceol. virid, Pedunc. axill. & terminal. ſolitar.  
Floſ ochræ col.
808. PRO- Cal. 3-phyll. præter foliola 2. baſeoſ. Cor. o.  
CKIA. Bacca 5-angul. polyſperm.

1. *Crucis*. P. *Syst. veg. ed.* 14.

*In insula S. Crucis* h.

Frutex ramis teretibus. Fol. alterna, petiol. ovata, acumin. ferrata, glabra. Stipul. lineares. Fl. nonnulli terminales, alterni, pedicellati; bracteis linearibus.

809. COR- Cal. 5-phyll. deciduus. Cor. 5-petal. Caps. plu-  
CHORUS. rivalv. loculamentosa.

1. *olitorius*. C. capsul. oblong. ventricosus: fol. ferraturis infimis setaceis. *Syst. veg. ed.* 14. *Comm. hort. tab.* 12.

C. *Plinii*. *Bauh. hist.* 2. p. 982.

*In Asia, Africa, America* ☉.

Caul. cubital. lævis. Fol. ovata, 2-3. unc. long. fescunc. lata. Stipul. simplic. basi rubræ. Caps. fusiform. sulcatæ, sub 5-dent. seu obtusæ, sensim usque ad mucronem adtenuatæ.

2. *trilocularis*. C. capsul. 3-locul. triquetris, 3-valvibus; angulis 2-fid. scabris: fol. oblongis, ferraturis infimis setaceis. *Syst. veg. ed.* 14. *Jacq. hort. 2. tab.* 173. *Pluk. phyt. tab.* 127. f. 3.

*In Arabia* ☉.

Caul. fruticosi, pedal. erecti, læves, virides. Stipul. parvæ, subsetaceæ. Fol. alterna, petiol. lineata, nuda, subtus scabra, undato-ferrata. Pedunc. suboppositifol. breves, 2-fl. Cal. angulat. purpurasc. Petal. angusta, lutea. Caps. lineares, triquetro-prismaticæ, scabræ, angulis linea striatis, apice obtusæ.

3. *tridens*. C. capsul. linear. teretiuscul. scabris: fol. ferraturis infimis setaceis. *Syst. veg. ed.* 14. *Pluk. phyt. tab.* 127. f. 4.

*In India*.

Caul. lævis, viridis. Stipul. setaceæ, 3-part. Fol. lanceol. lineata, undato-ferrata. Styl. 3. divaricatiss. 2-fidi.

4. *æstuans*. C. capsul. oblong. trilocular. 6-sulcat. 3-valv. 6--cuspidat. fol. cordatis; ferraturis infimis setaceis. *Syst. veg. ed.* 14. *Jacq. Hort.* 1. *tab.* 85.

*Alcea* &c. *Pluk. phyt.* 127. f. 3.

*Triumfetta* &c. *Brown. Jam. tab.* 25. f. 1.

*In Amer. calidiore* h.

Planta tenera, edulis cocta. Caul. fescuiped. a basi ramosus, ramis divaricatis, scabriuscul.



purpurasc. Stipul. setaceæ. Fol. trinervia, supra glabra, subtus venis hirsutis; quandoq. subrotund. Pedunc. axillar. breves, 1-parvifl. Cal. segmentis apice subtus sanguineis. Petal. obovat. integerr. aut emarginata, flava. Caps. binatæ, adproximatæ, lineares, angulis compressis, fuscæ, glabræ Styli 3. 2-fidi.

5. *capsularis*. C. capsul. subrotundis, depressis, rugosis: fol. ferraturis infimis setaceis. *Syst. veg. ed. 14.*  
*Alcea &c. Pluk. alm. tab. 255. f. 4. optima.*  
*Gania fativa. Rumph. amb. 5. tab. 78. f. 1.*  
*In India* ☉.

Caul. erectus, 5-10-ped. simpl. Rami laterales, pauci, diffusi. Fol. Urticæform. oblongo-acumin. 5-6-pollic. inferius 2-pollic. supra pallide virent. subtus glauca, costis obliquis. Cal. lacin. concavis, incurvatis, extus punctatis, cor. brevioribus. Petal. parva, emarginata, fusca.

6. *hirsutus*. C. capsul. subrotundis, lanatis: fol. ovat. obtusis, tomentosis, æqualiter ferratis. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. hort. 3. tab. 57. & amer. ed. 2. pict. tab. 157.*

*Guazuma &c. Plum. ic. 104.*

*In Amer. merid.*

Frutex 2-3-ped. ramis tomentosis. Fol. alterna, petiol. pollicar. Pedunc. petiolis oppositi, tomentosi, 4-7-fl. Cal. extus tomentosus. Petal. subrotunda, flava. Caps. ovata, obtusa, subincurva, lanuginosa. *In Curacao fol. sunt acuta.*

7. *japonicus*. C. capsul. rotundis, glabris: fol. duplicato-ferratis. *Syst. veg. ed. 14. Thumb. Jap.*

*Jamma Buki 50. Kæmph. am. exot. fasc. V. p. 843. fl. simpl.*

*Jamma Buki alter ibidem. 845. fl. pleno.*

*In Japonia* ☿.

Caul. frutescens, 2-ped. & ultra. Fol. e gemmis alternis plura, semi--sesquipollic. petiol. subcordata, ovata, acumin. nervosa, villosa. Petioli lineam longi. Fl. terminal. solitar. breviter peduncul. Cor. flava, vel aurantiaca.

8. *hirtus*. C. capsul. oblong. cauleq. pilosis: fol. oblong. æqualiter ferratis. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. hort. 3. tab. 58.*

*C. fol. Ulmi* &c. *Plum. ic.* 103. f. 2.

*In Amer. merid.* ☉.

Rad. ramosa. Caul. 2-3-ped. lignosus, ramosus.

Fol. alterna, breviter petiol. utrimq. rugosa.

Stipul. 2-lineari-subulatæ. Fl. laterales, soli-

tar-bini. Petal. calyce breviora, obtusiss. fla-

va. Caps. linear. hispidula, fusca, 2-sulc.

9. *siliquosus*. *C. capsul. linear. compressis, 2-valvibus: fol.*

ovat-oblong. æqualiter serratis. *Syst. veg. ed.*

14. *Jacq. hort.* 3. tab. 59.

*C. folio Ulmi, minor.* *Plum. ic.* 103. f. 1.

Corchoro adfinis &c. *Sloan. Jam. hist.* 1. tab.

94. f. 1.

*In Amer. merid.* ☿.

Caul. erectus, fere fruticosus, 3-6-ped. panicu-

lat. subpubescens, verruculis exasperatus. Fol.

alterna, breviter petiol. quandoq. lanceol.

utrimq. glabra, absque dente elongato ad ba-

sin. Pedunc. 1-paucifl. lateriflori, ebracteati.

Petal. longitudine calyc. flava, patentiss. ob-

verse ovata, integerr. Caps. erecta, 2-fida.

Fl. ante expansionem nudentes. Germ. hirta.

Fl. vernaes apetalæ, tetrandri, cal. 4-phyllo.

Autumnales 5-petal. polyandri, cal. 5-phyl.

*javanicus*. *C. capsul. subrotund. hispidis: fol. ovat-lanceol.*

æqualiter serratis: stipulis setaceis. *Burm. Ind.*

tab. 36. f. 3.

*In India.*

Cor. purpurea.

810. SEGUIERIA. Cal. 5-phyll. Cor. o. Caps. 1-sperm. ala

magna terminata, alulisq. lateralibus.

1. *americana*. *S. Syst. veg. ed.* 14.

*In Amer. merid.* ☿.

Frutex 12-ped. ramis longiss. nitidis. Aculei

breviss. recurvi, quandoq. nulli. Fol. 2-3-

pollic. alterna, petiol. elliptica, emarginata,

nitida. Racemi terminal. ramosi, foliosi. Fl.

plurimi, albicantes, fœtidi. Caps. *Securidacæ*

simil.

## DIGYNIA.

811. PÆO-  
NIA. CAI. 5-phyllus, persistens. Petal. 5. æqualia,  
Ovaria bina-terna. Capsl. polysperm. 1-locul.  
stygmate oblongo, persistente instructæ.

1. *officinalis*, P. fol. decompositis, nudis; foliol. lobatis, lobis lato--lanceol. capsulis rectiuscul. tomentosis.

P. foliol. oblongis. *Syst. veg. ed. 14.*

P. *officinal. fœmina Knorr. del. 1. tab. R. 3. & tab. R. 2. fl. pleno. Black. tab. 65. Matth. 915.*

Rad. glandulosa. Caul. 3-ped. ramosus. Fol. ampla, duplicato--ternata; pinnis ellipticis, trilobis, firma, nitida.

P. officin. mascula Black. 245. Lob. ic. 684.

*In montium nemoribus Italia, Helvetiæ &c. 24.*

Rad. napiformis. Fol. diversa, minus difformia, atrovirid. foliol. ovat--lanceol. Fl. in utrisq. plerumq. sature rubri.

2. *anomala*. P. foliol. 3-partito-laciniat. laciniis lanceol. utrimq. glabris: capsul. nudis, depressis.

P. calyce folioso: capsul. glabris, depressis. *Syst. veg. ed. 14. Gmel. Sib. 4. tab. 72.*

*In omni Sibiria 24.*

Caul. fere 3-ped. simpl. viridis, nudus, subfultatus. Fol. angusta, nitida, lacin. lineari-lanceol. acutis. Petioli patentes, non adeo divaricati, ut in cæteris, nudi, supra canaliculati. Fol. impar 3-part. varie, & inæqualiter in angustas lacinias fissum, sicuti fol. lateralibus, sed lobus interior reliquis multo minor.

*Differt a priore, fol. anomalis, seu inæqualiter divis: calyc. foliolis apice lanceol. germinibus glabris, plerumq. quinis.*

3. *tenuifolia*, P. foliol. linear. multipartitis. *Syst. veg. ed. 14. Lin. dec. 9. tab. 5. Gmel. Sib. 4. tab. 73.*

*In Sibiria &c.*

Rad. repens, tuberculosa. Caul. simpl. Fol. *Anthoræ* similia; in caule plurima, nec tantum 3-4. ut in P. offic. Flos terminalis P. offic.



sed minor, solitarius, peduncul. coccineus.  
 Germ. 3. purpurasc. vestita pilis purpur. nec  
 albis, ut in *P. offic.* Fruct. 2-3.

*corallina.*

*P. foliol. ovatis*, plerumq. integris, nudis: capsul. recurvatis, tomentosis. *Retz. Obs. fasc. 3.*

*Pæonia* &c. *Morif. hist. 3. f. 12. tab. 1. f. 1. --*  
*Besl. eyf. vern. ord. 6. f. 10. mala.*

*Habitat*

Caul. 2-3-ped. glaber, rubens. Stipul. radicalis, vel vagina dimidiata, maxima, rotundata, cucullata. Fol. 2-ternata, petiol. divergentibus. Petiol. terminal. 3-raro 5-phyll. laterales 5-phylli, foliol. petiolat. lato-ovatis, integerr. raro 2-lobis. Fol. primi, & secundi anni simpliciter ternata, forma, & magnitudine *Menyanthis trifoliata*. Pedunc. 1-fl. Cor. 6-petal. Petal. margine undiq. leviter emarginata, Kermesina. Capsul. magna, ferrugineo-tomentosa.

*humilis.*

*P. foliol. tripartito-laciniat.* subtus subvillosis: capsul. erectiuscul. pilosis. *Retz. l. c. -- Morif. l. c. f. 8.*

*Habitat*

Caul. sesquiped. simpl. glaber, viridis. Fol. 2-ternata, petiol. 3-fid. supra cæsia, subtus albidiora. Pedunc. & cal. prioris, quæ nunc petalorum magis variat, & col. magis sanguineo. Capsul. brevis.

812. **CURATELLA.** Cal. 5-phyll. Petal. 4. Styli 2. Capsul. 2-part. loculis 2-sperm.

1. *americana.* *C. Syst. veg. ed. 14. Aubl. Guian. tab. 232.*

*In Amer. merid. h.*

Statura *Coccoloba*. Arb. 7-8-pedal. trunco tortuoso, superne ramoso, cortice rufescente. Fol. alterna, subsessil. ovato-obl. sinuata, undulata, supra aspera, subtus minus, pallide virent. nervis lateralibus, ad marginem fol. extensis, aculeo terminatis. Fl. laterales. Petal. subrotund. alba. Capsul. subcarnosa, hirsuta.

813. **FOTHERGILLA.** Cal. truncatus, integerr. Cor. o. Germ. 2-fid. Capsul. 2-locul. Sem. solitar. ossea.

1. *alnifolia.* *F. Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*

*Flos amentum.*  *Ic. in Jo. Mill. op. nov. tab. 1.*

*In Carolina h.*

*Arbusc. fol. fructuq. Hamamelis similis: flore diversissima. Arb. facie, & fol. Betulae Alni. Fol. alterna, petiol. cuneiform. integra, apice serrato, ferraturis ma: paucioribus; supra virid. subtus cana; iuniora subtus albido-tomentosa. Fl. terminal. spicati, quasi in capitulum oblongum congesti, albi. Caps. magna, ovata, acuta, hirsutiss. cuius valvulae aperiuntur in 4. cuspides, dum sem. matura sunt. Fl. primo vere e gemmis terminalibus ante fol. prodeunt.*

814. CALLIGONUM. Cal. 5-phyll. Petal. o. Styl. o. Fruct. 1-sperm. hispidus.

1. *polygonoides. C. Syst. veg. ed. 14.*

*Habitat . . .*

## TRIGYNIA.

815. DEL-PHINIUM. Cal. o. Petala 5, horum 4. oblonga, patentia: quintum supremum oblong. calcaratum. Nectar. 1--2--phyll. petaloideum. Filamenta exeunt a membrana latiuscula, cuius apici adhærent. Siliquæ 3-5. Sem. angulosa.

\* *Unicapsulares.*

1. *Consolida. D. nectar. 1-phyll. caul. subdiviso. Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 683. Ludw. ed. tab. 54. Black. tab. 26. Knorr. del. 1. tab. R. 17. Consolida regalis arvensis. Tabern. 62. Cam. epit. 521.*

*In agris Europæ sterilibus ☉.*

Caul. minus erectus, brachiatus. Fol. potius latius divisa, prima rotunda, lobata. Spicæ vix ullæ. Fl. sparsi, sequenti min. col. vario; quandoq. pleni.

2. *Aiacis. D. nectar. 1-phyll. caul. simplici. Syst. veg. ed. 14.*

*D. sativum. Riv. tab. 123.*

*Flos regius. Dod. pempt. 252.*

*In Helvetia, & alibi ad macerics ☉.*

Caul. cubital. & ultra. Mire variat cultura fl. pleno, semipleno, colore &c. Differt a priore

*fol. tenuissime lacinjatis : spica densiore : fl. ma-  
siliquis villosis &c.*

3. *Aconiti*. D. nectar. 1-phyll. antice 4-dentat. capsul. solitar. ramulis 1-fl. *Syst. veg. ed. 14.*

*In Dardanella ☉.*

Statura D. *segetum*, seu *peregrini*, cor. *Aconiti*.  
Caul. ped. ramosus, paniculat. canescens, pubescens. Fol. pedato-multifid. linear. canescentia: summa tantum 3-part. Fl. terminal. solitar. pedunculati, parvi, lividi, intus purpurasc. viridiq. varii. Nectar. exterius rubulosum, reliquis longius, apice obtusissim. basi elongatum: interius basi utrimq. lobo obtuso amplectitur stam. Petal. infer. 4. æqualia, ovato-lanceol. virescent. lateribus purpurasc. Stam. purpurasc.

\*\* *Tricapfulares*.

4. *ambiguum*. D. nectar. 1-phyll. cor. 6-petal. fol. multipart. *Syst. veg. ed. 14-Clus. hist. 2. p. 206.*

*In Mauritania ☉.*

Statura D. *Aiacis*, sed magis canescens. Fol. frequentiora quam in vulgari. Rami divaricati in caule simplici. Cor. cœrulea, extus viridis. Nectar. calcar semper apice 2-dent.

5. *peregrinum*. D. nectar. 2-phyll. cor. enneapetal. fol. multipart. obtusis. *Syst. veg. ed. 14. All. Fl. Ped. tab. 25. f. 3.*

Consolida &c. *Bauh. prod. tab. 74. Moris. hist. 3. f. 12. tab. 4. f. 3.*

*In Italia, Melita &c. ☉.*

Caul. simpl. ramis virgatis, strictis, nudis. Fol. D. *Aiacis*. Bract. subulatae. Fl. parvi. Cor. cœrul. Præter nectar. & 4. petala inferiora habet præterea petal. 2. lateralia, subrotunda, unguibus longis adfixa, quæ reflectuntur versus petal. exteriora.

6. *grandiflorum*. D. nectar. 2-phyll. labellis integris: fl. subsolitar: fol. compositis, lineari-multipart. *Syst. veg. ed. 14. Mill. ic. tab. 250. f. 1. Gmel. Sib. 4. tab. 78.*

D. *lustanicum* &c. *Rolof. hort. tab. 3.*

*In Sibiria ☉.*

Caul. & pedunc. 1-fl. squamati. Fl. cœrul. E latere nectar. exit utrimq. petalum, longe un-



guiculatum. Hæc 2. petal. si adnumerentur 2 laciniis nectar. tunc erit cor. 9-petal. & planta accederet ad *D. peregrinum*. Caps. incana.

7. *elatum*. *D.* nectar. 2-phyll. labellis 2-fid. antice barbatis: fol. incis: caule erecto. *Syst. veg. ed. 14. Miller. ic. tab. 250. f. 2. Gmel. Sib. 4. tab. 77.*

*b. Aconitum lycoctonum &c. Clus. hist. 2. p. 94. In Helvetia, Sibiria &c. 4.*

Planta mire varians. Altitudo humana. Caul. erectus, ramosus, cavus. Fol. petiol. semi-5-7-lobata, lobis latis, acutis, ciliatis, sæpe semi 3-fid. Spica longiss. & pulcherr. Pedunc. 1-fl. lanuginosi. Petal. sature cœrul.

8. *puniceum*. *D.* labellis 2-part. pilosis; nectar. cornu recto: fol. multipart. bract. calycinis nullis. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*

*In Sibiria ☉.*

*Differt a cæteris colore fl. fusco--rubente, ut in Veratro nigro. Simil. D. elato, sed differt caule, petiolis, & peduncul. pubescentibus: petalis cor. æqualibus: cor. magis regulari, quam in priore, labellis profunde partit. re-ctis.*

9. *Staphisagria*. *D.* nectar. 4-phyll. petalo brevioribus: fol. palmat. lobis obtusis. *Syst. veg. ed. 14. Black. tab. 265. Dod. pempt. tab. 366.*

*In regno Neapolitano &c. ♂.*

Altitudo humana. Caul. ramosus, hirsutus. Fol. alterna, longe petiol. villosa, lobis 3-fidis. Cor. purpur. Nectar. cornu breviss. obtusum. *Var. fol. albo-venosis differt fol. incis, 7-part. laciniis acuminat. cor. calcari non obsoleto, sed longitudine pedicel.*

- hybridum*. *D.* nect. 4-phyll. labellis superioribus integris; inferioribus 2-fid. apice barbatis: fol. palmatis, lobis acutis. *Gouan. Illust.*

*Habitat*

*Ex patre Aconito Napello, & matre D. elato. Facies Napelli. Caul. pl. 2-cubital. simplic. glauci. Fol. Staphisagria; radical. lobis 7. caulina 5. summa 3. Racemus terminal. simpl. laxis, fl. sub 24. Bract. subulato-setaceæ. Cor.*

cœrulea, col. D. *Aiacis*. Nect. cœrulescenti--  
atrum, labellis utrimq. binis.

816. ACONI- Cal. o. Petal. 5. inferiora 4. fere orbiculata:  
TUM. quintum supremum cucullatum, quasi galea-  
tum. Nectar. 2. pedunculata, recurva. Sili-  
quæ 3-5. Sem. angulosa, vel rugosa. *Fol.*  
*multifida*.

\* *Tricapsulares*.

1. *Lycōdonom*. A. fol. palmatis, multifid. (plerumq.) villosis.  
*Syst. veg. ed. 14. Jacq. austr. tab. 380. Gmel.*  
*Sib. 4. tab. 81. Black. tab. 563. Besl. syst.*  
*æst. 25. f. 2.*

Napellus &c. *Riv. tab. 127.*

Aconito secundo. *Matth.*

b. A. lycōdonum fl. cœruleis. *Fl. Dan. tab.*  
*121.*

*In alpibus Italia &c. 24.*

Planta quandoq. glaberr. Rad. est magnum tu-  
ber. Caul. 2-3-cubit. Fol. cæteris speciebus  
latiora, petiolis brevioribus, 3-5-7-lobata.  
Spica simplex, rarior. Pedunc. infer. ramosi,  
ad basin bract. solitar. Cor. ochroleuca, vil-  
losa, galea cylindrac. longa, & angusta.

2. *japonicum*. A. fol. trifido-palmar. lacin. obtusis. *Syst. veg.*  
*ed. 14. Thumb. Jap.*

*In Japonia.*

Caul. herbaceus, teres, glaber. Fol. petiol. Fl.  
racemus brevis. *Differt a priore, fol. tantum*  
*profunde 3-fid. laciniis incisis, obtusis, rotun-*  
*dato-dentatis.*

3. *Napellus*. A. folior. laciniis linear. superne latioribus, li-  
nea exaratis. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. austr. 4.*  
*tab. 381. Garid. Aix. tab. 2. AÛ. Stock. 1739.*  
*tab. 2. Black. tab. 561. Knorr. del. 1. tab. E.*

Napellus verus. *Lob. hist. 387.*

Napello. *Matth.*

*In Italia, Gallia &c. 24.*

Caul. 2-5-ped. totus foliosus. Fol. supra sature  
virid. nitida, subtus pallidiora. Racemus ter-  
minal. erectus, cylindricus, densus, pedunc.  
simplicibus. Cor. sature violac. Nectar. ga-  
leæform. basi 2--fid. *Var. fl. min. albo, &*  
*fusco.*

4. *pyrenaicum*. A. fol. multipart. laciniis linearibus, incumben-  
tibus, squarrosis. *Syst. veg. ed.* 14.

*In Pyrenæis, Sibiria, Tataria* 24.

Caul. erecti, 3--pedal. ramosi, subtomentosi.  
Fol. ampla, petiol. lacin. linea exaratis, co-  
piofis, divaricatis. Cor. lutea, cucullo valde  
angusto. Nectar. ore oblongo, integerr.

\*\* *Quinquecapsulares.*

5. *Anthora*. A. fl. 5-gynis; folior. lacin. linearibus (æqua-  
libus). *Syst. veg. ed.* 14. *Jacq. Fl. Austr.* 4.  
*tab.* 382. *Black. tab.* 562. *Ludw. ed. tab.* 104.  
*Riv. tab.* 126. *Mill. ic. tab.* 12. *Cam. epit.* 837.

*Antora. Matth.*

*In alpebus Helveticis, Taurinis, Pyrenæis &c.* 24.

Bulbi carnosii, angulosi. Caul. 1-3-ped. subra-  
mosus, angulatus, subhirsutus. Fol. alterna,  
petiol. digitata, tenuiter laciniata, subhirsuta,  
subtus albescentia. Racem. terminal. simplex,  
cylindricus, densus. Cor. arcuata, hirsuta,  
ochroleuca.

6. *variegatum*. A. fl. 5-gynis; folior. laciniis semipart. superne  
latioribus. *Syst. veg. ed.* 14.

A. cœrul. parvum. *Dod. pempt.* 441. *Dalech.*  
*hist.* 1743.

*In Italia &c. montibus* 24.

Planta parva. Radix bulbosa. Cor. albo-cœrul.  
col. varia.

7. *Cammarum*. A. fl. sub 5-gynis: folior. laciniis cuneiform.  
incisis, acutis: (cor. galea mucrone elonga-  
to, & longe rostrato). *Syst. veg. ed.* 14. *Jacq.*  
*austr.* 5. *tab.* 424. *Riv. tab.* 129. *Clus. hist.*  
2. p. 95.

b. *A. neubergense. Clus. hist.* 2. p. 96.

y. *A. indenbergense. Clus. hist.* 2. p. 97.

*In stiria &c.* 24.

Differt ab *A. Napello*, fol. supra non nitentibus,  
nec atrovirentibus: caul. altiore: racemo brevior-  
e: petal. dilutioribus Rad. napiform. Caul.  
etiam 6--ped. Fol. latescencia, lacin. magis  
divaricatis, quam in *Napello*. Racemi axillar.  
multi, minus densi. Fl. laxiores. Petal. magis  
divaricata, violacea, alba, dilute cœrul. albo  
mixta,



8. *uncinatum*. A. fl. sub 5-gynis: fol. multilobis: cor. galea magis extensa. *Syst. veg. ed. 14.*  
*In Philadelphia 24.*  
 Fol. A. *Napelli*; sed flos fere prioris.

## TETRAGYNIA.

817. TETRACERA. **C**al. 6-phyll. Caps. 4.  
 1. *volubilis*. T. *Syst. veg. ed. 14.*  
*Arbor &c. Pluk. alm. tab. 146. f. 1?*  
*In Amer. merid. 13.*  
 Arb. excelsa. Fol. ampla, longiss. latiss. alterna, breviter petiol. obverse ovata, parum acumin. subserrata, nervosa, aspera. Fl. spicati.
818. CARYO-CAR. Cal. 5-part. Petal. 5. Styli sæpius 4. Drupa nucleis 4 sulcis reticulatis. *Syst. veg. ed. 14.*  
*In Berbices; & Essequetto 13.*  
 Arb. procera. Fol. ternata. Cal. & cor. purpur. Drupa magnitudine capitis. Nuclei esculenti *Amygdali* sapore.
819. CIMI-CIFUGA. Cal. 4-phyll. Cor. nectar. 4. urceolatis. Caps. 4. Sem. squamosa.  
 1. *fœtida*. C. *Syst. veg. ed. 14. Am. acad. tab. 6. f. 2.*  
*Gmel. Sib. 4. tab. 70.*  
*In Sibiria 24.*  
 Simil. *Actææ racemosæ*. Var. omnium maxime numero, calyc. cor. pistill. ut neque sexus constans sit, neque proportio. Odor gravis, & virosus. Caul. quandoq. orgyal. subhirsutus, subincanus, inferne rubens, ad exortum bifariam divisus, dein subdivisus in ramusculos, quorum singuli sustinent fol. pinnatum, pinnis circumferrat. pallide virid. ad costam hirsutis. Fol. super. min. summa integra. Fl. terminal. alterni, globosi, breviter peduncul. apetal. Caps. membranac. 1-locul. Sem. plerumq. 4. minuta, albentia.

## PENTAGYNIA.

820. AQUILEGIA. **C**Al. 0. Petal. 5. æqualia. Nectar. 5. corniculata, inter petala. Caps. 5. distinctæ, polyspermæ. Fol. Umbelliferarum more divisa.
1. *viscosa*. A. nectar. incurvis: caul. subnudo, sub-1-fl. viscoso-piloso: fol. subtrilobis. *Syst. veg. ed. 14. Gouan. Illus. tab. 19. AÆ. Helv. VIII. tab. 5.*  
*Habitat in Monspeliæ, & Pedemontii, umbrosis alpinis* 24.  
 Planta sesquipalm. tota pilis glandulosis. Fol. radical. 3-part. lacin. trilobis: caulina 1-2-ternata, foliol. lanceolat.
2. *vulgaris*. A. nectar. incurvis, (fol. trilobatis, lobis subrotundis). *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 695. Black. tab. 409. Ludw. ed. tab. 181. Knorr. del. I. tab. A. & Matth.*  
*In Europæ nemoribus montanis, saxosis* 24.  
 Caul. 3-ped. ramosus. Fol. alterna, petiol. ternata, supra obscure virent. subtus glauca. Fl. terminal. subcorimboſi, penduli, col. vario, albo, roseo, purpur. Sem. nigra, nitida. *Var. sibirica constans, humilior, cœrulea, nectariorum oris albidis.*
3. *alpina*. A. nectar. rectis, petalo lanceol. brevioribus. *Syst. veg. ed. 14. All. Fl. Ped. tab. 66. Bauh. hist. 3. p. 484.*  
*In Helvetia* 24.  
 Caul. pedal-cubit. 1-2-fl. Fol. parva, duplicato-ternata, aliter divisa, lineis fere paralellis, nec divergentibus, lobis sublinear. obtusis. Fl. grandiores, speciosi, penduli. Petal. longiff. lanceol. pulchre cœrul.
4. *canadensis*. A. nectar. rectis: staminibus cor. longioribus. *Syst. veg. ed. 14. Mill. ic. tab. 47. Corn. Canad. tab. 60. Lob. ic. 26. Moris. hist. 3. f. 12. tab. 2. f. 4.*  
*In Virginia, Canada, Dania* 24.  
 Caul. pedal. ramosi, striati, rubescent. Fol. nonnihil tenuiora; radical. longe petiol. Fl. puniceo-rubescens, ore croceo.

5. *viridiflora*. A. nectar. rectis, conniventibus; petalo lanceol. æqualibus. *Syst. veg. ed. 14. Comm. Gott. 1780. tab. 2.*

*Habitat* . . .

821. NIGEL- Cal. o. Petal. 5. æqualia, plana. Nect. 5. tri-  
LA. fida, intra cor. Caps. 5-10. connexæ. *Fol. capillacea*.

\* *Pentagynæ*.

1. *damaescena*. N. fl. involucro folioso cinctis. *Syst. veg. ed. 14. Mill. ic. tab. 187. f. 2.*

*Melanthium sylv. Matth. Diosc. 529. Iob. ic. 471.*

b. N. fl. maiore &c. *Knorr. del. 1. tab. S.*

*Inter segetes Europæ australis* ☉.

*Fol. capillacea. Involuc. adproximatum flori, 5-phyll. flore longius. Cor. cœrul. sæpius multiplicata. Caps. subrotund. 5-gona.*

2. *sativa*. N. pistillis quinis: capsul. muricatis, subrotund. fol. subpilosis. *Syst. veg. ed. 14. Mill. tab. 187. f. 1. Ludwig. ed. tab. 59.*

*Melanthium sativum. Cam. epit. 551.*

*In Creta, Germania, Ægypto* ☉.

*Petal. subtricuspid. albescent. Sem. fusca, aromatica.*

3. *arvensis*. N. pistillis quinis: petal. integris: capsul. turbinat. *Syst. veg. ed. 14.*

*Melanthium sylv. alterum. Cam. epit. 553.*

*Melantio salvatico 2. Matth.*

*In Italia, Galliæ, Germaniæ agris* ☉.

*Caul. ped. ramosus. Fol. cæteris speciebus tenuiora, sessilia, duplicato-pinn. Involuc. nullum. Petala obovata, dilute cœrulea, aut ex albo-virid. Cornua capsulæ prælonga.*

\*\* *Decagynæ*.

4. *hispanica*. N. pistill. denis, cor. æquantibus. *Syst. veg. ed. 14. Moris. hist. 3. f. 12. tab. 18. f. 8.*

*Habitat in Hispania, Monspelii* ☉.

*Caul. 2-ped. ramosus. Fl. cæteris speciebus ma. p.º pallide herbac. dein. dilute, tandem suaviter cœrul.*

5. *orientalis*. N. pistill. subdenis, cor. longioribus. *Syst. veg. ed. 14. Moris. hist. 3. f. 12. tab. 18. f. 10.*

*Circa Alepum* ☉.

*Petal. lutea, basi angusta, reflexa. Nectar. acu-*



tum, 2-fid. intus pictum. Pistil. recta. Caps.  
oblon. quandoq. 3-4. Sem. membranaceo-mar-  
ginata.

822. REAUMURIA. Cal. 6-phyll. Petal. 5. Caps. 5-valv. 5-  
locul. polysperm.

1. *vermiculata*. R. Syst. veg. ed. 14.

Sedum &c. Bocc. Sic. tab. 6. f. 7. Moris. hist.  
3. f. 12. tab. 9. f. 6. Lob. ic. 180.

Kali &c. Barr. ic. 888. Raw. it. tab. 37.

In Ægypti, Syriæ, Sicilia litoribus ☉.

Statura *Salsolæ*, seu *Tamarisci*. Fol. sparsa, li-  
near. carnosæ, subtus convexa, acuta, sessil.  
patentia, punctis roridis adspersa. Fl. termi-  
nal. sessiles inter fol. versus apicem maiora.  
Cor. alba. Lamina ciliata, lateribus petalor.  
utriusq. adnexa constituunt nectar. Fl. inferi.  
Sem. villosa.

823. BRA- Cal. 5-phyll. Petal. 5. Nectar. o. Caps. 1-locul.  
THYS. polysper.

1. *juniperina*. B. Syst. veg. ed. 14. Linn. Suppl.

In nova Granada.

Frutex facie media inter Ericam, & Juniperum,  
erectus, valde ramosus, ramis foliis rectis.  
Fol. confertiss. pollicar. opposita, acerosa,  
acuta, inermia. Fl. in apice ramorum non-  
nihil conferti, sessiles.

## HEXAGYNIA.

824. STRA- S Patha sub-2-phyll. Perianth. 3-fidum. Petal.  
TIOTES. 3. Bacca 6-locul. infera.

1. *Aloides*. S. fol. ensiformi-triangulis, ciliato-aculeat. Syst.  
veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 337. Lob. hist. 904.

In Europæ septentr. aquis pigris, puris 24.

Fol. radicalia, humifusa, breviter aculeata, cras-  
sa, in medio col. obsolete purpur. quandoq.  
ex luteo-variegata. Flos magnus. Petal. ve-  
nosa, nivea.

2. *Acoroides*. S. fol. ensiform. planis, glaberrimis: spatha api-  
ce barbata. Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.

*Acorus marinus*. Rumph. amb. 6. tab. 75. f. 2.  
Inter insulas Zeylonicas 24.

Rad. repens, articulata, ut in *Acoro*. Fol. radical. conferta, linear. plana, marginata, apice rotundo, integerr. versus apicem subserrata, subcoriacea, 4-pedal. margine elevato, obtuso. Vaginæ membranac. tenuerrimæ, fol. adnatæ. Scapus interfoliaceus, solitar. erectus, simpl. filiformis, versus apicem incrassatus, nudus, 3-4-ped. 1-fl. Spatha linearis, compressa, fusco-virid. 2-phylla. Foliol. complicata, membranacea, obtusa, barbata. Drupa magnitudine Ovi gallinacei, ovata, compressa.

3. *Alismoides*. S. fol. cordatis *Syst. veg. ed. 14.*

Ottel-ambel. *Hort. Mal. II. tab. 46.*

In India &c.

Scap. 4-gon. 1--fl. Fol. natantia, inermia, nervosa. Spatha 1-phylla, 5-alata, alis undulatis.

## P O L Y G Y N I A .

825. WINTE. **C**Al. 3-lobus. Petal. 6-12. Germina clavata.  
RA. Stylus o. Bacca obovata.

1. *aromatica*. W. peduncul. terminalibus, adgregatis: pistill. 4. *Syst. veg. ed. 14.*

*Drymus Winteri*. *Lin. Suppl. Forst. gen. A7.*  
*Upsal. v. 3.*

*Winterana aromatica*. *Solander in med. Obs. vol. 5. tab. 1. fig. bona. Mill. fascic. fig. pulcherrima.*

*Peryclymenum* &c. *A7. Angl. 1693. tab. 1.*

In Amer. austral. vallibus soli expositis &c.

Ex hac cortex *Winteranus* *Offic. verus*, a *Canela alba diversissimus*.

2. *granadensis*. W. peduncul. axillaribus, elongatis, 3-fidis; pistill. 8. *Syst. veg. ed. 14.*

*Drymus Granatensis*. *Lin. Suppl.*

In nova Granada &c.

An var. prioris, & climate calidiore causata.

Petal. 12.

826. DILLE- Cal. 5-phyll. Petal. 5. Caps. connatæ, poly-  
NIA. sperm. pulpa repletæ.

1. *indica*. D. Syst. veg. ed. 14.  
Songium. Rumph. amb. 2. tab. 45. an tab. 46?  
Syalita. Hort. mal. 3. tab. 38. 39.  
In Malabarìa h.

Arb. 40-50-ped. Fol. spithamam longa, palmum,  
& ultra lata, petiolis cavis, & lanuginosis in-  
nixa, oblongo-rotunda, nervosa, costa media  
crassa, supra nitida, subtus atro-virent. Pe-  
dunc. interfoliacei, 4-goni. Cal. cochleato-  
cavus, nitens. Petal. rotunda, coriacea, al-  
ba. Stam. albida. Apices aurei, odore Lili.  
Caps. *Malvæ* similis. Sem. rotunda, albicantia.

827. ILLI- Cal. 6-phyll. Petal. sub 27. Caps. pl. in orbem  
CIUM. digestæ, 2-valv. 1-sperm.

1. *anisatum*. 1. fl. flavescentibus. Syst. veg. ed. 14.  
Somo vulgo skimmi. Kæmph. amœn. tab. 881.  
*Anisum stellatum* Mat. med.  
In Japonia, China h.

Arb. *Cerasti* magnitudine, ramosa. Fol. adgre-  
gata, 3-unc. Lauriformia, sed molliora, ner-  
vis paucis. Fl. terminal. subsolitar. peduncu-  
lis ex albo-purpureis, *Narcissum* æmulantes.  
Petal. alterne minora. Caps. ventricosæ, fal-  
catae, *Evonymi* similes, col. herbaceo.

2. *floridanum*. 1. fl. rubris. Syst. veg. ed. 14. Ellis. Aët. angl.  
1770. vol. 60. tab. 12.

Habitat . . .  
Fl. rubri. Fruct. odoratiss.

828. LIRIO- Cal. 3-phyll. Petal. 9. Sem. imbricata in stro-  
DENDRON. bilum.

1. *Tulipifera*, L. fol. lobatis (S. apice truncatis). Syst. veg. ed.  
14. Trew. ehret. tab. 10. Herm. Lugd. tab. 613.  
Pluk. alm. tab. 117. f. 15. & tab. 248. f. 7.  
Catesb. Car. 1. tab. 48. Duham. arbr. 2. tab.  
102.

b. *Tulipifera* fol. productioribus &c. Pluk. alm.  
tab. 68. f. 3.

In Amer. septentr. h.

Arb. *Juglandis* magnitudine, ramis inæqualibus,  
inconcinne dispositis; ad quorum nodos fol.  
exeunt petiol. palmaria, triloba, quasi forfice  
horizontaliter truncata, supra virid. subtus al-  
bescentia, nervosa. Fl. formosi, *Tulipæform*.  
variegati.

2. Li-



2. *Liliifera*. L. fol. lanceolatis. *Syst. veg. ed. 14.*  
*Sampacca montana*. *Rumph. umb. 2. tab. 69.*  
*In Amboina* h.  
 Arb. ramis nodosis, incurvis. Fol. alterna, acuminata, rugosa. Flos solitar. Petal. flava, ab arbore avulsa fusca, odore *Mespili*.
829. MAGNO-LIA. Cal. 3--phyll. Petal. 9. Capsl. imbricatæ, 2-valv. Sem. baccata, pendula.
1. *grandiflora*. M. fol. lanceolat. perennantibus. *Syst. veg. ed. 14. Catesb. car. 2. tab. 61. Trew. chr. tab. 33. Amæn. angl. tab. 14.*  
*In Florida, Carolina* h.  
 Frutex 18-ped. & ultra. Rami racemum regularem efformant. Fol. Lauro-cerasi, sed maiora, coriacea, per ætatem purpurascenti-pubescent. Fl. maximi, albi, odore fragranti.
2. *glauca*. M. fol. ovat-oblongis, subtus glaucis. *Syst. veg. ed. 14. Dill. elth. tab. 163. f. 205. Catesb. car. 1. tab. 39. Trew. Ehret. tab. 9. Pluk. alm. tab. 68. f. 4.*  
*In Virginia &c.* h.  
 Frutex in solo nativo sub 15-ped. cortice cinereo, ramis longis, glauco-viridibus; gemmis fuscis. In ramulor. apice fol. breviter petiol. supra sature virid. glabra, subtus albido-cœrulescent. iuniora margine, & subtus lanugine sericea obsita. Fl. terminal. solitar. Petala lata, crassa, concava, primum lactea, dein gilva, odore *Lilii convallii*. Capsl. conica. Sem. reniform.
3. *acuminata*. M. fol. ovat-oblon. acuminatis. *Syst. veg. ed. 14. Catesb. car. 3. tab. 15.*  
*In Pennsylvania* h.  
 Magnitudine, & crassitie cæteris maior. Fol. longiora, sed dimidio angustiora, utrimq. virid. Petal. obtusa, alba. Lignum flavum.
4. *tripetala*. M. fol. lanceolat. petalis exterior. dependentibus. *Syst. veg. ed. 14. Catesb. car. 2. tab. 80.*  
*In Carolina, rarius in Virginia* h.  
 Frutex 16-20-ped. Fol. umbellatim posita, 30 pollic. longa. Fl. in medio fol. magnitudine *M. grandifloræ*. Petal. alba, fragrantiss. Fruct. coccin.
830. MICHELIA. Cal. 3-phyll. Petal. 15. Baccæ multæ, 4-sper.

1. *Champaca*. M. fol. lanceolat. *Syst. veg. ed. 14.*

*Sampacca. Rumph. amb. 2. tab. 67. 68.*

*Champacam. Hort. mal. 1. tab. 19.*

*In India h.*

Arb. procera, densis frondibus late sparsis. Fol. spitham. & ultra, petiol. acumin. supra viridi-fusca, & nitida, subtus dilutiora. Fl. axillar. peduncul. racemosi. Petal. oblong-angusta, triplici ordine disposita, crocea, suaveolent. Fruct. oblong-rotundi, magis, minusve gibbosi, col. flavo-diluto--albicante, odore minus grato. Sem. pulpa sublaetea.

2. *Tsiampaca*. M. fol. lanceol-ovatis. *Syst. veg. ed. 14.*

*Sampacca sylv. Rumph. amb. 2. tab. 68.*

*In India h.*

Fol. tenella, more salicium, pube sericea. Fl. albicantes, seu lutescentes, minus olentes.

831. UVA-RIA. Cal. 3-phyll. Petal. 6. Baccæ numerosæ, pendulæ, 4-sperm.

1. *zeilanica*. V. fol. integerrim. *Syst. veg. ed. 14. -- Aubl. Guian. tab. 243.*

*Funis &c. Rumph. amb. 5. tab. 42.*

*Narum-panel. Hort. mal. 2. tab. 9.*

*Piper æthiopicum Math.*

*In India, & Guiana h.*

Arb. 20-ped. & ultra, superne ramosa, ramis hinc inde sparsis. Fol. alterna, subsessil. ovata, acuta, integerr. glabra. Fl. axillar. 1-2. Petal. 3. exter. longiora, ovato-oblong. concava; extus villosa, cinerea, intus glabra, violac. 3. exter. min. alterna, glabra, violac. Baccæ cylindrac. torulosæ, rufescentes. Sem. rufescent. *Folior. & Ligni odor aromaticus. Fructus loco Piperis adhibetur.*

2. *japonica*. U. fol. ferratis. *Syst. veg. ed. 14.*

*Frutex &c. Kæmph. am. exot. tab. 477.*

*In Japonia h.*

Frutex parvus, procumb. veluti ramosus. Fol. *Telephio* vulgari similia, sparsa, 2--4--uncial. ex angusto principio in acumen desinentia, cum petiol. purpurascens. pinguis, rigida, inflexa, vel undulata, glabra, densa, pallide virid. Petal. alba. Fruct. racemosi, rubentes.

*longifolia*. V. *Sonnerat. Voyag. aux Indes &c. 2. tab. 131. In Coromandel. h.*

Arb. excelsa, erecta. Fol. alterna, breviter petiol. lanceol-acum. angusta, 7-8-pollic. longa, integerr. undata, glabra. Fl. in ramis qua parte fol. orbantur, parvi, racemosi.

832. ANNO- Cal. 3-phyll. Petal. 6. Bacca subrotunda, cor-  
NA. tice squamato, polysperma.

1. *muricata*. A. fol. ovali-lanceolat. glabris, nitidis, planis: pomis muricat. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. Obs. tab. 5. fig. optima, & amer. ed. 2. picta tab. 161. Merian. Sur. tab. 14. Pluk. alm. tab. 134. f. 2. Sloan. Jam. hist. 2. tab. 225. Comm. hort. 1. tab. 69.*

Guanabanus &c. *Plum. gen. tab. 143. f. 1.*

*In America calidiore h.*

Odor toti Generi gravis, & nauseosus, quo soli fructus maturi minus inficiuntur. Magnitudo, & forma Pyri mediocris. Ramuli læves. Fol. 3-4-pollic. longa, alterna, breviter petiol. subcoriacea, integerr. supra sature virent. subtus pallidiora. Pedunc. solitar. crassi, 1-fl. Flos magnus, pallide sulphureus. Cor. 3-petal. extus scabra. Nectar. petal. 3. min. extus alba, lævia, intus rubra. Fruct. cordatus, muricatus aculeis recurvis, non esculentus, 5-9-pollic. cortice flavo-virescente. Caro succulenta, albida, odora.

2. *squamosa*. A. fol. oblong. subundulat. fructibus obtuse sub-squamatis. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. amer. ed. 2. pict. tab. 162. & Obs. 1. tab. 6. f. 1. Pluk. alm. tab. 134. f. 3. Rumph. amb. 1. tab. 46. Sloan. Jam. hist. 2. tab. 227.*

Atamaram. *Hort. mal. 3. tab. 19.*

*In America merid. h.*

Arb. sub 13-ped. Fol. alterna, breviter petiol. subdisticha, integerr. glabra, fordide, & ex flavo--virent. odorata. Pedunc. solitar. 1-fl. Fl. coriacei, ex viridi-flavescent. Bacca magnitudine varia, ovato-subrotund. cortice sub-cœrulescente, papillis subimbricatis, obtusis.

3. *reticulata*. A. fol. lanceolat. fruct. ovaris, reticulato-areolatis. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. amer. ed. 2. pict. tab. 264. f. 93. & Obs. 1. tab. 6. f. 2. Sloan. Jam. hist. 2. tab. 226. Catesb. car. 2. tab. 62. Rumph. amb. 1. tab. 45.*



*Anona-marum*. *Hort. mal.* 3. *tab.* 30. 31.

*In Amer. merid.*  $\text{H.}$

Arb. priori similis, sed procerior, & vastior.  
Fol. longiora, latiora, acutiora. Bacca glabra, matura sordide flavescens, vel subrubella. Caro albida, dulcis, fere insipida.

4. *palustris*. A. fol. oblong. obtusiuscul. glabris: fruct. areolatis. *Syst. veg. ed.* 14. *Sloan. Jam. Hist.* 2. *tab.* 228. f. 1. *Pluk. alm. tab.* 240. f. 6.

*In America ad aquas*  $\text{H.}$

Arb. 40-ped. parum ramosa, cortice incano.  
Fol. Laurina, petiol. Bacca pugni magnitudine, flava, odorata.

5. *glabra*. A. fol. lanceolato-ovatis: fruct. conoidibus, glabris. *Syst. veg. ed.* 14. *Catesb. car.* 2. *tab.* 64.  
*In Carolina*  $\text{H.}$

Arb. mediocris magnitudinis. Fol. conferta, 3-pollic. petiol. integerr. glabra. Fl. penduli.  
Petal. extus virid. intus alba, interiora virid.  
Bacca pugni magnitudine, lutea.

6. *triloba*. A. fol. lanceolat. fruct. trifidis. *Syst. veg. ed.* 14. *Mill. ic. tab.* 35. *Catesb. car.* 2. *tab.* 85.  
*Trew. ehret. tab.* 5. *Duham. arbr.* 1. *tab.* 19.  
*In Carolina*  $\text{H.}$

Frutex 10-12-ped. Fol. in medio latiora. Bacca scrotum Arietis referens.

7. *asiatica*. A. fol. lanceolat. glabris, nitidis, lineatis. *Syst. veg. ed.* 14.

*Guanabanus* &c. *Plum. sp. ic.* 143. f. 2.

*In Zeylona*  $\text{H.}$

Arb. ramis longis, flexuosis, glabris. Fol. alternata, integerr. Fl. solitar. Bacca purpur.

8. *africana*. A. fol. lanceolat. pubescentibus. *Syst. veg. ed.* 14.

*Guanabanus* &c. *Trew. chr. tab.* 49?

*In Africa*  $\text{H.}$

Arb. ramis punctis scabris. Fol. ovata, sed magis elongata.

9. *hexapetala*. A. fl. 6-petalis. *Syst. veg. ed.* 14 *Lin. Suppl.*

*In China*  $\text{H.}$

Arb. simillima pl. *Annonis*. Fol. elliptica, glabra. Cal. parvus.

*paludosa*.

A. fol. villosis, supra viridibus; subtus rufescentibus: fructu tuberculato, luteo. *Aubl. Guian. tab.* 246.

*In Guiana h.*

Frutex 4-5-ped. superne ramosus, ramis rectis, & declinatis, undiq. sparsis. Fol. alterna, breviter petiol. ovat-oblonga, acuta, integerr. tomentosa. Fl. axillar. solitarii-bini.

*punctata.* A. fructu lævi, punctato; carne rubescente. *Aubl. Guian. tab. 247.*

*In Guiana h.*

Frutex 20-ped. ramosus; ramis sparsis. Fol. alterna, breviter petiol. ovat-oblonga, acuta, integerr. glabra. Fl. axillar. solitar. Cor. sublutea. Bacca ovata, subrotunda, obscure rufa, edulis.

*longifolia.* A. fructu rubro, punctato, & reticulato. *Aubl. Guian. tab. 248.*

*In Guiana h.*

Frutex 15-ped. ramosus, ramis sparsis. Fol. alterna, breviter petiol. angusta, ovat-oblonga, acuta, integerr. glabra. Fl. axillar. solitar. longe peduncul. Cor. ampla. Petal. purpurascen. Bacca ovata, subrotunda, incarnata, gelatinosa, edulis.

*Ambotany.* A. fol. amplis, subtus villosis, & rufescentibus. *Aubl. Guian. tab. 249.*

*In Guiana h.*

Frutex 8-ped. caulibus tortuosis, ramosis. Fol. alterna, breviter petiol. ovata, acuta, integerr. glabra, supra virid. subtus tomentosa, ferruginea. Fl. axillar. exigui, solitar. subvirid. *Cortex ramorum odorem aromaticum spirat.*

*mucosa.* A. fol. oblongis: fruct. areolatis: cor. extimis monopetalis: *Jacq. Obs. 2. tab. 16. Rumph. amb. 3. tab. 45.*

*In Amboina, & Martinicæ sylvaticis h.*

Toto habitu similis A. *reticulatæ*. Fl. cor. exterior basi in unum corpus subrotundum, non divisum excrescit, ut pileum referat. Caro mucosa.

833. UNONA. Cal. 3-phyll. Petal. 6. Baccæ pl. pedicellatæ, 2-sperm.

*I. discreta.* U. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*

*In Surinamo h.*

Arb. ramis virgatis, angustis, flexilibus. Fol. bifaria, alterna, petiol. Ligustrina, glabra, integerr. digitalia. Petiol. breviss. Pedicelli

baccarum intra cor. umbellati. Flos *Anno-*  
*næ*, sed fructus diversus, purpur. sapidus,  
 aromaticus.

835. ANEMO-Cai. 0-3 fid. Petal. 6-9. Sem. plura, placentæ  
 NE. comm. fixa.

\* *Fl. subcalyculato.*

1. *Hepatica*. A. fol. trilobis, integerr. *Syst. veg. ed. 14. Fl.*  
*Dan. tab. 610. Ludw. ed. tab. 140. Black.*  
*tab. 207.*

*Ranunculus* &c. *Garid. Aix. tab. 94, Knorr. del.*  
*1. tab. L. 13.*

*Trinitas. Matth.*

*In Europæ nemoribus 24.*

Fol. radicalia, longe petiol. semitriloba, coria-  
 cea. Pedunc. 1 fl. Cal. 3-phyll. Petal. pur-  
 pur. alba, rubra. *Var. fl. duplici.*

\*\* *Pedunculo involucrato; feminibus caudatis.*

2. *patens*. A. pedunculo involucrato: fol. digitatis, multi-  
 fidis. *Syst. veg. ed. 14.*

*Pulsatilla* &c. *Helw. Puls. tab. 2. 3.*

*In Sibiria, Silesia &c. 24.*

Fol. radical. ternato-digitata; foliol. sessil. lacini-  
 at. acuminatis, pubescent. vel glabris; fo-  
 liolo intermedio 3--part. lateralibus 2--part.  
 Scap. 1-fl. foliis brevior. Involuc. remotum,  
 villosum. Flos diversæ magnitudinis, semper  
 tamen erectus, & patens. Petal. lutea, aut  
 cœrul--purpureo--alba, subtus villosa. Stam.  
 lutea.

3. *sulphurea*. A. peduncul. involucrato: fol. triplicato-pinnat.  
 pilosis, planis, acute incis: feminibus cau-  
 datis. *Syst. veg. ed. 14.*

*Pulsatilla* II. *Dalech. p. 851.*

*In summis alpium scopulis Italiæ, Helvetiæ &c.*  
*24.*

Habitus A. *vernalis*, sed differt pinnis triplo  
 longioribus, acutioribus, lobatis, totis alba  
 lanugine obsitis; petalis acutioribus, intus lu-  
 teis.

4. *baldensis*. A. fol. biternatis, hirsutis. *Syst. veg. ed. 14.*  
*All. Fl. Ped. tab. 44. f. 3. & tab. 67. f. 2.*



*A. alpina*. Fl. Carn. tab. 26. Retz. Obs. 2.

In monte Baldo, Helvetia, Pedemontio &c. ad rupes 24.

Quadruplo minor, debilior, minusq. hirsuta *A. alpina*. Fol. radical. incisa, minimeq. decomposita. Flos amplus, albus.

5. *vernalis*. *A.* pedunc. involucrato: fol. pinnatis: fl. erecto. Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 29. Hall. helv. tab. 21.

*Pulsatilla* &c. Helw. puls. tab. 9.

In Italia, Helvetia, Germania &c. sylvis 24.

Fol. radicalia, multa, ex petiolo latefcentia, subhirsuta, 2-3-iuga, impari extremo: pinnæ lobis 2-3-part. Scapus semiped. Involuc. flavum, tomentosum, nitens. Petal. 6. ovat-lanceol. conniventia, iuniora alba, sulphureo col. mixta. Tubæ plumosæ, sericeæ. Var. fol. hirsutis, & pinnis acute lobatis.

6. *cernua*. *A.* pedunc. involucrato: fol. pinnatis: fl. cernuo. Syst. veg. ed. 14. Thumb. Jap.

In Japonia 24.

Scapus tomentosus, apice geniculatus, 1-fl. Fol. radicalia, digital. petiol. Pinnæ oppositæ, profunde incisæ: pinnulæ alternæ, acutæ, subserratæ, villosæ, præcipue subtus.

Differt ab *A. vernali* fl. carneo: folior. pinnis pluribus, magisq. incisis.

7. *Pulsatilla*. *A.* pedunc. involucrato; petalis rectis: fol. 2-pinnatis. Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 153. Ludw. ed. tab. 119. Kniph. cent. 1. tab. 4. Knorr. del. 2. tab. A. 7.

*Pulsatilla*: Matth.

*Pulsatilla* &c. Helw. puls. tab. 8. Cam. epit. 398.

In collibus apricis Europæ borealis 24.

Caul. cubital. lanuginosus, 1-fl. Fol. supina, longe petiol. villosa. Involucrum remotum, multifid. Pedunc. 1-fl. Flos nutans. Petal. erecta, elliptico--lanceol. extus villo subcinereo barbata, intus obscure violac. glabra. Capitulum rotundum, undiq. tubis capillatum. Placenta punctata. Sem. nitida, argentea. Var. fl. albis.

8. *pratensis*. *A.* pedunc. involucrato; petal. apice reflexis: fol. 2-pinnat. Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 611.

*Pulsatilla* &c. *Helw. puls. tab. 12. Clus. hist. 1. p. 246.*

*In Scanix, Germanix, Italiæ campis apricis, aridis*  $\mathcal{U}$ .

*Distincta sp. a priore.* Flos dimidio min. apice reflexo, nutans ut in priore Petal. atro-cœrul.

\*\*\* *Caule folioso; seminibus caudatis.*

9. *alpina*. A. fol. caulinis ternis, connatis, supradecomposit. multifid. semin. hirsutis, caudatis. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. Austr. 1. tab. 85. Crantz. Austr. tab. 3. f. 2.*

*A. sylv. 2. Clus. hist. 1. p. 245.*

*Pulsatilla* &c. *Lob. ic. 182. Bauh. hist. 3. p. 419.*

*b. P. lutea. Cam. epit. p. 393.*

*In alpinis Italiæ &c.  $\mathcal{U}$ .*

Caul. & fol. ex eodem loco radices prodeunt, basibus lanuginosis. Caul. basi purpur. Fol. radicale ternatum, pinnatifid. varians magnitudine, & hirsutie. Involucri fol. supradecomposita, ut radicalia, cuius vaginæ non emarginatæ. Petal. plerumq. 6. raro plura, extus pubescent. sæpe purpurascent. intus luteo-alba, dein citrina, & crocea.

10. *apiifolia*. A. fol. caulinis ternis, connatis, supra decompositis, multifid. tenuiss. subtus pilosiss. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. misc. 2. tab. 4.*

*Habitat*

11. *coronaria*. A. fol. radical. ternato-decompositis: involuc. folioso. *Syst. veg. ed. 14.*

*b. A. multiplex &c. Cam. epit. 386.*

*In Oriente; Constantinopoli allata hic colitur in hortis  $\mathcal{U}$ .*

Foliola oblonga, laciniata ad dimidium. Involuc. 3-phyll. Petal. 6-8. erecto-patent. ovata, intense coccinea, unguibus albidis.

12. *hortensis*. A. fol. digitat. semin. lanatis. *Syst. veg. ed. 14.*

*A. hort. latifol. 3. Clus. hist. 1. p. 249.*

*A. 1. Dod. pempt. 434.*

*In Italia, Helvetia  $\mathcal{U}$ .*

Fol. radical. alia profunde incisa, ut 5-digitata videantur: alia lata, profunde trilobata, obtusa: caulina amplexicaul. ovat-lanceol. Invo-

luc. foliolis laciniat. Petal. 9. longa, elliptica, lineata, col. vario, extus pubescentia.

13. *palmata*. A. fol. cordatis, sublobatis: calyc. 6-phyll. colorato. *Syst. veg. ed. 14. Moris. hist. 3. f. 4. tab. 25. f. 3.*

A. *hortensis latifolia* I. *Clus. hist. 1. p. 248.*

*In Lusitania ad Tagum 24.*

Rad. tuberosa. Caul. palmar. subhirsutus. Fol. ampla, longe petiol. subrotunda, dura, firma, supra intense virid. subtus purpurasc. Petal. extus flava, intus aurea. Cal. 6-part. villosus, coloratus, nec a fl. remotus.

\*\*\*\* *Fl. nudo; seminibus ecaudatis.*

14. *sibirica*. A. caul. 1-fl. involucro folioso, obtuso. *Syst. veg. ed. 14.*

*In Sibiria 24.*

Fol. ternata, suborbiculata: foliola inciso--palmata, ciliata, petiolis hirtis. Scap. pilosus. Involuc. sub fl. 3-part. lobatum, laciniis lanceolat. Flos patens. Petal. 6. subrotun. fulva. Stam. flava. Pistill. capitula subrotun. muricata.

15. *sylvestris*. A. pedunc. nudo: semin. subrotundis, hirsutis, muticis. *Syst. veg. ed. 14.*

A. *sylvestris* I. *Clus. hist. 1. p. 244.*

*In Germania, Italia &c. 24.*

Caulis cubit. foliosus. Fol. radical. longe petiol. ternato-digitata, obtusa, curva, crenata: lateralibus ad basin 2-part. ut quina videantur; lobis lateralibus profunde 2-dent. medio fere 3-dent. Caulina amplexicaul. acutiora. Petal. alba, extus subrubent. & hirsuta. *Var. fl. viridi, purpuro-viridi, & viridi pleno.*

16. *fragifera*. A. pedunc. nudo: semin. subrotundis, lanatis, muticis, folior. laciniis lanceol. acutis. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. misc. 2.*

*Habitat*

Fol. radical. 4-6. & ultra, longe petiol. subtriplicato--ternata, seu bis 3-part. lobis profunde, & inæqualiter 2-3-fid. dentat. latiusculis, ovato-lanceol. planis. Hirsutiem fol. tandem exeunt. Scapus simpl. dimidiam spitham. longus, erectus, teres, ex rufo-virens, tomentoso-hirsutus; involucro ex fol. basi connatis,



hirsutis, lobis magis lanceol etiam dentat. Flos terminal. Pet. 5-7. oblong-ovata, alba, extus hirsutula, & ex parte purpurasc. decidua.

17. *virginiana*. A. pedunc. alternis, longissim. fruct. cylindricis. semin. hirsutis, muticis. *Syst. veg. ed.* 14. *Herm. parad. tab.* 18.

*In Virginia* 24.

Caul. nudus, terminatus fol. ternis, ternatis, medio trilobo, acuto, ferrato, lateralibus 2-part. lobato-ferratis. Pedunc. exit e centro petiolor. longus, nudus. Flos parvus, petal. ovatis, dilute virid. instar calyc. cuiusdam. Pistill. capitulum elongatum, cylindricum. Juxta pedunc. basin exit caulis ulterius, terminatus pedunc. florifero, & fol. 2. oppositis, & sic ulterius.

18. *decapetala*. A. caule 1-fl. flore decapet. fol. ternatis, lobatis, radicalibus. *Syst. veg. ed.* 14. *Arb. Specim.* 2. *tab.* 12.

*In Brasilia* 24.

*Statura prioris, sed minuta*. Rad. Olivæform. Fol. petiol. Foliol. petiolulata, subovata, obtusa. Caul. semiped. simpl. Involuc. tripart. multifid. lineare, acutum, læve. Peduncul. axillar. longitudine involucris, hirtus. Flos parvus, albus, petal. lanceol. persistent. interioribus paulo minoribus. Stam. cor. breviora. Germ. capitatum, conicum, villosum. Stigm. acumin. lævia.

19. *pensylvanica*. A. caule dichotomo: fol. sessil. amplexicaulibus: infimis ternis, 5-fid. incis. *Syst. veg. ed.* 14.

*In Canada* 24.

*Simil. sequenti, ut incautum fallat; sed differt = fol. ad primam dichotomiam caulis ternis (non binis) sessilibus, magis venosis, minus horizontalibus. Fl. toti albi (non subius rubicundi), maiores. Anth. flavæ (non fulvæ). Fructus globosus: seminum apicibus subulatis (non mucrone minuto recurvo), undiq. exstantibus.*

20. *dichotoma*. A. caul. dichotomo: fol. sessil. omnibus oppositis, amplexicaulibus, trifid. incis. *Syst. veg. ed.* 14. *Lin. dec.* 29. *tab.* 15.

*In Canada, Sibiria* 24.

*Simil. priori, sed radix late repens. Fol. horizontalia. Cor. subius purpurascens, Anth.*

fulvæ. Sem. nuda, sed mucrone minuto recurvo.

21. *trifolia*. A. fol. ternatis, ovatis, integris, serratis: caul. 1-fl. *Syst. veg. ed. 14. Bauh. hist. 3. p. 412. Dod. pempt. 436.*

*In Gallia* 24.

Fol. oblonga, concava, subtus rubore tincta.

Petal. 6. elliptica, alba, vel purpur.

22. *quinquefolia*. A. fol. quinatis, ovalibus, serratis: caul. 1-fl. *Syst. veg. ed. 14.*

*Ranunculus* &c. *Pluk. alm. tab. 106. f. 3.*

*In Virginia, Canada* 24.

23. *nemorosa*. A. femin. acutis: foliol. incisis: caule 1-fl. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 549.*

*Ranunculus sylvarum*. *Clus. hist. 247.*

*In Europæ apricis, nemoribus* 24.

Caul. 3-unc. trifoliat. nutans, purpurasc. Fol. terna, (radical. nulla) foliol. medium trilobum; lateral. biloba. Flos supra fol. elatus. Petal. 6-8. elliptica, alba, vel plus, minus purpur. *Var. fl. pleno.*

24. *apennina*. A. femin. acutis: foliol. incisis: petal. lanceolat. numerosis. *Syst. veg. ed. 14.*

*Ranunculus* &c. *Mentz. pug. tab. 8. f. 2.*

*A. hortensis* &c. 1. *Clus. hist. 1. p. 254.*

*In apenninis, Romæ &c.*

Caul. nudus, involucratus. Fol. *Geranii robertiani*, 2-ternata, hirsuta, primum purpurasc. dein viridi-pallent. Petal. albo-cœrul. vel ex utroq. col. mixta.

25. *ranunculoides*. A. femin. acutis: foliol. incisis: petal. subrotundis: caule subbifl. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 140. Kniph. cent. 1. tab. 5.*

*Ranunculus* &c. *Bauh. hist. 3. p. 413.*

*In Europæ borealis pratis nemorosis* 24.

Caul. simplex, debilis. Fol. radicalia nulla; caulina 3-part. lobis lateralibus profunde 2-fid. Flos breviter supra fol. elatus. Petal. 6. tria interiora, tria exteriora, rotunda, flava.

26. *narcissiflora*. A. fl. umbellatis: semin. depresso-ovalibus, nudis. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. austr. tab. 159.*

*Cranz. austr. tab. 3. f. 1.*

*Ranunculi montani* 2 &c. *Clus. hist. 1. p. 235.*

*Ranunculus* &c. *Clus. pann. 366. 367.*

*In alpinis, & montanis Austria, Helvetiæ &c.* 24.

Mire variat statura, & hirsutie. Scap. pilosus, rubescens, involucrat. Fol. radicalia, ternata, petiol. longis, hirsutis, purpurasc. innixa, supra fature, subtus dilute virent. margine pilis albidis ciliata: foliol. plerumq. 3-loba, incisa. Fol. caulinum ternatum. Fl. 2-8. Cor. hypocraterifor. Petal. 5-6. ovata, alba, quandoq. stria purpur. extrus hirsuta.

27. *fasciculata*. A. fl. umbellatis, congestis: fol. multifidis. *Syst. veg. ed. 14.*

Ranunculus &c. *Tourn. it. 3. tab. 92.*

*In Oriente.*

*Videtur var. prioris.*

28. *Thalictroides*. A. fl. umbellatis: fol. caulinis simplic. verticillatis; radicalibus 2-ternat. *Syst. veg. ed. 14.*

Ranunculus &c. *Pluck. alm. tab. 106. f. 4.*

*In Virginia, Canada.*

Rad. tuberosa. Fol. radicalia longe petiol. foliol. subcordata, angulata. Scap. fol. paulo altior, terminatus fol. 4. simplicibus, foliolis radical. similibus, longe petiolat. Pedunc. terminal. 1. 2. 3. 5. simplices, 1-fl. æquales. Petal. ovata, obtusa, patentia, alba. Stami. flavescent. Pistil. capitulum ovatum, muricatum.

- Apifolia Scop.* A. rubis caudatis: fol. omnibus duplicato-pinnat. pinnulis confertis: fl. luteo. *Scop. Fl. Carn. Hall. enum.*

*In alpinis.*

Fol. radical. decomposita, tria. Sem. longis, & plumosis tubis caudata. Rad. in duos ramos divisa. Fol. prodeunt e vaginis striatis, sanguineis, villosis, petiolis basi pariter sanguineis. Petiolus medius dividitur in 3. ramos denuo 3-fidos, pinnis ternis, sessilibus; terminali profunde 3-fida, segment. acutis. Caul. semipedal. albo-lanuginos. teres, basi ruber. Petal. fena, oblonga, flava, venulis dichotom. obscurioribus lineata. Sem. caudæ uncial. plumosæ.

*Halleri.*

- A. tubis caudat. involucr. multifidis: fol. hirsutis, pinnat. pinnis acute lobat. *Hall. helv. n. 1148. All. Fl. Ped. tab. 80. f. 2.*

*In pascuis rupestribus &c.*



*Simil. A. sulphurea*. Tota planta sericea lanugine obducta. Folior. pinnæ profundius & acutius incisæ. Flos purpur. cum aliquo sericeo villo.

835. ATRA- Cal. 4-phyll. Petal. 10-12. Tubæ pilosæ, sericeæ. GENE. Sem. caudata.

1. *japonica*. A. erecta; fol. oppositis, triternatis: foliol. ovatis, incis. *Syst. veg. ed. 14. Thumb. Jap. In Japonia 24.*

*Facies Anemones, sed ob petala plurima huc pertinet.* Caul. 2-ped. villosus, striato-angulatus. subdichotomus. Fol. petiol. patentia. Foliol. pollic. dentata, tenuissime villosa, subtus pallida. Petiol. amplexicaul. Fl. e dichotomia pauci, peduncul. Petal. plurima, ultra 20. intus purpur. extus albo-tomentosa.

2. *alpina*. A. fol. duplicato-ternat. serratis: petal. exterior. quaternis. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. Austr. 3. tab. 241. Crantz. Austr. tab. 5.*

*Clematis &c. Mill. ic. 284. Pluk. alm. tab. 84. f. 7. Moris. hist. 3. f. 15. tab. 2. f. ult.*

*In Baldi, Austriæ &c. alpinis 24.*

Caul. pl. diffus, 2-fol. nodosi, fusci. Fol. opposita. Petioli hirsuti. Foliol. inæqual. sessil. lanceol. supra sature virent. innitida, subtus dilutiora, lucida. Stipulæ obtusæ. Pedunc. axillar. 1-fl. Flos nutans. Cal. cœrul. & albus. Petal. erecta, spathulata, integra, fordidè albertia, plerumq. 12. exteriora 4. cœrul. magna: interiora parva.

3. *capensis*. A. fol. ternat. foliol. incis, dentatis: petal. exterioribus quinis. *Syst. veg. ed. 14.*

*Pulsatilla &c. Burm. afr. 148. f. bona.*

*Ad cap. b. Spei 24.*

Scapus simplex, spitham. 1-fl. Involuc. e medio scapi e stipul. ventricos, ovatis, foliaceis, villosis. Foliol. cuneiform. acuta, 3-fida, nuda, intermedio longius petiolato. Petal. sub 20. alba, horum 6. inferiora latiora, subtus villosa, purpurascens. Sem. capitulum ovatum, hirsutum.

4. *tenuifolia*. A. fol. duplicato-pinnat. pinnul. linear. integris. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*

*Ad cap. b. Spei.*

5. *zeylanica*. A. cirrhis 2-phyll. petal. exterioribus quaternis.

*Syst. veg. ed. 14.*

*In Zeylona h.*

Caulescens, & scandens. Fol. opposita, petiol. composita. Foliol. breviter petiolul. ovata, plerumq. integerr. trinervia. Panícula terminal. sub 9-fl. Petal. angusta, subpurpurea.

*polygama*.

A. fol. caulinis omnibus ternatis; ramusculorum simplicibus: fl. dioicis. *Jacq. amer. ed. 2. pi. 7. tab. 261. f. 244.*

*In Havana sepibus h.*

Habitus *Clematidis flammulae*. Rami teretes, scandentes. Fol. cordat-ovata, integerr. vel dentato-incisa, supra glabriuscula, subtus villosa. Pedunc. ultimi 3-fl. Fl. albid, inodori.

*austriaca*.

A. fol. duplicato ternat. caule fruticoso, scandente. *Jacq. enum. Stirp. austr. p. 93.*

*In Austria.*

*Similis, sed diversa ab alpina.*

836. CLEMATIS. Cal. o. Petal. 4. raro 5. vel 6. Sem. ovata, stylo instructa adunco, aut plumoso.

\* *Scandentes*.

1. *cirrhus*.

C. fol. (saepe) simplicibus: caule cirrhis oppositis scandente: pedunc. lateralibus, 1-fl. *Syst. veg. ed. 14.*

C. *altera bœtica*. *Clus. hist. 1. p. 123.*

*In Bœtica, arbores operiens, & deprimens.*

Fol. ex iisdem geniculis caulibus plura, petiol. ovata, serrata. Sub singulo fl. calyculus remotus, minutus, hemisphaericus.

2. *Viticella*.

C. fol. compositis, decompositisq. foliol. ovatis, sublobatis, integerr. *Syst. veg. ed. 14.*

C. *altera*. *Clus. hist. 1. p. 122. Cam. epit. 696. In Italia, Hispania sepibus.*

Fol. nunc pinnata, nunc ternata, terminali uno dente utrimq. instructo, lateralibus bilobis: floralia ovata. Petal. deltoidea, seu superne dilatata, purpur.

3. *Viorna*.

C. fol. compositis, decompositisq. foliol. quibusdam 3-fidis. *Syst. veg. ed. 14.*

*Flammula &c. Dill. elth. tab. 188. f. 444.*

*In Virginia, Carolina.*

Caul. sarmentosi, scandentes, geniculati. Fol.

opposita, undata, plerumq. sinuata, glabra, subtus pallidiora. Fl. axillar. peduncul. crassi, nutantes. Petal. extus viridi--purpur. intus pallide viridia.

4. *crispa*. C. fol. simplicibus, ternatisque; foliol. integris, trilobisve. *Syst. veg. ed. 14. Dill. elth. tab. 73. f. 84.*

*In Carolina.*

Caul. scandentes. Fol. opposita, petiol. oblonga, angusta. Fl. axillar. breviter peduncul. solitar. oblongi, tubulosi, penduli. Petal. acumin. reflexa, crispa, dilute purpureo-violacalba.

5. *orientalis*. C. fol. compositis: foliol. incis, angulatis, lobatis, cuneiformibus: petal. interne villosis. *Syst. veg. ed. 14.*

*Flammula &c. Dill. elth. tab. 119. f. 145.*

*In Oriente, Russia.*

Caul. sarmentosus, 2-orgyal. Fol. glauca. Pedunc. stipula terminati, triangulari, subcompressa. Capitula oblonga, pendula, obscure rufescent. Petal. recurvata, viridi-lutea.

6. *hexapetala*. C. fol. compositis; foliol. ovatis, serratis: peduncul. 2--phyllis: cor. patente, 6--petala. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*

*In nova Zeelandia.*

Scandens, simillima reliquis. Fl. lutescentes.

7. *virginiana*. C. fol. ternatis; foliol. latis, subobliquatis, integris, 2-3 part.

C. fol. ternatis; foliol. cordatis, sublobato-angulat. scandentibus: fl. dioicis. *Syst. veg. ed. 14. Pluk. mant. tab. 389. f. 4.*

*C. floridensis &c. Albin. acad. tab. 7.*

*In America septentr. h.*

Caulis altissim. e singulis nodis rami 5. præter fol. in apice terni. Fol. ramosa, foliorum binis inter se semper contrariis pediculis. Fol. caulina propiora, ramosiora, in apice simplicia. Fol. parva, lata, certo modo obliquata, alia integra, alia plus, minus divisa, 2-3-part. nitida, concava. Pedunc. simplic. & 3-fl. Cor. patens, alba, odora, subtus tomentosa, subviridis.

8. *florida*. C. fol. decompositis; foliol. binatis, ternatisq. petal. ovatis. *Syst. veg. ed. 14. Thumb. Jap. In Japonia 24.*



Caul. scandens, striatus, purpur. glaber. Fol. opposita, petiol. Foliol. petiolul. Pinnæ sessil. ovate, acutæ, integræ, raro incisæ, villosæ, media maiori, unguicular. Fl. axillar. peduncul. solitar. Cor. magna, speciosa, patens, petal. ovatis, acuminat. lutescentibus. *Differt a C. Viticella fol. semper decompositis: foliol. acutis: petal. ovatis.*

9. *japonica*. C. fol. ternatis: foliol. elliptico-ovat. serratis: fl. cylindricis. *Syst. veg. ed. 14. Thum. Jap.*

*In Japonia.*

Caul. scandens, filiform. striatus, purpur. villosus. Fol. e geniculis pl. petiolata, a medio ad apicem serrata, nervosa, villosa, pollic. intermedio ma. Fl. e geniculis pedunculati, solitar. cylindrici, purpur. *Differt a C. Virginiana, foliol. utrimq. adtenuatis, nec cordatis: fl. cylindricis, nec ovatis, & pedunculat.*

10. *dioica*. C. fol. ternatis, integerr. fl. dioicis. *Syst. veg. ed. 14.*

C. *prima*, seu *slv. &c. Sloan. Jam. hist. 1. tab. 128. f. 1.*

*In Amer. calidiore.*

Caul. scandens. Foliol. petiolulata, 3-4-nervia. Fl. paniculati. Caul. pubescens Sem. cauda villosa.

11. *Vitalba*. C. fol. pinnat. foliol. cordatis, scandentibus. *Syst. veg. ed. 14. Sabb. hort. 4. tab. 40. Jacq. austr. tab. 308.*

C. *latifolia*, *integra. Bauh. hist. 2. p. 125.*

*Vitalba. Dod. Pempt. 404.*

*Clematide 3. Maith.*

*In sepibus Europæ australis 24.*

Caul. volubil. 6-pedal. & ultra. Fol. opposita, longe petiol. 2-3-iuga. Foliol. integra, vel incisæ. Pedunc. axillar. oppositi. Petal. lanceol. coriacea, hirsuta, alba, odora.

12. *Flammula*. C. fol. inferioribus pinnat. subtrilobatis: summis simplic. lanceol. integerrim. *Syst. veg. ed. 14. Sabb. hort. 4. tab. 41. Knorr. del. 1. tab. C. 9.*

C. *urensf. 1. 2. Tabern. 882. 833.*

*Flammula. Dod. Pempt. 404. Dalech. hist. 1171.*

*In sepibus 24.*

Habitus humilis. Sarmenta infirma. Fol. opposita.

Foliol. ovat-lanceol. Petal. sæpe 5. lanceol. lineata, alba. Tubæ plumosæ.

\* *Erectæ*.

13. *maritima*. C. fol. pinnat. linearibus caul. simplicibus, hexagonis. *Syst. veg. ed. 14.*

*Ad litora maris Adriatici &c. 24.*

Caul. e sarmentis procumbentibus pl. erecti.  
Fol. opposita: foliol. sæpius 5-iuga, remota, linear. rigidiuscula, subsessil. lævia, raro 2-3-fid. Fl. C. *rectæ*. *An Var. sequentis?*

14. *erecta*. C. fol. pinnatis; foliol. ovat-lanceol. integerr. caul. erecto: fl. 5-4-petalis. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. austr. tab. 291.*

Flammula. *Cam. epit. 698. Clus. hist. 1. p. 124. Matth.*

*In Italia, Helvetia &c. 24.*

Caul. 3-5-ped. Fol. subtus glauca, 1-2-3-iuga, cum impari. Umbellæ erectæ, & angustæ. Petal. elliptico-acum. lineata, extus glabra, alba, apicibus viridibus.

15. *integrifolia*. C. fol. simplic. sessil. ovato-lanceol. fl. cernuis. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. Austr. tab. 363. Sabb. hort. 4. tab. 42.*

*Clematis cœrulea &c. Clus. hist. 1. p. 123.*

*In Hungaria, Tataria 24.*

Caul. erectus, sub 2-ped. Fol. integerr. nervosa, venosa, sessilia; suprema connata. Petal. magna, coriacea, crassula, patentia, undulata, cœrulea.

*hexapetala*. C. *Pall. it. 3. tab. Q. f. 2.*

*In Dauuria 24.*

Tota planta glabra, præter corollam. Caul. erecti, simpl. subflexuosi. Fol. opposita, adscendentia, pinnata: foliola acuta, dura, venosa, marginata, imi paris ramoso-4-fid. Superiora lanceolata, & 2-fida, terminali 3-partito. Fl. paniculati. Petal. 6. raro 5. alba, oblonga, extus tomentosa, reflexa.

*chinesis*. C. fol. quinato-pinnat. foliol. lanceolatis. *Retz. Obs. Fasc. 2. tab. 2.*

*In China.*

Caul. debiles, vix scandentes, 4-goni. Fol. remota. Foliol. petiolul. Pedunc. axillar. oppos.

siti, 3-5-fl. bracteati. Fl. parvi. Peta<sup>l</sup>. lineari-lanceol. obscure purpur. margine interiore linea tomentosa picto.

837. **THALICTRUM**, Cal. o. Petal. 4-5. caduca. Germina plura, pedicell. stigmate simplici instructa evadunt caps. striatæ, aut alatæ, 1-sperm. Fol. Umbelliferarum more divisa.

1. *alpinum*. T. caul. simpliciss. subnudo: racemo terminali, simplici. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 11. Moris. hist. 3. f. 9. tab. 20. f. 14.*

*In alpinis Lapponia &c. 24.*

Radix reptans. Cauliculi breviss. erecti, simplices. Fol. ut in toto genere sub 2-pinnata: in hac specie omnium minora, obtusa, supra viridi-splendent. subtus cinereo-albida. Fl. alterni, cernui. Petal. 4. atro-rubent. aut purpur. *Var. fol. angustioribus.*

2. *fatidum*. T. caul. paniculato, filiformi, ramosiss. folioso. *Syst. veg. ed. 14. Moris. hist. 3. f. 9. tab. 20. f. 13. Bauh. hist. 3. p. 488. Pluk. alm. tab. 65. f. 4.*

*In Helvetia, Vallesia &c. 24.*

Planta pubescens. Odor hirci, aut urinæ felinæ. Caul. ped. Fol. alterna, ramis longiss. subrotunda, mollia, pulpota. Petal. subhirsuta, iuniora tubrubra; adulta albescentia.

3. *tuberosum*. T. fl. pentapetal. rad. tuberosa. *Syst. veg. ed. 14. Mill. ic. 265. f. 2.*

Ranunculus &c. *Moris. hist. 3. f. 4. tab. 28. f. 13.*

*In Hispania, Pyrenæis 24.*

Radix tuberosa pendula. Caul. pedal. simplex, inferne fol. unico trifariam supra decomposito præditus, foliol. subrotundis, trilobis: caulina superne 2-fida, foliolo subiecto, parvo, supradecomposito. Cor. alba, staminibus longior.

4. *Cornuti*. T. fl. pentapetal. radice fibrosa. *Syst. veg. ed. 14. T. canadense. Corn. canad.*

*In Canada 24.*

Caul. 2-cubit. superne ramosus, purpurasc. Fol. ampla, Aquilegiform. glauca. Petal. alba, quandoq. purpurasc. Sem. longa, cæteris speciebus maiora.

5. *dioicum*. T. fl. dioicis. *Syst. veg. ed. 14.*

*In Canada 24.*



Caul. vix ped. rectus. Foliol. cernua. Fl. 4-petal. stamin. 40. albis. Anth. flavescent.

6. minus.

T. fol. 6-part. fl. cernuis. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. austr. 5. tab. 419. Fl. Dan. tab. 244. & tab. 732? Dod. pempt. 58.*

T. *siliqua* &c. *Morif. umbel. tab. 8.*

Ruta &c. *Tabern. ic. 55.*

In *Europæ pratis* 4.

*Dignoscitur apicibus folior. purpurascens. & caulis nebula cœrulescens.* Rad. intus crocea. Caul. 1-3-ped. aphyllus, cœrulescens, flexuosus, striatus, sicuti vaginæ. Fol. subrotund. patula; ima obtuse triloba, suprema acuta, glauca, subtus pallidiora, apice purpurasc. Panicula diffusa. Pedunc. longe nudi. Fl. nutantes. Petal. primum purpur. dein lutea.

7. maius.

T. fol. multipart. fl. cernuis: ramis floriferis ex eisdem axillis binis, vel ternis. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. austr. 5. tab. 420.*

In *Austria.*

*Simile T. Sibirico. Notæ variabiles sunt = striæ: rectitudo: nitiditas: sulci in costis: crassities nodulorum &c. Costantes vero = major ramositas: tempus florendi: altitudo maior, scilicet ad unam 3. partem.*

8. medium.

T. fol. multipart. foliol. lanceolat. incis: fl. erectis. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. hort. 3. tab. 96.*

*Habitat . . . . .*

*Medium inter T. maius, & minus. Differt in fructificatione a T. elato, cui simile fol. & statura. Caul. 7-ped. obsolete angulati. Fol. inferiora multiplicato-pinn. Foliola oblonga, acutiuscula, rariter incisa, subtus pallide virentia.*

9. elatum.

T. fol. multipart. foliol. cordatis, vel ovatis, obtusis, incis: caul. tereti, paniculato. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. hort. 3. tab. 95.*

*Habitat . . . . .*

*Differt a T. Sibirico, panicula ad divaricationes non fusca: fl. non cernuis: & foliol. minoribus. Caul. pl. erecti, 4-ped. ramosiss. fistulosi, inferne purpurasc. Folior. vaginæ striatæ. Fol. ampla, multiplicato-pinn. Foliol. *Aquilegiæ*; obtusa, utrimq. glabra, venosa, superne incisa, supra saturè virent, subtus glauca. Fl.*

panicul. suaverubent. Petal. pallida. Filam. albida.

10. *sibiricum*. T. fol. 3-partit. foliol. subreflexis, argute incisifis: fl. cernuis. *Syst. veg. ed. 14.*

T. *alpinum* &c. *Segu. ver. 1. tab. 11.*

*In Sibiria.*

Habitus T. *min.* seu purpurascens. at foliol. parva, sextuplo min. glauca, colore *Rutæ*, seu *Fumariæ*. Caul. viridis, maxime paniculat. Panicula ad divaricationem fusca. Floret serius, nempe cum T. *flavo*, & *dioico*.

11. *purpurascens*. T. fol. 3-partit. caule (purpurascens) fol. duplo altiore: fl. cernuis. *Syst. veg. ed. 14.*

*In Canada 24.*

Habitus T. *minoris*, at dimidio humilior evadit, ubi illud 3-ped. Calyc. purpurascens. staminibus luteis. Differt a T. *min.* foliol. minime apice purpurascens. Tempore floreendi præcocius cum T. *min.* nec cum T. *flavo*. Flos ut in priore, petal. 4. staminibus 14; pistil. 8.

12. *angustifolium*. T. foliol. lanceolato-linear. integerr. (ultimo raro *dentato*). *Syst. veg. ed. 14. Jacq. hort. 3. tab. 43. Pluk. alm. tab. 65. f. 6.*

*In Pedemontio, Germania rarius B.*

Caul. 2-ped. & ultra. Fol. vaginant. multiplicato-pinn. supra pallide virent. subtus saturnitida. Panicula ampla, verticillatim ramosa, densa. Petal. ochroleuca, odore *Sambuci*. Adfines T. *flavo*.

13. *nigricans*. T. caule folioso, sulcato: panicula multiplici, erecta: foliol. acute trilobis. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. austr. 5. tab. 421.*

*In pratis udis.*

Caul. 2-4-ped. erecti, striati, fistulosi. Petioli membranac. Foliol. lanceol-acuta, supra saturne virent. subtus pallidiora, utrinq. glabra; alia integerr. alia 2-3-incisa. Panicula terminal. erecta, densa. Fl. non cernui, luteoli, odori. Petal. 4. parva, minus colorata. Sem. subovata, fusca.

14. *flavum*. T. caul. folioso, sulcato: (folior. lobulis acute 3-lobis) panicula multiplici, erecta. *Syst. veg. ed. 14.*

T. *nigrius* &c. *Bauh. hist. 3. p. 487.*

T. *magnum*. *Dod. pempt. 58.*

Thalitro . *Matth.*

*In Europæ septentr. subhumidis 24.*

Caul. 6-ped. Fol. amplexicaul. 3-part. lobata .  
Petal. exigua , 4. concava , lutescent. Stam.  
24. Pistil. 10-16.

15. *simplex* . T. caul. simpliciss. folioso , angulato . *Syst. veg.*  
*ed. 14. Fl. Dan. tab. 244. Segu. ver. 1. tab. 11.*  
*In Svecia , Dania &c. 5 .*

*Differt a priore , caule dimidio min. fl. nutanti-*  
*bis , nec erectis : petal. viridibus , nec albis :*  
*filament. 14. purpurascens , nec 17. albis :*  
*panicula rariore : fol. angustioribus . Præter sti-*  
*pulas inter ramificationem primam foliorum ,*  
*squamæ nullæ ; at in T. flavo squamula utrimq.*  
*lacera .*

16. *lucidum* . T. caule folioso , fulcato : fol. linear. carnosis .  
*Syst. veg. ed. 14. Pluk. alm. tab. 65. f. 5. tab.*  
*1. &c. Clus. hist. 1. p. 234.*

*Habitat Parisiis , & in Hispania .*

*An satis distincta a T. flavo ? Folia crassa , &*  
*lucida .*

17. *Aquilegi-* T. fol. triplicato-pinnat. patulis , obtuse triloba-  
*folium .* tis ; stipulis ovatis : paniculis umbellatis .

T. fruct. pendulis , triangularibus , rectis : caule  
tereti . *Syst. veg. ed. 14. Jacq. Austr. 4. tab.*  
*318.*

*T. majus &c. Bauh. hist. 3. p. 487.*

*In Austria , Helvetia &c. sylvis alpinis 24 .*

Caul. 2-3-ped. Fol. ampla , glauca , segmento  
medio trilobo , lateralibus bilobis . Stipul. ma-  
gnæ . Petal. magna , purpur. vel lutea , aut  
exalbida , odora , 4 .

18. *atropurpu-* T. fruct. pendulis , triangularibus , rectis , caule  
*reum .* tereti , stricto , pluries ramoso , nebuloso . *Syst.*  
*veg. ed. 14. Jacq. hort. 5. tab. 61.*

*Habitat . . .*

*Differt a T. cornuto , cui cor. 5-petal. a T. purpu-*  
*rascente , cui caulis purpurasc. & stam. 14. Rad.*  
*aromatica . Caul. 3-ped. teretes , fistulosi , li-*  
*-neati , nitidi , ante efflorescentiam atro-purpur.*  
*ac rore glauco tecti ; dein atro-virid. Fol.*  
*tritermata : foliola Aquilegiæ min. non nitida ,*  
*supra atro-virid. subtus subglauca , reticulata .*  
*Stipul. subrotundæ , albidæ . Paniculæ fasti-*  
*giatæ , densæ . Petal. admodum concava , fo-*



ris atro--purpur. intus albida. Anth. flavescentes.

19. *contortum*. T. fruct. pendulis, triangularibus, contortis: caule subancipiti. *Syst. veg. ed. 14.*

*In Sibiria.*

*Simil. priori, sed humilior, fl. albis. Petal. 4. Stam. 60. Pist. 8. Foliol. parva, subrotunda, glauca, pleraq. simplicia, terna, 3-fid. obtusa. Racemus non amplius. Petal. Gaminibus breviora.*

20. *flamineum*. T. flaminum filamen. petaliformibus, lanceolatis. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*

*T. petaloideum. Syst. veg. ed. 13.*

*In Sibiria.*

Rad. fibrosa, nigra. Caul. ped. simplex, ramo sæpe unico, substriatus, basi violaceus. Fol. triternato-pinn. Radical. 2-3. Caulinum unicum. Pinnæ parvæ, ovat-oblongæ: extimæ certe 3-part. Panicula congesta, alba. Filamenta colorata.

21. *styloideum*. T. fol. tripartito-pinnat. stylis basi alatis. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*

*In Sibiria 24.*

838. ADONIS. Cal. 5-phyll. Petal. plura, raro 5. absque squama nectarifera. Sem. nuda, angulata, receptaculo oblongo adfixa. *Fol. multifida.*

1. *æstivalis*. A. fl. 5-petal. fructibus ovatis. *Syst. veg. ed. 14. Knorr. del. 2. tab. A. 12.*

*A. fl. pallido. Cam. epit. 648.*

*Inter Europæ segetes ☉.*

*Adfinis sequenti.* Caul. elatior quam in vernali. Fol. minus conferta, molliora. Cal. pallidus. Fl. rubri, lutei, vel ochroleuci, basi intus macula nigra, vel violacea.

2. *autumnalis*. A. fl. 8-petal. fructibus cylindric. *Syst. veg. ed. 14.*

*An A. miniata Jacq. Austr. 4. 354? Clus. hist. 1. p. 336.*

*Inter Europæ segetes ☉.*

Fol. alterna, sessil. lineari-multifida, hilare virid. Fl. atro-purpur. *Var. fl. citrino.*

3. *flammea*. A. fl. 8-petalis: calyc. hirsutis: fructibus cylindricis. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. austr. 4. tab. 355.*

*In arvis, & inter segetes collium calidiorum ☉.*

*Floret æstate. Habitus prioris, sed differt potiss.*

*mum hirsutie; petalis angustioribus, inæqualibus, flammeis, macula fere nulla.*

4. *vernalis*. A. fl. dodecapetalo: fructu ovato. *Syst. veg. ed. 14. Mill. ic. tab. 14. Black. tab. 504.*

*An A. apennina. Jacq. tab. 44?*

*Buphtalinum. Dod. pempt. 261.*

*In Germaniæ, Helvetiæ &c. collibus apricis 24.*

*Soror sequentis. Planta uniflora, ramis etiam sterilibus. Caul. ped. & ultra. Fol. multifida, caulem occultantia, laciniis pungentibus. Flos maior. Petal. lanceol. lineata, citrina, cum macula in ungue violac.*

5. *apennina*. A. fl. pentdecapetalis: fruct. ovato. *Syst. veg. ed. 14.*

*An A. apennina. Jacq. austr. tab. 44.*

*Helleborus &c. Mentz. pug. tab. 3. f. 1.*

*In Apenninis, Sibiria.*

*Simillima priori, ut difficillime distinguatur. Planta multiflora, ramis scilicet etiam floriferis. Caul. quartæ speciei, adpersus pilis: 5. punctis farinosis, pellucidis. Rami 4. ex caulis parte inferiore: sex alis superioribus. Pedunculus 4. breviss. 5. longior. Fol. in 4. minus pinnata: 5. magis divisa, latiora, nitidiora. Cal. in 4. griseus, striatus, villosus, concavus: 5. luteo-virescens, glaber, avenius, planus. Petal. in 4. lanceol. sæpe 12: in 5. ovata, imbricata, sæpius 15. Flos in 4. unicus; in 5. plures. Stam. in 5. valde reflexa. Planta 5. diutius æstate durat. 4. vero vernalis est.*

6. *capensis*. A. fl. decapetalis: fructibus depresso: fol. duplicato-ternat. foliol. cordatis, serratis. *Syst. veg. ed. 14.*

*Actæa &c. Buem. afric. tab. 51.*

*Ranunculus &c. Comm. hort. 1. tab. 1.*

*Imperatoria &c. Pluk. alm. tab. 95. f. 2.*

*Ad cap. b. Spei 24.*

*Fol. biternata, radical. Foliol. subcordata, serrata, rigida. Petioli hirti. Scapi ped. simplices, teretes, pilosi. Umbella composita. Involucra utraq. 6-phylla, lanceol. Pedunc. partiales 3. exterior. 3. interior. & unicus centralis 1-fl. reliqui 4-fl. Cal. albidus. Petal. lanceol. alba, calyce duplo longiora.*

7. *vesicatoria*. A. fl. decapetal. fol. biternat. foliol. ferratis, glabris. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*

*In Africa.*

*Fol. ab Afris pro vesicatoriis adhibentur.*

839. RANUNCULUS. Cal. 5--phyll. deciduus. Petal. sæpe 5; intra ungues poro mellifero. Sem. plurima, nuda, in capitul. congesta.

\* *Foliis simplicibus.*

1. *Flammula*. R. fol. ovato-lanceol. petiolat. caule declinato.

*Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 575.*

*Flammula Ranunculus. Dod. pempt. 432. b. 433.*

*In Europæ pascuis udis 24.*

Caul. pedal-cubit. ramosus. Fol. firma, integra, vel dentata. Pedunc. 1-fl. Cal. subhirsutus. Petala flava, nitida. *Var. caul. erecto: fol. denticulatis, & fl. minoribus.*

2. *reptans*. R. fol. linearibus: caule repente. *Syst. veg. ed.*

*14. Fl. Dan. tab. 108. Fl. Lapp. tab. 3. f. 5.*

*Amm. ruth. tab. 13. f. 1.*

*Ad ripas lacuum 24.*

*Forte var. prioris. Caul. 2-3-pollic. radicans.*

Fol. 1-2-unc. sæpe opposita, cis finem latiuscula. Petal. exigua, lutea, nitida.

3. *Lingua*. R. fol. lanceol. caule erecto. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 755.*

*R. lanceolatus &c. Tabern. ic. 48.*

*b. R. flammeus &c. Pluk. alm. 312.*

*In Europæ fossis &c.*

Caul. erectus, ramosus, foliosus, sæpe sesquiped. Fol. vaginant. sessilia, subdenticulata, scabra pilis brevibus, adpressis. Pedunc. oppositifolii, 1-fl. Flos magnus. Petal. rotunda, flava, nitida.

4. *nodiflorus*. R. fol. ovatis, petiolat. fl. sessilibus. *Syst. veg. ed. 14.*

*R. parisiensis &c. Vaill. aed. 1719. tab. 4. f. 4.*

*b. R. ficulus &c. Pet. gaz. tab. 24. f. 9.*

*Parisis, & in Siciliæ locis paludosis.*

Planta parva. Fol. Plantaginellæ. Fl. parvi, cauliculis adhærentes.

5. *gramineus*. R. fol. lanceol-linear. indivisis: caule erecto, læviss. paucifloro. *Syst. veg. ed. 14. Bauh. pin. tab. 81.*

*In Galliæ pratis nudis 24.*



*Differt a sequenti rad. tuberosa, & fl. luteis. Caul. teres, non striatus. Fol. subnervosa, seu striata. Fl. 1-2-3. lutei.*

6. *pyrenæus*. R. fol. gramineis, indivisis: caul. erecto, striato, subbifloro. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. miscel. tab. 18. f. 1.*

R. *pumilus* &c. *Bauh. hist. 3. p. 850.*

R. *plantagineus*. *All. Fl. Ped. tab. 76. f. 1.*

*In Pyrenæis &c. 24.*

Radix subbulbosa, obducta reticulo tomentoso; radiculis fasciculat. Caul. erectus, filiform. digitalis, lævis, fol. uno, alterove. Fol. pollic. integerr. lævia, erecta, lineis saturation. striata, in petiolum decurrentia. Flos terminal. 1-2. pro ratione plantæ magnus, pedunculat. Petal. integra, nivea. Stam. subrotunda, mucronata. Fructus subrotund.

7. *parnassifolius*. R. fol. subovatis, nervosis, lineatis, integerr. petiolat. fl. umbellatis. *Syst. veg. ed. 14.*

*In Europa australi, Helvetia, Italia &c.*

Radix fasciculata. Gemma radicalis promit fol. duo, lanceol. membranacea, supra terram eminentia. Fol. longius petiolat. obtusa, coriacea, supra pubescentia, in primis basi involuta. Caul. palm. simplex. Fol. caulinum solitarium, sicuti & rameum, amplexicaul. acutum. Involuc. terminale 2-phyll. Pedunc. 2-4. uniflori, pubescent. Cal. purpurasc. Cor. albidia, vel purpurascens, nervis purpur.

8. *amplexicaulis*. R. fol. ovatis, acuminat. amplexicaulibus: caule multifl. radice fasciculata. *Syst. veg. ed. 14.*

R. *montanus* &c. *Morif. hist. 3. f. 4. tab. 30. f. 36.*

R. *dulcis* &c. *Mentz. pug. tab. 8. f. 8.*

*In Apenninis, Helvetia &c. 24.*

Caul. erectus, dodrant. ramosus, brachiatus. Fol. ex radice, petiolat. cordiform. dura, integerr. glabra: summa angusta, linearia, acuta. Cal. albus, vel subpurpur. Petala subrotunda, lactea. *Var. magnitudine, & fol. angustiss.*

9. *bullatus*. R. fol. ovatis, ferratis: scapo 1-fl. *Syst. veg. ed. 14.*

R. *lusitanicus*. *Dod. pempt. 429.*

R. *grumosa radice 1. Clus. hist. 1. p. 233.*

*b. R. latifolius* &c. *Morif. hist.* 3. f. 4. tab. 3<sup>r</sup>.  
f. 49. 50. 51.

*In Lusitania, Creta* 24.

Rad. tuberosa pendula. Fol. bullata, ad terram strata, nitida, subtus lanuginosa. Scap. dodrant. Flos parvus. Petal. lutea.

10. *Ficaria*. *R. fol. cordatis, angulat. petiolat. caule 1-fl.*  
*Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 499. Ludw. ed. tab. 52.*

*Ficaria. Black. tab. 51.*

*Chelidonium minus. Fuchf. hist. 866.*

*Chelidonia minore. Matth.*

*In Europæ ruderatis, umbrosis* 24.

Rad. tuberosa fasciculata. Caul. pl. procumbent. palmar. subrubent. Fol. crenata, nitida, interdum macula fusca notata. Cal. cucullatus. Petal. plerumq. 8. elliptica, lutea, nitida.  
*Var. fl. pleno.*

11. *plantagini-folius*. *R. fol. cordato-ovat. apice vel integris, vel tridentatis. Syst. veg. ed. 14. Comm. Gott. 1777. tab. 2.*

*R. ruthenicus. Jacq. Hort. 3. tab. 31. Amm. ruth. tab. 13. f. 2.*

*Habitat in Ruthæno* 24.

Fol. plura, petiol. crassula, firma, utrimq. nitida. Stolones repentes, 2-ped. Scapi 1-2-3-fl. bracteati. Petal. sub 10. patentiss. obverse ovata, lutea. Fruct. magnus.

12. *Thora*. *R. fol. inferioribus subrotundo-reniform. crenatis; floralibus lanceolat. integerr. caule inferne nudo.*

*R. fol. reniformibus, subtrilobis, crenatis: caulino sessili: fl. lanceol. caule subbifl. Syst. veg. ed. 14. Jacq. Austr. 5. tab. 442. Obs. 1. tab. 13.*

*Prora valdensium. Lob. ic. 604. Clus. hist. 1. p. 239.*

*Aconito pardalianche falso. Matth.*

*In alpinis Italicis, Helveticis &c.* 24.

Tota planta nitida. Radix ut in priore. Caul. humilis, vix dodrant. 1-2-fol. 1-2-fl. Fol. dura, coriacea, nervosa, glauca. Cal. coloratus, reflexus. Petal. 5-6. parva, lutea, nitida, ad exortum maculata. Capitulum subrotund, ex paucis capsulis.

\*\* *Fol. dissectis, & divisis.*

13. *creticus*. R. fol. radicalibus reniform. crenatis, sublobatis: caulinis 3-part. sessilibus, lanceol. caule multifl. *Syst. veg. ed. 14. Clus. hist. 1. p. 239.*  
*In Creta*  $\mathcal{U}$ .  
 Radix tuberosa pendula. Petal. lutea.
14. *cassubicus*. R. fol. radicalibus subrotundo-cordat. crenatis: caulinis digitat. dentatis: caule multifl. *Syst. veg. ed. 14.*  
*In Cassubia, Sibiria, Gedani*  $\mathcal{U}$ .  
 Fol. maiora, crassiora, & rigidiora R. *Thoræ, Calthæ pal.* similia, dilutiora. Petal. lutea.
15. *auricomus*. R. fol. radicalibus reniform. crenatis, incis ( *dein trilobis* ): caulinis digitatis, linearibus. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 665.*  
 R. *rotundifolius* &c. *Bauh. hist. 3. p. 341.*  
 R. *1. sylvestris*. *Dalech. hist. 1028.*  
*In Europæ pascuis humidiusculis*  $\mathcal{U}$ .  
 Planta mitis, oleracea. Fol. radicale cordatum. Caul. ped. ramosus, 2-3-chotomus. Cal. per ætatem reflexus. Petal. ovata, obtusa, flava, nitida. *Fl. mense Frondescentiæ apetal. Florescentiæ 2-3-petal. Grossificationis 5-petal.*
16. *abortivus*. R. fol. radicalibus cordat. crenatis: caulinis ternatis, angulatis: caule sub 3-fl. *Syst. veg. ed. 14.*  
*In Virginia, Canada*  $\mathcal{U}$ .  
 Fol. radical. petiol. caulina sessilia. Petal. parva, lutea.
17. *sceleratus*. R. fol. inferioribus trilobis, lobis incis: summis laciniis angustis, integris: fruct. ovato.  
 R. fol. inferioribus palmatis: summis digitatis: fructibus oblongis. *Syst. veg. ed. 14. Gmel. Sib. 4. tab. 83. f. a. Fl. Dan. tab. 571.*  
*Ranunculo 1. Matth.*  
 R. *palustris*. *Black. tab. 259.*  
 R. *sylvestr. 1. Dod. pempt. 426.*  
*Ad Europæ fossas, & paludes*  $\odot$ .  
 Radix cava. Caul. erectus, cubital. ramosus, fungosus. Fol. pallide virent. quandoq. albo-maculata, nitida, inferiora longe petiol. Cal. reflexus. Petal. parva, luteo-pallescent.
18. *aconitifolius*. R. fol. omnibus quinatis, (lobis) lanceolat. incis-ferratis. *Syst. veg. ed. 14.*



*R. albus* &c. *Bauh. hist.* 3. p. 844.

*R. montanus* 4. *Clus. hist.* 1. p. 236.

*In alpibus Helveticis, Italicis* &c. 24.

*Similis sequenti, sed fol. 5-part. usque ad petiolum; & caulis dimidio brevior. Var. fl. minore.*

19. *platanifolius*. *R. fol. palmatis, lævibus, incis: caule erecto: bracteis linearibus. Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. III.*

*R. montanus* &c. *Dalech. hist.* 1031.

*R. albus* &c. *Tabern.* 43. *Loc. ic.* 668. *Bauh. hist.* 3. p. 843.

*In alpibus* 24.

*Statura prioris, fl. iridem albis; sed fol. non composita, verum palmata, magis incisa, minus crassa. Fl. ma.*

20. *illyricus*. *R. fol. ternatis, lanceolato--linear. integerr. Syst. veg. ed. 14. Jacq. austr. tab. 222.*

*R. grumosa radice, 4 Clus. hist.* 1. p. 240.

*In Italia, Austria* &c. 24.

*Planta incana. Rad. tuberosa fasciculata. Caul. ped. & ultra, lanuginosus. Fol. radical. prima prodeuntia integerr. summa simplic. binata. Cal. foliol. reflexis. Petal. ampla, lutea. Var. fl. col. & pleno.*

21. *pensylvanicus*. *R. fol. ternatis, trifidis, incis, subtus pilosis: caule erecto: calyc. reflexis. Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*

*In Pennsylvania* 24.

*Caul. erectus, 2-ped. ramosus, teres, pilis patulis. Fol. sublineata. Pedunc. vagi, teretes, læves. Petal. 5-6. lutea, vix. cal. magnitudine. Stam. parva. Germinum capitulum ovatum, cor. longius. Sem. ovata, mucronata, compressa, glabra, breviter rostrata.*

22. *ternatus*. *R. fol. omnibus ternatis; foliol. 3-fidis: caule multifl. calyc. reflexis. Syst. veg. ed. 14. Thumb. In Insula Nipon Japonix.*

23. *asiaticus*. *R. fol. ternatis, biternatisq. foliol. 3-fid. incis: caule inferne ramoso. Syst. veg. ed. 14. Mill. ic. 216. Clus. hist.* 1. p. 241.

*In Asia, & Mauritania* 24.

*Radix grumosa. Caul. erect. pubescens, teres, uti pedunc. Fol. infima simplic. acuta, lobata, incisa, subtus pubescent. Cal. non reflexus. Flos coronarius. Petal. col. varia. Omnes plantæ partes, excepta cor, hirsutæ.*

24. *rutæfolius*. R. fol. supradecompositis: caul. simpliciss. subunifol. unifl. radic. tuberosa. *Syst. veg. ed. 14. All. Fl. Ped. tab. 67. f. 1. Moris. hist. 3. f. 4. tab. 31. f. 54.*

*In alpibus* 24.

Caul. fol. multifidis. Fol. glauca; radicalia primum pinnata, pinnis petiolatis: pinnæ habent unum par pinnarum cum impari. Quolibet foliol. profunde 3-fid. segmentis inæqualiter 3--4--dentat. medio segmento profundius, & fere æqualiter 3--fido: pinna impar amplior est; postrema pinna solitaria. Cal. coloratus, per maturitatem reflexus. Petal. basi latefcent. subrotunda, lineata, alba, basi miniata, macula cordifor. notata; apice emarginata.

25. *glacialis*. R. calyc. hirsutis: caule (plerumque) 2-fl. fol. multifid. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 19. Fl. Lapp. tab. 3. f. 1.*

*R. montanus* &c. *Scheuch. alp. tab. 20. f. 1.*

*R. alpinus* &c. *Barr. ic. 456.*

*In alpibus* 24.

Radix constat bulbillo, napulis teretibus. Caul. semiped. ramosi, succulenti, lati. Fol. sublutea, subhirsuta. Petal. subpurpur. aut alba.

26. *nivalis*. R. calyc. hirsuto: caule 1-fl: fol. radicalibus palmat. caulinis multipart. sessilibus. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Lapp. tab. 3. f. 2. Jacq. austr. 4. tab. 325. 326. cum varietatibus -- Crantz. austr. tab. 4. f. 3.*

*R. minimus* &c. *Bauh. hist. 3. p. 861. f. interior.*

*b. R. idem pygmæus. Fl. Lapp. tab. 3. f. 3.*

*In alpibus* 24.

Planta plerumq. tota glaberr. Caul. palm-pedal. Fol. radicalia 5-loba, superne incisa. Petal. 5-8. subrotund. integerr. lineata, flava, subtus venulis obscurior. *Mire variat statura; caule aphylo; hirsutie* &c.

27. *alpestris*. R. fol. radicalibus subcordat. tripartit. lobis 3-lobat. caulino lanceol. (plerumq.) integerr. caule subunifloro. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. Austr. 2. tab. 110.*

*R. alpinus* &c. *Segu. ver. tab. 12. f. 1.*

*R. montani* 1. *spec. 1. 2. Clus. hist. 1. p. 234.*

*In alpibus* 24.

Caul. 1-pl. 2-3-unc. una cum petiolis inferne

rubentes, quandoq. aphylli. Fol. longe petiol. crassiuscula, nitida, similia fol. *R. aquatilis* natantibus. Cal. reflexus, glaber, apice flavicans. Petal. patentiss. obcordata, alba. *Var. fl. ma: & fl. ma. pleno.*

25. *lapponicus*. R. fol. tripartit. lobatis, obtusis: caule subnudo, 1-fl. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 144. 331. Fl. Lapp. tab. 3. f. 4.*

*In alpidibus Lapponicis.*

Fol. fere reniform. lobo intermedio minore, obsoleto trilobo; lateralibus cum pl. lobulis.

29. *monspeliacus*. R. fol. 3-partit. crenatis: caule simplici, villosulo, subnudo, 1-fl. *Syst. veg. ed. 14.*

*Habitat Monspeli.*

Flos magnus.

30. *bulbosus*. R. calyc. retroflexis: peduncul. fulcatis: caul. erecto, multisl. fol. compositis. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 1. Lob. ic. 166.*

*Ranunculo quinto. Matth.*

*In Europæ pratis, pascuis 24.*

Rad. bulbosa, rotunda. Caul. pedal. villosus. Fol. radical. 3-loba, lobo medio 3-loba, crenato; lateralibus semibifidis. Petal. rotunda, lutea, nitida. *Var. fl. pleno.*

31. *repens*. R. calyc. patulis: pedunc. fulcatis: stolonibus repentibus: fol. compositis. *Syst. veg. ed. 14. Black. tab. 31. Fl. Dan. tab. 995.*

*R. hortensis 1. Dod. pempt. 425.*

*b. R. dulcis &c. Tabern. 51.*

*y. R. rectus &c. Bauh. hist. 3. p. 417. Petiv. tab. 38.*

*In Europæ pratis subhumidis 24.*

*Videtur var. prioris.* Planta mitis. Rad. semper tuberis vestigia habet; ex quo fibræ teretes descendunt. Caul. pedal. alii prostrati, sive flagella foliosa, quæ radices agunt: alii erecti, aut decumbentes; ramosi, multisl. adspersi pilis raris. Fol. ternata, trifariam profunde incisa, plerumq. hirsuta, lobis petiolatis: lobi laterales 2-partiti; lobulo laterali minore iterum semipartito, sic anteriore maiore, omnibus acute dentatis: medio lobo aut petiolato, 3-loba; aut sessili: lobis etiam lateralibus 4-dentatis; medio iterum lobo 3-lobato, dentato. Fol. caulina petiolata, simplicia, 3-fida.



Cal. per ætatem reflexus. Petala ut in priore. Capitulum sphaericum. *Var. fl. pleno.*

32. *polyanthes*. R. calyc. patulis: peduncul. fulcatis: caul. erecto: fol. multipart. *Syst. veg. ed. 14. Lob. ic. 666.*

R. *sylvestris*. *Tabern. ic. 42.*

In *Europæ borealis graminosis* 24.

*Similis* R. *acris*, a quo differt statura duplo majore, fol. profunde dissectis, & magis glabris. Rami longe nudi, multifl.

33. *acris*. R. calyc. patulis: peduncul. teretibus: fol. 3-partito-multifid. summis linearibus. *Syst. veg. ed. 14. Knorr. del. 1. tab. H. 1.*

R. *Napellifolius*. *Crantz. Austr. tab. 4. f. 2. cum priore coniungit.*

R. *hortensis*. *Dod. pempt. 426.*

b. R. *hortensis* &c. *Knorr. del. 1. tab. H. 2. fl. pleno.*

In *Europæ pratis, pascuis* ☉.

*Planta variabilis*. Caul. erectus, 2-ped. quandoque inferne maculat. Fol. radicalia longe petiol. caulina breviter: summa sessilia; macula plerumque nigra notata. Cal. flavescent. Petal. subcordata, lutea, nitida. Folior. lobi sessiles. *Varietates huius esse R. auricomum, & nivalem suspicatur Haller.*

34. *lanuginosus*. R. calyc. patulis: peduncul. teretibus: caule, petiolisq. hirsutis: fol. 3-fid. lobatis, crenatis, holosericeis. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 397.*

R. *magnus*. *Bauh. hist. 3. p. 417.*

b. R. *nemorosus* &c. *Loef. pruss. tab. 71.*

In *Italia, Helvetia* &c. 24.

*Simil.* R. *repenti*. Planta valde hirsuta, mitis. Caul. erectus, pedalis-cubitus, ramosus. Fol. crassiuscula, sæpe pallida macula in divisione segmentorum notata; lobis lateralibus 2-part. medio trilobato; lobulo medio iterum 3-dent. summa palmata, & simplicia. Pedunc. longi, teretes. Flos magnus, flavus. Cal. coloratus, sæpe reflexus, laciniis marginatis. Cor. in origine petalor. viridi lineata. Sem. acuta, compressa.

35. *chærophyllus*. R. calyc. retroflexis: pedunc. fulcatis: caule villosa, 1-fl. fol. compositis, lineari-multifid.

*Syst. veg. ed. 14. Barr. ic. 581. Col. cephr. I. tab. 311.*

*In Gallia, Italia 24.*

*Radix tuberosa pendula.*

36. *parvulus*. *R. hirtus*; fol. 3-lob. incis: caule erecto, subunisfloro. *Syst. veg. ed. 14.*

*R. minimus &c. Col. cephr. tab. 316.*

*In Italia &c. ☉.*

*Caul. digital-femiped. filiform. Fol. pauca, hirta, petiol. dentata. Flos fere foliis maior. Cal. membranac. villosus. Petala lutea.*

37. *arvensis*. *R. femin. aculeatis*: fol. 3-part. lobis longe petiolat. bipartit. & tripart. acute incis:.

*R. femin. aculeatis*: fol. superioribus decompositis, linear. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 219.*

*R. sylv. 3. Dod. pempt. 427.*

*In Europæ agris ☉.*

*Planta acris. Caul. diffusus, pedalis, ramosus, foliosus, multifi. Fol. radical. longe petiol. caulina tenuius divisa. Petal. parva, pallida.*

38. *muricatus*. *R. femin. aculeatis*: fol. simplic. lobatis, obtusis, glabris: caule diffuso. *Syst. veg. ed. 14.*

*R. creticus &c. Alp. exot. tab. 262.*

*In Europæ fossis, & humentibus ☉.*

*Caul. palm. & ultra valde ramosus. Petal. lutea.*

39. *parvisflorus*. *R. femin. muricatis*: fol. simplic, laciniat. acutis, hirtis: caule diffuso. *Syst. veg. ed. 14.*

*R. hirsutus &c. Pluk. alm. tab. 55. f. 1. Raii: angl. 3. tab. 12. f. 1. Moris. hist. 3. f. 4. tab. 28. f. 21.*

*In Europa australi ☉.*

*Fol. Geranii columbini. Petal. lutea. Dissert a priore, fl. parvo: caule magis prostrato: fol. profunde lacinulatis: seminibus latere tantum tuberculis, nec aculeis muricatis.*

40. *orientalis*. *R. femin. spinoso-subulatis, recurvis*: calyc. retroflexis: fol. multifid. *Syst. veg. ed. 14.*

*In Oriente.*

41. *grandiflorus*. *R. caul. erecto, bifolio; fol. multifidis; caulinis alternis, sessilibus.* *Syst. veg. ed. 14.*

*In Oriente h.*

*Folia Aconiti. Flos grandis.*

42. *falcatus*. *R. fol. filiformi-ramosis: femin. falcatis: scapo nudo, 1-fl.* *Syst. veg. ed. 14. Jacq. austr. I. tab. 48.*

*R. cera-*

*R. ceratocephalus* &c. *Morif. hist.* 3. f. 4. tab. 28. f. 22.

*R. alopecuroides* &c. *Bocc. Sic. tab.* 14. f. 3.

*Inter segetes Europæ, & Orientis* ☉.

Planta 1-4-unc. subincana, & subhirsutula. Prima duo fol. lanceol. & integerr. cætera multifida. Scapi plerumq. pl. Fol. longe petiol. Cal. lanuginosus. Petal. ovato-oblong. lutea. Sem. leviter uncinata, basi testiculata.

43. *hederaceus*. *R.* fol. subrotund. trilobis, integerr. caule repente. *Syst. veg. ed.* 14. *Fl. Dan. tab.* 321.

*R. aquaticus* &c. *Morif. hist.* 3. f. 4. tab. 29. f. 29.

*In aquis vadosis Angliæ &c.*

*Pro loco natali larvam alienam induit, cum longe diversus in paludibus.* Caul. geniculat. glaber, vel hirsutus. Fol. virid. utrimq. nitida, glabra, venosa; lobi laterales divisi, medius in apice solum crenatus. Petal. dilute lutea. Capitula rotundo-compressa.

44. *aquatilis*. *R.* fol. submersis capillaceis; emerfis peltatis. *Syst. veg. ed.* 14. *Dod. pempt.* 387-*Pluk. phyt. tab.* 55. f. 2.

b. *R. aquaticus* &c. *Pluk. alm. tab.* 52. f. 2.

y. *R. tricophyllos* &c. *Col. ceph.* 1. tab. 316.

*In aquis undosis, fossis, rivulis* &c.

Caul. 2-cubit. oblique per aquam serpentes, ramis alternis. Fol. alterna, vagina alba caulem amplexente. Pedunc. 1-fl. Cal. reflexus, coloratus. Petal. alba, unguibus luteis.

*Breyneus*. *R. alpinus*, receptaculo lanuginoso. *Crantz. Stirp. austr. tab.* 4. f. 2.

*In alpidibus Austria, & Augustæ Pretoriæ* &c.

Habitus hirsutus: inter alpinos, post alpestem, fere minimus. Ex summo capite plura, quam cæteri *R. alpini*, fol. promit e viridi nigricant. subtus maxime hirsuta, profunde 3-parr. Pedunc. atropurpur. hirsuti. Caul. raro erectus, hirsutus, subnudus. Flos ut in cæteris. Cal. hirsutus. Fructus capitatus.

*pyrenæus Gouan.* *R.* fol. radicalibus orbiculato-reniform. 3-5-lobis: caulino palmato sessili. *Gouan. Illuf. tab.* 17. f. 1. 2.

*Differt a R. nivali.* Radix grumosa. Fol. radi-



calia 4-5. Petioli hirsutie cani, vaginis amplexicaul. hirsutiss. Caul. unicus, subpalm. 1-raro 2-fol. 1-fl. hirsutus. Cal. hirtus, coloratus. Petal. aurea.

*multifidus*. R. fol. multifidis; inferioribus pinnato-multifid. caule multifi. calyc. cor. æquante. *Forsk. Æg. In Ægypto*.

Caul. erectus, 2-pedal. subtus teres, superne striatus, pilosus. Fruct. ovalis. Sem. ovali-acuta.

*polymorphus*. R. *All. Fl. Ped. tab. 82. f. 2.*

*In Monteferrato 24.*

Fol. radical subrotunda, *Thora* similia, longissime petiolata, magnis dentibus incisa: caulina sessilia, digitata, foliol. integerr. Fruct. *Ranunculi*.

*Columnæ*. R. *All. Fl. Ped. tab. 67. f. 3. 4.*

R. *alpinus*, *Apil &c. Segu. ver. 1. tab. 12. f. 2. 3.*

*In montibus 24.*

Rad. ex longis fibris in unum caput collectis. Fol. radicalia aliquot, ad imum caulem vaginant. oris vaginæ convolutis, petiolo sulcato, semitereti, 2--unc. Fol. rotunda sunt, atrovirent. glabra, nitida, succulenta, ad petiolum usque 5-fida, laciniis duabus inferioribus minoribus: petiolum parziale explanatur in folium bis 3-fid. foliola ovata, aut elliptica cum acumine; foliol. lateralialia aut foliolo, aut lobo aucta esse solent. Caul. brevis, inferne fusco-livens. Pedunc. in ramis terminales, pilosi. Cal. foliol. concavis, ovatis, acutis, margine albo. Flos amplus, lacerus. Petal. ex triangulo--cordata, magna, alba, margine leviter crenulato. Anth. albæ. Fol. modo parcius, modo profundius divisa. *Planta caustica*.

*peucedanifolius*. R. caule fluitante: fol. capillaceis, longiss. laciniis paralellis: petiolis 1--fl. *Hall. helv. n. 1161. All. Fl. Pedem.*

Ranuncolo, seu Polyanthemo &c. *Bauh. hist. 3. p. 782.*

*In aquis lente fluentibus 24.*

Flos albus, ungue flavo, fovea insigni. *Planta acris*.

840. TROL- Habitus, & fructus *Ranunculi*, sed Cal. o. Pet-  
LIUS. tala circiter 14. Nectar. plura, plana, basi  
perforata. Caps. plurimæ, ovatæ, polysperma.

1. *europæus*. T. cor. conniventibus: nectariis longitudine stam.  
*Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 133. Knorr. del.*  
2. tab. 4.

*Ranunculus flore &c. Dod. pempt. 430.*

*In alpibus Italix &c. 24.*

Caul. erectus, pedal. sæpe simpl. 1-multifl. Fol.  
rotunda, 5-fid. segmentis lobatis, lobis acu-  
tis, incis: radicalia petiol. caulina amplexi-  
caul. Flos globosus, elegans, dilute luteus,  
odorus.

2. *asiaticus*. T. cor. patula: nectariis stamine longioribus.  
*Syst. veg. ed. 14. Buxb. cent. 1. tab. 22.*

*In Sibiria, Cappadocia 24.*

*Differt a priore, nectar. fulvis stamine longioribus;  
cor. hiantibus, sature luteis. Germina, seu pi-  
stil. extrorsum flexa, quasi incumbentia.*

841. ISOPY- Cal. o. Petal. 5. Nectar. 3-fida, tubulata. Caps.  
RUM. recurvæ, polyspermæ.

1. *fumarioides*. I. stipulis subulatis: petalis acutis. *Syst. veg. ed.*  
14.

*Helleborus fumariæ &c. Amm. ruth. tab. 12.*

*In nemoribus Sibiricæ ☉.*

Planta parva, odore *Hellebori*. Caul. 3--4-pol-  
lic-2 palm. circa genicula cœrulesc. Fol. *Fu-  
maricæ* similia, glauca. Flos parvus, evanidus,  
extus e luteo-virid. intus luteus. Caps. stelli-  
form. Sem. ovata, nigra.

2. *thaliæroides*. I. stipulis ovatis: petalis obtusis. *Syst. veg. ed.*  
14. *Jacq. austr. 2. tab. 105.*

*Thalictrum &c. Bocc. mus. tab. 79. f. 1.*

*Ranunculus &c. Moris. hist. 3. f. 4. tab. 28. f.*  
12.

*Ranunc. præcox II. &c. Clus. hist. I. p. 233.*

*In alpibus Italicis &c.*

Radix conica, fasciculata. Caul. spitham. ramo-  
sus, inferne aphyll. superne fol. uno, vel al-  
tero, ternato, vel lobato. Pedunc. nudus,  
1-fl. Petal. 5-6. primum alba, dein purpura-  
scent.

3. *Aquilegioides*. I. stipulis obsoletis. *Syst. veg. ed. 14.*

*Aquilegia &c. Moris. hist. 3. f. 12. tab. 11. f. 5.*

*In alpibus Italicis, Helveticis &c.*

- Caulicul. tenuis, vix palmar. Fol. *Aquilegiæ*, parva, pallide virentia. Flos solitar. cœrul.
842. HELLEBORUS. Cal. o. Petal. 5-plura. Nectar. plura, bilabia-  
ta, tubulata. Caps. pl. polyspermæ, erectiusculæ, distinctæ.
1. *hyemalis*. H. fl. folio insidente. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. austr. 3. tab. 202. Black. tab. 576.*  
H. *ranunculoides* &c. *Morif. hist. 3. f. 12. tab. 2. f. 4.*  
Aconitum &c. *Dod. pempt. 352. Cam. epit. 828. Garid. Aix. tab. 3.*  
In Italia, Apenninis &c. 24.  
Scapus simpl. vix pollic. monophyllus. Flos unicus, terminal. erectus, sessilis, luteus, caducus. Fol. radicale subrotund. sub 5-part. Bract. involucriformis, fl. superans.
2. *niger*. H. scapo subbifloro, subnudo: fol. pedatis. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. austr. 3. tab. 201. Black. tab. 506. 507. Knorr. del. 1. tab. N. 6. Hill. anat. tab. 1. Clus. hist. 1. p. 275.*  
Elleboro nero. *Matth.*  
In Italia, Austria &c. 24.  
Fol. consistentia, hyeme perennantia, omnia radicalia, coriacea, pedata, laciniis crassis, obtusis, subcrenatis, septenis. Scapus rudimento unius folii, aphyll. 2-fid. ramis aphyllis, bifloris. Bract. binæ, subovatae, concavae. Fl. ampli, primum albi, dein rosei, tandem subviridi.
3. *viridis*. H. caul. 2-fido: ramis foliosis, bifloris: fol. digitat. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. austr. 2. tab. 106. Black. tab. 509. 510. Knorr. del. 1. tab. N. 5.*  
Elleborum nigrum &c. *Cam. epit. 941.*  
Elleboro nero 2 *Matth.*  
In montium locis umbrosis 24.  
Scapus ped. obscura purpura tinctus. Fol. radicalia, lacin. angustis, acuminat. ferratis, asperis, nigricant. Nectar. brevia. Pedunc. subangulati. Fl. nutantes, virides, dein fusci.  
*Var. fol. maculis sanguineis adspersis.*
4. *fetidus*. H. caule multisl. folioso: fol. pedatis. *Syst. veg. ed. 14. Black. tab. 57. Garid. Aix. tab. 48.*  
Helleboraster &c. *Lob. ic. 679.*



*H. femina*. Sterb. fung. tab. 36. f. C.

*In Italia, Helvetia* ♂ ♀.

Tota planta foetet. Caul. cubital. umbellifer. Fol. omnia caulina, trilobata, lobis lateralibus ad petiolos 4-fidis, angustis, dentatis, venosis, e viridi-nigricant. nitidis. Petal. subvirid. margine subrubro.

5. *trifolius*. *H.* scapo unifloro: fol. ternatis. *Syst. veg. ed.* 14. *Am. acad.* 2. tab. 4. f. 18. *Fl. Dan.* tab. 566.

*In Canadæ, Sibiria sylvis.*

Planta parva relate ad congeneres. Radix repens. Scapus petiolis duplo longior. Foliol. sessilia, obverse ovata, extrorsum magis gibba, argute serrata, rigidiuscula, venosa. Bractea subovata. Nectaria petalis sæpe plura, lutea. Flos minutus, *Parnassia* similis, albus, magnitudine *Trientalis*.

843. CAL-  
THA. Cal. o. Petala 5. patentia, decidua. Nectaria o. Caps. pl. bicarinatæ, polyspermæ.

1. *palustris*. *C.* *Syst. veg. ed.* 14. *Fl. Dan.* tab. 668. *Knorr.* del. 1. tab. H. 2.

*Populago maior. & minor. Tabern. ic.* 750. *fl. pleno* 751.

*In Europæ humidiusculis, montanis* ♀.

Caul. pl. pedal. ad basin purpur. Fol. crenata; inferiora longe petiol. orbiculata; superiora breviter petiol. subreniform. Fl. grandes, solitar. peduncul. stipulæ fuscae, membranac. marcescentes. Petal. subrotundo-ovata, lutea, nitida.

844. HOUTUYNIA. Cal. 4-phyll. Cor. o. Stam. mixta pistillis.

1. *cordata*. *H.* *Syst. veg. ed.* 14. *Thumb. Jap. tab.* 26.

*In Japonia* ☉.

Caul. herbaceus, palm-spitham-pedal. erectus, simpl. flexuosus, glaber. Fol. alterna, petiol. cordata, cuspidata, integerr. subtus pallidiora. Petioli basi stipulati. Stipul. apice membranac. Fl. e vagina petioli, solitar. pedunculati.

845. HYDRAS-  
TIS. Cal. o. Petal. 3. Nectar. o. Bacca composita acinis 1-sperm.

1. *canadensis*. *H.* *Syst. veg. ed.* 14.

## POLYANDRIA POLYGYNIA.

Warnera. Mill. ic. tab. 285.

In Canada aquis 24.

Simil. Hydrophyll. Fol. bina, petiol. basi emarginata, palmata, ferrata; lobis utrimq. lobulo laterali. Petal. ovata.

## NOVA GENERA.

## MONOGYNIA.

## MÆRUA.

**Cal.** **P** Friant. 1--phyll. 4--fid. glabrum, tubo urceolato-4-gono; limbi lacin. reflexis, subciliatis.

**Cor.** nulla. Nectar. setis numerosis, viridibus, compressis, apici tubi calycis insertis, apice lacin. conniventibus; tegentibus pedicellum; elevans fructificationem.

Receptaculum elevatum columna tetraedra viridi, filamentis crassiore, e fundo tubi calycis surgenti, nectario connivente oblecta; apice filamenta, & germen pedicellatum gerente.

**Stam.** Filam. sub 30. subulata, patentia, alba, calyce longiora. Anth. incumbentes, didymæ, oblongæ, flavæ.

**Pistil.** Germ. elevatum ex receptaculo, pedicello filiformi, illo brevius, & crassius, cylindricum, glabrum, viride. Styl. o. Stigm. verrucifor. obtusum.

**Peric.** pedicellatum, diametro semipollic.

1.

M. Forsk. Æg.

In Arabia ß.

Arbor ramis paniculatis, glabris. Fol. alterna, breviter petiol. semipollic. ovalia, cuneato-ovalia, retusa, succulenta, vix concava. Pedunc. terminal. solitarii, 1-fl. Cal. flavicans.

## A P E I B A .

*Cal.* Periant. 1--phyll. lacin. oblong. acutis, marginibus crassis, extus pilosis, rufescentibus: intus luteis, deciduis.

*Cor.* Petal. 5. subrotunda, undata, fimbriata, unguiculata, receptaculo germinis infra stam. inserta.

*Stam.* Filam. plurima, brevia, crassa. Anth. oblong-linear. lateri filamentor. adnatæ, apice subfoliaceo, subhirsutæ.

*Pistil.* Germ. subrotund. compressum, villosum. Styl. longus, striatus, sensim crassescens, leviter incurvus. Stigm. patens, perforatum, 10-dentat.

*Peric.* Caps. orbiculata, depressa, coriacea, 10-locul. echinata.

*Sem.* numerosa, minuta, placentæ carnosæ adfixa.

1. *Tibourbou*. A. fol. cordat. ovat-oblongis, acutis, ferrulatis, subtus hirsutis, rufescentibus: fructu magno, rotundo, compresso, hispido. *Aubl. Guian. tab. 213.*

*Sloanea dentata* Loef. p. 400. n. 312. *Marcgr. Bras. tab. 123.*

In Caienna, & Guiana h.

Non est *S. dentata* Lin. monente Vahl. Arb. 8-ped. superne ramosa, ramis late dispersis, ramusculis villosis. Fol. alterna, breviter petiol. Stipulæ binæ, oppositæ. Racemi oppositifol. bracteati. Racemi, & pedunc. pilis rufescent. præditi.

2. *glabra*. A. fl. virescentibus: fructu aspero. *Aubl. Guian. tab. 214.*

In Caribæis h.

Arb. 12-ped. superne ramosa. Fol. breviter petiol. ovat-acum. integerr. utrimq. viridia, glabra. Stipulæ binæ, breves. Racemi oppositifol. Petal. ovata, integerr. subvirid. Caps. orbicular. depressa, coriacea, 8-10-ocular.

3. *Petoumo*. A. fol. ovatis, subtus incanis: fl. racemosis, luteis *Aubl. Guian. tab. 215.*

In Caribæis h.

Arb. 40-ped. superne ramosa. Fol. alterna, pe-



tiolat. subcordata, acuta, integerr. superne glabra, viridia, subtus incana, nervis rufescentibus. Stipul. binæ, oppositæ. Racemi oppositifol. Cor. flava. Caps. orbicul. depressa, coriacea, setis villosis.

4. *aspera*.

A. fructu rotundo, compresso, leviter echinato. *Aubl. Guian. tab. 216.*

*In Caribæis h.*

Arb. 30--40-ped. superne ramosa. Fol. petiol. ovata, subcordata, integerr. glabra. Stipulæ binæ, oppositæ. Racemi terminal. & oppositifol. Cor. 4-5-petal. lutea. Caps. coriacea, depressa, articulata, echinata, 8-10-striata.

### B A N A R A .

*Cal.* Perian. 1-phyll. 6--part. persistens, lacin. subrotund.

*Cor.* Petal. 6. subrotun. concava, calyce triplo maiora, infra discum inserta.

*Stam.* Filam. 15. & ultra, longitudine petalor. Anth. subrotun. emarginatæ, 2-locul.

*Pistil.* Germ. orbiculatum, disco insidens. Styl. longitudine stam. Stigm. capitatum.

*Peric.* Bacca globosa, vix succulenta, stylo non deciduo terminata, 1-locul.

*Sem.* plurima, minima, angulata, striata.

*Guianensis*.

B. *Aubl. Guian. tab. 217.*

*In Caienna h.*

Arb. 10-ped. ramosa. Fol. alterna, breviter petiol. ovat-oblonga, acuta, denticulata, superne virid. subtus pallide virent. subtoment. stipul. exiguæ. Fl. axill. & terminal. racemosi. Cor. flava. Bacca, & Sem. nigra.

### T O U N A T E A .

*Cal.* Perian. turbinat. persistens; limbus 4-part. lacin. oblong. acutis, incurvis.

*Cor.*

*Stam.* Filam. plurima, longa, unilateral. receptaculo germinis inserta. Anth. oblon. 2-locul.

*Pistil.* Germ. ovatum. Styl. brevis, incurvus. Stigm. obtusum.

*Peric.* Caps. ovata, utroq. latere sulcata, 2-valv. 1-locul.

*Sem.* unicum, ovatum glabrum, basi caliptra alba obvolutum.

1. *Guianensis*. T. *Aubl. Guian. tab.* 218.

*In Caribæis* h.

Arb. 25-30-ped. superne ramosa. Fol. alterna, impari-pinn. Foliol. subopposita, sessil. costa alata, ovata, acuta, integerr. glabra, imparima. Fl. supra ramos, & ramulos spicati. Cal. albicans. Caps. lutea.

### S O R A M I A.

*Cal.* Perian. 1--phyll. 5--part. lacin. ovatis, concavis, coloratis.

*Cor.* 5-petal. Pet. subrotund. unguibus receptaculo pistilli inserta.

*Stam.* Filam. plurima (160), ad apicem latiora, receptaculo inserta. Anth. compressæ, 2-locul.

*Pistil.* Germ. orbiculat. Styl. longus, incurvus. Stigm. capitatum.

*Peric.* Bacca ovata, 1-locul.

*Sem.* unicum, ovatum, membrana alba, crassa, viscosa obvolutum.

1. *Guianensis*. S. *Aubl. Guian. tab.* 219.

*In Guiana* h.

Frutex sarmentosus, ramis scandentibus; ramulis declinatis. Fol. alterna, petiolat. ovata, basi angustiora, integerr. glabra. Fl. corymbosi, longe peduncul. axillar. aut supra tubercula in ramis, & ramulis sparsi. Cal. supra purpur. Cor. alba. Bacca carnosa, rubra, acida.

### N O R A N T E A.

*Cal.* Perian. 5--6--7-phyll. lacin. coriaceis, subrotund. acutis. Bractea utriculata, petiolata, e basi calyc. adfurgens.

*Cor.* Petal. 5. ovata, acuta, unguibus receptaculi pistil. inserta.

*Stam.* Filam. plurima (40-50), brevica, receptaculo inserta. Anth. oblon. 2-locul.

*Pistil.* Germ. subrotun. Styl. brevis. Stigm. subrotun.

*Peric.* 1-locul. . . .

*Sem.* plurima.

1. *Guianensis*. N. Aubl. *Guian. tab.* 220.

*In Caribais* h.

Arb. altissima, 80-ped. & ultra, ramis rectis. Fol. alterna, breviter petiol. ovata, acumin. crassa, integerr. leviter emarginata. Fl. longe spicati, spica incurva, sessiles. Bract. calycina, carnosae, utricularis, coccinea. Cal. margine rubente. Cor. violac.

### C A L I N E A.

*Cal.* Perian. 1-phyll. 3-part. lacin. subrotundis, concavis. Bract. binæ ad basin calycis.

*Cor.* Petal. 3. subrotunda, denticulata, receptaculo stam. & pistil. inserta.

*Stam.* Filam. plurima, infra pistil. inserta. Anth. ovata, lateri filament. adnatæ.

*Pistil.* Germ. subrotund. Styl. longus, incurvus. Stigm. conicum, concavum.

*Peric.* . . . 2 locul.

*Sem.* solitaria.

1. *scandens*. C. Aubl. *Guian. tab.* 221.

*In Guiana* h.

Frutex. Caul. pl. sarmentosi, ramosi, nodosi, supra arbores sparsi. Fol. alterna, petiol. ovata, acuta, integerr. rigida, glabra. Fl. cespitosi, axillar. & supra ramos sparsi. Bract. binæ ad basin singuli pedunc.

### M A H U R E A.

*Cal.* Perian. 1-phyll. 5-part. lacin. 2. ma. subrotund. acutis.

*Cor.* Petal. 5. tria min. erecta; 2. maiora declinata, & remota; ovata, acuta, coccinea, receptaculo stam. & pistil. inserta.

*Stam.* Filam. plurima (170). Anth. oblon. 4-gon. 2-locul.

*Pistil.* Germ. oblon. ovatum. Styl. incurvus. Stigm. obtusum, 3-gonum.

*Peric.* Caps. ovata, 3-locul. 3-valv. valvulis acutis, introrsum dehiscentibus.



*Sem.* plurima, oblonga, receptaculo triangulari adfixa.

1. *palustris*. *M. Aubl. Guian. tab. 222.*

*In Caienna, & Guiana h.*

*Arb.* 15--ped. superne ramosa, ramis erectis. *Folia* alterna, petiol. integerr. glabra. *Stipul.* binæ, parvæ. *Fl.* in spica terminali vel solitar. vel bini, vel ternatim dispositi, pedunculati. *Color* spicæ, & fl. purpur. *Capsl.* ovata, cum stylo. *Sem.* nigra, membrana flava obvoluta.

## C A R A I P A.

*Cal.* Periant. 1-phyll. 5-part. lacin. subrotund. villosis.

*Cor.* . . . . .

*Stam.* Filam. plurima, receptaculo pistilli inserta. *Anth.* subrotund. 2-locul.

*Pistil.* . . . . .

*Peric.* *Capsl.* subrotunda, subtrigona, apice acuto, incurvo, 3-locul. 3-valv.

*Sem.* solitar. angulata, extus convexa.

1. *parvifolia*. *C.* fol. ovatis, acutis, subtus tomentosis, candidantibus. *Aubl. Guian. tab. 223. f. 1.*

*In Guiana h.*

*Arb.* 20-ped. ramosiss. ramulis rubicundis. *Fol.* alterna, petiol. integerr. *Stipul.* breves, oppositæ. *Fl.* terminal. racemosi. *Capsl.* cinerea, villosa, in acumen incurvum desinens. *Lignum* durum.

2. *longifolia*. *C.* fol. ovato-oblong. acutis, subtus incanis. *Aubl. Guian. tab. 223. f. 2.*

*In Guiana h.*

3. *latifolia*. *C.* fol. latis, ovatis, acuminat. subtus cinereis. *Aubl. Guian. tab. 224. f. 3.*

*In Guiana h.*

4. *angustifolia*. *C.* fol. longis, ovatis, acuminat. subtus candidantibus. *Aubl. Guian. tab. 224. f. 4.*

*In Guiana h.*

## H O U M I R I.

*Cal.* Periant. 1-phyll. 5-dent. denticul. acutis.

*Cor.* Petal. 5. oblong. acuta, receptaculo pistil. inserta.

*Stam.* Filam. 20. receptaculo inserta. Anth. subrotund. 2-locul.

*Pistil.* Germ. minimum, subrotund. Styl. longus, incurvus, villosus. Stigm. capitatum, 5-radiat.

*Peric.* immaturum, transverse sectum, 5-locul.

*Sem.* unicum.

*I. balsamifera.* H. Aubl. Guian. tab. 225.

In Caienna, & Guiana h.

Arb. 50-60-ped. superne ramosiss. ramis longis, late sparsis. Fol. alterna, semiamplexicaul. ovat-oblon. acuta, integerr. glabra. Fol. erumpentia utrimq. superne convoluta, rubra. Fl. axillar. & terminal. corymbosi. Petal. alba. Corticis trunci succus resinofus, odore Styracis.

## CIPONIMA.

*Cal.* Perian. 1-phyll. turbinat. 5-dent. villosum, pedunc. brevi.

*Cor.* monopet. tubulosa, limbo expanso, 5-part. lacin. oblong. concavis.

*Stam.* Filam. 30. & ultra, fauci cor. inserta, basi connata, in duos ordines disposita. Anth. subrotund. 2-locul.

*Pistil.* Germ. minimum, ovatum. Styl. longus, villosus. Stigm. capitatum, obtusum.

*Peric.* Bacca ovata, 1-locul.

*Sem.* Nucleus lignosus, 4-locul. singulis loculis 1-sperm.

*I. Guianensis.* C. Aubl. Guian. tab. 226.

In Guiana h.

Arb. 7-ped. ramis pl. ramulosis, col. roseo. Fol. alterna, petiol. ovata, oblong. acumin. integerr. glabra. Fl. axill. subsessil. corymbosi. Cal. villo roseo. Cor. alba, margine luteo. Bacca nigra.

## VANTANA.

*Cal.* Periant. concavum, 5-dent. denticul. subrotund. acutis.

*Cor.* Petal. 5. longa, angusta, apice recurva, nectar. cyathifor. inserta.

*Stam.* Filam. numerosa, capillaria, cor. longiora. Anth. parvæ, subrotund. 2-locul.

# POLYANDRIA MONOGYNIA: 381

*Pistil.* Germ. subrotun. disco circumdatum. Styl. longus, filiform. Stigm. obtusum.

*Peric.* Fruct. immaturus, transversim sectus 5-locul. adparuit.

*Sem.* unicum in quolibet loculo.

1. *Guianensis*. V. *Aubl. Guian. tab. 229.*

*In Caribæis* h.

Arb. 20-ped. valde ramosa, ramis sparsis. Fol. alterna, petiol. ovata, acuminata, integerr. glabra. Fl. terminal. numerosi, corymbosi, coccinei.

## SINGANA.

*Cal.* Periant. 3-5-phyll. lacin. subrotun. acutis, concavis.

*Cor.* Petal. 3-5. subrotun. denticul. ungue brevi, angusto, inserta receptaculo.

*Stam.* Filam. plurima, receptaculo germinis inserta. Anth. subrotun. 2-locul.

*Pistil.* Germ. ovatum. Stylus longus, apice incurvus. Stigm. capitatum, concavum.

*Peric.* Caps. longa, cylindrica, fragilis, 1-locul.

*Sem.* plurima, magna, angulata, pulpa alba, dulci involuta; sibi mutuo incumbentia.

1. *Guianensis*. S. *Aubl. Guian. tab. 230.*

*In Caribæis* h.

Frutex sarmentis longiss. nodosis, supra arbores scandentibus, & sparsis. Fol. opposita, petiol. ovata, acuta, integerr. glabra. Fl. sparsi, & axillar. remoti, corymbosi. Cor. alba. Fructus subcinereus.

## PARALEA.

*Cal.* Periant. 1-phyll. 4-dent. denticul. acutis.

*Cor.* 1-petal. carnosae, tubo brevi, 4-gono; limbo 4-part. lacin. acutis.

*Stam.* Filam. plurima (18), intra tubum cor. & ipsius fundo inserta. Anth. minimæ, subrotun.

*Pistil.* Germ. o. sed ipsius loco corpusculum villosum, rufum.

*Peric.* & *Sem.* desiderantur.

1. *Guianensis*. P. *Aubl. Guian. tab. 231.*

*In Caribæis* h.



## POLYANDRIA MONOGYNIA.

Arb. altiss. superne ramosa, ramis numerosis, sparsis. Fol. alterna, breviter petiol. ovato-oblong. acuta, integerr. glabra, ad oras tomentosa. Fl. plurimi, axillar. distincti, fasciculati, squamis villosis, rufescentibus. Cal. pilosus, rufescens. Cor. carnea, fulva, odora.

## DIGYNIA.

## MOURERA.

**P** Cal. Erian. o.

Cor. o.

Stam. Filam. plurima (40), disco aculeato intra pistil. inserta. Anth. oblong. acutæ, sagittatæ, 2-locul. nutantes.

Pistil. Germ. subrotund. striatum. Styli duo, oppositi, incurvi. Stigm. obtusa.

Peric. Caps. membranac. ovata, striata, 1-locul. 2-valv.

Sem. plurima, minutiss. receptaculo libero adfixa.

1. *fluvialis*. M. Aubl. Guian. tab. 233.

In Caribæis.

Caul. simplices, asperi. Fol. alterna, lobis multipart. in lobulos undulatos, crispisque, superne, & inferne atroviorent. & ad angulos nervorum aculeo carnofo, rigido. Fl. terminal. spicati: pars inferior. caulis cylindrica; superior florens ex uno latere convexa, & altero concava. Fl. solitar. pedunculati: singulus flos ante expansionem foliol. 3. involvitur. Filam. violac. Anth. luteæ.

## ABLANIA.

Cal. 1-phyll. 4-5-part. persistens, lacin. ovatis, acutis.

Cor.

Stam. Filam. numerosa, receptac. germinis inserta. Anth. minutæ, subrotund. 2-locul.

*Pistil.* Germ. ovatum, villosum. Styli 2, longi, apice 2-fid. Stigm. obrusa.

*Peric.* Caps. ovata, pilosa, pilis longis, rigidis, rufescentibus, deciduis, 1-locul. 4-valv.

*Sem.* numerosa, parva, receptaculo longo, libero adfixa, membrana viscosa, rubra obvoluta.

1. *Guianensis*. A. Aubl. *Guian. tab.* 234.

In *Caribæis* h.

Arb. 40-50-ped. superne ramosa, ramis late sparsis. Fol. alterna, petiol. ovato-obl. acuta, integerr. undulata, rigida, glabra. Fl. axillar. corymbosi.

## TRIGYNIA.

### ENOUREA.

*Cal.* **P**eriant. 1-phyll. 4-part. lacin. 2. ma.

*Cor.* Petal. 4. duo ampliora, subrotund. calyc. fundo unguibus inserta.

*Stam.* Filam. 13. inæquali basi connata, uno versu disposita, ad basin petali min. disco germinis inserta. Anth. 2-locul.

*Pistil.* Germ. subrotund. 3-gon. Styl. o. Stigm. 3.

*Peric.* Caps. orbiculata, 3-valv. 1-locul.

*Sem.* unicum, sphaericum, pulpa farinosa obductum, sub pellicula membranac.

1. *capreolata*. E. Aubl. *Guian. tab.* 235.

In *Caribæis* h.

Planta lactescens. Frutex 3-ped. sarmentis supra arbores scandentibus. Fol. alterna, imparipinn. Foliol. 2. utrimq. opposita, subrotund. acuta, glabra, subtus ferrugin. Viticulus axillar. circinnatus. Spica axillar. & pl. ad apices ramulorum. Petala alba.

### RACUBEA.

*Cal.* Perian. 1-phyll. turbinat. 7-dent. dentibus acut. subtus 7-costis.

## POLYANDRIA TRIGYNIA.

*Cor.* Petal. 7. ovata, acuta, calyc. disco pistil. inserta.

*Stam.* Filam. 21. tria ad basin cuiusq. petali. Anth. minimæ, subrotun. 2-locul.

*Pistil.* Germ. turbinat. basi calyc. adnatum. Styl. o. Stigm. 3-4. acuta.

*Peric.* Capsl. lignosa, ovata, 1-locul.

*Sem.* plurima, minutiss.

1. *Guianensis*. R. *Aubl. Guian. tab.* 326.

*In Guiana* h.

Frutex 4-ped. Rami 6-8-pedal. tortuosi. Fol. alterna, petiol. ovata, obtuse acuta, dentata, rigida, glabra. Stipul. binæ, exiguæ, ad basin petioli. Spica axillar. & terminalis. Fl. remoti, sessiles, alterni.

## N A P I M O G A.

*Cal.* Perian. parvum, 1-phyll. concavum, 6-part. lacin. subrotun. acutis, persistens.

*Stam.* Filam. 18. disco inidentia. Anth. subrotun. 2-locul.

*Pistil.* Germ. inferum, calyc. fundo adnatum, disco coronatum. Styl. 3. Stigm. obtusa.

*Peric.* . . . .

*Sem.* . . . .

1. *Guianensis*. N. *Aubl. Guian. tab.* 237.

*In Caribæis* h.

Arbor procera. Fol. alterna, ovata, ferrata. Stipul. binæ, deciduæ. Fl. exigui, spica interrupta, sessiles. Petal. subvirid.

## H O M A L I U M.

*Cal.* Perian. 1-phyll. 6-fid. segment. ovat-lanceol. acutis, persistentibus.

*Cor.* Petal. 6. ovata, plana, patentiss. calyc. paulo longiora. Glandulæ nectariferæ 6. planæ, cum petalis alternæ.

*Stam.* Filam. 18-24. erecta, subulata. Anth. simplic. subrotun.

*Pistil.* Germ. subrotun. villosum. Styli 3. erecti, filiform. Stigm. simplicia.

*Peric.* . . . .

*Sem.* . . . .



*I. racemosum*. H. Jacq. *amer. tab.* 83. f. 72. ed. 2. *pic. tab.* 261. f. 43.

*In Martinica* h.

Arb. procera, comosa, habitu *Ulm*i. Fl. racemosi, plani,

E U R Y A N D R A .

*Cal.* Perian. 5-phyll. foliol. subrotun. concavis; 2. exterioribus min.

*Cor.* Petal. 3. subrotun. concava, calyc. longiora.

*Stam.* Filam. plurima, capillaria, apice valde dilatata. Anth. didymæ, lobis discretis, apici filament. adfixæ.

*Pistil.* Germ. 3. ovat. Styli 3. breviss. Stigm. 2. leniter divisa.

*Peric.* Follic. 3. ovati, divaricati, latere interiore longitudinaliter dehiscentes.

*Sem.* aliquot.

*I. scandens*. E. Forst. *gen.*

*In Insulis maris australis.*

*Ad Tetracæræ genus spectat; monente Vahl.*

T E T R A G Y N I A .

P E K E A .

*Cal.* **P**erian. 1-phyll. carnosum, tomentosum, semi-5-fid. lacin. subrotun. concavis.

*Cor.* Petal. 5. subrotun. concava, carnosæ, infra divisuras calyc. disco inserta.

*Stam.* Filam. numerosiss. cor. longiora, disco inserta. Anth. subrotun. 2-locul.

*Pistil.* Germ. 4-gon. disco insidens. Styli 4., stamin. longiores. Stigmata obtusa.

*Peric.* Drupæ 4. subrotun. reniform. compressæ, 1-locul. Cortex luteus, carne butyracea. Nuxsetis rigidis, brevibus.

*Sem.* 1. reniform. edule, dulce.

*I. butyrosa*. P. fructu lævi: fol. digitat. utrimq. glabris.

*Aubl. Guian. tab.* 236.

*Tom. III.*

Bb

*Castanea peruana*. JB. hist. 1.

*In Caribæis* h.

Arb. 80-ped. & ultra, superne ramosa, ramis extus horizontalibus, intrus rectis, hinc inde sparsis. Fol. opposita. Foliol. 5. subsessil, ovata, acuta, integerr. glabra, intermedio longiore, & latiore; petiolis quasi articulatis. Fl. terminal. corymbosi: corymbo longæ peduncul. pedunculis tomentosis, parte media articulatis. Petal. alba.

2. *tuberculosa*. P. fol. digitat. subtus tomentosis. Aubl. Guian. tab. 239. -- Pluk. phyt. tab. 323. f. 4.

*In Caribæis* 2.

Differt a priore fol. crassioribus, subtus tomentosis: fructu matiore, tuberculoso: carne exsucca, nec butyrosa. Nucleus dulcis, edulis.

3. *glabra*. S. Aubl. Guian. tab. 240.

*In Caribæis* h.

Arb. 60-80-ped. superne ramosa, ramis rectis, & declinatis, sparsis. Fol. opposita, digitata, ternata. Foliol. subsessil. ovata, subdent. longe acumin, longe petiol. ruberr. venosa, glabra. Fl. axillar. & terminal. racemosi. Drupa oviform. cortice aspero, rufescente; carne subviridi, butyracea. Nux. fetis rigidis aspera. Nucleus edulis, dulcis. Cortex drupæ senior scinditur in rimas sparsas.

## C A T A N G A.

*Cal.* Perian. 3-phyll. foliol. ovatis, acutis, carnosis.

*Cor.* Petal. 6 tria inferiora longiora; tria super. alterna, acuta, carnosæ, subvirid.

*Stam.* Filam. vix ulla. Anth. numerosiss.

*Pistil.* Germ. plurima, sessil. subrotund. Styl. o. Stigm. obtusa.

*Peric.* Caps. receptac. adfixæ, ovatæ, peduncul. 1-locul.

*Sem.* foliar. subrotund.

1. *Oeregou*, C. Aubl. Guian. tab. 244.

*In Caribæis* h.

Arb. 50-ped. superne ramosa, ramis rectis, & declinatis, undiq. sparsis. Fol. alterna, breviter petiol. ovato-oblong. acuta, integerr. glabra.

bra, supra virid. subtus ferrugin. Fl. axill.  
solitar. bini, terni, breviter peduncul. *Odor*  
*aromaticus.*

A B E R E M O A.

*Cal.* . . . *Cor.* . . . , *Stam.* . . . *Pistil.* . . .

*Peric.* Baccæ numerosæ, exsuccæ, breviter pe-  
duncul. receptac. communi adfixæ, ovat. acu-  
tæ, 1-locul. subluteæ.

*Sem.* solitar. subrotund. testa fragili inclusum.

1. *Guianensis*, A. Aubl. *Guian.* tab. 245.

*In Caribæis* h.

Frutex 20-ped. ramosus. Fol. ampla, alterna,  
subsessil. ovata, oblong. acuta, integerr. utriq.  
tomentosa, obscure virid. Fl. axillar. solitar,

A B U T A.

*Cal.* . . . *Cor.* . . . , *Stam.* . . . *Pist.* . . .

*Peric.* Baccæ 3. exsuccæ, ovat. tomentosæ, ci-  
nereæ, receptaculo adfixæ, 1-locul.

*Sem.* solitarium, sulcatum.

1. *rufescens*, A. Aubl. *Guian.* tab. 250.

*In Caribæis* h.

Frutex tortuosus, sarmentis scandentibus. Fol.  
alterna, longo, crasso petiolo innixa, subcor-  
data, acuta, integerr. nervosa, supra glabra,  
virid. subtus tomentosa, ciner. Fruct. axillar.  
racemosi. *Var. fol. subtus tomentoso-ferrugin.*

2. *amara*. A. fol. lævi, cordifor. ligno flavescente. Aubl.  
*Guian.* tab. 251.

*In Caribæis* h.

Frutex caulibus pl. sarmentosis, volubil. ramo-  
sis. Lignum luteum, amarum. Fol. ampla,  
alterna, petiol. longo, crasso, recurvo inni-  
xa, cordata, nervosa, glabra, supra virid.  
subtus flavescens.





## CLASSIS XIV.

## DIDYNAMIA.



## GYMNOSPERMIA.

\* *Calyces subquinquefidi.*

855. *Perilla*. **C**alyc. lacinia suprema breviss. emarginata : laterales patulæ : infima longior, obtusa. *Stam. distantia*. Styli duo.
863. *Leonurus*. *Antheræ punctis nigris adpersæ*. Galea elliptica, concava, integra, non incumbens. Lab. 3-fid. segment. omnibus, aut lateralibus acuminat. *Stam. villosa*.
856. *Glecoma*. *Antherarum singulum par in formam crucis connuens*. Cal. 5-fid. parvulus, cylindricus, striatus, lacin. acutis. Cor. lab. superius erectum, semibifid. inferius patens, 3-fid. lacin. media latiore, emarginata.
850. *Hyssopus*. Galea suberecta, crenata, 2-fid. segment. ovatis. Cor. lab. inferius lacinula intermedia crenata. *Stam. recta, distantia*.
854. *Mentha*. Cor. subæqual. 4-fid. lacinia latiore, sæpe emarginata. *Stam. erecta, distantia*.
853. *Sideritis*. *Stam. intra tubum cor. Stigma brevius, involvens alterum*. Cor. erecta : lab. super. erecto, plerumq. 2-fido ; inferiore 3-fid. lacin. media subrotunda, crenata ; lateralibus acutis.
852. *Lavendula*. Cor. resupinata. *Stam. intra tubum*. Cal. brevis, cylindric. 5-dentatus, bractea suffultus. Cor. lab. super. 2-fid. inferius 3-fid. lacin. ovatis, æqualibus.
847. *Teucrium*. Galea nulla, sed dentes divaricati pro egressu staminum. Cor. lab. inferius patens, 3-fid. lacinia media magna, rotundata.
846. *Aiuga*. Galea minima, vel nulla ; sed loco galeæ denticuli bini, adproximati. Cal. brevis. Cor. lab. inferius 3-part. lacin. media ma.

864. *Phlomis*. *Cal. angulatus*. *Cor. lab. super. incumbens, compressum, villosum*: *lab. infer. 3-part. lacinia media ma. Differt a Leonuro defectu punctorum in antheris*.
859. *Betonica*. *Cal. aristatus*. *Cor. lab. super. adscendens, planiusculum; tubo cylindrico, incurvo*: *lab. inferius 3-part. lacin. media latiore, rotundata, emarginata*.
857. *Lamium*. *Cor. lab. infer. utrimq. dente setaceo*. *Cal. 5-fid. aristatus*. *Cor. lab. super. integrum, etiam emarginatum, fornicatum; infer. breve 2-lobum. cordiform.*
858. *Galeopsis*. *Cor. lab. inferius fauci bidentat.* *Cal. tubulosus, longe aristatus*. *Cor. lab. super. subcrenatum, fornicatum; lab. inferius 3-fid. lacinia media latiore, crenata*.
860. *Stachys*. *Cor. lab. inferius lateribus reflexum. Stam. deflorata ad latera deflexa*. *Cal. angulat. denticulis subulatis*. *Cor. lab. super. fornicatum, integrum, vel læviter emarginatum: inferius 3-fid. lacinia intermedia ma. emarginata; tubo breviss. fauce gibba*.
851. *Nepeia*. *Cor. lab. infer. lacinula intermedia crenata: fauce margine reflexo. Stam. adproximata*. *Cal. tubulosus, incurvus, 5-dent. denticul. 3. lab. super. erectis; binis lab. infer. deflexis*. *Cor. tubulosa, incurvata: lab. super. erectum, subrotund. emarginatum*.
848. *Satureja*. *Flos Thymi, sed galea acute emarginata*. *Cor. lacin. subæqual. Stamina distantia*. *Cal. striatus*. *Cor. lab. super. erectum, obtusum, emarginatum; infer. 3-fid. lacin. media paulo reliquis ma.*
861. *Ballota*. *Cal. hypocraterifor. 5-dent. 10-striat. Cor. lab. super. fornicatum, crenatum: lab. infer. 3-fid. obtusum, lacin. media plana, crenata*.
862. *Marrubium*. *Cal. hypocraterifor. rigidus, 10-striat. Cor. lab. super. rectum, lineare, 2-fid. lab. inferius reflexum, leviter 3-fid.*
865. *Moluccella*. *Cal. campanulat. cor. amplior, dentibus spinosis*. *Cor. tubus brevis: lab. super. erectum, integrum; infer. 3--fid. lacin. intermedia longiore*.
- \* *Verbenæ sp. aliquot.*

\* *Calyces bilabiati.*

875. *Scutellaria*. Cal. ore integro; fructiferus clausus, operculatus.  
 Cor. tubus longus, sursum flexus, 2-labiatus.  
 lab. super. concavum, nonnihil emarginatum:  
 inferius latum; lacin. media deorsum pendet,  
 late emarginata.
868. *Thymus*. Calycis faux villis clausa. Cor. lab. super. bre-  
 ve, erectum; parum emarginatum, inferius pa-  
 tens segment. subrotund. pene æqualibus. Sem.  
 subrotunda. Fl. nulla bract. distincti.
873. *Ocimum*. Cor. resupinata. Filamenta exteriora basi processum  
 emittentia. Cal. lab. super. orbiculatum; infe-  
 rius 4-fid. Cor. alterum lab. 4-fid. alterum in-  
 tegerrim. Sem. ovata.
876. *Prunella*. Filam. omnia apice bifurca; altero apice antheri-  
 fera. Stigma 2-fid. Cor. faux oblonga; lab.  
 super. amplum, fornicatum, lævissime 3-dent.  
 nutans; inferius 3-fid. lacinia media semicircu-  
 lari, crenata.
877. *Cleonia*. Stigma quadrifid. Filam. bifurca, apice altero  
 antherifera. Fl. intra singulas bracteas pinna-  
 tifidas, apicibus in spiculas molles desinen-  
 tibus.
874. *Trichostema*. Stam. longissima. Cor. tubus breviss. Lab. super.  
 falcatum; inferius 3-part. lacinia media lon-  
 giore.
870. *Dracopis*. Cor. faux inflato dilatata. Cal. breviss. Cor. lab.  
 phalum. super. concavum; inferius 3-part. lacinia me-  
 dia pendente.
867. *Origanum*. Strobilus 4-gonus, spicatus, fl. colligans. Flos  
 Thymi, sed galea profundius emarginata.
866. *Clinopodium*. Involuc. multifetum, verticillo subiectum. Cal. le-  
 viter incurvus. Cor. lab. super. erectum, ob-  
 tusum, fornicatum, divisum: infer. 3-fid. la-  
 cin. media latiore, emarginata.
849. *Thymra*. Cal. utrimq. linea ciliata carinatus. Cor. labia  
 plana, fere æqualia. Stylus semibifid.
872. *Melittis*. Cal. campanulat. tubo cor. amplior. Cor. lab.  
 super. rotunde emarginatum: lab. infer. 3-  
 fid. segmentis rotundis, medio cordato. Anth.  
 cruciatæ. Sem. villosa.
869. *Melissa*. Cal. angulatus, aridus, lab. super. adscendente.  
 Cor. lab. super. subfornicatum, 2-fid: inferius  
 lobo medio cordato, ampliore.



# DIDYNAMIA GYMNOSPERMIA. 391

871. *Hormi-* Cal. campanulat. lacin. 4. subæqualibus; quinta  
num. ma. emarginata. Cor. lab. super. breve; concavum; infer. 3-fid. inæquale.
878. *Prasium*. Baccæ 4. monospermæ.
879. *Phryma*. Sem. unicum, in calyce nudum. Cor. lab. super. emarginatum; inferius maius, 3-fid. lacinia media longiore.

## ANGIOSPERMIA.

\* *Calyces hiantes.*

880. *Castilleja*. Cor. ringens: lab. infer. glandulis tubulosis. Cal. 1-phyll. tubulosus, longitudinaliter hians. Caps. 2-locul.

\* *Calyces bifidi.*

924. *Obolaria*. Stam. ex divisuris cor. Cal. 2-fid. Cor. campanul. 4 fid. lacin. 2-fid. Caps. ventricosa, 2-valv. 1-locul. polysperma.
925. *Orobanch* *Glandula sub basi gervinis*. Cal. tubus magnus, che. ventricosus, 4-5 fid. inclinatus. Cor. ringens, subæqual. lab. super. emarginat. infer. 3-fid. Caps. 2-valv. 1-locul. polysperma.
918. *Hebenstre-* Stam. margini limbi cor. inserta. Cal. ringens; tia. lab. super. breve; inferius deflexum, rude. Cor. 1-labiata, lab. ascendente, 4-fido. Caps. 2 sperma.
898. *Torenia*. Filum. 2. bifida. Cal. 2-lab. super. tricuspidate, inferiore 3-fido. Cor. personata, lab. super. integro; infer. 3-fido. Caps. 2-locul.
942. *Acanthus*. Cal. inæqual. 2-fol. 2-fid. Cor. 1-lab. deflexa, 3-fid. tubo brevi, barbato. Anth. villosæ. Caps. 2 locul.
910. *Premna*. Cal. 2-lobus. Cor. 4-fid. inæqualis, obtusa, lacin. 2. super. erectis, brevioribus: reliquis patentibus. Bacca subglobosa, 4-locul. 4-sperm.
907. *Crescen-* Cal. brevis, 2-part. æqualis. Cor. tubus ventri- tia. cosus, curvus; limbus 5-fid. lacin. inæqualibus, sinuatis. Bacca pedicellata, 1-locul. polysperma. Sem. 2-locul.

\*\*\* *Calyces trifidi.*

906. *Halleria*. Cal. 3-5-fid. Cor. obliqua, 4-fid. lab. super.

longiore. Filam. cor. longiora. Bacca infera,  
2-locul.

\*\*\*\* *Calyces quadrifidi.*

916. *Selago*. Cal. parvus, 3--4--5--fid. lacinia infima ma.  
Cor. tubus capillar. limbo subæquali. Sem. 1.  
2. cor. involuta.
928. *Lippia*. Cal. subrotund. compresso-membranac. erectus,  
4-dent. Cor. hypocrateriform. Caps. recta, 2-  
valv. 1-locul. 2-sperm. Sem. 1-2-locul.
885. *Lathraea*. Cal. 4-fid. Glandula depressa ad basin futuræ ger-  
minis. Cal. 4-fid. Cor. personata, varians:  
lab. super. integrum; infer. 3-fid. Caps. 2-  
valv. polysper.
881. *Bartisia*. Cal. coloratus (in quo differt potissimum a con-  
generibus) 2-lobus, emarginatus. Cor. per-  
sonata, minus ipso cal. colorata, lab. super.  
longiore, erecto, angusto, integro, læviter  
emarginato: infer. brevi, 3-fid. reflexo. Caps.  
2-valv. polysper. Sem. angulata.
883. *Euphrasia*. Anth. inferiores altero lobo basi spinosa. Cal. cy-  
lindricus, 4-fid. inæqualis. Cor. personata;  
lab. super. concavum, emarginatum; infer.  
patens, obtusum, 3-fid. æquale medio saltem  
segmen. sæpius emargin. Caps. ovat-oblong.  
2-locul. polysp. Sem. exigua.
882. *Rhinan- thus*. Cal. ventricosus, compressus, 4-fid. Caps. obtusa,  
compressa, 2-locul. Cor. personata: lab. super.  
galeatum, compressum, angustum, emargina-  
tum; inferius obtusum, 3-fid. lacin. media  
latiore.
884. *Melampy- rum*. Cal. tubulosus, 4-5-fid. lacin. tenuibus. Cor.  
personata sursum ampliata: lab. super. com-  
pressum, margine reflexo; lab. infer. 3-fid:  
planum, 2. eminentiis in medio notatum. Caps.  
obliqua, hinc dehiscens, 2-locul. Sem. ovata,  
sæpius 4.
886. *Schwal- bea*. Cal. tubulato-ventricosus, 4-fid. lacinia super. mi-  
nima; infima maxima, emarginata. Cor. per-  
sonata; lab. superius integrum; inferius 3-fid.  
lacin. æqualibus. Sem. 1. parvum.
932. *Barleria*. Cal. 4-part. lacin. oppositis ma: Cor. infundibu-  
liform. lacinia unica profundiore. Stam. 2 lon-  
ge min. Caps. 4-angul. 2-valv. 2-locul. ela-  
stica, absque unguibus. Sem. 2.

913. *Laselia*. Cal. brevis, 4-fid. Cor. 5-fid. lacin. omnibus secundis. Stam. petalo adversa. Caps. ovata, 3-locul.
908. *Gmelina*. Cal. minimus, sub 4-dent. Cor. campanulata, limbo 4-fid. 2-labiato; lab. super. fornicatum; inferius brevius, 3-fid. lacin. obtusis, patulis. Anth. binæ crassiores, 2-part. Drupa nucleo 2-locul.
911. *Lantana. Stigma uncinatum*. Cal. brevis, tubulosus, connivens, obsolete 4-dent. Cor. tubus tenuis, obliquus, connivens; limbus parum inæqual. obtusus. Drupa nucleo 2-locul.
- \*\*\*\*\* *Calyces quinquefidi*.
940. *Avicennia*. Cal. 5--part. lacin. subovatis, obtusis, auctus squamis 3. Cor. 2-lab. lab. super. quadrato; infer. 3-fido, lacin. æqualibus, obovatis, planis. Caps. rhomboidea, compressa, coriacea, 1-sper.
888. *Toxaria*. Cal. parvus, 5-dent. Cor. hypocraterifor. lab. super. 2-fid. interius 3-fid. lacin. omnibus subæqualibus, subrotund. Caps. globosa, 1-locul. 2-valv. 1-sperm.
924. *Limosella*. Cal. erectus, 5-fid. lacin. erectis, acutiuscul. Cor. campanulata, 5-fid. æqualis, lacin. hinc patentibus, acutis. Stam. per paria adproximata. Caps. ovata, 2-valv. 1-locul. polysper.
921. *Browallia*. Cal. brevis, tubulatus, 5 dentibus inæqualibus. Cor. hypocraterifor. 5-fid. lacinia super. ma. patens; umbilico clauso. Anth. 2. ma. Caps. 1-locul. Sem. numerosa.
915. *Lindernia*. Stam. 2 infer. dente terminali, antheraq. sublaterali. Cal. 5-part. lacin. linear. acutis, æqualibus. Cor. ringens, lab. super. breviss. infer. erectum, 3-fid. lacinia media paulum longiore. Caps. ovalis, 1-locul.
925. *Vandellia*. Cal. sub 4-fid. Cor. ringens. Filam. 2 exter. e disco labii cor. Anth. per paria connexæ. Caps. 1-locul. polysperma.
892. *Gesneria*. Cal. 5-fid. germini insilens. Cor. supera, incurva, & recurva, 5-fida. Caps. subrotunda, infera, 2-locul.
900. *Scrophularia*. Cal. brevis, 5-fid. lacin. rotundatis. Cor. subglobosa, resupinata, lacin. 2 super. erectis, ma. Capsula globosa, 2-locul.



# 394 DIDYNAMIA ANGIOSPERMIA.

926. *Stemodia*. Cal. 5-fid. Cor. 2-lab. labio super. integro; infer. 3-part. lacin. æqualibus, rotundis. Stam. 4. filamentis singulis bifidis anth. geminæ. Capsula 2-locul.
901. *Celsia*. Cal. 5-part. Cor. rotata, lacin. subrotun. infima ma. Filam. barbata. Caps. oblon. 2-locul.
902. *Hemimeris*. Cor. rotata, lacinia una ma: obcordata. Fossula laciniarum nectarifera. Caps. 2-locul. loculo altero gibbosiore.
923. *Sibthorpia*. Cal. turbinatus, 5-part. lacin. ovatis. Cor. rotata, 5-part. subæqual. lacin. rotundatis. Stam. paribus remotis. Caps. orbicular. compressa, 2-locul. dissepimento transverso. *Habitus Hydrocotyles*.
914. *Capraria*. Cal. oblongus, 5-part. lacin. linearibus. Cor. campanulata, 5-fid. acuta, subæqualis, lacin. 2 superioribus erectioribus. Stigma cordatum, 2-valv. Caps. 2-valv. 2-locul. polysperma.
903. *Digitalis*. Cal. 5 part. lacin. rotundatis, acutis; suprema angustiore. Cor. campanulata, ventricosa, 5-fila, lacin. obtusis, infima ma: Stam. declinata. Caps. ovata, 2-locul. Sem. alata.
904. *Bignonia*. Cal. cyathiform. 5-fid. Cor. campanulata, 5-fida, subtus ventricosa. Siliqua 2-locul. Sem. membranaceo-alata.
931. *Ruellia*. Cal. 5-part. lacin. erectis, linear. acutis. Cor. subcampanulata: tubus inclinatus, patulus; lacin. 2. super. magis reflexæ. Stam. per paria approximata. Caps. dentibus elasticis dissiliens.
920. *Buchneria*. Cal. 5-dent. obsolete. Cor. hypocraterifor. limbus lacinis obcordat. æqualibus. Caps. acumin. 2-locul.
919. *Erinus*. Cal. 5-phyll. lacin. laceol. subæqualibus. Cor. bilab. lab. super. breviss. reflexo. Caps. 4-valv. 2-locul. polysper.
909. *Petræa*. Cal. maximus, coloratus, 5-part. Cor. rotata, calyce min. Caps. in fundo calyc. 2-locul. Sem. solitar.
917. *Manulca*. Cal. 5-part. Cor. limbus 5-part. subulatus; lacin. super. 4. magis connexis; infima profundiore reflexa.
893. *Antirrhinum*. Cal. 5-phyll. lacin. 2 superioribus dehiscentibus. Cor. personata tubulosa, ventricosa; lab. super. 2-fido, lateribus reflexis: inferiore 3-fido, segmento medio min. subtus nectar. pro-

minente. Caps. rotundata, 2-locul. polysperm. varie dehiscens.

941. *Columnea*. Cal. 5-part. Cor. lab. super. fornicatum, integrum, supra basin gibbæ. Anth. connexæ. Caps. globosa, 2-locul.

890. *Gerardia*. Cal. 5-fid. lacin. erectis, acutis. Cor. lab. super. erectum, emarginatum; infer. 3-part. lacin. emarginatis, media 2-part. Caps. ovata, basi dehiscens. Sem. 1.

889. *Pedicularis*. Cal. ventricosus, 5-fid. Cor. personata; lab. super. fornicatum, compressum, angustius, emarginatum, etiam in quibusdam rostratum; inferius 3-fid. lacinia media angustiore. Caps. mucronata, obliqua, 2-valv. 2-locul. Sem. angulata.

930. *Mimulus*. Cal. prismaticus, 5-dent. Cor. personata; lab. super. lateribus replicatum; infer. 3-fid. in cuius basi platum convexum, 2--fid. Caps. ovata, 2-locul. polysperma.

927. *Dodartia*. Cal. campanulat. subæqual. 5-dent. Cor. personata; tubus longus, deflexus; lab. super. breve, adscendens, emarginatum; infer. duplo longius.

891. *Chelone*. Cal. breviss. 5-part. lacin. ovatis. Cor. personata, inflata, clausa; tubus brevis; lab. super. emarginat. infer. 3-dent. Rudimentum filam. 5.

929. *Sesamum*. *Flos Digitalis, sed fructus diversus*. Cal. breviss. 5-part. lacinia suprema brevior. Cor. campanulata, fauce inflata, maxima, declinata, 5-fid. lobo infimo ma. Rudimentum filam. 5. Stigma lanceol. Caps. 4-locul.

897. *Martynia*. Cal. 5-fid. lacin. 2. reflexis. Cor. campanul. tubus magnus, ventricosus, inferne ad basin gibbus: limbus brevis, subæqualis, lacin. infima tantum erectiore, crenata. Rudimentum filam. 5. Caps. lignosa, corticata, rostro hamto, 2-valv. 5-locul.

896. *Craniolâria*. *Simil. Martinia, sed cor. magis æqualis*. Cal. duplex fl. Periant. 4-phyll. Spatha, 1-phylla, ovata, inflata. Cor. tubus angustiss. longiss. lab. super. integrum, subrotund. infer. 3-fid. lacin. media latiore. Caps. *Martinia*.

943. *Pedalium*. Cal. parvus, 5-part. inæqual. Cor. subringens, limbo obliquo, 5-fido, lacin. infima ma. Nux conica, suberosa, 4-gona, angulis spinosis, 2-locul. Sem. bina.

# 396 DIDYNAMIA ANGIOSPERMIA:

944. *Amasonia*. Cal. campanulat. Sem. 5--fid. Cor. tubulosa, limbo parvo, 5 fid. Nux ovata, 1-locul.
922. *Linnæa*. Cal. duplex; floris 5-part. superus; fructus 4-phyll. Cor. campanul. semi 5-fid. Bacca ovata, sicca, 3-locul.
939. *Bontia*. Cal. parvus, erect. 5-part. lacin. obtuso-acumin. Cor. tubus longus, lab. super. emarginat. infer. 3-part. revolutum. Drupa ovata, 1-sperma, apice obliquo. Sem. unicum, plicatum.
912. *Cornutia*. Cal. parvulus, subrotund. 5-dent. Cor. ringens, tubus calyce multo longior; lacin. super. erecta, subrotunda; laterales distantes; infer. integra. Stam. cor. longiora. Styl. longissim. Bacca 1-sperm.
937. *Clerodendron*. Cal. magnus, campanulat. 5-fid. Cor. ringens, tubo filiformi; limbo obliquo, 5-part. æquali. Stam. longiss. intra lacinias maxime hiantes. Bacca 1-sperm.
936. *Volkameria*. Cal. parvulus, turbinatus, 5-fid. Cor. lacinia secundæ. Bacca 2-sperm. Sem. 2-locul.
905. *Citharexylon*. Cal. campanulat. 5-dent. Cor. infundibulifor-rotata, lacin. 5. subæqual. supra villosis. Bacca 2-sperm. Sem. 2-locul.
934. *Ovieda*. Cal. 5-fid. fructificus campanulat. Cor. tubus cylindric. longissim. lab. super. concavum; infer. 3-part. lacin. æqualibus. Bacca globosa, 2-sperm.
935. *Millingtonia*. Calyc. margo 5--dent. reflexus. Cor. longiss. limbo 4-fid. Anth. 2-part. vaginantes. Siliqua?
938. *Vitex*. Cal. parvus, 5-dent. Cor. ringens, limbo 6-fid. lacin. inæqualibus. Bacca globosa, 4-locul. 4-sperma.
933. *Duranta*. Cal. superus, 5-fid. Cor. subringens, tubo longo, curvo: lab. super. erect. ovatum, integrum; infer. 3-fid. lacinia infima 2-part. Bacca 4-sperm. Sem. 2-locular.
899. *Besleria*. Cal. magnus, erectus, 5-part. laxis. Cor. inæqual. tubus gibbus; lab. super. 2-fid. infer. 3-fid. Bacca subglobosa, polysperma.

\*\*\*\*\* *Calyces multifidi*.

926. *Hyobanche*. Cal. heptaphyll. lacin. erectis, linear. acuminat. Cor. unilab. lab. super. fornicato, emarginato, Caps. subrotunda, 2-locul. polysper.



894 *Cymbaria*. *Planta proxima Antirrhino, tota incana*. Cal. 10-dent. Cor. ringens. Caps. cordato-acumin. 2-locul.

895. *Thunbergia*. Cal. duplex. exter. 2--phyll. inter. multipart. Cor. campanulata. Caps. globosa, rostrata, 2-locul.

\*\*\*\*\* *Polypetali*.

945. *Melanthus*. Cal. magnus, coloratus, 5-phyll. lacin. infer. gibba. Cor. papilionaceæ simil. 4-petal. lab. inferius constituens; nectario infra infima. Caps. 4-locul. 4-loba.

## DIDYNAMIA.

### GYMNOSPERMIA.

846. *AIUGA*. Cor. lab. super. minimum, seu denticuli 2 adproximati. Stam. lab. super. longiora.

1. *orientalis*. A. fol. ovatis: fl. resupinatis. *Syst. veg. ed. 14. Sabb. hort. 3. tab. 100.*

b. *Bugula orientalis*. &c. *Dill. elth. tab. 53. f. 61. In Oriente 24.*

Caul. pedal. erecti, basi tantum procumbent. hirsuti. Fol. undulata, dentata, rugosa, villosa; floralia quandoq. triloba, viridi-rubra. Fl. utrimq. 5-7. sessiles. Cal. latus. Cor. cœrul. labio sæpe alba macula picto. *Var. cor. alba, oris purpur. vel e cœruleo-flavescente.*

2. *pyramidalis*. A. tetragono-pyramidalis, villosa: fol. radical. maximis. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 185. Ludw. eccl. tab. 8,*

*In Svecia, Helvetia &c. ♂.*

Planta ab initio ad summum pyramidalibus, 4-fariam undiq. fol. vestita, non stolonifera. Caul. digital-pedal. & ultra, seniores declinati. Fol. angulis incis, etiam trilobatis, lata, villosa, ciliata, subtus nigra purpura perfusa; inferiora longe petiol. superiora sessil. Cor. cœrul. vel duabus maculis alba. *Var.*

fol. infimis maximis, & angustis; floralibus integris, vel trilobis.

3. *alpina*, A. caul. simplici: fol. caulinis radicalia æquantibus. Syst. veg. ed. 14.

In *Alpibus helveticis* &c. 24.

Differt a priore fol. rugosis, magis ovatis, confertioribus, hirsutis, brevissime, & latissime petiolat. radicalibus vix reliquis ma: fl utrumq. 10. nec 3. iisque satore cœruleis, nec albis: bracteis viridibus, nec coloratis.

4. *genevensis*, A. fol. tomentosis, lineatis: calycibus hirsutis. Syst. veg. ed. 14.

*Bugula montana*. Riv. monop. tab. 140. f. 2.

*Consolida media* &c. Bauh. hist. 3. p. 432.

In *Europæ pratis*, & collibus 24.

Non stolonifera. Habitus congestus. Fol. magnis, & rectis angulis donata. Cor. carnea, vel alba. Var. fol. ovatis, integerr.

A. *pyramidalis*, *alpina*, & *genevensis* videntur una, eademq. species.

5. *reptans*, A. glabra, stolonibus reptantibus. Syst. veg. ed. 14. Black. tab. 64. f. 1. Knorr. del. 2. tab. A. 8. Sabb. hort. rom. 3. tab. 99.

*Bugula*. Riv. tab. 75. Dod. pempt. 135.

In *Europa australi*; in pratis, & ad vins 24.

Caul. erectus, semiped. hirsutus. Fol. radical. petiol. caulina sessil. obtusa, ovata, vel oblonga, crenata, nitida, subtus sæpe purpur. Bract. purpur. Fl. dense spicato-verticillati. Verticilli sub 8-fl. Cor. cœrul. alba, purpur. aut colore cæcio. Var. fol. longioribus.

6. *decumbens*, A. decumbens, villosa: fol. obovatis, dentatis. Syst. veg. ed. 14. Thumb. Jap.

In *Japonia*.

Tota planta villosa. Caul. pl. decumbentes, apicibus erectis, herbacei, simplices, vel subramosi, palmat. Fol. semipollic. radical. plura, & maiora: petiolata, & dentata. Fl. verticillati, minuti, cœrul. Cor. non resupinata.

847. TEUCRIUM. Galea nulla, sed dentes divaricati pro egressu staminum.

1. *campanulatum*, T. fol. multifidis: fl. lateralibus, solitar. Syst. veg. ed. 14.

*Iva moschata* &c. Riv. monop. tab. 24.

In *Orientis*, *Apuliæ humectibus* 24.

*Simile T. Botryi, sed planta tota glabra. Fol. brevius petiol. angustiora, & profundius incisa. Caul. pedal. seniores prostrati, repentes. Fol. bis 3-fida. Pedunc. flore breviores, post anthesin cernui. Cal. campanulat. nec basi gibbus. Cor. albo-margaritacea, fol. incumbens.*

2. *orientale. T. fol. multifidis: fl. racemosis. Syst. veg. ed. 14. Comm. rar. tab. 25. Riv. monop. tab. 19. T. lupinum &c. Till. pis. tab. 49. f. 1. In Oriente.*

*An var. prioris? Planta pubescens; culta glabra. Caul. erecti, pedal. Fol. petiolata, ambitu cordat-ovata. Racemus ramis adscendentibus, basi nudis. Fl. magni. Cal. pilosus. Cor. cœrul. venis saturationibus.*

3. *Botrys. T. fol. multifid. fl. lateralibus (sæpe ternis), pedunculatis. Syst. veg. ed. 14. Sabb. hort. 3. tab. 91.*

*Chamædryes &c. Lob. ic. 385. Mill. ic. 264.*

*Iva moschata &c. Riv. tab. 14.*

*Chamæpythis &c. Dod. pempt. 46.*

*In Europæ apricis, cultis ☉.*

*Caul. vix pedal. ramosissim. coloratus. Fol. longe petiol. mollia, subtus villosa, segmentis integris, 2-fid. ultimo 3-fido. Verticilli 6-8-fl. Pedunc. colorati. Cor. dilute purpur. vel alba.*

4. *Chamæpithys. T. fol. linearibus, trifidis, integerr. fl. solitar. lateralibus, sessilibus: caule diffuso. Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 733. Black. tab. 528. Ludw. ed. tab. 130.*

*Chamæpithys vulgar. Bauh. hist. 3. p. 295.*

*In Europæ arvis ☉.*

*Habitus canescens. Caul. vix dodrantal. a basi ramosus. Fol. ex viridi lutescent. Verticil. 2-3-fl. Calyc. turgidi, dentibus inermibus. Cor. lutea, raro rosea.*

5. *nissolianum. T. fol. trifidis, quinquefidisq. filiformibus: fl. oppositis, solitar. pedunculat. caule decumbente. Syst. veg. ed. 14.*

*Chamædryes &c. Moris. hist. 3. f. II. tab. 22. f. 19.*

*In Hispania, Lusitania ☉.*

*Caul. scaber. Fol. perangusta, obrusiuscula, fere glabra. Fl. secundi. Cor. vix calyce longior, obtusa, cœrul.*



6. *pseudo-chamæpythis*. T. fol. 3-partit. trifidis, integrisq. linearibus: fl. racemosis: caule hirsuto. *Syst. veg. ed. 14. Sabb. hort. 3. tab. 95. Clus. hist. 2. p. 185.*  
*In Hispania, Lusitania, Massilia 24.*  
 Caul. erectus, internodiis elongatis. Fol. pilosa. Pedunc. longi, erecti. Calyc. aristati. Cor. pilosa, alba. Filam. longiss.
7. *Iva*. T. fol. subtricuspidat. linearibus: fl. lateralibus, solitar. sessilibus. *Syst. veg. ed. 14.*  
*Anthyllis &c. Lob. ic. 384.*  
*Anthyllis altera. Clus. hist. 2. p. 186.*  
*In Lusitania, Gallia, Pedemontio, ad vias, & secus agros ♂.*  
 Planta moschum redolens. Caul. lignosus, humifusus, hirsutus. Fol. sessil. raro integerr. Flos magnus, hirsutus, purpur. *Var. cor. lutea, & alba.*
8. *mauritanum*. T. fol. pinnato-multifid. caule erecto, simpliciss. bract. subulato-palmatis: racemo simplici. *Syst. veg. ed. 14. Shaw. afr. tab. 575. ic. monstrofa.*  
*In Mauritania 24.*  
 Tota planta pilis raris adspersa. Caul. spitham. Fol. ima in petiolum desinentia. Fl. oppositi, solitar. Cal. villosus. Cor. obtusiss. alba, extus villosa.
9. *fruticans*. T. fol. ellipticis, integerr. subtus tomentosis: fl. (plerumq.) lateralibus, solitar. pedunculat. *Syst. veg. ed. 14. Mont. in Zann. tab. 163. Sabb. hort. 3. tab. 96. Dill. elth. tab. 284. f. 366-368. Clus. hist. 1. p. 348. Barr. rar. tab. 512.*  
*In Bætica, Sicilia maritimis ♂.*  
 Caul. 2-3-pedal. canescens. Fol. opposita, petiol. brevia, acuminata, sæpe undulata, supra atro-virid. nitida. Fl. in planta spontanea apice congesti, subracemosi; in culta remotiores. Cor. coerul. auriculis griseis, rubro-striatis; vel candida. *Var. fol. latioribus, brevioribus, rugosis; vel maculis aureis variegatis.*
10. *latifolium*. T. fol. rhombeis, acutis, integerr. villosis, subtus tomentosis. *Syst. veg. ed. 14. --- Dill. elth. tab. 284. f. 368 -- Hort. Angl. tab. 3. -- Riv. mon. tab. 18.*  
*In regione Bætica h.*

*Var. prioris.* Fol. obtusiora, supra atro-virid. lana telæ aranæ instar obducta; subtus, cum ramis, tomento niveo tecta.

11. *creticum.* T. fol. linearibus, acuminat. integerr. subtus niveis: racemo fl. ternatis, solitariisq; calycibus spinosis.

T. fol. lanceol-linearibus, integerr. fl. racemosis, ternis. *Syst. veg. ed. 14.*

Rosmarinum &c. *Alp. exot. tab. 102.*

In Creta, Ægypto h.

Frutex rigidus, in apice denso tomento oblitus. Fol. fere *Hyssopi*, sessil. marginibus parum reflexis. Racemi longi, interrupti. Cor. cœrul.

12. *Marum.* T. fol. ovatis, acutis, petiolat. integerr. subtus tomentosis: fl. racemosis, secundis. *Syst. veg. ed. 14. Black. tab. 47. Sabb. hort. 3. tab. 90. Ludw. ed. tab. 14.*

*Marum cortusi.* *Bauh. hist. 3. p. 242. Riv. monop. tab. 23.*

In regno Valentino h.

Caul. erecti, fruticulosi, incani. Fol. *Serpylli*, fragrantia. Fl. purpurasc.

13. *multiflorum.* T. fol. ovalibus, antice dentatis, superne glabris: fl. racemosis; verticill. 6-fl. *Syst. veg. ed. 14.*

*Marum hispanicum* &c. *Bocc. mus. tab. 117.*

In Hispania h.

Caul. ramosiss. ramis filiform. incanis. Fol. rhombea, plana, non nitida. Fl. magnitudine T. *Mari.* Verticilli diffiti. Cor. purpur.

14. *Laxmanni.* T. fol. ovato-oblon. integerr. sessilibus: fl. solitar. sessilibus. *Syst. veg. ed. 14.*

In Sibiria.

Caul. pedal. villosus. Fol. trinervia. Fl. laterales, solitar. secundi.

b. Caul. erectus, striatus, totus tomentosus. Fol. tomentosa. Fl. gemini. Cal. hirsutiss. Cor. sordide lutea, purpur. lineis longitudinaliter striata. *Piller It. Slavonia.*

15. *sibiricum.* T. fol. ovatis, serratis: peduncul. solitar. 3-fl. intermedio sessili: bract. lineari-lanceol. *Syst. veg. ed. 14.*

In Sibiria 24.

Caul. pedal. herbaceus, adscendens, brachia-

tus, ramis oppositis, erectis. Fol. facie *Veronica officinalis*, breviter petiol. subobtusula, scabriuscula, utrimq. virid. venosa; summa subsessil. lanceol. acuta, sæpe integerr. Bractæ sub bifurcatura 2. lanceol. mucronatæ, integerr. longitud. calyc. ut in *Satureia montana*. Cor. parva, purpur.

16. *salicifolium*.

T. fol. lanceolato-ellipticis, obtusiuscul. integerr. calycibus 4-fid. *Syst. veg. ed. 14.*

*Chamæpythis* &c. *Schreb. dec. pl. 1. tab. 9.*

*In Oriente 24.*

Caul. diffus. palmar. teretiusculi, pubescent. basi fere perennantes. Fol. opposita, erecta, nuda, non nitida, nervosa, internodiis longiora. Fl. magni, oppositi, brevissime peduncul. Cor. foliis triplo breviores, luteæ, intus striis 5. sanguineis.

17. *asiaticum*. T. fol. lanceolat. repando-ferratis, basi rectangulis: fl. soltar. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. hort. 3. tab. 41. Med. æt. Pal. vol. 3. physic. tab. 10.*

*In India Orientali* ☉?

Caul. ped. erect. fuscescens, brachiat. nudus. Fol. petiolat. rugosa, mollia, patentia, supra sature virid. subtus tomentosa, pallide virid. venoso-reticulata. Fl. axillar. breviter peduncul. secundi. Cor. alba, vix incarnata.

18. *cubense*. T. fol. cuneatis, ferrato-incisis, in petiolum attenuatis, glabris: fl. soltar. pedunculat. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. Obs. 2. tab. 30. amer. tab. 183. f. 74. ed. 2. pict. tab. 164.*

*In Cuba humidiusculis* h 24.

Caul. erectus, sesquiped. parum ramosus, glaber. Fol. T. lucido similia, sed breviter petiol. Pedunc. axillar. oppositi, 1-fl. Fl. parvi, albi.

19. *Arduini*. T. fol. ovatis, ferratis: racemo terminali, spicato, sessili, tereti. *Syst. veg. ed. 14. Arduin. Spec. 1. tab. 3.*

*Habitat* . . .

Caul. suffruticosi, ut tota planta, obscure pubescent. ped. erecti. Fol. breviter petiol. nitida. Spica simil. T. *hircanico*, at brevior, flavescens, sicuti cor.

20. *canadense*. T. caul. erecto: fol. ovato-lanceolat. ferratis:



racemo terminali, tereti; verticill. 6.-phyll.  
*Syst. veg. ed. 14.*

*In Canada 4.*

Planta e Canada habet fol. angustiora, æqualiter ferrata, subtus tomentosa, plana. Spica ex verticillis, aut sparsis, fl. bractea minima singulis subiecta. At *hortensis* habet fol. maiora, rugosa, inæqualiter ferrata, vix subtus pubescentia; & fl. in racemum subspicatum ex verticillis 6-fl. 6-phyll. bracteis ferratis. Cor. rubra.

21. *virginicum*. T. fol. ovatis, inæqualiter ferratis: racemis terminalibus. *Syst. veg. ed. 14. Pluk. alm. tab. 318. f. 1. sed male fl. bilabiatos fecit pictor.*

*In Virginia.*

Caul. erectus, pedal. & ultra, ramosus, rubens, pubescens. Fol. pollicar. & ultra, subtus pallida, petiol. oblong-ovata, acuta, basi inæquali. Racemi laxi, subsessil. Fl. alterni, cernui. Cor. maiuscula, purpurascens.

22. *hircanicum*. T. caul. brachiato, dichotomo: fol. cordat-oblong. obtusis: spicis terminalibus, longiss. sessilibus, spiralibus. *Syst. veg. ed. 14. Hall. Comm. Gouting. tom. 2. tab. 13. Arduin. Spec. 1. tab. 4.*

*In Hircania 4.*

Caul. 2-3-ped. molliter hirsuti, purpur. Fol. *Betonice officin.* cordato-elliptica, crenata, rugosa, atro-virid. subtus pubescent. florale solitarium, linear-acuminat. Spicæ pyramidata, purpur. fl. congestis. Cor. purpur.

23. *Scorodonia*. T. caul. erecto: fol. petiolat. cordati, ferratis: racemis lateralibus, secundis. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 485. Black. tab. 9. Riv. monop. tab. 12.*

*In Europæ siccis 4.*

Odor alliaceus. Caul. fruticosi, 3-ped. ramosi, purpurascens. Fol. *Salvia æmula*, longe mucronata, rugosa, scabra, squallida, villota. Racemi pl. longi, nudi. Verticil. 1-2-fl. Cor. ochroleuca. Stam. purpurasc.

24. *massiliense*. T. caulibus erectis: fol. ovatis, inciso-crenatis, rugosis, incanis: racemis rectis, secundis. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. hort. tab. 94. Medic. act. Pal. Vol. 3. phys. tab. 11. Ger. prov. tab. 11.*

*T. creticum*. *Clus. hist.* 1. p. 348.

*In Creta, Gallia australi &c.* h.

Caul. suffruticosi, vix pedalis. incani. Fol. petiol. obtusiusc. parva, inæqualiter ferrata, margine reflexo, subtus venosa. Racemi terminal. breves. Fl. oppositi, peduncul. Cal. fere *Scutellariæ*, ut in *T. hircanico*. Cor. purpurasc. lab. inferiore valde concavo. Odor *Nepetæ*.

25. *Scordium*. *T.* caule diffuso: fol. sessil. oblong. dentato--ferratis: fl. axillaribus, geminis, pedunculat. *Syst. veg. ed.* 14. *Fl. Dan. tab.* 593. *Black. tab.* 475. *Riv. mon. tab.* 11. *Cam. epit.* 588. *Dod. pempt.* 126.

*In Europæ paludosis* 24.

Odor allii. Caul. fistulosus, hirsutus. Fol. breviter petiol. molliuscula, subalbida. Verticil. ad 6-fl. Cal. ventricos. Cor. ex cœruleo-purpureis.

26. *Chamædryas*. *T.* caulibus subprocumbent. pilosis: fol. petiolat. cuneiformi ovatis, incis, crenatis: fl. ternis. *Syst. veg. ed.* 14. *Sabb. hort.* 2. *tab.* 38. *Riv. mon.* 10. *Lob. ic.* 491.

*b.* *Chamædryas min.* *Fuchs. ic.* 498. *Clus. hist.* 1. 351. *tab.* 17. *Black. tab.* 80.

*In Europæ siccis* 24.

Caul. palmat. ramosi. Fol. firma, subhirsuta, nitida. Bract. ferratæ. Verticil. 2-4-5-fl. superne adgregati. Cor. purpur. raro alba.

27. *lucidum*. *T.* caul. erecto, lævi, fol. ovatis, acute incisoferratis, glabris: fl. axillaribus, ternis. *Syst. veg. ed.* 14. *Medic. ac. Pal. Vol.* 3. *phys.* 12. f. 7. 8. 9. *Riv. monop. tab.* 80?

*Chamædryas &c.* *Magn. hort. tab.* 52.

*In alpinis Sabaudia &c.* 24.

Rad. stolonifera. Caul. recti, glabri, nigricantes. Fol. petiolata, oblonga, carnosae, nitida, subtus pallidiora. Cal. fuscus. Cor. purpurasc. Differt a *T. Chamædryas*, caul. 1-fesquiped. erecto, glabro; nec palm. diffuso, piloso.

28. *flavum*. *T.* fol. ovatis, obtuse ferratis: bracteis integerr. concavis: caule fruticoso: fl. racemosis, ternis. *Syst. veg. ed.* 14. *Sabb. hort.* 3. *tab.* 89. *Riv. mon. tab.* 10.

*Chamaedrys* &c. *Morif. hist. 3. f. 11. tab. 22. f. 1. Clus. hist. 1. p. 348*

*In Italia, Hispania &c. ad rupes aridas* 24.

Caul. 2-ped. Fol. petiol. basi integerr. undulata, dura, utrimq. subhirsuta, supra atro-virid. nitida, subtus canescentia: floralia sessilia, concava. Verticilli multi. Fl. utrimq. 3. pedunculati. Cor. ochroleuca, vel alba, raro purpur.

29. *montanum*. T. fol. lanceolat. integerr. subtus tomentosis: corymb. terminali. *Syst. veg. ed. 14.*

*Polium VIII. Clus. 363.*

*Polium maius. Cord. hist. 124.*

*Aiuga &c. Riv. mon. 15.*

*In Europæ siccis* 24.

Caul. multi, breves, ad terram strati. Fol. remoti, prima ovata, oris contractis. Spica brevis, capitata. Cor. exalbido-lutea. *Odor gratus, aromaticus.*

30. *supinum*. T. fol. linearibus, margine revolutis: corymbo terminali. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. austr. 5. tab. 415.*

*Polum montanum &c. Lob. ic. 488.*

*In agro Viennensi* 24.

*Ad fine priori.* Caulicul. pl. fruticosi, ramosi. Fol. subsessil. conferta, integerr. acutiuscula, supra virid. glabra, subtus subrugosa, villosa, incana. Capitula densa. Cor. alba. *Odor aromaticus.*

31. *pyrenaicum*. T. fol. cuneiformi-orbiculat. crenatis, pilosis: corymbo terminali. *Syst. veg. ed. 14.*

*Polium &c. Bocc. masf. 2. tab. 61. Barr. rar. tab. 1086. Fol. male.*

*In Pyrenæis* 24.

Caul. flexuosi, ramosi, pilis longis, densis, albis adspersi. Fol. breviter petiol. basi productiore, integerr. venosa. Corymbi subrotundi, densi. Fl. magni. Cor. albo-rubro col. mixta.

32. *Polium*. T. caul. prostrato: fol. sessil. oblong. obtusis, crenatis, tomentosis: spicis subrotund. *Syst. veg. ed. 14.*

b. *P. luteum. Black. tab. 456. Morif. hist. 3. f. 11. tab. 2. f. 1.*

c. *Polium album. Lob. ic. 486.*

*In Italia, Hispania &c. 24.*



Fol. sessil. linear. apice crenata.

b. Suffrutex ramis flexilibus, tomento albo, denso obtusis. Cal. hispidus. Cor. lutea.

a. Caul. tomentosus. Fol. elliptica, seu lanceol-linear. apice incisa, obtusa, tomento breviter incana; axillaria angustiora. Capitula 1-3. plerumq. terminalia, compacta, foliis magis albidiora. Flos T. *Pseudo-hysopi*.

33. *capitatum*. T. caul. erecto: fol. lanceolat. crenatis, tomentosis: capitul. pedunculat. *Syst. veg. ed. 14.*

*Polium* &c. *Barr. ic. 1047.*

b. *Polium monspeliacum*. *Bauh. hist. 3. p. 699.*

*In Hispania, Gallia &c. 24.*

*Habitus Origani Majoranæ, sed tomentosum, & angustifolium. Capitula subrotund. Cor. alba, lituris violac.*

34. *pumilum*. T. caule procumbente, tomentoso: fol. linear. planis, quadrifariam confertis: capitul. terminalibus, sessilibus. *Syst. veg. ed. 14.*

*Polium. Barr. ic. 192. b. 1093.*

*In Hispania.*

Caul. tomentosus. Fol. obtusa, margine reflexo, supra læte virid. subtus canescent. Capitula tomentosa. Cor. cœrul.

35. *spinosum*. T. spinosum calyc. lab. super. ovato; cor. resupinatis; pedunculis geminis. *Syst. veg. ed. 14.*

*Chamædryas &c. Bauh. prod. f. 117. Moris. hist. 3. f. 21. tab. 22. f. 17.*

b. *Scordium* &c. *Corn. Canad. 123. Barr. rar. tab. 202.*

*In Lusitanicæ collibus, ærvis ☉.*

Odor obsolete gravis. Caul. decumb. ramosus, subviscidus. Spinæ oppositæ, ovatæ, rigidæ. Fol. mollia; caulina infer. petiol. oblonga, incisa, seu pinnatifida; super. sub spinis ovata, sæpe integerr. Peduncul. axillar. Bract. sub singulo fl. parva, oblonga. Cor. albicans. Stam. brevissima.

*chium.*

T. fol. 3-fid. fl. axillaribus, solitar. fol. longioribus: caule diffuso. *Schreb. (sub Aiuğa) unilab.*

*An Gmel. it. 2. tab. 26. f. 1.*

*In Insula Chio.*

Simile T. *Chamæpythi*, sed tenerius, & stri-

ctius. Flos multoties ma. Cor. lutea, lab. crena profundiore.

*brevifolium*. T. fol. lanceol. obtusis, integerr. revolutis: fl. solitar. calyc. muticis. Schreb. *unilab*.

*Teucrium frutescens Stæchadis* &c. T. Cor.

*In maritimis Cretæ* ß.

*Simile* T. *cretico*. Fruticul. cubitalis; cortice luteo, rimoso, ramis annotinis pubescentibus. Fol. breviter petiol. supra pilis brevibus adspersa, subtus tomentosa, *Stæchadi arabicæ* similia, sed dimidio breviora. Fol. axillar. min. fasciculata. Cor. extus villosa.

*parviflorum*. T. fol. multifid. linearibus: racemo decomposito; pedicell. elongatis, divaricatis. Schreb. *unilab. cum fig.*

T. *or. latifolium* &c. T. Cor.

*In Armenia*.

Planta incana. Caul. sub 3-ped. herbaceus, erectus, ramosus, sulcatus. Fol. magna, cordat-ovata, 2-part. floralia parva, 3-part. indivisa. Racemus ramis horizontalibus, basi nudis. Fl. parvi, patuli. Cor. vix calyce longior, cœrul.

*nitidum*. T. fol. ovat. crenatis: floralibus integerr. verticillis dimidiatis, racemosis: caule bifariam barbato. Schreb. *unilab*.

*In Mauritania* ß.

*Simile* T. *flavo*. Caul. fruticosus. Fol. breviter petiol. basi integra, antice crenis obtusis, margine reflexis incisa, glabra, nitida, nervo medio basi barbata, obtusa, dura; floralia sub lanceol. Cor. purpur.

*regium*. T. fol. ovatis, antice dentatis: floralibus integerr. sessilibus: verticillis racemosis: caule ramoso. Schreb. *unilab. Pluk. alm. tzb. 367. f. 2.*

*In Hispania* ß.

*Non est Piperella Barr. & Bocc. Simil. T. multiflora*. Fruticul. diffusus, sesquiped. ramis pubescentibus. Fol. parva, breviter petiol. supra medium 2-3-dent. marginibus reflexis, acuta, fere concava, satore virid. nitida, subtus incana. Verticilli contigui. Flos vix ma. T. *Chamædry*. Cor. purpur.

*quadratum*. T. fol. ovato-rhombéis, dentat. subtus niveis: verticill. racemosis. Schreb. *unilab*.

*Chamædryas hispanica, saxatilis* &c. *Tourn. I. R. H.*

*In Hispania.*

Caul. erectus, vix spitham. basi ramosus, tomento niveus. Fol. *Mari* litoria, breviter petiol. supra nitida; floralia concava, apice dentata, pubescent. Racemus brevis. Fl. *Mari*.

*Scordiodes.* T. fol. oblongis, cordatis, amplexicaul. crenatis, lanuginosis: fl. axillaribus: pedunc. geminis. *Schreb. unilab.*

*Chamædryas cretica palustris* &c. *T. Cor.*

*In Creta.*

Caul. lanatus. Fol. rugosa, minus *Scordio*, profunde crenata. Fl. ma.

*Salviastrum.* T. fol. ovalibus, crenulat. rugosis, subtus tomentosis, petiolat. racemo secundo. *Schreb. unilab.*

*Chamædryas fruticosa, Lusitanica* &c. *Tourn. I. R. H.*

*In Lusitania*  $\mathcal{U}$ .

Caul. erectus, subviscidus, pubescens. Fol. basi, apiceque rotundata, inæqualiter crenulata, reticulata, supra villo sericeo cana, subtus albidia, *Salvia* æmula, sed min. breviter petiol. floralia lanceol. acuta. Racemus brevis. Fl. *Scorodaniæ*. Cal. pilosus. Cor. extus villosa. Stam. curva.

*rotundifolium.* T. corymb. terminalibus: fol. subrotundis, crenatis, villosis. *Schreb. unilab.*

*Polium hispanicum.*

*Chamædryas* &c. *Tourn. I. R. H.*

*In rupibus altissimorum montium Regni Valentini*  $\mathcal{U}$ .

Caul. flexuosus, in breves ramos divisus, villo molli, albo oblitus. Fol. min. *pynenai*, basi excisa, integra, profunde, & obtuse crenata, margine reflexo, supra virid. villo molli, cano tecta; subtus villosiora. Corymbi subrotundi, paucifl. Fol. floralia lanceol. Cal. angulis 10. striatus, villosus.

*Buxifolium.* T. corymb. terminalibus: fol. ovalibus, apice crenatis, rugosis, villosis. *Schreb. unilab. Barr. obs. 1086.*

*In rupibus Regni Valentini*  $\mathcal{H}$ .

Suffrutex flexuosus, villo denso, niveo tectus.



Fol. supra medium crenis sub 3. obtusa, rugosa, subtus convexa, & incaua. Petioli breviss. villosi, albi. Corymb. subrotundi, densi, multifl. solitarii, seu terni. Fl. imbricati, patuli. Fol. floralia lanceol-obtusa, pilosa. Cal. pilosus. Cor. parva.

*flavesceus.* T. capitul. subrotund. fol. lineari-lanceol. antice crenatis, tomentosis; summitatibus flavis. Schreb. unilab. Barr. ic. 1073.

In Gallia australi.

Cum *T. aureo* confundi solet; sed differt fol. angustioribus, lanceol. (novellis linearibus); capitulis parvis, paucifl. calyc. non agulato, carinato; summitatibus non aureis, sed eleganter sulphureis. Capitula terni-plura, ut in fig. Barrel.

*Achæmenis.* T. corymb. densis: fol. inverse lanceolat. antice crenatis, tomentosis, incanis; floralibus fl. longioribus. Schreb. unilab. Moris. hist. 3. f. 11. tab. 2. f. 12.

*Polium montanum* 5. Clus. p. 362.

T. *Polium maritimum*, *supinum*, *venetum*. Lin. var. In littoribus maris Adriatici &c.

Caul. tomentosus. Fol. subtus dense tomentosa, coriacea, obtusa, rugosa; floralia petiol. fere elliptica; superiora integerr. Corymb. terminal. quandoq. lateral. breves, basi laxiores. Cal. angulatus, albus. Cor. brevis, acuta, purpur.

*Pseudo-hyssopus.* T. corymb. rotundatis, laxis: fol. oblong. antice crenatis, tomentosis, incanis: caul. corymbifero, lanato. Schreb. unilab.

*Hyssopium Dioscor.* Col. ceph. 1. tab. 67.

T. *Polium*. Lin. E.

In montibus aridis; apricis Italiae, Creta &c. f.

Suffrutex dodrant. basi procumbens, ramosus, lanatus. Fol. sessil. lanceol-oblong. obtusa, basi integer. incana. Rami floriferi foliosi, sæpe 5-fid. corymbum compositum efformant. Capitula laxa. Fl. horizontal. Fol. floralia ovata. Cal. angulatus, albus. Cor. alba, macula lutea in fauce.

*Valentinum.* T. capitul. subrotund. breviter pedunculat: fol. linearibus, crenatis: caule erecto, incano. Schreb. unilab. Barr. Obs. ic. 1048.

In Regno Valentino &c.

*Simile T. Teuthrio, a quo differt caul. erecto, tenuiore: fol. perangustis, obsolete crenatis, tomento perenni, subius densiore, incano; obtusis: capitul. numerosis, minoribus, incanis: fl. minoribus. Cal. albicans.*

*lusitanicum. T. capitul. laxis: fol. linear. obtusis, crenulat. incanis: caule corymbifero, pubescente. Schreb. unilab.*

*Polium lusitanicum supinum &c. Tourn. I. R. H. In Lusitania 24.*

*Maius, & viridius T. Pseudo-hyssopo, & fl. ma. Fl. quoadq. terni. Caul. adscendens, tomento albedo, raro adpersus. Fol. longa, obtusa, basi angustiora, a medio crenis parvis incisa, rugosa, virid. subtus magis incana. Capitul. subrotund. paucifl. Fl. erecti, inferior. patuli. Cal. angulatus, dense tomentosus. Cor. alba.*

*pyncophyllum. T. capitul. subrotund. fol. linear. revolutis, antice crenatis, confertis; cauleq. dense tomentosus. Schreb. unilab. Barr. Obs. ic. 1096.*

*In Hispania 24.*

*Tota planta tomento albo, denso testa. Caul. spitham. basi procumb. ramis adscendentibus. Fol. obtusa. Capitula terminalia, ac lateralia, parva. Fol. floralia ovata, obtusa. Cal. parvus, tomentosus. Cor. alba.*

*angustissimum. T. capitul. terminalibus, pilosis: fol. linear. integerr. subnudis: caule erecto. Schreb. unilab. Barr. Obs. ic. 1080. bona.*

*In Hispania 25.*

*Suffrutex digital. basi flexuosus, filiform. tomentosus. Fol. omnium angustiss. margine revoluta, vix pubescent. obtusa; inferiora minora, confertiora. Capitula parva, solitaria, densa, e ternis conglomerata. Fol. floralia ovalia. Cal. viridis, pilis rarioribus, ore barbatis. Cor. vix calyc. longior, alba.*

*cælestis. T. capitul. terminalibus, tomentosus: fol. linear. integerr. incanis: caule erecto. Schreb. unilab. Barr. Obs. ic. 1081. bona.*

*In præcelsis montibus Regni Valentini 25.*

*In multis cum priore, & T. Valentino convenit. Cor. parva, alba.*

*Thymifolium. T. capitul. terminalibus, paucifl. fol. petiolat.*

ovat. obtusis, subtus tomentosis: caule procumbente. *Schreb. unilab. Barr. Obs. ic. 1062. bona.*

*In Regno Valentino h.*

Suffrutex digital. ramosus, tomentosus. Fol. conferta, quandoq. ovat-lanceol. parva, incana. Cal. incanus. Cor. purpur.

*japonicum.*

T. fol. ovatis, acuminat. ferratis, petiolat. racemis nudiusculis, verricillato-spicat. *Burm. Ind. Pluk. amalt. tab. 441. f. 2.*

*In Japonia, & Java.*

Caul. procumb. (non erectus, ut in *fig. Pluknetii*). Fol. glabra, nitida. Racemi terminal. geniculati, binis superioribus ex alis, verticillis adproximatis, spicati. Cor. minima, cœrul.

*trifidum.*

T. fol. lanceolat. trifidis: peduncul. axillar. 3-fl. *Retz. fasc. 1. p. 21.*

*Ad cap. b. Spei.*

Caul. 4-gonus, ramosus, foliosus, hirtus. Fol. opposita; maiora lobo, minora dente utrimq. acuto incisa, cæterum integra, supra scabra, subtus flavo-tomentosa. Pedunc. oppositi. Cal. pubescens. Cor. purpurasc. lab. extus pubescente.

*speciosum.*

*T. Hill. hort. Kevenf.*

*In Amer. boreali u.*

Caul. 2-pedal. ramosus, firmus. Fol. cordata, crenata. Spicæ multæ axillar. & terminal. speciosiss. Cor. rosea.

*Betonicum.*

T. fol. lanceolat. ferratis, utrimq. acutis: racemis terminalibus: caule florifero, brachiato. *Herit. Stirp. nov. fasc. 4. tab. 40.*

*Salvia maior &c. Sloan. Jam. 1. tab. 3. f. 3.*

*In Madera h.*

Suffrutex pulcher, 2-cubit. Rad. ramosa, cinerea. Caul. erectus, teres, ramosus. Rami oppositi, patuli, apice floriferi, brachiati. Turiones 4-goni, canescenti-virides, pubescentes. Fol. opposita, petiolata, lato-lanceol. basi integra, parce nervosa, costa, venisq. subtus prominentibus, supra lineatis; subtus glauca, molliter subpubescentia, plana, patentiss. seniores reclinata, 2-4. pollic. longa, 15-24. lin. lata. Petioli tercies fol.



breviores, teretes, cinerei, subpubescentes. Racemi terminales, & summorum fol. axillares, quasi in paniculam brachiatam digesti, erecti, pedunculati, simplices, quasi ternati, bracteati, pubescentes, 4-6. poll. longi. Fl. oppositi, pedicellati, bractearum axillares, solitarii, patuli, pomum redolentes, purpur. 6. lin. longi, & lati. Bract. oppositæ, sessil. lanceol. integræ, patentiss. pedicello longiores.

*heterophyllum*. T. fol. ellipticis, crenatis: fl. lateralibus, solitariis; lab. cor. extus lanato: ramis heterophyllis. *Herit. Stirp. nov. fasc. 4.*

*In Madera.*

Singularis fol. heterogenis discoloribus in diversis ramis. Fl. purpur.

*abutiloides*. T. fol. cordat. acuminat. dentatis: racemis lateralibus, nutantibus. *Herit. Stirp. nov. fasc. 4.*

*In Madera* h.

Fol. maxima *Sidæ*. Fl. lutei.

*gnaphalodes*. T. fl. subcapitatis, solitariisq. fol. linearibus, ferratis, lanatis. *Herit. Stirp. nov. fasc. 4.*

*Polium montanum* V &c. *Clus. hist. 1. 362. Barr. ic. tab. 2083.*

*In Hispania.*

Differt a T. *Polio* fl. solitar. latiusculis, vix capitellatis, nec capitulis subrotundis; fol. linearibus, nec oblongis.

848. SATU-REIA. Flos Thymi, sed galea acute emarginata. Stam. distantia.

1. *juliana*. S. verticillis spicat. & densius dispositis.

S. verticillis fastigiatis: fol. lineari--lanceolat. *Syst. veg. ed. 14. Moris. hist. 3. f. 11. tab. 17. f. 4.*

*In Hetruriæ monte S. Juliano; in Thyrrheni maris asperis* &c. 24.

Tota planta ex purpureo--albicans. Caul. fruticos. sarmentosus. Fol. ima crebra, glabra. Verticill. 9-20. Cor. purpur.

2. *Thymbra*. S. verticill. subrotundis, hispidis: fol. oblong. acutis. *Syst. veg. ed. 14. Sabb. hort. 3. T. 71.*

*Thymbra legitima*. *Clus. 1. p. 358.*

*Thymum creticum* &c. *Barr. rar. tab. 898.*

*In Creta, Tripoli* &c. *collium locis saxosis* 24.

Caul. pl. fruticosi, lanuginosi, purpurasc. ramulis alternis. Fol. *Thymi*, subhirsuta. Fl. dense verticillati. Verticil. 4-5. subnudi. Cor. purpurasc.

3. *græca*. S. peduncul. lateralibus, subtriflor. involu-cell. calyce brevioribus. *Syst. veg. ed.* 14.  
S. *annua* &c. *Morif. hist.* 3. f. 11. tab. 17. f. 2.

*Clinopodium* &c. *Pluk. alm. tab.* 84. f. 8. *Alp. exot. tab.* 264.

*Ad Archipelagum, in agro Nicænsi* 24.

Facie convenit cum *S. montana*, a qua differt fol. minus mucronatis; sed præcipue corymbis fl. qui utrimq. non foli, sed bini: involucrum in nostra minimum est; in montana vero longitudine corymbi. Fol. infer. ovata, *Thymi*, subtus purpurascens; reliqua magis linear. in superna fol. pagina sunt quasi micæ, seu atomi splendentes. Cor. extus purpurasc. intus albido-purpurasc. maculis 3. purpur. ad cor. basin, quarum intermedia maxima. *Adultior in sequentibus annis corymbis solitar: primo geminis.*

4. *montana*. S. peduncul. lateralibus, solitar. fl. fastigiat. fasciculat. fol. lineari-lanceol. mucronat. *Syst. veg. ed.* 14. *Sabb. hort.* 3. tab. 64. *Scop. Fl. Carn. ed.* 2. tab. 30.

S. *perennis*. *Riv. mon.* 41.

*Saxifraga secunda*. *Cam. epit.* 717.

*In Hetruria, Narbona, Pedemontio, locis apricis scopulosis, subalpinis* 24.

Caul. spitham. frutescens, ramosus. Fol. dura, integerr. glabra, non ciliata; ima reflexa, super. patula. Ex utraq. ala racemus ramis 3-fl. pedunculis foliolis suffultis. Cor. albida.

5. *hortensis*. S. peduncul. bifloris. *Syst. veg. ed.* 14. *Sabb. hort.* 3. tab. 70. *Black. tab.* 419. *Ludw. ed. tab.* 199.

S. *altera*. *Cam. epit.* 487.

*In Italia* &c. ☉.

Caul. palmar. subhirsutus, pubescens, ramosiss. Fol. linearia. Cor. ex albido-purpur.

6. *capitata*. S. fl. spicato-capitat. fol. carinatis, punctatis, ciliatis, albescentibus. *Syst. veg. ed.* 14.  
*Thymum legitimum*. *Clus. hist.* 1. p. 357.

414 DIDYNAMIA GYMNOSPERMIA.

*Thymum creticum*. *Barr. ic.* 897.

*In Creta, Græcia &c.* 4.

Caul. pedal. fruticosi. ramosus. Fol. min. maioribus intermixta. Cor. purpurasc.

7. *spinosa*. S. ramis spinosis: fol. hispidis. *Syst. veg. ed.* 14.  
*Don. Ital.* 21.

*In Creta* h.

Caul. pedal. fruticosus. Fol. ad apicem ramulorum conferta. sessil. lingulata.

8. *viminea*. S. peduncul. axillar. 3-fl. involucris linearibus: fol. lanceolat-ovat. integerr. *Syst. veg. ed.* 14.

*In Jamaica*.

*Habitus Cunila*, sed *flam.* 4. Fol. lineata, quandoq. subtus tomentosi. Involuc. 2-phyll. Fl. parvi, breviter peduncul.

- Thymifolia*. S. *Scop. Fl. Carn. ed.* 2. tab. 29.

S. *Dioscoridis Matth.*

*In Carniola*.

Fol. ovata, rariter dentata. Pedunc. ramosi.

Fl. corymbosi. Calyc. obtuse dent. & 15--striati.

849. THYM-BRA. Cal. subcylindricus, bilabiat. utrimq. linea villosa exaratus. Cor. galea obtusa, 2-fida: barba 3-fida, laciniis fere æqualibus. Styl. femibifidus.

1. *spicata*. T. fl. spicatis. *Syst. veg. ed.* 14. *Barr. rar. tab.* 1230.

*Thymum &c. Pluk. alm. tab.* 116. f. 5.

*In Macedonia, Libano, Pedemonio, locis montosis* 4.

Caul. dodrant. lignosi, geniculati, incani. Fol.

*Hyssop*, rigida, atro-virent. minoribus intermixtis. Foliol. in summis caulibus, margine lanuginoso. Fl. ex axillis bractear. terni, purpur.

2. *verticillata*. T. fl. verticillat. *Syst. veg. ed.* 14.

*Hyssopus montana. Dalech. hist.* 394.

*In Europa australi* h.

Caul. vix pedal. Fol. opposita, lineari-lanceol. integerr. punctata: floralia paulo latiora, acutiora, sed ciliata. *An prioris var.?*

850. HYSSO-PUS. Galea suberecta, crenata, bifida, segmentis ovatis. Barba trifida, segmentis lateralibus



acutis ; medio lato , emarginato , crenato .  
Stam. recta , distantia .

1. *officinalis* . H. fol. lanceolat. spicis secundis . *Syst. veg. ed.*  
14. *Jacq. austr.* 3. tab. 254. *Black. tab.* 296.  
*Sabb. hort.* 3. tab. 79. *Ludw. æt. tab.* 40.  
*Dod. pempt.* 287.

*In Austria , Valle Augustæ , Sibiria* 24 .

*Odor acutus* . Caul. cubital. ramotus . Fol. opposita , sessil. integerr. satore virid. Verticil. densi , spicati . Cor. cœruleo--rubra , vel alba .

2. *Lopanthus* . H. cor. resupinat. stamin. inferioribus cor. brevioribus : fol. cordat. *Syst. veg. ed.* 15. *Jacq. hort.* 2. tab. 182.

*In China septentr.* 24 .

*Planta villosa , & subviscida , odore aromatico , ingrato* . Caul. 2-ped. ramosi . Fol. opposita , breviter petiol. obtusa , rugosiss. supra atrovirent. quandoq. terna . Pedunc. axillar. solitar. multifi. Cor. purpureo-cœrulesc.

3. *Nepetoides* . H. caul. acuto , quadrangulo . *Syst. veg. ed.* 14. *Jacq. hort.* 1. tab. 69.

*Betonica* &c. *Herm. par. tab.* 106. *Pluk. alm. tab.* 150. f. 3. *Morif. hist.* 3. f. 11. tab. 4. f. 11.

*In Virginia , Canada* ♂ .

Caul. erect. 5-ped. virid. vel purpurasc. hirsutii . Rami adscendentes . Fol. opposita , petiol. ovata , acuminata , ferrata ; infer. cordata . Spicæ longæ , verticill. dentis . Bract. sessil. cordatæ , acumin. integræ . Cor. ochroleuca , quandoq. purpur.

854. NEPE-  
TA . Cal. tubulosus , incurvus , 5-dentat. denticulis tribus labii superioris erectis ; binis lab. inferioris deflexis . Cor. incurvata : galea erecta , plana , emarginata : barba 3-partita ; laciniis lateralibus sursum flexis , acutis ; media lata , concava , ferrata .

1. *Cataria* . N. fl. spicatis ; verticill. subpedicellat fol. petiolat. cordatis , dentato-ferratis . *Syst. veg. ed.* 14. *Fl. Dan. tab.* 580. *Black. tab.* 455. *Sabb. hort.* 3. tab. 80.

*Cataria herba* . *Dod. pempt.* 99.

*In Europa* 24 .

Caul. 2-ped. ramosus , brachiatus . Rami axillar.

3-fid. verticillis spicatis terminati. Fol. Urticæform. mollia, tomentosa. Stipul. feracæ. Fl. unilateral. Cor. subcarnea, maculis rubris. *Var. duplo min non ramosa.*

2. *pannonica*. N. fl. paniculat. fol. petiolat. cordat. obsolete crenatis. *Syst. veg. ed. 14. Moris. hist. 3. f. 11. tab. 6. f. 6.*

N. *nuda*. Jacq. *ausr. 1. tab. 24.*

Menthastrum &c. *Clus. hist. 2. p. 32.*

*In Austria, Pannonia &c. 24.*

*Odor gravis.* Caul. 2-ped. ex ramis tandem paniculari. Fol. breviter petiol. supra glabra, subtus pubescent. pallide, & sordide virid. caulina infer. cordata. Cor. albo-rubescens; in planta culta punctata.

3. *violacea*. N. verticillis pedunculat. corymbosis: fol. inferioribus petiolat. cordato-oblong. dentatis. *Syst. veg. ed. 14.*

N. *montana* &c. *Barr. ic. 601. Bocc. mus. 2. tab. 36.*

*In Hispania, Carniola &c. 24.*

Altitudo humana. Caul. angulis cœrulescent. Verticilli. diffiti, racemosi, racemis dichotomis. Lab. punctatum, pallidum: tubus ferrugin.

4. *amboinica*. N. fl. subverticillatis: fol. cordatis, obrutis, crenatis: bract. ovatis. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*

N. *indica* &c. *Moris. hist. 3. f. 11. tab. 6. f. 7. Hort. mal. 10. tab. 90.*

*In Amboina h.*

Caul. suffruticos. Rami erecti, 4-gon. pubescent. inferne purpurascens. Fol. opposita, petiol. supra lineata, mollior. subtomentosa, viridia, subtus venosa. Petiol. breves, apice dilatati. Bract. 2. minimæ. Cor. lab. super. breve, album; infer. violac.

4. *ucranica*. N. fl. paniculatis: fol. sessil. lanceolat. ferratis, nudis. *Syst. veg. ed. 14.*

*In Ucraina.*

Cor. cœrulescens.

6. *incana*. N. florum paniculis axillaribus: fol. petiolatis, ovatis, ferratis, tomentosis. *Syst. veg. ed. 14. Thumb. Jap.*

*In Japonia.*

Caul.

Caul. decumbens, spitham. & ultra, herbaceus, nudus. Fol. semipollic. petiolis lineam longis, opposita, patentia. Panicul. oppositæ, fastigiatae, 3-fid. *Differt a seq. fol. ovat-oblong. nec cordatis: fl. paniculis axillaribus.*

7. *Nepetella*. N. fl. racemosis; racemul. sub 5-fl. fol. cordato-lanceolat. acute sinuato-dentatis, tomentosis. *Syst. veg. ed. 14.*

*In Europa australi 4.*

*Triplo minor Cataria*. Fol. angustiss. Fl. verticillato-spicati. Calyc. nudi, striati. Cor. alba. Anth. coerul. Bract. angustiss. patentibus. *Odor vehemens.*

8. *nuda*. N. florum racemis verticillat. nudis: fol. inferioribus cordat-oblong. sessilibus, serratis. *Syst. veg. ed. 14.*

*N. pannonica. Jacq. Austr. 2. tab. 129.*

*Mentha cataria, angustioribus &c. Bauh. hist. 3. p. 236.*

*In Helvetia, Hispania &c., in collibus 4.*

Caul. 2-ped. glabri, stricti, quadrifolci; seniores atropurpur. Fol. *Stachydis palust.* sessil. obtusa, venosa, nuda, utrimq. scabra. Racemi brachiati, bracteis linearibus. Fl. distantes. Cor. albido-rufescens, palati barba albidâ, fauce punctis purpur.

9. *hirsuta*. N. fl. sessilibus, verticillato-spicatis; verticillis tomento obvolutis. *Syst. veg. ed. 14.*

*Horminum spicatum &c. Bocc. sic. tab. 25. f. 2.*

*In Sicilia.*

*Planta arida odore Lavandulae*. Caul. 2-cubit. Fol. *Sclareae*. Spicae longissim. coerul. Cor. purpureo-coerul.

10. *italica*. N. fl. sessilibus, verticillato-spicatis; bracteis lanceolat. longitud. calycis: fol. petiolat. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. hort. 2. tab. 112.*

*In Italia alpibus 4.*

Caul. 1-fesquiped. villosus, parum ramosus. Fol. cordata, obtusa, crenata, subvillosa, subrugosa. Spicae terminales. Verticilli remoti, densi, sessiles. Bract. latere albidiores. Calyc. erecti, æquales. Cor. ex carneo-albescens.

11. *tuberosa*. N. spicis sessilibus, terminalibus: bracteis ovatis, coloratis: fol. summis sessilibus. *Syst. veg. ed. 14.*



*b. N. tuberosa, spicata &c. Sabb. hort. 3. tab. 82.  
Bocc. mus. 2. tab. 36. Barr. ic. 1232.*

*In Hispania, Lusitania &c.*

Rad. tuberosa. Caul. in horto 4-ped. toti ramosi. Fol. cordat-oblong. obtusiuscula, rugosa, grosse serrata; infer. incana, tomentosa. Spica terminal. longa, 6-unc. subinterrupta. Bract. numerosæ, erectæ, acutæ, nervosæ, rubræ, marginæ pubescentes, calyces obtegentes. Fl. violac. 6-8. *Var. b. procumbens est.*

12. *scordotis*. N. spicis terminalibus, sessilibus: bracteis subcordat. villosis: fol. cordatis, obtulis. *Syst. veg. ed. 14. Alp. exot. tab. 283. Clus. hist. 2. p. 312.*

*In Creta &c.*

Caul. ped. pilosus. Fol. opposita, petiol. crassiuscula, crenata, rugosa, tomentosa. Bract. lanceol. pilosæ. Cal. pilosus. Cor. alba, punctis purpurascens. prædita.

13. *virginica*. N. capitulis terminalibus: staminibus flore longioribus: fol. lanceol. *Syst. veg. ed. 14.*

*Clinopodium &c. Pluk. alm. tab. 85. f. 2. Moris hist. 3. f. 11. tab. 8. fig. ult.*

*In Virginia &c.*

Caul. erecti, cubital. rigidi, ad genicula ramosi. Fol. opposita, sessilia, pollicem longa, angusta. Verticilli 2-3. Fl. exigui. Cor. lab. super. ferratum, et non concavum. Cor. alba.

14. *malabarica*. N. spica verticillata; bracteis filiformibus: fol. ovato-lanceol. inferne integerr. *Syst. veg. ed. 14.*

*In Malabar &c.*

Caul. erecti, obtusanguli, tomentosi. Fol. petiol. serrata, tomentosa. Verticil. plurimi, remoti. Bract. binæ sub singulo fl. pubescent. Cal. villosus. Cor. pallide violac. Lab. super. lanceol. integrum, concavum, margine revolutum, erectum, obtusum: inferius longius, latius, 3-part. intermedio lobo max. crenulato; margine deflexum.

15. *indica*. N. cor. lab. super. integerr. breviss. *Syst. veg. ed. 14. Moris. hist. 3. f. 11. tab. 6. f. 7.*

*Katu-Kurka. Hort. mal. 10. tab. 90.*

*In India &c.*

*Simil. priori*. Caul. e viridi-albicant. Fol. lato-

oblonga. Fl. verticillato-capitati. Cor. persico-aureo-pallida.

16. *multifida*. N. fl. spicatis: fol. 2-pinnat. linearibus. *Syst. veg. ed. 14.*

*Lavandula* &c. *Gmel. Sib. 3. tab. 55.*

*In Sibiria* ☉.

Caul. erectus, brachiatus, 4-gonus. Fol. nuda, cordata, lacin. obtusis. Spica terminal. sessilis, hexagona, alba. Fl. parvi, albi. Lab. super. erectum, acute 2-fid. infer. 3-fid. lacin. lateralibus emarginatis, media biloba, subcrenata.

17. *pedinata*. N. fl. spicatis, secundis; cor. minimis: fol. cordatis, nudis: caule frutescente. *Syst. veg. ed. 14.*

*In Jamaica* ☿.

Caul. orgyal. brachiatus, lævis, vix fragrans. Fol. petioll. ferrata, venosa, Spicæ terminales, interruptæ, vix foliatæ. Verticilli fastigiati, pedunculati, secundi; bract. plurimis, fetaceis. Cor. lutea. vix calyce ma. limbo 5-fido, lacin. 4. æqualibus, acutis, patentibus, lab. purpurasc. subrotund. *Flores hyeme.*

18. *lavandulacea*. N. spica compacta: fol. ovatis, inciso-ferratis, lineatis. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*

*In Sibiria* ♀.

Caul. spitham. ped. erectus, brachiatus, teres, purpurasc. albido-pilosus. Fol. opposita, petioll. profunde obtuse ferrata, *Veronica offic.* similia, infima integerr. Spica terminal. obtusiuscula. Fl. omnino sessiles, bracteati. Cal. fusco--cœrulesc. pilosus. Cor. violac. in hoc genere maxim.

*americana*. N. fol. ovato-acut. ferratis: spicis imbricatis, acuminat. *Burm. Plum. Amer. L. 162. f. 2.*

*tomentosa*. N. (Cataria) tomentosa; fol. ellipticis, acute ferratis: verticillis spicatis. *Hall. helv.*

*In Helvetia*.

Non est N. italica Lin. cum nostræ fol. peracute sint. Altior N. Cataria, 4-ped. & ultra, ramosiss. ramis longioribus. Fol. tota tomentosa, longiora, angustiora vulgari, ut in *Sideritide arvensi*. Stipul. capillac. Cal. totus tomentosus. Cor. violac. *Odor Pulegii virulentior.*

420 DIDYNAMIA GYMNOSPERMIA.

852. LAVAN-Cal. cylindricus, 5-dentat. bractea suffultus.  
DULA. Cor. galea 2-part. Barba 3-part. Stam. intra  
tubum.

1. *Spica*. L. fol. sessil. lanceolato-linear. margine revolu-  
tis: spica interrupta, nuda. *Syst. veg. ed. 14.*  
*Sabb. hort. 3. tab. 72.*

a. L. *angustifol.* Black. tab. 294. Dod. *pempt.*  
273.

b. L. *Latifolia* Black. tab. 295. *Datur altera var.*  
*tomentosa*.

*In Europa australi* H.

*Odor suavis*. Caul. cubital. tomentosus. Fol. su-  
periora sessil. albescent. Fl. spicato-verticilla-  
ti. Verticil. sub 8-fl. Cal. tomentosus. Cor.  
cœrul. Tota planta tecta tomento ex pilis;  
ramulis furcatis.

2. *Stœchas*. L. fol. sessil. linear. margine revolutis: spica  
coarctata, comosa. *Syst. veg. ed. 14. Black.*  
*tab. 242. Clus. hist. 1. p. 344. Var. p. 344.*  
*longioribus ligulis.*

*In Europa australi, locis apricis, maritimis* H.

Caul. 1-2-cubit. fruticosus. Fol. incana. Fl. in  
spicam quadrangulam dispositi. Squamæ imbric-  
atæ, pilosæ. Bract. lato-ovatæ, subtrilobæ,  
purpureo-violac. Cor. purpur. *Var. aphylla*.

3. *dentata*. L. fol. sessil. linear. pectinato-pinnatis: spica  
coarctata, comosa. *Syst. veg. ed. 14.*

*Stœchas crispa* &c. *Clus. hist. 1. p. 346.*

*In Hispania, Oriente* H.

Caul. ped-cubit. Fol. subtus albescent. Bract. ter-  
minal. coloratæ. Cor. purpur. *In cæteris con-*  
*venit cum priore.*

4. *pinnata*. L. fol. petiolat. pinnat. foliol. cuneiformibus:  
spica imbricata. *Syst. veg. ed. 14. Lin. junior*  
*Diff. de Lavandula tab. 1. Act. Medic. Svec.*  
*T. I. tab. 9. Jacq. rar. tab. 9.*

*Habitat* . . .

Caul. ramosiss. cortice fuscescente. Rami iunio-  
res 4-goni, dein teretes. Fol. circumscriptio-  
ne lato-ovata, ubiq. obtusiss. plana, crassula,  
mollia, incana, opposita. Foliol. oblonga,  
modo integerr. modo superne 2-3-fid. Pedunc.  
erecti, subped. aphylli, incani, molles, su-  
perne 4-goni. Spicæ terminales, plerumq.  
ternæ, erectæ; obtuse 4-gon. Bract. ad sin-



gulos fl. ovatae, acutae, erectae, integerr. concavae, calyce paulo longiores. Cor. pallide violac. odora.

5. *multifida*. L. fol. petiolat. pinnat. foliol. decursive pinnatifid. spica quadrangulari, angulis spiralibus. *Syst. veg. ed. 14. Burm. Ind. tab. 38. f. 1. Clus. hist. 2. p. 345.*

b. L. fol. longiore &c. *Comm. rar. tab. 27.*

c. L. *canariensis* &c. *Pluk. alm. tab. 303. f. 5.*

*In regione Baetica ♂.*

Caul. quandoq. cubit. ramulis hirsutis. Fol. cinerea, lanuginosa. Spica brevior, spiralis. Cor. coerulea.

6. *carnosa*. L. fol. petiolat. ovato-cordat. serratis, carnosis: spica 4-gona; calyc. recurvatis. *Syst. veg. ed. 14. Lin. diff. cit. tab. 2. Act. Medic. Svec. T. I. tab. 9.*

*Intra rupes prope Sadraffam h.*

Tempore efflorescentiae aphylla. Spica p.<sup>a</sup> pyramidata, dein teres, tandem in cylindrum elongatur.

853. **SIDERITIS.** Cal. sub 5-fid. Galea erecta, plerumque 2-part. Barba 3-fida, laciniis lateralibus acutis, media subrotunda. Stam. intra tubum cor. Stigma brevius involvens alterum.

\* *Ebracteata.*

1. *canariensis*. S. fruticosa, villosa: fol. longe petiolat. cordato-oblong. acutis: spicis verticillat. ante florescentiam nutantibus; ramis divaricatis. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. hort. tab. 30.*

Stachys &c. *Pluk. alm. tab. 322.*

*In Canariis h.*

Planta tomentosa, odore non grato. Caul. sesquiped. Fol. subtus magis incana. Spicae longae, peduncul. verticillis remotis, densis, sub 9-fl. Involuc. breve, setaceum, hirsutum. Cal. hirsutus, mucronatus. Cor. alba.

2. *cretica*. S. fruticosa, tomentosa: fol. petiolat. cordato-oblong. obtusis: ramis divaricatis: spicis verticillat. *Syst. veg. ed. 14.*

Stachys &c. *Comm. hort. 2. tab. 99. fol. subtus alba.*

*In Creta h.*

Frutex 3-ped. & ultra, ramis densissime tomen-

toſis, niveis. Fol. crenata, utrimq. tomentoſa, potiſſimum ſubtus, ſupra virid. ſubtus nivea. Spica e dichotomia ramorum, pedunculata, pendula, tomentoſa, nivea, una cum calyc. obtuſis. Fl. ſub 8: in ſingulo verticillo. Cor. alba.

3. *Syriaca*. S. fruticoſa, tomentoſo-lanata: fol. lanceol. integerrim. fl. verticillatis. *Syſt. veg. ed. 14. Sabb. hort. 3. tab. 40.*

b. *Stachys* &c. *Barr. ic. 227.*

*In Creta* h.

Fruticul. facie *Salviæ*, ſed longior. Fol. *Salviæ*, infer. petiol. ſuper. ſeſſil. Cor. ex albo flavoſcens.

4. *perfoliata*. S. herbacea, hiſpido--pilofa: fol. ſuperioribus amplexicaulibus. *Syſt. veg. ed. 14.*

*In Oriente?*

Caul. erectus. Fol. floralia cordata, acuminata, integerr. Cor. alba, venis ruſis.

5. *montana*. S. herbacea, ebracteata; calycibus cor. maioribus, ſpinofis; lab. ſuper. 3-fid. *Syſt. veg. ed. 14. Jacq. auſtr. 5. tab. 434. Col. ecphr. 1. tab. 196.*

*In Italia* ☉.

*In ſaxoſis creſca; in pratis procumbens. Habitus ſequentis. Planta hirsuta.* Caul. ped. ſæpe ramosus, totus folioſus. Fol. oppoſita, lanceol-acuta, ſupra medium rariter ſerrata; ſumma integerr. ſub 5-nervia. Fl. per totum caulem verticillati, verticill. 6-fl. Cor. flava, limbo atro-purpur.

6. *elegans*. S. herbacea, ebracteata, villoſa: caule diſfuſo: calyc. laciniis ſubæqual. ſpinuloſis. *Syſt. veg. ed. 14. Murray Comm. Gottin. 1779. Vol. I. tab. 4.*

*Habitat* . . .

*Odor Stachydum. Habitus reſert S. romanam: cor.*

*S. montanam.* Habitus villoſus. Caul. ped. a baſi ramosus, hirsutiſſ. ramis compoſitis. Fol. rarius infra ovat-oblong. ſerraturis obtuſis, excepta fol. extremitate; petiolata. Verticilli 6-fl. Cor. calyce paulo longior, ochroleuca, extus hirsuta.

7. *romana*. S. herbacea, ebracteata, decumbens: calyc. ſpinofis; lab. ſuper. ovato. *Syſt. veg. ed. 14. Moris hiſt. 3. f. 11. tab. 12. f. 5.*

*In Agriſ Europæ auſtralis* ♂.

Caul. depressi, rigiduli. Fol. sessil. ovata, hirsuta, spinulosa. Cor. alba (*Marrubii*), lab. super. tantum emarginato. Verticil. 6-fl.

\*\* *Bracteata*.

8. *incana*. S. suffruticosa, tomentosa: fol. lanceol-linear. (plerumq. omnibus integerr.) fl. bracteifq. dentat. *Syst. veg. ed. 14.*

*Hyssopus* &c. *Barr. ic. 239. Bocc. mus. 2. tab. 67. f. 2.*

*In Hispania* &c. *h.*

*Habitus Lavandulae, sed tomentoso-incanus*. Rami multi, ped. erecti, 4-gon. albi. Fol. lineata; infer. lineari-lanceol. supra nuda; superior. remotiora, linear. Bract. cordatae, subspinosae. Verticill. 6-fl. Cor. flava; lab. super. erecto, lineari, saepe 2-fid. infer. 3-fid. intermedia quadruplo latiore.

9. *hyssopifolia*. S. fol. (longe) ellipticis, quandoq. subcrenatis: bract. cordatis, dentato-spinosis: calycibus aequalibus. *Syst. veg. ed. 14.*

S. VII. *Clus. hist. 2. p. 41. Barr. ic. tab. 172. & 329.*

*In Hetruria, Pyrenæis* &c. *14.*

*Simil. sequenti, caule magis tomentoso*. Rad. crassa, longa, rugosa. Caul. multi, ped. erecti, hirsuti. Fol. sessilia viridia, nervosa, subhirsuta. Verticil. densi, 6-fl. in spicas breves collecti. Cal. villosus. Cor. ochroleuca, galea supra purpurascens.

10. *Scordioides*. S. fol. ellipticis, acute dentat. bract. ferratis, aristatis: verticillis spicatis.

S. fol. lanceolat. subdentat. supra glabris: bract. ovat. dentato-spinosis: calyc. aequalibus. *Syst. veg. ed. 14. Barr. ic. 343. Lob. ic. 528.*

*In Hetruria, Monspeli* *14.*

*Odor gravis, non absque aromate*. Caul. cum fol. villosi, supra terram parum perennantes, adscendentes, simplic. Fol. sessil. obtusa, profunde crenata, sicca. Cor. lutea. *Differt a priore, caulibus magis tomentosis: fol. profunde dentatis. A sequenti caulibus erectioribus: fol. supra saepe glabris: spicis ovatis, non interruptis: bract. ovatis, dentato-ciliatis; cor. etiam lab. super. luteo.*



424 DIDYNAMIA GYMNOSPERMIA.

11. *hirsuta*. S. caulibus decumbentibus, hirtis: fol. lanceolatis, obtusis, dentat. pilosis: bract. dentatospinosis. *Syst. veg. ed. 14. Sabb. hort. 3. tab. 52.*

S. III. *Clus. hist. 2. p. 40.*

*In Italia, Hispania, Gallia.*

Caul. palmar. & ultra. Fol. sessil. rugoso-plicata. Bract. cordatae. Verticilli remotiss. sessiles, 6-fl. Cor. flava, maculis rubris adspersa, tubo incurvo; lab. super. semibifid. lineari, reflexo, erecto, niveo; infer. minimo.

12. *ciliata*. S. herbacea; fol. ovat. ferratis: bract. ciliatis. *Syst. veg. ed. 14. Thumb. Jap.*

*In Japonia.*

Tota planta villosa. Caul. erectus, ped. & ultra, ramis, & ramulis inflexis. Fol. vix pollicar. petiolata, acuta, subtus pallida, supra punctis impressis pertusa. Spicae terminal. erectae, digital. lanceol. Bract. imbricatae, sub-orbiculatae.

13. *lanata*. S. caul. erecto: fol. cordatis, obtusis, villosis: spica oblong. calycibus muticis, lanatis. *Syst. veg. ed. 14.*

*In Aegypto, Palaestina ☉.*

Planta spitham. tota lanata. Caul. simpl. Fol. subsessil. obsolete crenata. Spica terminal. e verticillis 6-fl. remotis. Bract. ovatae. Cor. atro-violac. longitudine calycis.

854. MEN-  
THA. Cor. subaequal. 4-fida, lacinia latiore emarginata. Stam. erecta, distantia.

\* *Spicatae.*

1. *Auricularia*. M. spicis oblongis: fol. sessil. cordat-oblongis, ferratis, pilosis: staminibus cor. longioribus. *Syst. veg. ed. 14.*

*Maiorana foetida Rumph. amb. 6. tab. 16.*

*In India aquosis.*

Caul. sesquiped. pilosus. Fol. in nonnullis regionibus glabra. Spicae foliosae. Verticill. sub 14. Cal. 5-fid. Cor. exalbo-purpurascens. Filam. pilosa.

2. *niliaca*. M. spicis oblong. fol. sessil. ovatis, ferratis, villosis. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. hort. 3. tab. 87. Juss. in demonstrat. H. R. P.*

*In Aegypto prope Nilum.*

*Differt a priore fol. ovatis, & filamentis glabris.*  
 Odor aromaticus, sed debilis. Caul. pedal.  
 adscendentes, villosi, tandem ramosi. Fol.  
 utrinq. villosa. Spicæ ferme cylindricæ, den-  
 siss. caulina erigitur; inferior. proximæ hori-  
 zontaliter patent. Fl. parvi. Cor. pallens, col.  
 violac. mixta.

3. *sylvestris*. M. spicis oblong. fol. sessil. oblongis, ferratis,  
 subtus tomentosis: staminibus cor. longioribus.  
*Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 484.*  
 Menthastrum &c. *Black. tab. 292. Riv. monop.*  
*tab. 52. Bauh. hist. 3. p. 321.*

*In Europa, ad fossas 24.*

Fol. incano-glaucæ, & mollia. Cor. subcœrul.  
 aut nivea. Simil. M. rotundifoliæ: differt fol.  
 longioribus, angustioribus, elliptico--lanceolat.  
 acutis.

4. *viridis*. M. spicis oblongis: fol. lanceol. nudis, ferratis,  
 sessilibus: staminibus cor. longioribus. *Syst.*  
*veg. ed. 14.*

M. spicata &c. *Bauh. hist. 3. p. 220.*

*In Europæ vineis, collibus 24.*

Simil. priori, sed fol. latiora, satore virid. Caul.  
 3-ped. rufescent. valde ramosi. Cor. albido-  
 cœrul.

5. *rotundifolia*. M. spicis oblongis: fol. subrotund. crenatis,  
 rugosis, subsessilibus. *Syst. veg. ed. 14.*

Menthastrum &c. *Bauh. hist. 3. p. 219.*

*In aquosis Europæ 24.*

Caul. 2-ped. ramosi, villosi. Fol. crispa, cras-  
 sa, albescentia; infima hirsuta. Verticil. nudi.  
 Cor. ex albo-rubra, vel alba.

**\*\* Capitata.**

6. *crispa*. M. fl. capitatis: fol. cordatis, dentatis, undu-  
 latis, sessilibus: staminibus cor. æquantibus.  
*Syst. veg. ed. 14. Bauh. hist. 3. p. 217. Moris.*  
*3. f. 11. tab. 8. f. 5. Riv. mon. tab. 50.*

*In Helvetia, Hircynia &c. 24.*

Caul. erectus, cubital. & ultra, ramosiss. Fol.  
 sessil. vel breviter petiol. rotundo-lanceol. acu-  
 ta, denticulata, hirsuta. Fol. sub verticill.  
 exigua.

7. *hirsuta*. M. fl. capitatis: fol. ovat. ferratis, subsessil.  
 pubescentibus: staminibus cor. longioribus.  
*Syst. veg. ed. 14.*

*b. M. Sifymbrium &c. Raii. Angl. 3. tab. 10. f. 1.*

*In aquosis Angliæ &c. 24.*

*Differt a sequenti fol. magis sessilibus, hirsutis. An var.?*

8. *aquatica*. *M. fl. capitatis: fol. ovatis, ferratis, petiolatis: staminibus cor. longioribus. Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 673. Black. tab. 32.*

*M. palustris &c. Riv. mon. tab. 49.*

*Sifymbrium sylv. Dalech. hist. 677.*

*In Europa, ad aquas 24.*

*Planta non hirta. Caul. cubit. villosus. Fol. villosa, quandoq. ex nigro-rubent. odore Pulegii. Cor. dilute purpur. fauce villosa.*

9. *piperita*. *M. fl. capitatis: fol. ovatis, petiolat. staminibus cor. brevioribus. Syst. veg. ed. 14. Raii. Angl. 3. tab. 10. f. 2.*

*In Anglia 24.*

*Sapor Piperis acer.*

\*\*\* *Verticillatæ.*

10. *fativa*. *M. fl. verticillatis: fol. ovatis, acutiuscul. ferratis, crispis: staminibus cor. longioribus. Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 794.*

*M. crispa &c. Bauh. hist. 3. p. 216.*

*In Europa australi 24.*

*Minus hirta sequenti. Caul. 2-ped. & ultra, villosi, in imo purpur. Fol. rugosa, atro-virid. Cor. cœrul.*

11. *gentilis*. *M. fl. verticillat. fol. ovatis, acutis, ferratis: staminibus cor. brevioribus. Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 756. Sabb. hort. 3. tab. 50.*

*M. verticillata &c. Bauh. hist. 3. p. 216.*

*M. quarta. Fuch. hist. 291.*

*In Europa australiore 24.*

*Simillima M. arvensi, at minus hirta. Olor Ocymi; sapor Melissæ. Caul. rubri. Fol. sat ure virid. Verticilli laterales. Calyc. adpersi punctis resinosis. Cor. infima lacinia acuta.*

12. *arvensis*. *M. fl. verticillat. fol. ovatis, acutis, ferratis, staminibus cor. æquantibus. Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. Moris. hist. 3. f. 11. tab. 7. f. 5.*

*In Europæ agris humidis, & inundatis frequens post messem 24.*



Caul. diffusi, pedal. ramosiss. Planta tota hirta.  
Verticilli lateral. breves, densi, tomentosi.  
Calyc. canescentes. Cor. subcœrul. lacinia in-  
fima obtusa.

13. *austriaca*. M. fl. verticillat. cor. lacin. omnibus obtusis:  
fol. subovat. villosis: staminibus, cor. bre-  
vioribus. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. austr. 5. tab.*  
*430. All. Fl. Ped. tab. 75. f. 2.*

*In Austria &c. locis udis 24.*

M. *arvensi* valde similis: differt statura min. odo-  
re: brevitate staminum: maiori hirsutie &c.

14. *exigua*. M. fl. verticillat. fol. lanceolat-ovatis, acutis,  
dentatis, glabris. *Syst. veg. ed. 14.*

M. *hortens. quarta. Fuchsf. hist. 291.*

*Calaminta aquatica &c. Lob. ic. 505.*

*In Helvetia, Anglia &c. locis subhumidis 24.*

Similis M. *arvensi*; sed odor diversus: planta al-  
tior: fol. multo ma. verticill. luxioribus: st.  
ma. subcœrul. aut roseis.

15. *canadensis*. M. fl. verticillat. fol. lanceolat. serratis, pilo-  
sis, petiolat. staminibus cor. æquantibus.  
*Syst. veg. ed. 14.*

*In Canada.*

Differt a priore, caul. altiore, non ramoso, val-  
de piloso: fol. dimidio angustioribus, acutiori-  
bus, profundius serratis, obscurioribus. Calyces  
5-dent. subæqual. Cor. 4-fid. lacin. super. ob-  
longa, longiore, integra; reliquis æqualibus  
Styl. cor. longior, apice 2-fid.

26. *Pulegium*. M. fl. verticillat. fol. ovatis, subcrena-  
tis: caulibus repentibus, subteretibus: stami-  
nibus cor. longioribus. *Syst. veg. ed. 14. Sabb.*  
*hort. 3. tab. 49. Ludw. ed. tab. 195. Riv.*  
*mon. tab. 23. f. 1. Black. tab. 302. Fuchsf.*  
*hist. 199.*

*In Europa inundatis 24.*

Odor gratus. Caul. subhirsuti. Fol. petiolat. ad  
basin verticillata. Fl. verticilli globosi, densi,  
minus distantes. Cor. purpur. cœrul. alba.

17. *cervina*. M. fl. verticillat. fol. linearibus: bracteis pal-  
matis: staminibus cor. longioribus. *Syst. veg.*  
*ed. 14.*

*Pulegium angustifol. Morisf. hist. 3. f. 11. tab.*  
*7. f. 7. Riv. mon. tab. 23. f. 2. Black. tab.*

*304.*

*In Helvetia, & Gallia 24.*

Odor gratus. Caul. suberect. pedal. & ultra, ramosus. Fol. in medio latiora, obtusa, tota punctata, ut in *Hyperico*. Cor. dilute cœruli.

18. *canariensis*. M. fl. capitatis, axillaribus dichotomis: fol. ovat. crenatis: caule arborecente: flaminibus cor. brevioribus. *Syst. veg. ed. 14. Pluck. alm. tab. 307. f. 2.*

*Heliotropium* &c. *Comm. 2. tab. 65.*

*In Canariis.*

Caul. 3-ped. cortice fusco: rami lanuginosi. Fol. opposita, petiol. nervosa, supra virid. subtus incana, utrimq. lanuginosa. Fl. longe peduncul. albi.

19. *plumosa*. M. panicul. terminalibus, dichotomis: fol. petiolat. ovatis, ferratis, subtus albo-tomentosis: caule fruticoso. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*

*In Teneriffa.*

*Differt a priore, cui similis, paniculis plumosis, & fol. subtus albidioribus &c. Cor. parva.*

20. *perilloides*. M. racemis lateralibus, secundis. *Syst. veg. ed. 14.*

*In India 24.*

*Simil. Perilla ocymoides*. Caul. 2-ped. Fol. longe petiol. ovali-lanceol. dentata. Bract. copiosæ. Fl. minimi. Stam. cor. breviora.

- Kahirina*. M. fol. ovato-lanceol. acutis, ferraturis descenditibus. *Forsk. Suppl. Æg.*

*In Arabia.*

Fol. breviter petiol. Verticil. pedicellati, 8-10-æ. Stam. cor. breviora.

855. *PERILLA*. Calyc. lacinia suprema breviss. Stam. distantia. Styl. duo connexi.

1. *ocymoides*. P. *Syst. veg. ed. 14.*

*Melissa maxima* &c. *Ard. Specim. 2. tab. 13.*

*Cottam. Hort. mal. 10. tab. 77.*

*In India ☉.*

Caul. 3-5-ped. simpl. strictus, obtusus, 4-angul. hirtus. Fol. ovata, ferrata, nudiuscula, petiolis longitudine folior. Racemi terminal. & lateral. erecti, hirti. Fl. solitar. f. terni, parvi, albi. Bract. subfoliaceæ.

856. *GLECOMA*. Cal. 5-fid. Cor. galea 2-part. barba 3-fida, lacinia media latiore, emarginata. An-

therarum singulum par in formam crucis con-  
nivens.

1. *hederacea*. G. fol. reniform. crenatis. *Syst. veg. ed. 14.*  
*Ludw. eccl. tab. 62. Knorr. del. 2. tab. G. 1.*  
*Hedera terrestris. Black. tab. 225. Riv. monop.*  
*tab. 67.*

*Chamæcissus. Fuchf. hist. 876.*

*In Europæ sepibus 24.*

*Flagella repentia. Cauliculi erecti, palmar. Fol.*  
*longe petiol. inferiora reniform. super. sæpe*  
*cordato-acum. Fl. axillar. semiverticillati. Ver-*  
*ticil. 4-8-fl. fl. sessilibus. Cor. cœrul. lineis*  
*purpur. galea obtusa, semibifida. Var. fl. al-*  
*bo; & altera fl. ma.*

857. **LAMIUM**. Cal. 5-fid. aristatus. Cor. lab. superius for-  
nicatum, etiam emarginatum: lab. infer. cor-  
difforme, 2-lobum: faux utrimq. margine den-  
tata.

1. *Oryala*. L. fol. cordatis, inæqualiter, arguteq. ferratis:  
cor. fauce inflata: calyc. colorato. *Syst. veg.*  
*ed. 14.*

*L. pannonicum. Scop. Fl. Carn. ed. 2. tab. 27.*

*L. montanum &c. Till. pis. tab. 34. f. 2?*

*Galeopsis maxima &c. Clus. hist. 2. p. 35.*

*b. Papia garganica &c. Mich. gen. tab. 17.*

*In Pannonia, Italia &c., montosis, saxosis, um-*  
*brofis 24.*

*Planta tota odore Lamii. Caul. cubit. ad basin,*  
*& sub verticillis sanguineo col. tinctus. Fol.*  
*longe petiol. supra lucida; recentia subtus ru-*  
*bella. Primi verticilli 14-fl. Cor. rubra, fau-*  
*ce lineis saturioribus. Anth. villosæ, obscu-*  
*ræ.*

2. *lævigatum*. L. fol. cordatis, rugosis: caule lævi: calyc.  
glabris, longitudine tubi cor. *Syst. veg. ed.*  
*14. Sabb. hort. 3. tab. 34.*

*L. purpur. Pluk. phyt. 198. f. 1.*

*L. subrotundo &c. Bocc. mus. 2. tab. 23.*

*Galeopsis fl. purpurasc. &c. Bauh. hist. 3. p. 321.*

*In Italia, Helvetia, Sibiria 24.*

*Haller. cum L. maculato coniungit. Caul. erecti,*  
*pedal. & ultra, fragiles, purpurasc. sub-*  
*hirsuti. Fol. infer. longe petiol. Urticæform.*  
*ferrata, foetida. Verticil. utrimq. sub-5-fl.*

*Cal. similis priori. Cor. ampla, lab. inferiore*  
*patente, nec lacin. reflexis.*



430 DIDYNAMIA GYMNOSPERMIA.

3. *garganicum*. L. fol. cordatis, pubescentibus: cor. fauce inflata; tubo recto, dente utrimq. gemino. *Syst. veg. ed. 14. Till. pis. 34. f. 2.*  
*In Gargano monte, ad castrum Angeli &c. 24.*  
 Caul. pubescent. Fol. obtusiuscul. sublobato-ferrata. Verticil. multifl. Cor. purpurasc. lab. super. 4-dent. patente, nec compressio.
4. *maculatum*. L. fol. cordatis, acuminat. verticill. 10-fl. *Syst. veg. ed. 14. Col. ecphr. 2. tab. 192.*  
*In Italia, Germania 24.*  
*Valde adfines L. albo; diversum cor. purpur. foliis area longitudinali alba: petiol. non dilatatis: fl. utrimq. 5. nec 10. Macula fol. alba disparet æstate.*
5. *album*. L. fol. cordatis, acuminat. ferratis, petiolat. verticill. sub-20 fl. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 594. Ludw. æt. tab. 162. Black. tab. 33. Knorr. del. 2. tab. N. 8.*  
*Galeopsis. Cam. epit. 865. Riv. monop. tab. 62. In Europæ cultis 24.*  
 Odor gravis. Caul. cubit. ab imo ramosus, nodis raris, subhirsutus. Cal. macula fusca notatus. Cor. ampla, pallida, raro carnea.
6. *purpureum*. L. fol. cordat. obtusis, petiolat. (in summo ramo congestis). *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 532. Knorr. del. 2. tab. N. 9.*  
*Galeopsis min. Riv. mon. tab. 62.*  
*L. rubrum. Black. tab. 152. f. 1.*  
*Urtica iners altera. Dod. pempt. 153.*  
*Galeopsis 2. Tabern. 545.*  
*In Europæ cultis ☉.*  
 Odor foetidus. Caul. semiped. prope terram ramosus, apice subnudus. Fol. infer. longe petiol. crenata; super. breviter petiol. ovatocordata. Cor. purpur. raro alba. *Var. fol. profunde incis.*
7. *amplexicaule*. L. fol. radicalibus petiolat. lobatis; superioribus amplexicaulibus, rotundis, incis. L. fol. floralibus sessilibus, amplexicaulibus, obtusis. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 752. Riv. monop. tab. 63.*  
*Morus &c. Lob. ic. 463.*  
*In Europæ cultis ☉.*  
 Caul. semiped. erecti, vix ramosi. Fol. hirsuta. Verticil. 10-12-fl. Fl. purpurasc. Cor. tubo

longo, gracili; galea ovata, villosa: barba maculata.

8. *multifidum*. L. fol. multipart. *Syst. veg. ed. 14.*

L. *orientale*. *Comm. rar. tab. 26.*

In *Oriente*.

Caul. pl. Fol. nervosa, viridia. Fl. verticillati, rubentes.

858. *GALEOPSIS*. Cor. lab. super. subcrenatum, fornicatum: lab. infer. 3-part. lacinia media crenata; fauce utrimque denticulum cavum emittente.

1. *Ladanum*. G. internodiis caulinis æqualibus: verticill. omnibus remotis: calycibus inermibus: *Syst. veg. ed. 14.*

In *Europæ sterilibus* ☉.

Caul. 1-2-ped. ramosiss. brachiatus. Fol. linearilanceol. hirsuta, rariter ferrata, vel integer. Verticil. densi. Cal. dentes vix spinosi. Cor. calyce triplo longior, limbo rubro; lab. super. vix crenato, apice subreflexo; inferiore macula lutea, striisq. purpur. *Var. fl. albo: & fol. latioribus, rhomboidæis, sericeis.*

2. *Tetrahit*. G. internodiis caulinis superne incrassatis: verticill. summis subcontiguus: cal. subpungentibus. *Syst. veg. ed. 14.*

*Cannabis spuria Riv. mon. 44.*

In *Europæ segetes, & olera* ☉.

Caul. erect. ramosus, hispidus. Fol. petiol. ovat-lanceol. ferrata, nervosa, dura. Verticil. densi, sessil. Cor. calyce duplo longior; galea crenata, hirsuta, purpurasc. barba lacin. media purpur. cæterum cor. lutea, aut alba. *Var. fl. quadruplo ma. uncialibus, versicoloribus. Barr. ic. 1158. Pluk. alm. tab. 41. f. 4.*

3. *Galeobdolon*. G. verticill. 6-fl. involucro 4-phylo. *Syst. veg. ed. 14. Knorr. del. hort. 1. tab. N. 9. n. 1.*

*Lamium fl. luteo Riv. monop. tab. 20.*

*Urtica iners &c. Dod. pempt. 153.*

In *Europæ nemoribus* ☿.

Flagella longa a radice. Caul. ped. infirmus, hirsutus. Fol. infer. petiol. cordata; summa subsessil. lanceol. quandoq. albo-maculata. Verticilli in alis superioribus sub 10-fl. Cor. lutea. *Var. fol. angustiss.*

*cannabina*. G. fol. ovat-lanceolat. ferratis: caule hirsuto:

fl. calyce quadruplo ma. *Pollick. palat. Hall. hist. 1. p. 117.*

*In Helvetia &c.*

*Simillima G. Tetrahit, sed omnia multo maiora, & molliora, nec futa in ipsam umquam migravit. Fl. albi, vel ochroleuci.*

359. BETO-NICA. Cal. aristatus, 2-lab. Cor. lab. super. adscendens, planiusculum; tubus cylindricus: inferius 3-fid. lacinia media latiore, emarginata.

1. *officinalis*. B. spica interrupta; cor. lab. lacinia intermedia emarginata. *Syst. veg. ed. 14. Ludw. ed. tab. 2. Black. tab. 46. Knorr. del. hort. 2. tab. B. 4. Sabb. hort. 1. tab. 82. Fl. Dan. tab. 726. Riv. monop. tab. 28. Dod. pempt. 40.*

*In Europæe pratis 24.*

Caul. cubit. Fol. radical. petiol. super. sessilia, subrotund-oblong. crenata, villosa. Fl. primum verticillati, dein in spicam digesti. Cor. purpureo, raro alba. *Var. minima in alpinis Helveticis.*

2. *orientalis*. B. spica integra: cor. lab. lacinia intermedia integerr. *Syst. veg. ed. 14.*

*In Oriente 24.*

Caul. 2-ped. Fol. longiora quam in *B. hirsuta*; infer. cordat-oblong. crenata, villosa; subsessil. Spica cylindrica.

3. *alopecuroides*. B. spica basi foliosa: corollis galea bifida. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. austr. 1. tab. 78.*

*Sideritis &c. Fl. Carn. ed. 2. tab. 28. Barr. ic. 339. Bocc. mus. 2. tab. 7.*

*Betonica folio &c. Bauh. hist. 3. p. 303.*

*In montibus Italicis &c. 24.*

*Odor Sambucinus.* Caul. pedal. hirsuti, raris geniculis longe nudi. Fol. cordat-ovata, nunc rotundata, nunc elongata, crenata: radicalia in cespitem diffusa; longe petiol. satis ampla; caulina duabus oppositionibus. Spica brevior, interrupta. Bract. integerr. Verticilli 16-20-fl. Cor. ochroleuca.

4. *hirsuta*. B. spica basi foliosa; cor. galea integra. *Syst. veg. ed. 14. Murray. Comm. Gou. vol. 2. tab. 3. Mont. in Zanoni. tab. 30.*

*B. alpina &c. Barr. ic. 340. bene.*

*In Apenninis 24.*

*Simil. priori, sed torosior, hirsutior, robustior, spica*



*spica brevior, crassior: cor. galea integra, nec bifida; col. purpurasc. nec flavescen. spica ovata, nec interrupta. Fol. in caul. similiter uno, alterove pari petiolato, præter par sessile sub spica. Habitus hirsutus. Caul. cubital. Fol. palmaria, cordata, obtusa, petiol. obtuse crenata; radical. longiora; caulina breviora, & angustiora. Spica brevis, ovata. Bract. 4. lanceol.*

5. *heraclea*. B. *spica calycibus lanatis; dentibus filiformibus: fol. lanceolat. nudis. Syst. veg. ed. 14.*

*In Oriente.*

Caul. & fol. fere glabra. Spica maiuscula. Involucra filiform. Cor. lutea, lab. super. vix calyce longiore; infer. 3-fido, intermedia ma. rotundata.

860. STACHYS. Cor. lab. super. fornicatum, integrum, vel leviter emarginat. infer. lateribus reflexis; lacin. intermedia ma. emarginata. Stam. deflorata versus latera reflexa.

1. *sylvatica*. S. verticill. 6-fl. fol. cordatis, serratis, petiolat. *Syst. veg. ed. 14. Sabb. hort. 3. tab. 38. Riv. monop. tab. 26.*

Galeopsis &c. *Black. tab. 84. Clus. hist. 2. p. 35.*

*In Europæ nemoribus ☉.*

Planta villosa. Caul. 3-ped. Fol. palmaria, longe petiol. hispida. Cor. galea sature purpurea, cum 3 lineis saturioribus: barba ex albo-purpurasc. *Var. fol. longioribus.*

2. *palustris*. S. verticill. sub 6-fl. fol. elliptico-lanceol. semiamplexic. sessilibus. *Syst. veg. ed. 14. Black. tab. 273. Loef. pruss. ic. 41. Riv. monop. tab. 26.*

*S. aquatica. Taber. ic. 577. bona.*

*In Europæ ripis ☿.*

Caul. 2-ped. Fol. dentata, molliter hirsuta. Calyc. sessiles. Cor. purpur.

3. *alpina*. S. verticill. multifi. folior. serraturis apice cartilagineis: cor. lab. plano. *Syst. veg. ed. 14. Sabb. hort. 3. tab. 41-Pluk. alm. tab. 317. f. 4.*

*In Germania, Helvetia &c., in spongiosis ad a l pium radices ☿.*

*Plantæ color obscurus. Odar. Melissophylli. Ca Tom. III. E e*

sæpe simplex. Fol. petiol. mollia, rugosa, hirsuta, flavo-virescent; ima cordata, suprema oblong. Verticil. sub 14-fl. subtomentosi. Cal. pedunculat. Cor. triste purpur. galea horizontali, nec erecta.

4. *germanica*. S. verticill. multifi. folior. ferraturis imbricatis: caule lanato. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 684. Jacq. austr. 14. tab. 319. Fuchsf. hist. 766. Barr. ic. 297.*

S. *montana*. *Riv. monop. tab. 27. optima.*

*In Europæ ruderatis declivibus 24.*

*Planta tota fortens, albo-lanata. Caul. 1-3-pedal. Fol. rugosa, crassa, sicca; inferiora sessil. cordata; super. breviter petiol. elliptico-lanceol. Verticilli densi: superne fl. spicati. Cal. lanuginosus. Cor. purpur. extus hirsuta. Anth. albo-flavescent. Var. fl. albo: solisq. angustioribus.*

5. *lanata*. S. verticill. multifi. fol. lanatis, subcrenulatis: caulibus basi procumbentibus, & radicanibus. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. misc. 2. p. 342.*

*Habitat*

Tota planta lana obsita. Caul. sublignosi, ex quibus alii quotannis herbacei, pedal. & ultra, erecti, parum ramosi, virentes. Fol. opposita, petiolat. ovat-oblong. acutiusc. 3-4. unc. long. minutim crenulata, venosa. Verticill. densi, superne adproximati. Cor. S. *germanicæ*, sed saturior.

6. *cretica*. S. verticill. 30-fl. calyc. pungentibus: caule hirsuto. *Syst. veg. ed. 14. Walth. hort. tab. 19.*

*In Creta 24.*

*Simil. S. Germanicæ, sed planta lurida, hirta, absq. lana alba. Fol. floral. lanceol. serrato-undulata, non vero reflexa, seu fornicata, ut in illa. Caul. 3-ped. Cor. purpurea.*

7. *glutinosa*. S. ramis ramosissim. fol. lanceolat. glabris. *Syst. veg. ed. 14.*

*Sideritis &c. Mont. in Zann. tab. 81. f. 1.*  
*In Creta.*

*Planta glutinosa, bitumen olens. Caul. brevis dodrant. ab imo ramosus. Fol. radical. in orbem posita; caulina sessil. opposita, integerr. Fl. terminal. flavi, dein albi.*

8. *spinosa*. S. ramulis spina terminatis. *Syst. veg. ed. 14. Morisf. hist. 3. f. 21. tab. 10. f. 9.*

Gaidarorhymo. *Clus. hist.* 2. p. 311.

*In occidentali Cretæ.*

Color cinereus. Caul. pedal. diffusus. Fol. inordinata, longa, digitalia, angusta. Fl. 3-4; *Salix* col. & magnitudine.

9. *orientalis*. S. fol. tomentosis, ovat-lanceol. floralibus verticillo brevioribus. *Syst. veg. ed.* 14.

*In Oriente.*

Planta alta, candicans, foetida. Cor. luteola.

10. *palæstina*. S. fl. subspicatis: fol. lanceolat. tomentosis, sessil. integerr. rugosis: calyc. muticis. *Syst. veg. ed.* 14.

S. *alba*. *Barr. ic.* 279.

Sideritis &c. *Bocc. mus.* 2. tab. 109. 112.

*In Palæstina h.*

Planta albo-tomentosa. Caul. dodrant. teretes. Fol. parum acuta. Cal. subdecagonus. Cor. lab. sup. concavum, integrum, purpurasc. margine laterali linea purpur. lab. infer. purpurasc. media mac. concava; fauce albo-maculata.

11. *maritima*. S. fol. cordat. obtusis, crenatis: bract. oblong. integerr. *Syst. veg. ed.* 14. *Jacq. hort. tab.* 70. *Betonica* &c. *Dill. elth. tab.* 42. f. 50. *Bocc. mus.* 2. tab. 127.

*In litoribus maris adriatici &c.* 24.

Caul. suffruticos. spitham. erectus, pubescens. Fol. radical. oblonga, venosa; in culta planta leviter hirsuta; in sylvestri subtoment. Spica e verticillis interrupta. Bract. ovales. Verticilli 6-fl. Calyc. lanati, 5-dent. acuti, vix aristati. Cor. luteo-pallesce.

12. *æthiopica*. S. verticill. 2-fl. *Syst. veg. ed.* 14. *Jacq. Obs.* 4. tab. 77.

Sideritis &c. *Pluk. alm. tab.* 315. f. 3.

*Ad cap. b. Spei* 24.

Habitus *Lamii* purpur. subhispido-pilosus. Caul. palmar. erectus, vel diffusus. Fol. breviter petiol. cordata, profunde, obtuseq. serrata, rugosa, subvillosa, lucida. Spicæ terminal. Cor. tubus curvus. Lab. super. breve, erectum, fornicatum, villosum: lab. inferius maximum, exprorectum, 3-fid. intermedia latissima, crenata, plana, lateralibus revolutis.

13. *hirta*. S. verticill. 6-fl. caulibus prostratis: cor. lab.



super. 2-fido, divaricato, reflexo. *Syst. veg. ed. 14. All. Fl. Ped. tab 2. f. 3.*

*Ocimum valentinum. Clus. hist. 2. p. 42.*

*In Italia, Hispania, Orientis collibus 24.*

Caul. pl. cubitales, ramosi, fragiles, fistulosi, pilis raris adspersi. Fol. petiol. cordato-oblonga venosa: infer. longe petiol. obtusa, obtuse ferrata; super. acuta, acute ferrata. Rami longe floriferi. Cal. aristatus. Cor. tubus incurvus: lab. super. fornicatum; infer. obtusiss. planum, obsolete 3-lobum. Punctula purpurascens. ad margines baseos lab. super: & in disco baseos lab. infer. cæterum cor. alba. *Planta odore Galeopsidis.*

14. *canariensis.* S. verticill. 6-fl. fol. cordatis, villosis, crenatis: caulibus suberectis: calycibus fructigeris campanulato-patentiss. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. misc. vol. 3. Ic. rar.*

*Habitat*

15. *recta.* S. verticill. subspicat. fol. cordato-ellipticis, crenatis, scabris: caulibus adscendentibus. *Syst. veg. ed. Jacq. austr. 4. tab. 359.*

*Sideritis &c. Riv. mon. tab. 70. Bauh. hist. 3. p. 425.*

*In viis, & sterilibus Europæ 24.*

Caul. sub 3-ped. rigidiusculi, pilis raris adspersi. Fol. subpetiol. quandoq. lanceol. subrugosa. Calyc. subspinosi. Cor. lutea.

16. *annua.* S. verticill. sub 6-fl. fol. ovato-lanceol. trinerviis, lævibus, petiolat. caul. erecto. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. austr. 4. tab. 360.*

*Sideritis &c. Riv. mon. tab. 69.*

*Alyssum maius. Tabern. hist. 929.*

*In Europæ agrorum margine ☉.*

*Odor Lamii. Fol. latiora priore.* Caul. in montibus erectus, in pratis procumbens, 1-3-ped. Fol. infer. ovata, obtusiss. rugosa, media petiolata, oblonga: summa sessil. lanceol. trinervia. Cor. flavæ; lab. super. marginibus lateralibus ferrugineis; recurvatum, emarginatum. Cal. mucronat.

17. *arvensis.* S. verticill. 6-fl. fol. obtusis, nudiusculis: cor. longitudine calyc. caul. debili. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 587. Sabb. hort. 3. tab. 51. Riv. mon. tab. 27. Petiv. 33.*

*b. Lamium &c. Herm. Lugd. tab. 353.*

*In Europæ arvis ☉.*

Caul. pedal. & ultra, obtusus, brachiatus, hirtus, uti petioli, & calyc. Fol. cordata, obtuse ferrata, minus hirta. Cal. sessil. mucronat. Cor. albida, cal. fere min. galea integerr. lab. 3-fid. lobo intermedio latiore, purpureo. punctato, non emarginato.

*Speciat ad Glechomæ genus, cum hac definitione.*

*G. fol. cordatis, oblong. crenatis: caul. erecto, hispido.*

*circinata.*

*S. verticill. 6-fl. fol. cordato-rotundat. crenatis. Herit. Stirp. fasc. 3. tab. 26.*

*In Barbaria 24.*

Planta mollissima. Cotyled. 2. petiolat. subrotund. planæ. Caul. nonnulli, erecti, brachiati, 4-gon. nodosi, hirsuti, medullosi, obscure violac. cubit. Rami, & ramuli oppositi, patentiss. mox adsurgentes, anulati, virid. hirsutiss. Fol. opposita, longe petiol. patent. villosa, nervosa, venosa, crenis subundulatis, læte viridia, subtus pallidiora, plana, ingrata olentia, 18-24. lin. long. & lata: superiora subsessil. Petioli hirsutiss. Spicæ terminal. erectæ, basi foliaceæ, apice bracteata, verticillatæ, hirsutæ, 4-gon. 6. poll. & ultra long. Fl. carnei, ad basin lab. infer. purpura dilutiore maculati, 6-8. lin. lon. & lati.

*Differt a S. sylvatica = fol. rotundioribus, crenatis, nec dentatis, villo aliquatenus cano: a S. hirta lab. super. integro.*

*heraclea.*

*S. hirsuta; fol. obscure virentibus, elliptico-lanceol. verticillis 10-fl. All. Fl. Ped. tab. 84. f. 1. Col. ecph. p. 131.*

*In collium locis incultis 24.*

Fol. utrimq. hirsuta, splendide virentia; radicalia petiolis canaliculatis, rugosa, obtuse dentata, non acuta. Caul. sesquipalm. toti florigeri. Fol. caulina ima radicalibus similia; cætera dentata, neque rugosa, & subsessilia, cordato-acuta. Cor. limbus hirsutus, obscure rubens.

861. BALLOTA. Cal. hypocraterif. 5-dent. 10--striat. Cor.

lab. super. concavum, crenatum: inferius 3-fid. segment. lateralibus acutis; medio plano, crenato.

1. *nigra*.

B. fol. (plerumq. oblong-ovatis, acutis) indivisis, ferratis: calyc. acuminat. *Syst. veg. ed. 14. Sabb. hort. 3. tab. 35. Fuchs. hist. 154.*  
*Marrubiastrum. Riv. monop. tab. 66.*  
*Marrubium &c. Black. tab. 136.*  
*In Europæ ruderatis 24.*

Odor foetidus. Caul. 3-ped. ramosus. Fol. petiol. villosa. Involuc. dimidiatum. Fl. plerumq. secundi. Cor. obsolete purpur. barba venis albis picta.

2. *alba*.

B. fol. cordatis, indivisis, ferratis; calyc. subtruncatis. *Syst. veg. ed. 14.*  
*In Europa 24.*

*Var. prioris, sola cor. alba diversa.*

3. *lanata*.

B. fol. palmat. dentatis: caule lanato. *Syst. veg. ed. 14.*  
*Phlomis &c. Gmel. Sib. 3. tab. 54.*  
*In Sibiria.*

Caul. ped. procumbent. alba lanugine obsiti. Fol. *Grossulariæ*, longe petiol. semi 3-5-fid. lobis obtusis, 3-dent. supra viridia, glabra, subtus lanugine alba. Fl. verticill. ad medium caulis. Cal. 5-dent. denticul. setaceis. Cor. hirsutiss. ochroleuca, extus alba.

4. *suaveolens*.

B. fol. cordatis: spicis foliosis: calyc. truncatis, aristis linearibus. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. hort. 3. tab. 42. amer. ed. 2. picta tab. 163.*  
*Mesosphærum &c. Brown. Jam. tab. 18. f. 3.*  
*Marrubialtrum &c. Sloan. Jam. hist. 1. tab. 102. f. 2.*

*In Amer. meridian.*

*Planta tota hirsuta. Odor fortis ex Melissa, & Lamio mixtus. Caul. 2-3-ped. brachiat. Fol. opposita, longe petiol. acutiuscula, sinuato-ferrata, subundulata, venosa, subtus rugosa. Pedunc. axillar. oppositi. Fl. umbellati, sessil. 4-6-fl. Cor. violac.*

5. *disticha*.

B. verticill. dimidiatis, 2-part. semispicatis. *Syst. veg. ed. 14.*  
*Marrubium odoratiss. &c. Burm. Zeyl. tab. 71. f. 1.*  
*In India.*



# DIDYNAMIA GYMNOSPERMIA. 439

*Statura Nepetæ*. Caul. pubescens. Fol. petiol. subcord. serrata, tomentosa. Bract. sublingulo fl. subulata. Cal. muticus.

862, MARRUBIUM. Cal. hypocraterif. rigidus, 10-striatus, Cor. lab. super. 2-fid. lineare, rectum.

\* *Calycibus 5-dentat.*

1. *Alysson*. M. fol. cuneiform. plicatis, 5-dent. verticill. involucro destitutis. *Syst. veg. ed. 14.*  
M. album &c. *Morif. hist. 3. f. 11. tab. 10. f. 12.*

*Alysson Galeni Clus. hist. 2. p. 35.*

*In Hispania.*

Habitus canescens. Caul. pedal. ab imo ramosus. Fol. crispa, fl. utrimq. 3. purpur. parvi. Cal. aculeati.

2. *peregrinum*. M. fol. ovato-lanceol. ferratis; calyc. dentibus setaceis. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. austr. 2. tab. 160.*

M. album &c. *Morif. hist. 3. f. 11. tab. 9. f. 8.*

M. alterum &c. *Clus. hist. 2. p. 34.*

b. M. creticum, *Dalech. hist. 962.*

*In Sicilia, Austria, Cretæ &c. siccis.*

Caul. semi-2-ped. incani. Fol. infer. aut ovata, aut rotundiora, rugosa, ex viridi-albentia; super. lanceol. Fl. utrimq. 3-5. Bract. calycibus æqual. Cor. alba.

3. *candidissimum*. M. fol. subovat. lanatis, superne emarginato-crenatis: denticul. calycin. subulat. *Syst. veg. ed. 14.*

M. hispanicum &c. *Dill. elth. tab. 174. f. 215. pertinet huc,*

*In Creta?*

Caul. 1-sesquiped. inferne humifusi, villosi. Verticill. densi. Fl. candidi.

4. *astracanicum*. M. fol. ovatis, crenatis, tomentosis, rugosiss. dentibus calyc. subulat. cor. lacin. super. acutis. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. icl. rar. tab. 7.*

*Habitat ad Astracan.*

Caul. procumbent. semiped. ramosi, ex quibus quotannis alii caul. adsurgunt herbacei, pedal. erecti, 4-goni, vix ramosi, lanate villosi, & incani. Fol. opposita, petiolat. obtusa, incana, mollia, vix odora, sapore amaro. Fl. verticilli pl. sessil. ad folia, densissimi, invo-

lucris subulatis, lanatis. Cal. 10-striat. incanus, ore lanuginoso. Cor. calyce duplo longior. Tubus cylindric. albus; limbo purpur. lab. super. lineare, erectum, 2-fid. dorso villosum: infer. 3-fid. longitudine super. laciniis lateralibus brevioribus, oblong. obtusis; media maxima, late subrotunda, emarginata, plana, antrosum porrecta.

5. *supinum*. M. dentibus calycin. rectis, setaceis, villosis. Syst. veg. ed. 14.

M. album &c. Barr. ic. 685. Bocc. mus. 2. tab. 69.

M. album hispanicum &c. Barr. ic. 686.

In Hispania, Carniola &c.

Tota planta incana. Caul. ped. Fol. subtus magis incana, ut in *Althæa*, oblonga, obtusa, crenata. Cor. alba.

\*\* Calycibus 10-dent.

6. *vulgare*. M. dentibus calycin. setaceis, uncinat. Syst. veg. ed. 14. Sabb. hort. 3. tab. 59. Ludw. cæ. tab. 145. Riv. tab. 67. Black. tab. 479. Clus. hist. 2. p. 34.

In Europæ ruderatis &c.

Habitus canescens, quandoq. villosus. Caul. multi, cubit. subramosi. Fol. subrotund. crenata, profunde rugosa, pulverulenta, odore *Mali Apii*. Verticil. densi. Cor. alba.

7. *africanum*. M. fol. cordat. subrotund. emarginato-crenat. Syst. veg. ed. 14.

M. album &c. Pluk. alm. tab. 306. f. 2.

Pseudo-dictamnus &c. Comun. hort. 2. tab. 90.

Ad cap. b. Spei h.

Caul. sesquiped. hirsuti. Fol. opposita, petiol. hirsuta, supra virid. subtus tomentoso-albida. Fl. verticill. rubri. Differt a sequenti simili, cor. galea emarginata, pilosa.

8. *crispum*. M. fol. cordat. subrotundis, crenato-subdentat. calyc. 10-dentat. muticis. Syst. veg. ed. 14.

Pseudo-dictamnus &c. Bocc. mus. 2. tab. 129.

In Italia, Hispania &c.

Caul. erectus, suffruticos. hirtus. Fol. petiol. rugosiss. subtomentosa, subtus pilosa. Cor. purpurasc. lab. super. subrotundo, obtuso, integro: infer. 3-fid. intermedia 3-fid. lateralibus porrectis.

9. *hispanicum*. M. calyc. limbis patentibus, denticul. acutis. *Syst. veg. ed. 14.*  
M. *album* &c. *Herm. par. tab. 201.*  
M. *subrotundo* &c. *Barr. ic. 797. Bocc. mus. 2. tab. 122.*  
*In Hispania 24.*  
Caul. tomentosus. Fol. subrotunda, plana, crenata, incana. Calyc. dent. alterne min. Cor. alba, intus 2 lineis sanguineis longitudinaliter prædita; lab. super. 3-4-fid.
10. *Pseudo-di-* M. calyc. limbis planis, villosis: fol. cordat.  
*Damnus.* concavis: caul. fruticosq. *Syst. veg. ed. 14.*  
*Sabb. hort. 3. tab. 47. Dod. pempt. 281.*  
*In Creta 14.*  
Tota planta tomento denso, compacto obsita.  
Fol. crenata. Fl. verticillati, sessil. Calyc. pungentes. Cor. dilute purpur.
11. *acetabulo-* M. calyc. limbis tubo longioribus, membranac.  
*sum.* angulis maioribus rotundatis. *Syst. veg. ed. 14.*  
*Dictamnus &c. Barr. ic. 129.*  
*In Creta 24.*  
Fol. cordata, obtusa, profunde ferrata, tenuia, villosa. Calyc. margo 20-angular. minoribus acutis; latioribus obtusiss. rotundatis.
- 
- indicum.* M. fol. cordatis, ferratis: calycibus 5-dentat.  
subulatis, villosis. *Burm. Zeyl. tab. 71. f. 1.*  
*In Zeylona, & Java 24.*
- plicatum.* M. fol. semiorbiculat. tomentosus, rugosis, plicato-lobatis. *Forsk. Suppl. Ægypt. Alexandria 24.*  
Cor. violacea.
863. LEONURUS. Galea elliptica, integra, concava, non incurbens. Lab. 3-fid. segmentis omnibus, aut lateralibus acuminatis. Stam. villosa. *Antheræ punctis nitidis adpersæ.*
1. *Cardiaca.* L. fol. caulinis lanceolato-trilobis. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 727. Ludw. ed. tab. 5. Blak. tab. 171. Fuchs. hist. 395.*  
*In Europæ ruderatis 24.*  
Caul. 3-ped. & ultra, ramosiss. Fol. opposita; infer. longe petiol. rotundiora: omnia venosa, rugosa, sublanuginosa. Fl. dense verticill. sessil. 7-fl. Galea extus hispida, pallide purpurea; barba alba, vel flavescens, cum maculis purpureis. *Var. cor. alba.*



442 DYDINAMIA GYMNOSPERMIA.

2. *crispus*. L. fol. omnibus acute ferratis, rugolissim. margine inæqualiter reflexis; caulinis 5-lobis. *Syst. veg. ed. 14. Murr. comm. Gott. 1777. tab.*

4.

*In rud-ratis 24.*

3. *Marrubiastrum*. L. fol. ovatis, lanceolatisq. ferratis: calyc. sessilibus, spinosis. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. austr. 5. tab. 405. Bocc. mus. 2. tab. 98.*

*In Europa, ad muros, vias, & fossus 24.*

Caul. 1-3-ped. in planta culta duplo maior, ramosus. Fol. opposita, petiol. ferrata, venosa: caulina infer. in culta rotundato-ovata, & ampla. Cor. carnea, vix cal. longior, facie *Nepetæ*; galea integra, barba intermedia non crenata.

4. *tataricus*. L. fol. tripartit. laciniatis: calyc. villosis. *Syst. veg. ed. 14.*

*In Tataria ♂.*

*Differt a L. Cardiaca, quod fol. ad petiolum usque sint divisa.*

Cor. incarnata, lab. super. erecto, fornicato, stam. obtegente: lab. infer. 3-fid. lateralibus labio superiori adproximatis; medio obcord. *Ex India or, magis glabra.*

5. *sibiricus*. L. fol. 3-part. multifid. linear. obtusiuscul. *Syst. veg. ed. 14.*

*Ballore &c. Amm. ruth. tab. 8.*

*In Sibiria, China ♂.*

*Var. prioris cor. maioribus.*

864. PHLOMIS. Cal. angulatus. Cor. lab. super. incumbens, compressum, villosum,

1. *fruticosa*. P. fol. subrotund. tomentoso--subcrenatis: involucris lanceolat. caule fruticoso. *Syst. veg. ed. 14. Sabb. hort. rom. 3. tab. 15.*

*Verbascum &c. Dod. pempt. 146.*

*b. P. latifolia &c. Dill. elth. tab. 237. f. 306.*

*In Sicilia, Hispania 24.*

Habitus incanus: odor gravis. Fol. rugosa, supra luteo-virentia, subtus albida. Verticilli sæpe 2. raro 3. Cor. lutea.

2. *purpurea*. P. involucris linear. obtusis, calyce brevioribus: fol. cordat. oblong. tomentosis: caul. suffruticoso. *Syst. veg. ed. 14.*

*Salvia &c. Pluk. alm. tab. 57. f. 6.*

*In Italia, Lusitania 24.*

- Caul. tomentosus. Fol. albida. Verticil. 6-fl.  
Cor. lob. infer. supra purpurasc.
3. *Nissolii*. P. fol. radicalibus cordato-sagittatis, utrimq. tomentosus, villosus. *Syst. veg. ed. 14.*  
*In Oriente* 24.  
Altitudo humana. Fol. obtusiusc. floral. ovata.  
Cal. hirsut. Involuc. nulla. Verticil. 6-fl. Cor. lutea.
4. *Lychnitis*. P. fol. lanceolat. tomentosus; floralibus ovatis; involucris setaceis, lanatis. *Syst. veg. ed. 14.*  
*Mill. ic. tab. 203.*  
Verbascum &c. *Lcb. ic. 558.*  
*In Europa australi* 24.  
Habitus P. fruticosi, sed fol. angustiora. Caul. cubit. Cor. vix calyc. ma. lutea.
5. *laciniata*. P. fol. alternatim pinnatis: foliol. laciniat. calyc. lanatis. *Syst. veg. ed. 14.*  
*In Oriente.*
6. *samia*. P. fol. ovatis, subtus tomentosus: involucris subulatis, stricis, 3-part. *Syst. veg. ed. 14.*  
*In Samo.*  
*Differt a sequenti, fol. ovatis, parum acumin. obsolete, & obtuse serratis, subtus tomentosus. Fl. bini. Involucra non reflexa, non hispida.*
7. *herba venti*. P. involuc. setaceis, hispidis: fol. ovato-oblong. scabris: caul. herbaceo. *Syst. veg. ed. 14. Sabb. hort. 3. tab. 17. Mont. in Zann. tab. 135.*  
*In Narbona, Persia, ad aggeres* 24.  
Caul. 2-ped. Fol. dentata, rigida. Cal. 5-dent. Cor. purpuro-violac. nonnihil albescent, extus hirsuta.
8. *tuberosa*. P. involucris subulatis, hispidis: fol. cordatis, scabris: caule herbac. *Syst. veg. ed. 14. Ad. Goett. tab. 12.*  
Galeopsis &c. *Buxb. cent. 1. tab. 6.*  
*In Sibiria campestribus* 24.  
Altitudo humana. Rad. tuberosa. Caul. purpur. Fol. ima magna, crenata; summa ovata. Calyc. dentes patentes, hispidi. Cor. purpur. galea dentata.
9. *zeylanica*. P. fol. lanceol. subserratis: capitul. terminalibus: calyc. 8-dent. *Syst. veg. ed. 14.*  
Cardiaca &c. *Pluk. alm. tab. 118. f. 4.*  
Clinopodium &c. *Pluk. phyt. tab. 164. f. 2. aut tab. 163. f. 6. aut tab. 80. f. 7.*

Herba admirationis. *Rumph. amb. 6. tab. 16. f. 2.*

In India ☉.

Caul. erectus, 2-ped. herbac. Fol. petiol. lineata, subtomentosa. Involuc. subulatum. Cal. oblique deorsum truncatus, obsolete 7-dent. dente super. longiore. Cor. alba; lab. super. breviss. fornicato, clauso, integro, hirsuto; lab. infer. magno, 3-fid. patente; intermedia ampla, subplicata, media vix triloba. Anth. nigræ.

10. *indica*. P. involuc. linearibus: calyc. unilabiatis, obliquis: fol. ovatis, pilosis. *Syst. veg. ed. 14.*

In India.

Nimis adfinis priori. Fol. petiol. basi adtenuata. Cor. *Leonuri Cardiacæ*.

11. *Nepetifolia*. P. fol. cordat. acutis, ferratis, subtomentosis: calyc. 6-8-dent. dente supremo, infimoq. max. caule herbaceo. *Syst. veg. ed. 14.*

*Cardiaca* &c. *Herm. Lugd. tab. 117.*

*Habitat Surinami.*

Caul. erectus, simpl. Fol. viridia. Cal. subpilosus. Cor. fulva, holoserice. facie, & col. P. *Leonuri*, sed triplo minor. Involuc. subulat.

14. *Leonurus*. P. fol. lanceol. ferratis, calyc. decagonis, 10-dent. muticis: caule fruticoso. *Syst. veg. ed. 14. Sabb. hort. 3. tab. 44. Knorr. del. hort. 2. tab. L.*

*Sideritis* &c. *Barth. aë. 2. p. 57. fig.*

*Leonurus* &c. *Breyn. cent. tab. 86. Seb. mus. 1. tab. 14. f. 1.*

*Stachys* &c. *Morif. hist. 3. f. 11. tab. 19. f. 27.*

*Ad cap. b. Spei H.*

*Planta florens spectatissima*. Cal. 2-cubit. Fol. 3-pollic. frequentia, alterna, patentia, pubescenti-scabra, ad basin integerr. in petiol. adtenuata. Fl. magni, verticill. sessil. Involuc. polyphyll. subulatum, reflexum, denticul. alterne minoribus. Cal. muticus. Cor. fulva, holosericea; lab. super. longo, integerr. tomentoso, ciliato; lab. infer. brevi, nudo, membranac. lateralibus reflexis, aridis; intermed. 3-fid. media emarginata.

13. *Leonitis*. P. fol. ovatis, obtusis, crenatis, subtomento-



DIDYNAMIA GYMNOSPERMIA. 445

sis: calyc. 7-dent. aristatis: caule fruticoso.

Syst. veg. ed. 14.

Leonurus min. Mill. ic. 162. f. 62.

Ad cap. b. Spei h.

Simil. priori, sed fol. ovata, magis tomentosa.

alba.

P. involucris palmato-filiformibus: fol. ovatis, ferratis. Forsk. Æg.

In Arabia.

Cor. alba; lab. super. hirsuto, præsertim margine, & intus; apice emarginato, dorso elevate striato.

chinensis.

P. fol. ovatis, ferratis, tomentoso-sericeis: calyc. verticillat. 10-dentat. Retz. Obs. fasc. 2.

In China 24.

Caul. fruticos. ramis 4-gon. hispidis. Fol. opposita, petiol. Verticil. axill. 5-6-fl. Fl. pedicellati. Cor. alba, extus hirsuta.

865. MOLUC-CELLA. Cal. ampliatus, campanulat. cor. latior, spinofus.

1. lavis.

M. calyc. campanulat. sub 5-dent. denticul. æqualibus. Syst. veg. ed. 14. Sabb. hort. 3. tab. 45.

Molucca &c. Dod. pempt. 92.

In Syria ☉.

Caul. 2-ped. Fol. opposita, petiol. cuneiform. dentata. Fl. verticillati, sessil. Cal. cor. longior. Cor. ex albo-purpureo.

2. spinosa.

M. calyc. ringentibus, 8-dentat. Syst. veg. ed. 14. Sabb. hort. 3. tab. 46.

Molucca &c. Dod. pempt. 92.

In Moluccis ☉.

Caul. 5-6-ped. Fol. 5-7-lobata. Verticil. sessil. 6-fl. Involuc. spinis 4. ternatis, linearibus, patentibus, spinosis. Cor. calyce triplo longior.

3. frutescens. M. calyc. infundibulifor. 5-fid. cor. calyc. longioribus. Syst. veg. ed. 14. All. Fl. Ped. tab. 2. f. 2.

M. persica. Burm. Ind. tab. 38. f. 2.

In Persia, & Pedemontio, in rupium fissuris h.

Fruticul. palmar. ramulis totis florigeris, dichotomis. Fol. pollic. ovalia, breviter petiol. utrimq. 2-3. profunde ferrata, pilis raris pubescentia, nervoso-venosa. Spinæ axillar.

utrimq. solitar. ternatæ, ut in *Berberide*, sed tantum ad fl. verticillos. Cal. spinosus, 10-striatus. Cor. alba, *Cardiacæ*, galea lanata.

*tuberosa*.

M. Pull. it. 3. tab. T. f. 1. 2. 3.

In *Dauria* 24.

Rad. maxima, e 2-3. tuberibus, ovatis conflans; interdum simplex, napiform. Fol. radical. longe petiol. ovata, profunde crenata, crenis obtusis. Caul. erect. dodran-pedal. 4-gono-obtusangul. brachiat. ramis binis-quaternis, ad nodos valde pilosus. Fol. caulina opposita, ad ramorum primariorum ortum, radicalibus similia, breviter petiol. super. sessil. ovato-cuneiform. crenata. Verticill. pauci, 3-4-6-fl. Cal. maximus, pallide virid. venis reticulatus. Cor. flava.

866. CLINO-Involuc. multifetum, verticillo subiectum. Cal.

PODIUM. 2-lab. Galea fornicata, divisa. Barba 3-fida, lacinia media latiore, emarginata. Stigma simplex.

1. *vulgare*. C. capitul. subrotund. hispidis: bract. setaceis. Syst. veg. ed. 14. Sabb. hort. 3. tab. 65. 66. Riv. tab. 43. Cam. epit. 563.

b. C. fol. ovatis &c. Mill. tab. 95. cor. incarnata.

In *rupestribus Europæ, Ægypti, Canadæ* 24.

Tota planta molliter hirsuta, odore subaromatico. Caul. 2-ped. villosus. Fol. ovato-acumin. rariter dent. subtus pubescent. Verticill. densiss. 40-fl. Cor. purpur. raro alba. Stigm. 2-fid. Var. *humilior*, & *altera trifoliata*.

2. *incanum*. C. fol. subtus tomentosis: bract. lanceolat. Syst. veg. ed. 14.

C. *Menthæ* &c. Dill. elth. tab. 74. f. 85.

C. *maius* &c. Moris. hist. 3. f. 11. tab. 8. f. 4.

C. *Serpentaria* &c. Pluk. mant. tab. 344. f. 7.

In *Amer. boreali* 24.

Caul. sesqui-2-cubit. ramis binis ad genicula.

Fol. opposita, acumin. odora. Cor. carnea.

3. *rugosum*. C. fol. rugosis: capitul. axillar. pedunculat. explanatis, radiatis. Syst. veg. ed. 14. Dill. elth. tab. 75. f. 86.

Scabiosæ &c. Pluck. alm. tab. 222. f. 7.

Sideritis &c. *Sloan. Jam. hist. 1. tab. 109. f. 2. In Carolina, Jamaica &c. 24.*

Caul. fruticos. 2-cubit. & ultra subhirsutus. Rami axillar. erecti, scabri. Fol. opposita, petiol. ovata, ferrata, luteo-virid. Capitula globosa. Fl. parvi, albid.

*Fruticosum.* C. caul. arborecente: fol. ovalibus, crenatis: calyc. lab. infer. subrotund. *Forsk. Æg.*

*In Arabia h.*

Frutex 3-ulnar. ramis oppositis, erectis, villosis. Fol. opposita, petiol. patentia, basi integra. Fl. verticill. sessil. in quavis axilla 9. Involuc. 4-part. filiform. Cal. 10-carinat. Cor. nivea, lab. super. villoso, margine hirsuto.

*martinicense.* C. fol. ovato-oblong. basi adtenuatis: bract. setaceis: verticill. globosis. *Jacq. amer. tab. 76. f. 75. ed. 2. pict. tab. 261. f. 45.*

*In Martinica ☉.*

Caul. erect. 2-ped. parum divisus. Fol. opposita, obtusa, inciso-crenata. Verticill. pl. in caulis superna parte nuda ad distantias positi. Fl. numerosi, parvi. *Fl. structura diversa.*

867. ORIGANUM. Strobilus 4-gonus, spicatus, calyces colligens. Flos Thimi, sed galea profundius emarginata.

1. *ægyptiacum.* O. fol. carnosus, tomentosus: spicis nudis. *Syst. veg. ed. 14. Moris. hist. 3. f. 11. tab. 3. f. ult.*

*Zatarhendi. Alp. Ægypt. tab. 95.*

*In Ægypto 24.*

Odor O. cretici, sed fortior. Caul. diffusus, 4-ped. ramosiss. Fol. petiol. cordat-lanceol. succulenta, rugosa. Spica longa. Cor. alba.

2. *Dictamnus.* O. fol. inferioribus tomentosus: spicis nutantibus. *Syst. veg. ed. 14. Sabb. hort. 3. tab. 76. Black. tab 462. Ludw. ed. tab. 134.*

*Dictamnium. Cam. epit. 472. Lob. ic. 502.*

*In Cretæ monte Ida 24.*

Planta tomentosa, & incana. Caul. ramosus. Fol. opposita, sessil. ovato-orbicul. odore grato, sapore urente, & acerrimo. Bract. maximæ, laxæ, pellucidæ. Cor. purpurasc.

3. *Siphyleum.* O. fol. omnibus glabris: spicis nutantibus. *Syst. veg. ed. 14. Herm. Lugd. tab. 463.*



*Dictamnus* &c. *Morif. hist. 3. f. 11. tab. 4. f. 2.*  
*In Phrygiæ monte Siphylo.*

*Differt a priore, cui simile, fol. glabris.*

4. *creticum*. O. spicis adgregat. longis, prismatic. rectis:  
 bract. membranac. calyce duplo longioribus.  
*Syst. veg. ed. 14.*

*b. O. monspel. Cam. epit. 468.*

*In Europa australi &c. 24.*

Fol. subsessil. integerr. *Per Hall. var. vulg. bracteis, & st. maioribus.*

5. *Smyræum*. O. fol. ovatis, acutis, serratis: spicis umbellatim fastigiatis congestis. *Syst. veg. ed. 14.*

*In Creta, & Smyræ.*

Caul. villosus. Fol. sessilia. Spicul. globosæ.  
 Cor. bracteis ma.

6. *heracleoticum*. O. spicis longis, adgregatis, pedunculat. bract. longitudine calyc. *Syst. veg. ed. 14.*

*Orega Lob. ic. 492.*

*In Europa australi, Græcia &c. 24.*

*Habitus O. sylv. sed spicæ digital. laxè imbricatæ.*  
*At differt ab O. cretico, quod bractæ vix calycibus longior. & spicæ sint pedunculat.*

7. *vulgare*. O. spicis paniculat. conglomerat. ovat-acuminat. bract. ovatis, calyce longioribus. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 638. Ludw. ed. tab. 90. Sabb. hort. 3. tab. 75. Black. tab. 280. Riv. tab. 60. Fuchsf. hist. 522.*

*In Europæ, Canada rupestribus.*

Caul. 2-ped. rubens, quandoq. ramosus. Fol. breviter petiol. denticul. subhirsuta, e viridi-obscura, minoribus intermixtis. Cor. dilute rosea, vel alba. *Var. fol. forma*

8. *onites*. O. spicis oblong. adgregat. hirsutis: fol. cordatis, tomentosis. *Syst. veg. ed. 14.*

*O. lignosum &c. Bocc. mus. 2. tab. 38.*

*Habitat Syracusæ h.*

*Habitus Maioranæ, sed lignosus. Caul. pilis longis, patulis. Fol. parva, subsess. acuta, rarius serrata; ex alis ramorum rudimenta. Spicæ villosæ. Cor. alba.*

9. *Syriacum*. O. spicis longis (sepe) ternatis, pedunculat. villosis: fol. subrotund-ovatis, villosis. *Syst. veg. ed. 14.*

*Marum &c. Lob. ic. 499.*

*In Syria.*

Habitus *Maioranæ*. Corymb. terminalis, ex ramis longioribus brachiatus. Spicæ terminal. erectæ, longæ, 4-gon.

10. *Maru*. O. spicis hirsutis: fol. ovatis, tomentos. sessilibus. *Syst. veg. ed. 14. Alp. exot. tab. 288. In Creta 24.*

Facies O. *Maioranæ*, sed rigidior. Fol. valde crassa. albida. Caul. purpurasc. adspersus villis raris. Capitula triternata, valde hirsuta, ultima sessil. caulem, ramosque terminantia. Cor. purpurasc.

11. *Maioranæ*. O. fol. ovalibus, obtusis: spicis subrotund. compactis, pubescentibus. *Syst. veg. ed. 14. Black. tab. 319.*

Amaracus &c. *Lob. ic. 498.*

b. M. *tenuifolia*. *Sabb. hort. 3. tab. 78.*

*In Lusitania, Palæstina* ☉.

Surculi lignosi. Fol. opposita, subsess. parva, integerr. albescent. subvillosa, 5-nerv. Cor. albida.

*Benghalense*. O. fol. ovatis, dentatis: spicis imbricatis, lanuginosis: bract. ovatis. *Burm. Ind. tab. 38. f. 3.*

*In Benghalæ 24.*

Caul. purpurasc. glaber. Fol. ad basin integerr. coarctata, lateralibus inæqualibus, acuminata, glabra. Spicæ oppositæ, peduncul. Fl. minimi.

368. THYMUS. Calyc. bilabiati: faux villis clausa. Galea parum emarginata: barbæ segmenta subrotunda, pene æqualia: Fl. ebracteati.

1. *Serpyllum*. T. fl. capitatis: caulibus repentibus: fol. obtusis, planis, basi ciliatis. *Syst. veg. ed. 14. Ludw. cæ. tab. 121. Black. tab. 418. Dod. pempt. 277.*

b. *Serpyllum maius*. *Sabb. hort. 3. tab. 69.*

*In Europæ aridis apricis* h.

Caul. T. *vulgari* longe minus duri; & fol. latiora. Odor gratus. Caul. ramosi, foliosi. Fol. parva, petiolat. ovata, integerr. Fl. verticillato-capitati. Capitul. subglobosa. Bract. fol. ma. Calyc. dentes ciliati. Cor. purpur. alba. Stam. longitudine cor. *Dantur pl. variet.*

2. *vulgaris*. T. erectus: fol. ovatis, revolutis: fl. verticilla-  
Tom. III. F f

to-spicatis. *Syst. veg. ed. 14. Black. tab. 221. Ludw. ed. tab. 122.*

b. *T. fol. latiore. Sabb. hort. 3. tab. 68. Dod. pempt. 276.*

*In Hispania montosis, saxosis, in Gallia, Sibiria h.*

*Caul. lignosi. Fol. parva, rigida, odora. Cor. purpurasc.*

3. *Ugis.*

*T. fl. verticillato-spicat. caule suffruticoso, erecto: fol. linear basi ciliatis. Syst. veg. ed. 14.*

*Thymum &c. Barr. ic. 777.*

*Serpyllum &c. Clus. hist. 1. p. 358.*

*In Hispania h.*

*Facies T vulg. sed fol. basi ciliata. Caul. palmar.*

*Rami multi, recurvi ante florescentiam. Fol. revoluta, supra pubescent. subtus rubra. Petiol. ciliati. Cor. alba cum staminibus.*

4. *Acinos.*

*T. fl. verticillat. pedunc. 1-fl. caulibus erectis, subramosis: fol. acutis, serratis, (fl. fol. minoribus). Syst. veg. ed. 14.*

*Acinos. Riv. monop. tab. 43.*

*Clinopodium vulg. Lob. ic. 506.*

*In Europæ cretaceis, siccis ☉.*

*Caul. semiped. hirsutus, purpur. Fol. opposita, in petiol. adtenuata, oblong. supra medium dentata, dura, margine reflexo, parva. Pedunc. rari, oppositi. Fl. minimi. Cor. violac. lab. infer. alba macula notato, fauce luteola; vel alba.*

5. *alpinus.*

*T. verticill. superioribus 6-fl. fol. obtusiuscul. rarius serratis: fl. folio ma. Syst. veg. ed. 14. Jacq. austr. tab. 97.*

*Clinopodium &c. Bocc. mus. 2. tab. 45.*

*Acini pulchra &c. Bauh. hist. 3. p. 620.*

*In alpinis helveticis &c. 24.*

*Cespites densi, procumbent. Caul. adscendent. semiped. purpurasc. villosi, ad basin sæpe ramosiss. Fol. basi adtenuata, rotundiora, vel magis angusta, acuta, vel obtusa, supra medium obiter dentata. Fl. imi utriusq. solitarii: superior. terni, odori. Cor. violac. faucibus maculosis, vel alba. Simil. priori, sed maior; & fl. triplo ma. pedunculati.*

6. *Piperella.*

*T. peduncul. multifl. lateralibus: fol. ovatis, acutis, integerr. nervosis, glabris. Syst. veg. ed. 14.*



Marum &c. *Bocc. mus. 2. tab. 227. Barr. rar. tab. 694.*

*In Hispania, Pedemontio &c.*

*Simil. Melissæ Nepetæ, sed glabra.*

Caul. fere decumbent. rotundi, spitham. simplic. aut parum ramosi, ramis primis oppositis, dein alternis. Fol. opposita, subseff. *Serpylli* odore. Caul. & ramuli circa medium florere incipiunt. Flos medius longe pedicellatus. Cor. purpur.

*Melissæ potius quam Thymo accedit.*

7. *cephalotus*. T. capitul. magnis, imbricat. bract. ovatis: fol. lanceolatis. *Syst. veg. ed. 14.*

*Tragoriganum &c. Bocc. mus. 2. tab. 43.*

*In Hispania, Lusitania &c.*

8. *villosus*. T. capitul. magnis, imbricat. bract. dentatis: fol. setaceis, pilosis. *Syst. veg. ed. 14.*

*In Lusitania &c.*

Caput oblong. vel rotundum, purpurascens.

9. *Mastichina*. T. fl. verticillat. calyc. lanuginosis; dentibus calycin. setaceis, villosis. *Syst. veg. ed. 14.*

*Marum &c. Dod. pempt. 271. Black. tab. 134.*

*In Hispania petrosis &c.*

Habitus fruticosus, villosus. Fol. *Serpylli*, incana, mastichen olentia. Verticil. diffiti, densi. Cor. alba, vel purpur. *Media inter Satureiam, & Thymum.*

10. *Tragoriga-* T. fl. verticillat. caul. suffruticoso, erecto, fol.  
*num.* acuminat. hispidis. *Syst. veg. ed. 14. Alp. exot. tab. 78.*

*Tragoriganum 2. altera sp. Clus. hist. 1. p. 355.*

*In Creta &c.*

Planta suaveolens. Caul. pedal. hirsuti. Fol. rigidiuscula. Cor. cœrulesc.

11. *virginicus*. T. capitul. terminalibus: caul. erecto: fol. lanceol-linear. *Syst. veg. ed. 14.*

*Satureia &c. Herm. par. tab. 218.*

*Pulegium &c. Moris. hist. 3. f. 12. tab. 7. f. 8.*

*Clinopodium &c. Pluk. alm. tab. 54. f. 2.*

*Serpentaria &c. Bocc. mus. 2. tab. 115.*

*In Virginia &c.*

Odor aromaticus. Caul. pedal. & ultra, subfusci. Fol. *Artemisæ Dracunculi*, crebra, opposita. Capitul. parva, subrotunda. Cor. parva, albo-cœrulesc.

- indicus*. T. repens, caulibus erectis: spicis verticillato-interruptis. *Burm. Ind.*  
*Habitat Coromandeli.*
- imbricatus*. T. caulibus decumbentibus, imbricatis: fol. ovat-acutis: fl. axillaribus, solitar. sessilibus. *Forsk. Æg.*  
*In Arabia 24.*  
 Caul. exiguus, fruticulos. Cal. striatus, fauce villis clausa, non bilabiat. sed 5-dent. Cor. rubra.
- pannonicus*. T. verticillis in summis ramis congestis: fol. ovatis, & caule hirsutis. *Hall. helv. All. Fl. Ped.*  
*Serpyllum &c. Clus. Pann. p. 628. Hist. 235. Bauh. hist. 3. 267.*  
*In Sabulosis torrentium inter alpes 24.*  
*In hortum translatus, numquam habitum mutavit.*
869. MELIS-SA. Cal. aridus, supra planiuscul. lab. super. subfastigiato, 3-fido; inferiore 3-fido. Cor. lab. super. subfornicatum, 2-fid. lab. infer. lobo medio ampliore, cordato.
1. *officinalis*. M. racemis axillaribus, verticillat: pedicell. simplicibus. *Syst. veg. ed. 14. Sabb. hort. 3. tab. 61. Black. tab. 27. Riv. monop. tab. 45.*  
*Apiastrum Lob. ic. 227.*  
*In Italia &c. collibus 24.*  
 Caul. cubit. ramosiss. Fol. infer. longe; super. breviter petiol. pene cordiform. acumin. serrata, supra hirsuta, tubus glabra, e viridi lutescent. odore Citri. Cor. pallide rubens.
2. *grandiflora*. M. peduncul. axillar. dichotomis, longitudine florum. *Syst. veg. ed. 14.*  
*Calamintha &c. Best. cyst. æst. 7. tab. 7. f. 2.*  
*In Heururix &c. montosis 24.*  
 Caul. villosus. Fol. ovata, dentata, villosa. Fl. magni, purpur.
3. *Calamintha*. M. pedunc. axillaribus, dichotomis, longitudine fol. *Syst. veg. ed. 14. Ludw. ed. tab. 33.*  
*Calamintha montana. Black. tab. 166. Riv. tab. 46. Dod. pempt. 98.*  
*In Europa clivis saxosis, sylvis apricis, & montanis 24.*  
 Caul. erectus. Fol. petiol. ovat--acumin. sup-

# DIDYNAMIA GYMNOSPERMIA. 453

dent. villosa. Panicula laxa. Cor. purpur. faucibus maculatis, & pilosis. *Odor gratus, aromaticus, Menthae adfinis.*

4. *Nepeta*. M. pedunc. axillaribus, dichotomis, fol. longioribus: caule adscendente, hirsuto. *Syst. veg. ed. 14. Black. tab. 167.*

b. *Calamintha* &c. *Bocc. mus. 2. tab. 38. 40. Riv. tab. 47.*

*In Europæ aggeribus glareosis, ad vias, & ad muros* 24.

Caul. 2-ped. duriusculi, uti tota planta, hirsuti. Fol. ovat-lanceol. rarius crenata, villosa, supra glabra, odore gravi. Bract. subulatæ. Cor. sub-cœrul. palato albo, cœruleoq. marginato; vel alba. *Var. b. ramosior est.*

5. *cretica*. M. racemis terminalibus: peduncul. solitar. breviss. *Syst. veg. ed. 14.*

*Calamintha* &c. *Barr. ic. 1166.*

*Habitat Monspeli, in Hispania, Pedemontio* 24.

*Similis priori.* Caul. humilis, palmar. rectus, atro-purpur. Fol. ovata, parce, obtuseque ferrata. Verticil. plurimi e peduncul. 1-fl. aphyllis, instar racemi ramos terminantes. Bract. lanceol. Cal. fusci. Cor. albo-purpureo.

6. *fruticosa*. M. ramis adtenuatis, virgatis: fol. subtus tomentosis: caule fruticoso. *Syst. veg. ed. 14.*

*In Hispania* ♂.

Caul. pedul. vix ramosi. Fol. parva. *Acini* similia. E summis geniculis racemi verticillati. Cor. albo-purpur.

*perennis*. M. fl. verticillat. utrimq. ternis, pedunculat. fol. oblongis, crenatis. *Forsk. Æg.*

*In Arabia* 24.

*An M. fruticosa, sed fol. utrimq. aequaliter villosa?* Caul. conferti, erecti, lignosi, spitham. Fol. semipollicar. sessil. basi linear. pilosa, integra; reliqua parte latiora, lanceol. crenata, reflexa. Bract. utrimq. ternæ, media ma. Fl. in summis alis, breves, patentes. Cal. villosus. Cor. albido-cœrulesc. maculis flavis, & cœruleis mixta.

870. DRACO-*Cal. 2-lab. Cor. faux inflata: lab. super. conc-*  
CEPHALUM, *cavum.*



# 454 DIDYNAMIA GYMNOSPERMIA.

1. *virginianum*. D. fl. spicatis: fol. lanceol. ferratis. *Syst. veg. ed. 14. Sabb. hort. 3. tab. 26. Breyn. ic. tab. 27. Hirr. act. 1712. tab. 11. Moris. hist. 3. f. 11. tab. 4. f. 1. Mont. in Zann. tab. 69.*  
Pseudo-digitalis &c. *Bocc. Sic. tab. 6. f. 3.*  
Lyfimachia &c. *Barr. ic. 1152.*  
*In Amer. septentr. 24.*  
Caul. 1-2-3-ped. simpl. Fol. opposita, sessil.  
Pedunc. ex summis alis oppositi. Cor. purpur.
2. *canariense*. D. fl. spicatis: fol. compositis. *Syst. veg. ed. 14.*  
Dracocephalo &c. *Volk. Norimb. tab. 145.*  
Camphorosma. *Moris. hist. 3. f. 11. tab. 11. fig. ult.*  
Melissa &c. *Sabb. hort. 3. tab. 27. Pluk. alm. tab. 315. f. 5.*  
Cedronella &c. *Comm. hort. 2. tab. 41.*  
*In Canariis 24.*  
Odor Camphoræ. Caul. 2-ped. ramosus, fusco-virid. glaber. Fol. petiol. ternata, rugosa: foliol. lateral. oblique lanceol. dentata; foliol. impar maius: inferiora 5-part. Spica 1-2-uncial. Cor. purpurasc.
3. *pinnatum*. D. fl. spicatis: fol. cordat. pinnato-sinuatis. *Syst. veg. ed. 14. Gmel. Sib. 3. tab. 52.*  
*In Sibiria 24.*  
Caul. fruticosi, decumbent. Fol. obtusa, lobis remotis, longe petiol. sulcata, rigida, supra intense virid. subtus incana. Spica *Melampyri arvensis*, pollic. bract. lanceol. dentato-ferratis, sæpe rubris. Cor. parva, intense cœrul. Styli fl. duplo longiores.
4. *peregrinum*. D. fl. subspicatis: fol. caulin. ovato-oblong. incis: bract. lineari-lanceolat. denticulato-spinosis. *Syst. veg. ed. 14.*  
*In Sibiria 24.*  
Caul. brachiati. Fol. petiol. mucronata, utrimq. 3-4. ferraturis spinosis. Fl. oppositi. Cor. cœrul.
5. *austriacum*. D. fl. spicatis: fol. bracteisque linearibus, par-titis, spinosis. *Syst. veg. ed. 14.*  
Chamæpithys &c. *Clus. hist. 2. p. 185.*  
*In Austria 24.*

DIDYNAMIA GYMNOSPERMIA. 455

Caul. cubital. Fol. opposita, mollia, viridia.  
Fl. ampli, cœrul.

6. *Ruyfchiana*. D. fl. spicatis: fol. bracteifq. lanceol. indivisis, muticis. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 121. Zann. nov. tab. 146.*

*Prunella* &c. *Morif. hist. 3. f. 11. tab. 5. f. 9. In Helvetia, Sibiria* &c. 24.

Caul. multi, pedal. Fol. elliptica, acuta, viridia, utrinq. 2-3-dent. oris revolutis. Fl. spicato-verticill. verticillis 6-fl. uncial. longe de calyce exeuntes. Cor. fature cœrul. hirsuta, barba maculata. Anth. nigræ, polline albo.

\*\* *Verticillata*.

7. *sibiricum*. D. fl. subverticillat. pedunc. 2-fid. secundis: fol. cordat-oblong. acumin. nudis. *Syst. veg. ed. 14. Gmel. Sib. 3. tab. 51.*

*Cataria* &c. *Buxb. cent. 3. tab. 50. f. 1. In Sibiria* 24.

Caul. 1-2-ped. ramosus, superne nutans. Fol. profunde ferrata, rugosa, supra nitida, subtus venosa. Cor. violac.

8. *Moldavica*. D. fl. verticillat. bract. lanceolat. ferraturis capillaceis. *Syst. veg. ed. 14. Black. tab. 551. Lzdw. ed. tab. 15.*

*Melissa moldavica*. *Cam. epit. 576.*

*In Moldavia, Sibiria* ☉.

Odor Citri. Fol. breviter petiol. ovat-triangular. ferrata. Cor. cœrul. vel alba.

9. *canescens*. D. fl. verticillat. bract. oblongis, ferraturis spinosis: fol. subtomentosis. *Syst. veg. ed. 14. Mill. ic. tab. 129.*

*Moldavica* &c. *Comm. rar. tab. 28.*

*Sideritis* &c. *Volk. nor. tab. 353. Morif. hist. 3. f. 11. tab. 8. f. 18.*

*In Oriente* ☉.

Caul. ped-cubit. parum ramosus. Fol. opposita, petiol. infer. ovat-lanceol. superior. lanceol. Cal. 5-fid. Cor. magna, violac.

10. *peltatum*. D. fl. verticillatis: bract. orbiculat. ferrato-ciliatis. *Syst. veg. ed. 14.*

*In Oriente* ☉.

*Convenit in fol. cum priore*. Cor. parva, cœrul.

11. *grandiflorum*. D. fol. crenatis; radicalibus cordat. petio-

lat. caulinis orbiculat. sessilibus: bracteis acuminato-dentat. *Syst. veg. ed. 14.*

D. Altajense. *Pall. Ad. Petrop. 1770. tab. 29. f. 3.*

*Habitat in Altaic. 24.*

Radix fusca. Caul. plerumq. 1-raro pl. simplic. 4-goni, pedal. Fol. leviter rugosa: radical. pauca, petiol. hirsutis. Caulina opposita, 5-nervia, ad basim hirsuta: floralia profundius ferrata, in violaceum color. vergentia. Bract. violac. hirsutæ. Verticill. ex alis folior. floralium in capitulum dispositi. Fl. 6-8. maximi, patentes, violaceo-cœrul.

12. *nutans*. D. fl. verticillat. bract. ovatis, oblong. integerr. cor. maiuscul. nutantibus. *Syst. veg. ed. 14. Gmel. Sib. 3. tab. 49.*

*In Sibiria.*

Caul. pedali. Fol. radical. rotundiuscula, obtuse dent. caulina ovato-oblong. integra, vel leviter ferrata. Verticill. 6. fol. cincti. Cal. hirsutus. Cor. dilute violac. purpur. alba.

13. *thymiflorum*. D. fl. verticillat. bracteis oblong. integerr. cor. vix calyce ma. *Syst. veg. ed. 14. Gmel. Sib. 3. tab. 50.*

*In Sibiria ☉.*

*Simil. priori, sed cor. calyce vix longior; & lab. super. patens.*

Fol. longe petiol. cordat-ovat. dentata.

871. *HORMI- NUM*. Cal. campanulat. lacin. 4. subæqualibus: 5. ma. emarginata. Cor. lab. super. concavum.

1. *pyrenaicum*. H. fol. ovatis, obtusis: caul. nudo. *Syst. veg. ed. 14.*

*Melissa &c. Jacq. hort. 2. tab. 183. Magnol. hort. tab. 233.*

*In alpidibus Tyrolensibus 24.*

Caul. pl. pedal. hirsuti. Fol. radicalia, petiol. obtuse crenata, parum bullata. Bract. subverticill. exiguæ, sessil. ovato-lanceol. integerr. Verticilli distincti, nudi, 8-fl. in spicam producti: fl. quandoq. unilateralibus. Cor. grandis, rubro-cœrul.

872. *MELIT- TIS*. Cal. late campanulat. 2-labiato. Cor. tubo amplo, cylindrico. Galea rotunde emarginata; lab. inferiore 3-fido, segment. rotundis, medio cordato. Anth. cruciatæ. Sem. villosa.



1. *Melissophyl-* M. Syst. veg. ed. 14. Jacq. austr. 2. tab. 26.  
lum. Riv. mon. tab. 21.

*Melissa Fuchsii*. Cam. epit. 30.

In collibus, & dumetis montanis Europæ 24.

Tota planta foetet. Caul. erectus, cubit. & ultra, simpl. villosus, medullosus. Fol. opposita, petiol. ovat-acuta, dentato-ferrata, subvillosa, rugosa. Verticil. 6--fl. Fl. magni, unilateral. Cal. pubescens. Cor. ex purpura, & albo varia, quandoq. tota nivea.

873. OCY- Cal. lab. super. orbiculato: infer. 4-fido. Cor.  
MUM. resupinatæ alterum lab. 4-fid. alterum indivi-  
sum. Filam. exter. basi processum emittentia.

1. *thyrsiflorum*. O. fl. paniculato-fasciculat. caule ramosiss. Syst.  
veg. ed. 14. Murr. nov. Comm. Gott. tab. 5.  
Jacq. hort. 3. tab. 72.

In India.

An degeneratio O. *Basilici*? Caul. erect. ligno-  
sus, sesquiped. ramulis teretibus, utrimq. ca-  
naliculat. Fol. petiol. elliptico-lanceol. acumin.  
leviter ferrata, nuda, basi integerr. utrimq.  
viridia. Ramuli purpurasc. Bract. lanceol. pur-  
purasc. Cor. purpurascens, extus pallida,  
lab. infer. albo. Stam. alba. Pistil. purpurasc.  
Odor fol. *Rutæ*. Differt a reliquis statura ra-  
mosiore fruticis: fol. magis virentibus, diutur-  
nioribus, odore *Rutæ*, fl. in thyrsum fascicu-  
latis.

2. *monachorum*. O. staminibus edentulis; alternis basi barbatis.  
Syst. veg. ed. 14. Bauh. hist. 3. p. 260.

Habitat . . . ☉.

Caul. erectus, ped. teretiuscul. subpilosus: ra-  
mis fere supra-axillaribus. Fol. petiol. ovata,  
obtusiuscula, ferrata, nuda, vix ciliata. Ra-  
cemi verticillis 6--fl. Cal. lab. super. cordatum,  
striis 3. Bract. cordatæ, caducæ. Cor. min.  
albidæ, lab. infer. purpurasc. Filam. purpur.

3. *gracillimum*. O. caul. suffruticoso: fol. ovat-acutis: racemis  
teretibus. Syst. veg. ed. 14.

O. *zeylanicum* &c. Burm. Zeyl. tab. 80. f. 1.

In Asia h.

Caul. 2-ped. strictus, basi perennans, hirsutus.  
Fol. costa supra tomentoso-canefcentia; ima-  
liora, crenata, villosa, petiolata; summa  
oblonga, angustiora, breviora. Spicæ ante

anthesin 4-gonæ, laxæ, bracteis subulato-pro-  
minentibus. Fl. parvi, penduli, reflexi. Cor.  
alba, antheris luteis.

4. *album*. O. fol. ovatis, obtusis: verticillis racemorum  
adproximatis; nubilibus 4-gonis: cor. crena-  
tis. *Syst. veg. ed. 14.*

*In India, Java* ☉.

Caul. pedal. albo-virens, basi lignosus. Racemi  
pauci. Fol. congeneribus crassiora, latioraq.  
concava, obtuse serrata. Bract. lanceol. acu-  
tæ. Cor. magna, alba, lacin. lateralibus ma-  
gis divaricat. Stam. alba.

5. *verticillatum*. O. fol. ovatis, obtusis: racemo elongato, nu-  
do: fl. verticillato-quaternis, pedunculat. *Syst.*  
*veg. ed. 14. Lin. Suppl.*

*In India*.

Caul. pedal. adscendens, lævis, racemo bre-  
vior. Fol. oppositionibus 5-6. petiolat. ferra-  
turis utrimq. 2. Racemus filiform. Fl. ut in  
*Hottonia*, bracteati. Cor. curvata.

6. *Basilicum*. O. fol. ovatis, glabris: calyc. ciliatis. *Syst. veg.*  
*ed. 14. Sabb. hort. 3. tab. 84. Black. tab. 104.*  
*In India, Persia* ☉.

Caul. dodran-pedal. Fol. uncial. & ampliora,  
pallide virentia, integerr. vel raris crenis ser-  
rata. Verticilli laxi. Cor. alba.

7. *minimum*. O. fol. ovatis, integerr. *Syst. veg. ed. 14. Sabb.*  
*hort. 3. tab. 85. Moris. hist. 3. f. 11. tab. 10.*  
*f. 17.*

*In Zeylona* ☉.

Caulicul. veluti conglomerati. Fol. *Maiorana*,  
parva, sature virid. Fl. parvi, albi.

8. *punctatum*. O. caule tereti: fol. ovatis, rugosis: fl. spicatis.  
*Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*

*An O. punctat. Thumb. Jap.?*

*Plectranthus punctatus. Herit. Stirp. nov. fasc. 4.*  
*tab. 42.*

*In Abyssinia* ☉.

Facies *Perillæ min.* sed fl. resupinati *Ocymi*.  
Caul. pedal. herbaceus, inferne divaricate ra-  
mosus, rufo-punctatus. Fol. opposita, petiol.  
serrata, lineata, pilosa. Stipul. nullæ. Bract.  
ovatæ. Fl. cernui. Cor. magnitudine *Thymi*,  
cœrulesc.

9. *capitellatum*. O. herbaceum; fol. ovatis: fl. adgregatis, pe-

tiolis lateralibus. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*  
Kofaria. *Forsk. Arab. tab. 20. sed fl. minores*  
*nostris.*

*In China.*

Caul. ped. oleraceus, parum ramosus, obtuse  
4-gon. bisulcatus. Fol. *Lamii*, opposita, pe-  
tiol. obtuse ferrata, costata, rugosa, lævia,  
non nitida. Petioli sensim desinunt in folium.  
Pedunc. axillar. solitar. capitulo magnitudine  
nucis *Coryli*. Cor. minima, alba.

10. *sanctum.* O. fol. oblongiuscul. obtusis, ferratis, undula-  
ris: caule hirsuto: bract. cordatis. *Syst. veg. ed.*  
*14.*

*In India* ☉.

Caul. erect. sesquiped. brachiat. utrinq. subcana-  
liculat. atro-purpur. muricatus, tuberculis pi-  
lo albo. Fol. nuda, margine, nervisq. subtus  
pilosa, venis purpureis subtus; superiora ob-  
scuriora. Petiol. hirti, atro-purpur. Racemi  
terminal. solitar. atro-purpur. Bract. petiol.  
concavæ. Cor. læte purpur. vix calyce ma-  
*Odor vix ullus.*

11. *americanum.* O. fol. sublaceol. acumin. subserratis: racemis  
teretibus: caule subherbac. *Syst. veg. ed. 14.*  
*Jacq. hort. 3. tab. 86.*

*In America* ☉.

*Odor Caryophylli aromatici.* Caul. ped. Geni-  
cula inter petiolos barbata. Verticilli rotundi,  
6-fl. Cor. alba, vel carnea.

12. *tenuiflorum.* O. fol. ovat-oblong. obtuse ferratis: bract.  
cordatis, reflexis, concavis: spicis filiformi-  
bus. *Syst. veg. ed. 14.*

O. *maderaspatanum* &c. *Pluk. alm. tab. 208. f. 4.*

Basilicum &c. *Rumph. amb. 5. tab. 92. f. 2.*

Mentha &c. *Burm. Zeyl. tab. 70. f. 2.*

*In Malabaria* ☉ h.

Caul. 1-2-ped. brachiat. teretiuscul. purpurasc.  
pilis patulis. Fol. longe petiol. mollia. Spicæ  
terminal. ternæ, longæ. Fl. 3. ex singula  
bractea, subsessil. Cor. parva, vix oculis con-  
spicua, purpurasc.

13. *polystachion.* O. cor. 4-fid. racemis aphyllis, apice nutanti-  
bus. *Syst. veg. ed. 14. Murr. nov. Comm.*  
*Gott. 101. 3. tab. 3.*

*In India* 24.



Caul. erect. 2-ped. brachiat. 4-gon. Rami copiosiss. oppositi, erecti. Fol. opposita, petiol. ovata, obtusa, acuta, grosse ferrata, lineata. Racemi axillar. longi, secundi. Fl. verticillati, quini. Cor. minuta, *Menthae* facie, albid.

14. *menthoides*. O. fol. lineari-lanceol. ferratis. *Syst. veg. ed. 14.*

*In Zeylona.*

Caul. erect. pedal. brachiatus. Fol. subsessil. in medio profunde ferrata. Spicae terminal. longae, laxae, verticillatae.

15. *scutellarioides*. O. cor. falcatis: pedicell. ramosis. *Syst. veg. ed. 14.*

Maiorana &c. *Rumph. amb. 5. tab. 101.*

*In India.*

Caul. pubescens. Fol. petiol. ovata, obtuse serrata; petiol. tenellis valde tomentosis. Racemus erectus, longus. Bract. sessil. cordatae, acumin. Cal. parvus. Cor. ex caeruleo-purpureo. lab. infer. elongato, falcato. (In quo differt a congeneribus).

16. *prostratum*. O. caulibus prostratis: fol. ellipticis, lineatis. *Syst. veg. ed. 14.*

*In India Orient. ☉.*

Caul. spitham. octosulcat. pilis nutantibus. Rami divaricatiss. prostrati. Fol. pollicar. opposita, petiol. argute ferrata, subpilosa. Spicae terminal. foliar. e verticillis oblongae. Cal. lacin. super. latiore, obtusiore. Cor. minima, caerulea.

17. *acutum*. O. racemis filiformibus: fol. ovar. acumin. serratis: bracteis hirtis. *Syst. veg. ed. 14. Thumb. Jap.*

*In Japonia.*

Caul. erectus, glaber, 4-gon. Fol. petiol. inferne integra, venosa, glabra, subtus pallida, 3-pollic. 2. pollic. lata. Racemi digital. & ultra. Bract. ovar. acutae, hispidae.

18. *crispum*. O. racemis terminalibus: fol. ovatis, serratis, crispis: calycibus hispidis. *Syst. veg. ed. 14. Thumb. Jap.*

*In Japonia.*

Caul. erectus, ramosus, villosus. Fol. pollicar. petiol. inferne integra, purpurascens, glabra.

Petiol. villosi. Racemi digital-spitham. laxi.  
Bract. oblong-acumin. glabræ.

*Herba infusa rheumaticis præscribitur.*

19. *rugosum*. O. racemis terminalibus: fol. ovatis, acutis, ferratis, subtus rugosis. *Syst. veg. ed. 14. Thumb. Jap.*

*In Japonia.*

Caul. 2-ped. & ultra, sulcatus, tenuissime tomentosus. Rami patuli. Fol. subtus pallida. Racemi contracti.

20. *inflexum*. O. panicula terminali, racemosa: caule, ramisq. flexuosis. *Syst. veg. ed. 14. Thumb. Jap.*

*In Japonia.*

Caul. herbac. Fol. ovata, acuta, ferrata, tenuissime scabra, unguicular. Panic. coarctata.

21. *virgatum*. O. racemis verticillat. virgatis: fol. oblong. ferratis. *Syst. veg. ed. 14. Thumb. Jap.*

*In Japonia.*

Caul. flexuoso-erectus, ramosus, profunde sulcatus, tenuissime tomentosus. Fol. pollicar. & ultra, tenuissime tomentosa. Racemi digital. erecti.

- 
- inodorum*. O. fol. ovalibus, denticulat. racemis paniculatis. *Burm. Zeyl. tab. 80. f. 2.*

*In India.*

Caul. glabri. Fol. petiolat. Bract. minima. *Var. fol. duplo maioribus, cordatis.*

- grandiflorum*. O. caul. fruticoso: fol. ovatis, ferratis: genitalibus longiss. *Herit. Stirp. nov. tab. 43.*

O. filamentosum. *Forsk. Æg.*

*In Abyssinia.*

Suffrutex 2-cubit. fragrans. Rad. cinerea. Caul. e rad. nonnulli, diffusi, vel suberecti, teretes nodosi, rimosi, cinerei. Rami oppositi, patentes, sub 4-gon. epidermide lacerosa. Turiones 4-goni, anulati, virides, pubescentes. Fol. decussatim opposita, breviter petiol. utrimq. acuta, basi integra, papillosa, nudiuscula, scabriuscula, subviscosa, nervulosa, concava, vel convexa, patentia, fragrantia, persistentia, 24-30 lin. long. 12-15. lin. lata. Petioli patuli, compressiusculi, hinc teretiusculi, inde plani, fol. sexies breviores. Spicæ terminales, erectæ, verticillatæ, bracteatae,

2. poll. longæ. Verticilli 6-fl. inferior. remoti; super. adproximati. Bract. sub verticillis oppositæ, ovat-lanceol. acuminat. crenatæ, concavæ, apice reflexæ, ante explicationem fl. caducæ. Cicatrices, bractearum lapsu, orbicul. concavæ, marginatæ, latæ. Cor. alba.

*Dignoscitur fl. magnitudine, & genitalium longitudine.*

*Hadiensc.* O. fol. ovatis, obtusis, crenatis, villosis, flexilibus: fl. refractis. *Forsk. Æg.*

*In Arabia.*

Fl. surgentes, villosi. Fol. ad basin pedunculor. conferta, opposita, petiol. subtus rugosa. Racemus terminal. spitham. hispidus. Verticill. utrimq. 4-fl. Cor. pallide cœrul. tubo ad calycis apicem refracto.

(a) *zatharhendi.* O. fol. carnosis, rigidis, late ovatis, crenatis, villosis, basi truncatis. *Forsk. Æg.*

*In Ægypto ☉.*

Caul. surgentes, sempervirent. fetis mollibus farcti. Fol. brachiata, petiol. fere subrotund. patentia, reticulata, venosa, sesquipollic. Verticil. bracteati, 6-fl. Fl. resupinati. Cor. tubo albicante: limbo violac. & albo.

(b) *zatharhendi?* O. fol. carnosis, cuneat-oblong. utrimq. sub 4-dentat. sessilibus, villosis. *Forsk. Æg.*

*In Arabia.*

Caul. pedal. fruticosus, diffusus, brachiat. Rami conferti, brachiati. Fol. subpollic. opposita, subtus punctis ferrugin. adspersa, intus papilloso. Pedunc. axillar. terni, 1-fl.

*Serpyllifolium.* O. fol. oblong-cuneat. acutiuscul. complicatis, subtus scabris. *Forsk. Æg.*

*In Arabia.*

Fol. unguem longa, basi attenuata, integra. Fl. racemoso--verticill. Cal. ferrugin. Cor. violac.

874. TRICHOSTEMA. Cor. lab. super. falcatum. Stam. longissima.

1. *dichotoma.* T. stamin. longiss. exsertis. *Syst. veg. ed. 14.*

*In Virginia, Pennsylvania ☉.*

Rad. fibrosa. Caul. erectus, spitham. teres, brachiatus, pubescens. Fol. opposita, lanceol. obtusa, integerr. scabra; ex infimis alis folio-



- la aliquot. Rami ex alis superioribus caule longiores. Panicul. peduncul. dichotoma.
2. *brachiata*. A. stamin. brevibus, inclusis. *Syst. veg. ed. 14.* Teucrium &c. *Dill. elth. tab. 285. f. 369.*  
*In Amer. septentr.*  
 Cauliculi pedal. ramis decussatis. Fol. *Origani sylves.* similia, opposita, sessil. Capitula ante anthesin nutantia. Cor. violac. *Planta subhirsuta.*
875. SCUTELLARIA. *Cal. brevis, ore integro; post florescentiam clauso, operculato.* Cor. tubus longus, sursum flexus, 2-lab. Galea integra, concava, non-nihil emarginata: barba 3-fida; binæ laterales laciniae acutæ accedunt e latere tubi positæ, sursum flexæ, ad lab. superius relatæ. Barbæ lacinia media deorsum pendet, late emarginata. Stigma simplex.
1. *orientalis*. S. fol. incisif, subtus tomentosis: spicis rotundato-tetragonis. *Syst. veg. ed. 14.*  
*Cassida &c. Tourn. it. 3. tab. 306. Comm. rar. tab. 30. Mart. cent. tab. 18.*  
*In America, Mauritania &c.*  
 Caul. pl. diffusif. Fol. subovata, cinerea. Bract. integerr. concavæ. Cor. purpur. lab. albo.  
*Var. col. luteo.*
2. *albida*. S. fol. subcordat. ferratis, rugosis, opacis: spicis secundis: bract. ovatis. *Syst. veg. ed. 14.*  
*Sabb. hort. 3. tab. 29. Bauh. hist. 3. p. 291.*  
*Cassida &c. Col. ecphr. 1. p. 196. var.*  
*In Oriente &c.*  
*Adfin. priori, sed cor. alba, ma. Fol. obtusiora, pilosiora, non nitida.*
3. *alpina*. S. fol. cordatis, inciso-ferrat. crenatis: spicis imbricat. rotundato--tetragonis. *Syst. veg. ed. 14. All. Fl. Ped. tab. 26. f. 3.*  
*In alpibus Helvetiæ &c. &c.*  
 Caul. procumb. ramosiss. Fol. petiol. ovata, obtuse mucronata. Fl. magni. Cor. lab. super. superne cœrul. inferne albo: lab. infer. exigua parte cœrul. cæterum pallente, & albo.  
*Similis sequenti, sed cor. violac. lab. albedo, nec flavo. Bract. ovata, acuta, nec acuminata.*
4. *lupulina*. S. fol. cordat. acutis, inciso-ferrat. glabris: spicis imbricat. rotundato-tetragon. *Syst. veg. ed. 14.*  
*In Sibiria, Tataria &c.*

Caul. diffusi, semipedal. Fol. petiol. Spicæ laxæ. Foliol. floralia ovata, patula, integerr. concava. Cor. magna, albido-flavescens, laciniis lateralibus violac.

5. *lateriflora*. S. fol. lævibus, carina scabris: racemis lateralibus foliosis. *Syst. veg. ed. 14.*

*In Canada, Virginia 24.*

Fol. min. lanceol. ferrata. Pedunc. multifl. Cor. cœrul.

6. *galericulata*. S. fol. cordat-lanceol. crenatis: fl. axillaribus. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 637. Sabb. hort. 3. tab. 30. Black. tab. 516. Riv. monop. tab. 77.*

*Lythimachia* &c. *Dalech. hist. 1060. Lob. ic. 344. In Europa litoribus, & secus torrentes* &c.

Caul. erectus, cubit. ramosus, glaber. Fol. breviter petiol. subtus albidiora, ore reflexo. Fl. geminati, unilateral. Cor. cœrul. raro alba.

7. *hastifolia*. S. fol. integerr. inferior. hastatis; super. sagittatis (floralibus ovato-lanceol.). *Syst. veg. ed. 14.*

*In Germania* &c. 24.

*Videtur var. prioris*. Caul. digital. simplex, 7. internodiis. Fol. infer. longe, super. breviter petiol. obrusa, subtus pallidiora. Spica patens, laxa, secunda. Cor. magna, cœrul.

8. *minor*. S. fol. cordato-ovat. subintegerr. fl. axillaribus. *Syst. veg. ed. 14.*

*In Angliæ paludibus 24.*

*Adfinis valde duabus prioribus, sed minor. Cor. purpurasc. lab. infer. punctis saturioribus.*

9. *integrifolia*. S. fol. sessilibus, ovatis; inferiorib. obsolete serratis; superioribus integerrim. *Syst. veg. ed. 14. S. cœrulea* &c. *Pluk. alm. tab. 313. f. 4.*

*In Virginia, Canada.*

10. *havanensis*. S. fol. cordat-ovat. crenatis: fl. axillaribus, solitar. cor. lab. utroq. 3-fid. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. Obs. 2. tab. 29. amer. ed. 2. pict. tab. 265.*

*In Havana.*

Planta procumbenti-erecta, herbacea, tenella. Fol. vix semipollicar. opposita, petiolat. obtusa. Pedunc. axillar. Fl. fere pollicar. Cor. cœrul. galea trifida.

- 11. hyssopifolia.** *S. fol. lanceolat. Syst. veg. ed. 14.*  
*In Virginia.*  
 Caul. erectus. Fol. sessil. integerr. scabra. Cor.  
 lab. super. carina pilosa.
- 12. peregrina.** *S. fol. subcordat. ferratis: spicis elongatis, secundis. Syst. veg. ed. 14. Till. Hort. pis.*  
*In Hetruriæ nemoribus, & in Sibiria 24.*  
 Fol. ovata, crenato-dent. dentibus p.<sup>o</sup> utrimque  
 4, deinde 3, postea 2. firma, glabra, subtus  
 venosa, obscure virid. floralia, sive bracteæ  
 integræ, ellipticæ. Fl. purpuro-violac. cum  
 labio albo. Caul. fusco-rubent. nitidi. Rami  
 floriferi longiss. Cal. hirsutulus. Cor. galea  
 subpilosa.
- 13. indica.** *S. fol. subovat. obtusis, crenatis, petiolatis; racemis nudiuscul. Syst. veg. ed. 14.*  
*Serratula &c. Rumph. amb. 5. tab. 170. f. 1. 2.*  
*S. sinica &c. Pluk. amalt. tab. 441. f. 1.*  
*In China.*  
 Planta minor. Caul. spitham. subvillosus. Fol.  
 pollicar. Racemi digital. secundi, terminal.  
 Bract. breviss. linear. Cal. brevissim. absq. oris  
 tubo. Cor. longiuscula, angusta, alba.
- 14. altissima.** *S. fol. cordat-oblong. acuminat. ferratis: spicis subnudis. Syst. veg. ed. 14.*  
*In Oriente.*  
 Planta grandis, alba. Fol. Urticæform.
- 15. cretica.** *S. villosa: fol. cordatis, obtusis, obtuseq. cordatis: spicis imbricatis: bracteis ovatis. Syst. veg. ed. 14.*  
*In Creta.*  
 Statura *Nepetæ*, tota hirsuta. Bract. non concavæ, ut in cæteris speciebus. Cal. *Scutellariæ*. Cor. fere *Teucrii*, minuta, extus hirta; lab. super. minimum, emarginatum.
- 
- ovata.* *S. Hill. hort. Keven. tab. 8.*  
*In Amer. boreali 3.*  
 Caul. 2-pedal. ramosus, subhirsutus. Fol. ovata. Fl. axillar. rubescentes.
- columnæ.* *S. villosa, caule erecto, brachiato: fol. cordatis: fl. racemosis, internodio longioribus. All. Fl. Ped. tab. 84. f. 2.*  
*Cassida. Col. ecphr. p. 189. 1*  
*Secus torrentes 24.*  
*Tom. III.*



Tota planta hirsuta; ad flores autem hirsutiss.  
& viscosa. Caul. virides. Fol. longe petiolata,  
obtusè dentata, mollia, viridia. Fl. magni,  
cœrulei, lab. inferiore purpureo-cœruleo,  
non albo, licet maculis albis notetur.

876. PRU- *Filam. bifurca*; altero apice antherifera. Stigm.  
NELLA. 2-fid. Cal. 2-lab. superiore quasi resecto brevissime  
3-dent. Galea ampla, fornicata, levissime incisa: barba ad caulem reflexa, 3-part.  
segmento medio semicirculari, crenato.

1. *vulgaris*. P. fol. omnibus ovato-oblong. obiter dentat. petiolatisq. *Syst. veg. ed. 14. Sabb. hort. 3. tab. 32. Ludw. ed. tab. 19.*

Brunella. *Black. tab. 24. Riv. tab. 29.*

b. P. *grandiflora*. *Jacq. austr. 4. tab. 377.*

Brunella 1. *Clus. hist. 2. p. 42.*

*In Europæ pascuis 24.*

Caul. ped. Fl. verticillato-capitati. Cor. ex cœrul-purpureo. raro alba, rubra, vel lutea.

In apricis procumb. pollicar. in nemoribus erecta, pedal.

b. Cultura non mutatur, unde diversa sp. Fol. magis virentia, hirsuta. Cor. violac. purpur. alba.

*In rupium fissuris plerumq. nascitur.*

2. *laciniata*. P. fol. ovato-oblong petiolat. supremis quatuor lanceolat. dentat. subsessilibus. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. austr. tab. 378. Sabb. hort. 3. tab. 31.*

Brunella. *Riv. tab. 30.*

Brunella 11. *Clus. hist. 2. p. 43.*

b. B. *verbenulæ* &c. *Vaill. parif. tab. 5. f. 1.*

*In Europæ pascuis 24.*

Caul. palm-pedal. hirsuti, purpur. Fol. hirsuta, subincana; infima plerumq. integerr. Spica sessil. bracteata. Cal. pilosus. Cor. ochroleuca. alba, rosea, cœrul. purpureo.

3. *hyssopifolia*. P. fol. lanceolat. integerr. sessilibus. caul. erecto. *Syst. veg. ed. 14.*

Brunella &c. *Morif. hist. 3. f. 11. tab. 5. f. 7.*

*Pluk. phyt. tab. 80. f. 3.*

*Habitat Monspeliæ &c. 24.*

Habitus plantæ strigosus. Caul. angulati, rubentes, pilis hispidis, sicuti & fol. quæ tamen quandoq. glabra. Bract. acuminatæ. *Differt a*

# DIDYNAMIA GYMNOSPERMIA. 467

*P. vulg. caule erecto, nec adscendente: fol. sessilibus, lanceolat. scabris; nec petiolat. ovatis, ferratis, lævibus: cor. quadruplo maioribus; lab. super. carina pilosa.*

*indica.*

*P. fol. oblong. superne crenatis: spicis capitatis: bract. ciliatis. Burm. Ind.*

*In Javana 24.*

*Differt a cæteris, fol. subuncinatis instar Verbenæ nodifloræ; peduncul. axillaribus, & terminalibus: Spicæ capitatae.*

877. CLEONIA. 4-fid.

1. *lusitanica.* C. Syst. veg. ed. 14.

*Prunella &c. Mill. tab. 70. Barr. ic. 561.*

*Bugula &c. Moris. hist. 3. f. 11. tab. 5. f. 4.*

*In Lusitania, Hispania ☉.*

*Caul. erectus, sub-ped. pubesc. ramis oppositis, inferne pilosus. Fol. sessil. lanceol. sinuato-ferrata, glabra. Spicæ oblong. Cor. longa, erecta, purpuro-cærul. barba macula subalbida: galea erecta lacin. apice reflexis: barba obcordata, complicato--patente, basi super. gibba. Filam. omnia spinosa. Anth. a tergo cristatae.*

878. PRASIUM. Baccæ 4. monospermæ.

1. *maius.* P. fol. ovat-oblong. ferratis. Syst. veg. ed. 14. Sabb. hort. 3. tab. 37.

*Lamium &c. Mont. in Zann. tab. 80.*

*Melissa &c. Moris. hist. 3. f. 11. tab. 21. f. 3.*

*In Sicilia, Romæ, & in agro Tingitano h.*

*Caul. frutescens. Fol. opposita, nitida, quandoq. subhirsuta, satore virid. Cal. ampliatus. Cor. alba.*

2. *minus.* P. fol. ovatis, crena utrimq. duplici. Syst. veg. ed. 14.

*In Sicilia h.*

*Differt a priore ramis virgatis; & odore fol. Dia-coceph. Moldavicae.*

879. PHRYMA. Sem. unicum.

1. *Lepiostachya.* P. fol. ovatis, ferratis, petiolat. cal. 1-phyll. 5-fid. Syst. veg. ed. 14.

*Amaranthi &c. Pluk. amalt. tab. 380. f. 5. phyt. tab. 380. f. 1.*

*In Amer. septent. 24.*

- Caul. ped. brachiatus. Fol. opposita, grosse ferrata, acuta, scabriuscula. Spicæ terminal. solitar. Fl. oppositi, remoti. Bract. ternæ, subulatæ. Fl. horizontal. deflorati mox cernui. Cal. cylindric. striatus, basi supra gibbus, durus; lab. super. angusto, purpurasc. 3-dent. infer. 2-fid. Cor. albida, fig. *Dodartia*, sed parva, lab. super. extus purpurasc.
2. *dehiscens*. P. calyc. tandem longitudinaliter dehiscentibus: *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*  
*Ad cap. h. Spei.*  
 Caul. basi suffruticos. Rami pauci, oppositi, erecti. Fol. opposita, subpetiol. cuneata, 9-dent. crassiuscula. Racemi terminal. solitar. simplic. erecti, brevissime pedicellati. Bract. solitar. minutæ, subulatæ. Cor. *Verbenæ*.

## ANGIOSPERMIA.

880. CASTILLEJA. Cal. 1-phyll. tubulosus, longitudinaliter hians. Cor. ringens; lab. infer. glandul. 2. tubulosus. Caps. 2-locul. dissipatione opposito.
1. *fissifolia*. C. fol. linear. integris, apice 3-fid. fl. racemosus, interspersis bract. 3-fid. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl. Mutis. amer. vol. 1. tab. 11.*  
*In nova Granada h.*  
 Caul. erectus, 3-ped. teretiuscul. subramosus. Fol. pollic. alterna, sessil. patentia. Rudimenta ramulorum fol. fasciculat. axillaribus. Stipul. nullæ. Racemi terminal. Cal. auritus, Ariformis, cor. galeam quasi carina sustulciens. Anth. 8. in filam. 4.
2. *integrisolia*. C. fol. lineari-subulat. integerr. bracteisq. indivisis. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl. Mutis. amer. vol. 1. tab. 12.*  
*In Amer. meridion.*  
*Simil. priori, sed minor; racemo magis elongato*  
*An var.?*
881. BARTSIA. Cal. 2-lobus, emarginat. coloratus. Cor. minus ipso calyce colorata; lab. super. longiore. Caps. 2-locul.



1. *coccinea*. B. fol. alternis, linear. utrimq. 2-dentat. *Syst. veg. ed. 14.*  
*Pedicularis* &c. *Pluk. alm. tab. 102. f. 5.*  
*Horminum* &c. *Morif. hist. 3. f. 11. tab. 13. f. 28.*  
*In Virginia, Noveboraco 24.*  
 Caul. ped. simpl. Fol. 2-unc. in segmenta longa divisa, *Coronopi* modo. Fl. in spicam congesti, ampli, rubicundi. Cal. margine coccin. bract. 3-fid. Caps. elastica.
2. *pallida*. B. fol. alternis, lineari-lanceolat. integerr. floralibus ovatis, dentatis (coloratis, lanuginosis). *Syst. veg. ed. 14. Gmel. Sib. 3. tab. 42.*  
*In Sibiria.*  
 Caul. pl. simplic. angulati, contorti, hirsuti, violaceo-rubent. Fol. sessil. pallide virid. trinervia, tomentosa. Spica laxa, foliosa, lanuginosa. Fl. parvi. Cal. albo-virescens. Cor. galea viridi-lutea, ad oras purpur. barba dilute carnea. Fruct. oblongo-acumin. fuscus.
3. *viscosa*. B. fol. superioribus alternis, ferratis: fl. lateralibus distantibus. *Syst. veg. ed. 14.*  
*Euphrasia* &c. *Pluk. alm. tab. 27. f. 5.*  
*Alectorolophos* &c. *Barr. rar. tab. 665.*  
*In Europæ rivulis ☉.*  
 Caul. erectus, pedal. pubescens. Fol. uncial. angusta, dentata, subviscosa. Cor. lutea.
4. *alpina*. C. fol. amplexicaul. cordat. ferratis: floralibus coloratis.  
 B. fol. oppositis, cordat. obtuse ferratis. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 43.*  
*Chamædryas* &c. *Bauh. hist. 3. p. 289.*  
*Clinopodium* &c. *Pluk. alm. tab. 163. f. 5.*  
*In alpibus 24.*  
 Caul. spitham. simpl. villosus. Fol. subhirsuta, sicca, col. obscuri; floralia violac. Fl. racemosi: pedunc. subcœrul. Cal. 4-fid. Cor. ex rubro-cœrul.
5. *Gymnandra*. B. diandra: fol. radicalibus binis, petiolat. caule subdiphyлло, unispicato: spica lineari-obtusafa: verticill. coarctatis, bracteatis. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*  
*Gymnandra borealis*. *Pall. it. 3. tab. A. f. 1.*

*Lagotis glauca*. *Ad. Petropoli. Vol. 14. tab. 18.*

*In summis alpinis Dauriæ 24.*

Rad. sapore dulcificato. Fol. radical. ovalia, glaberr. succulenta. Caul. erectus, palm. simpl. teres, glaber. Fol. caulina alterna, sessil. ovata. Spica ex verticill. coarctatis. Bract. ovata, coerulesc. Cal. coloratus. Cor. dilute coerul. *Var. magnitudine, & fig. folior.*

882. RHINANTHUS. Cal. 4-fid. ventricosus. Galea 2-fida, auriculata; barba 3-fida, medio segmento emarginato, transversim lato. Caps. obtusa, compressa, 2-locul. Sem. compressa.

1. *orientalis*. R. cor. lab. super. subulato, incurvo. *Syst. veg. ed. 14.*

*Elephas &c. Tourn. it. 3. f. 151.*

*In Oriente.*

Caul. 10-pollic. purpur. inferne lanuginosi. Fol. opposita, sessil. R. *crista galli* similia. Fl. axill. utrimq. solitar. magni. Cal. licinia prima (sub rostro cor.) ovata; lateralibus utrimq. reflexis; quarta recta, obtusa. Cor. crocea, galea inferne albida.

2. *Elephas*. R. cor. lab. super. subulato, recto. *Syst. veg. ed. 14.*

*Elephas &c. Col. ecphr. 1. tab. 188.*

*Euphrasia &c. Moris. hist. 3. f. 11. tab. 24. f. 14.*

*In umbrosis Italiæ, Sibiria ☉.*

*Habitus prioris, at flos diversus calyc. 3-fido, laciniis 2. reflexis; tertia mu. erecta, acuta, plicata. Cor. lutea.*

3. *crista galli*. R. cor. lab. super. compresso, brevior. *Syst. veg. ed. 14. Riv. tab. 92. Bauh. hist. 3. p. 436.*

*In Europæ pratis humidis ☉.*

Caul. sesquiped. Fol. subrotunda, crenata, glaberr. subtus tuberculosa. Spica foliosa, bracteis albidis. Cor. lutea, tubo plicato, decolore; galea compressa, auriculis 2-fid. *Variet. macilenta, ramosa, fol. angustis. Altera caul. altiore, sæpe cubitali: fol. ma. & latioribus: calyce constanter hirsuto: cor. pallide flava.*

4. *Trixago*. R. calyc. hirsuto-tomentosis: fol. oppositis, obtuse ferratis: caule simpliciss. *Syst. veg. ed. 14.*

*Colum. ecphr. 1. tab. 197. Moris. hist. 3. f. 21. tab. 24. f. 8.*

*In Italia, Monspelii maritimis humentibus inter Juncos ☉.*

Caul. palmar. Fol. 3-uncial. angusta. Spica longa, quadrata, densa, e cristatis fol. rotundioribus, *Euphrasix vulg.* similibus, constructa. Fl. magni, purpurascens, barbulis albis, pallentibus. Galea rostrata. Caps. nigra. *Non pertinet ad hoc Genus. All. Fl. Ped.*

5. *capensis*. R. calyc. tomentosis: bracteis ovatis: fol. lanceol. dentatis. *Syst. veg. ed. 14.*

Pedicularis &c. *Pluk. alm. tab. 310. f. 3.*

*In Æthiopia.*

Planta facie *Trixaginis*, exsiccatione tota nigra evadens. Spica oblonga; bract. parum acumin. tomentosis. Cor. alba.

6. *indica*. R. fol. sublanceol. integerr. pilosis. *Syst. veg. ed. 14. Burm. Ind. tab. 39. f. 1.*

b. *Veronicæ* &c. *Pluk. alm. tab. 114. f. 2.*

*In Zeylona.*

Odor *Thymi*. Caul. erectus, spitham. simplex, hispidus. Fol. parva, opposita, ovali-lanceol. Fl. ex alis superioribus sessiles, oppositi, foliolar. ampli, quandoq. summo cauli fere umbellati.

7. *virginicus*. R. cor. fauce patentibus: fol. sinuato-dentat. *Syst. veg. ed. 14.*

*In Virginia.*

Anth. hirtæ.

883. EUPHRASIA. Cal. cylindric. 4-fid. Cor. tubulosa, 2-lab. lab. super. 2-fido, aut inciso; infer. 3-part. medio saltem segmento sæpius emarginato. Anth. inferior. altero lobo basi spinosæ. Caps. ovat-oblon. 2-locul. 2-valv. polysperm.

1. *latifolia*. E. fol. dentato-palmat. fl. subcapitatis. *Syst. veg. ed. 14. Sabb. hort. 3. tab. 7.*

E. *purpurea* &c. *Magn. monsp. tab. 94.*

E. *pratensis* &c. *Moris. hist. 3. f. 22. tab. 24. f. 8.*

E. *tertia* &c. *Col. ecphr. tab. 202. f. 2. Pluk. phyt. tab. 280. f. 2.*

*In Italia, Monspelii ☉.*

Caul. 3-unc. Fol. per caulem rara, opposita, subhirsuta, rugosa. Bract. palmat. subhirsutæ. Fl. oppositi, purpur.



472 DIDYNAMIA ANGIOSPERMIA.

2. *officinalis*. E. fol. ovatis, lineatis, argute dentatis. *Syst. veg. ed. 14. Subb. hort. 3. tab. 9. Black. tab. 427. Ludw. ed. tab. 135. Riv. monop. tab. 90. Camer. epit. 767. Tabern. 362.*

*In Europæ pascuis aridis* ☉.

Planta multiform. Caul. dodrant. subniger. Fol. parva, opposita, sessil. Cor. albido--purpur. cum lineis luteis. *Var. cor. alba, flava: fol. angustis, tenuissime dissectis: & fl. maioribus.*

3. *tricuspidata*. E. fol. linear. tridentat. *Syst. veg. ed. 14. Pluk. alm. tab. 177. f. 1. Zann. hist. tab. 76.*

*In Italia* ☉.

Caul. dodrant. subruher, pilis raris adpersus. Fol. opposita, dente utrimq. unico. Cor. simil. priori, violac-cœrul-crocea.

4. *Odontites*. E. fol. linearibus; omnibus ferratis. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 625.*

E. altera. *Riv. tab. 89. Dod. pempt. 55.*

b. E. *sylvestris* &c. *Col. ecphr. tab. 202. f. 1.*

*In Europæ pascuis sterilibus* ☉.

Caul. etiam cubit. ramosissim. hirsutus. Fol. sessil. reflexa, hirsutula, quandoq. ovata. Spica apice subnutans. Fl. unilateral. purpur. raro albi.

5. *lutea*. E. fol. linearibus: inferioribus ferratis; superioribus integerr. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. austr. 4. tab. 398. Odontites &c. Riv. tab. 91.*

E. *pratensis* &c. *Morisi. hist. 3. f. 11. tab. 24. f. 16.*

E. *lutea* &c. *Col. ecphr. 1. tab. 203.*

*In Europæ montosis, aridis* ☉.

Caul. semiped. rubens. Fol. alterna, subsessil. villosula. Fl. axill. solitar. Cor. flava.

6. *linifolia*. E. fol. linearibus: omnibus integerr. calyc. glabris. *Syst. veg. ed. 14. Col. ecphr. 2. tab. 69.*

*In Italia, Gallia* ☉.

Simillima priori.

7. *viscosa*. E. fol. linearibus: calyc. glutinoso-hispidis. *Syst. veg. ed. 14.*

*Pedicularis* &c. *Garid. air. tab. 78.*

*In Helvetiæ &c. glareosis sterilibus* ☉.

*Differt ab E. lutea, fol. lineari-lanceol. nec striatè linearibus: calyc. villosis, viscidis; nec glabris: cor. clausis, nec flamine brevioribus.*

884. MELAMPYRUM. Cal. 4-5-fid. Cor. tubulosa, sursum

ampliata; lab. superius compressum, margine replicato; infer. 3-fid. segment. æqualibus. Caps. obliqua, hinc dehiscens. Sem. ovata, gibba.

1. *cristatum*. M. spicis quadrangularibus: bract. imbricat. cordatis, compactis, denticulat. *Syst. veg. ed. 14. Riv. tab. 80. Pluk. alm. tab. 99. f. 2.*

*In Europæ pratis asperis* ☉.

Caul. ped--cubit. sæpe coloratus, inferne rotund. & nudus, dein valde ramosus. Fol. caulina lata, sessil. lanceol. ad exortum sæpe laciniat-pinn. dein integra, non serrata: alia longa, angusta, linear omnia aspera, & retrorsum hispida. Bract. rubræ. Spica elegans, densa. Cor. tubo purpur. galea purpur. aut alba: barba ex aurantiaco-rufa. *Var. cor. alba.*

2. *arvense*. M. spicis conicis, laxis: bracteis dentato-setac. coloratis. *Syst. veg. ed. 14. Sabb. hort. 3. tab. 8. Riv. tab. 79.*

*Triticum* &c. *Dod. pempt. 541.*

*In Europæ agris* ☉.

Caul. altior priore, non adeo ramosus. Fol. longe lanceol. ad basin incisa. Coma ex cœrul-purpurasc. Galea ex albo-ferrugin. barba ferrugin. faux flava. *Var. cor. alba.*

3. *nemorosum*. M. fl. lateralibus, secundis: bracteis dentat. summis coloratis, sterilibus: calyc. lanatis. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 305.*

*M. sylvaticum. Riv. tab. 81.*

*Parietaria sylv. 1. Clus. hist. 2. p. 44.*

*In Europæ nemoribus* ☉.

Caul. cubit. hirsutus, nutans. Fol. latiora, ovat-lanceol. Basis fol. & bract. laciniat. Cor. rubra, barba flavescens. *Var. coma alba, & purpur.*

4. *pratense*. M. fl. lateralibus, secundis: fol. coniugationibus remotis: cor. clausis. *Syst. veg. ed. 14.*

*In Europæ pratis siccis* ☉.

Caul. dodrant. debilis, ramis longis, diffusis. Fol. longiss. angusta, lanceol.; infer. integerr. media dentata; summa 3-fida, hastata. Cal. ex purpura maculat. Cor. lutea, aut rubella.

5. *sylvaticum*, M. fl. lateralibus, secundis: folior. coniugatio-

nibus remotis: cor. hiantibus. *Syst. veg. ed.*  
14. *Fl. Dan. tab.* 145.

*In Europæ sylvis* ☉.

Caul. debilis, ramosus, foliosus. Fol. lunge lanceol. integerr. flavo-virent. summa basi dent. Fl. gemelli. Cor. flava. *Differt a priore cor. dimidio brevior, limbo hiant; tota flava, nec tubo albo.*

885. LATHRÆA. Cal. 4-fid. lab. super. integro; infer. 3-fido. Glandula depressa, ad basin futuræ germinis. Caps. 1-locul. 2-valv. polysper.

1. *clandestina*. L. caule ramoso, subterrest. fl. erectis, solitar. *Syst. veg. ed.* 14.

Orobanche &c. *Rudb. elys.* 2. p. 233. f. 14. *Morif. hist.* 3. f. 12. *tab.* 26. f. 15.

Planta &c. *Dalech. hist.* 960.

*In umbrosis Italiæ, Pyrenæorum &c.* 14.

Denso cespitem terram operit. Caul. infra terram corymbosus. Fl. ex singul. squamis singuli, breviter peduncul. Cal. amplus, turgidus, striatus. Cor. magna, purpurasc.

2. *Phelipæa*. L. cor. campanulato-patentibus. *Syst. veg. ed.* 14. *In Lusitanis umbrosis* 14.

Caul. sesquipalm. foliol. crebris obsitus, ad basin latioribus, apice mucronato. Fl. terminal. 3-4. uncial. & ultra, lutei, raro coccin.

3. *Anblatum*. L. cor. labiis indivisis. *Syst. veg. ed.* 14. *In Oriente* 14.

Cor. purpurasc.

4. *squamaria*. L. caule simpliciss. cor. pendulis; lab. infer. 3-fid. *Syst. veg. ed.* 14. *Fl. Dan. tab.* 136. *Black. tab.* 430. *Riv. tab.* 89.

Dentaria. *Math.* 964.

Orobanche &c. *Rudb. elys.* 2. p. 234. f. 17. *Morif. hist.* 3. f. 12. *tab.* 16. f. 14.

*In Europæ frigidioris umbrosissimis* 14.

Rad. squamosa, alba. Scapi pl. in cespitem collecti, crassi, carnosissimi, colorati. Spica unilateral. Squamæ inter fl. amplæ, subrotund. purpurasc. Cal. albidus, hirsutus. Cor. ex cærul-purpurasc. barba albida.

*quinquefida*. L. caule simplic. spica undiq. imbricata; cal. corollaq. 5-fid. *Forsk. Æg.*

*In Ægypto.*



Caul. pedal. Spica diametro 3-pollic. Cor. flava.  
 886. SCHWAL- Cal. 4-fid. lobo super. minimo ; infimo maxi-  
 BEA. mo, emarginato.

1. *americana*. S. *Syst. veg. ed. 14.*

Euphrasia &c. *Pluk. mant. tab. 348. f. 2.*

*In Amer. Septentr.*

Caul. simpl. 4-gon. pubesc. Fol. lanceol. pube-  
 scent. Fl. alterni, sessil. Cal. pubesc. Cor.  
 atro-rubens, inclinata, tubo longo.

887. TORZIA. Cal. tubulosus, 5-dent. Cor. tubulosa, lab. su-  
 per. 2-fido; infer. 3-part. laciniis omnibus te-  
 re æqualibus. Caps. globosa, 2-valv. 1-sperin.

1. *alpina*. T. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. austr. 2. tab. 165.*

*Mich. gen. tab. 16. Mont. in Zan. tab. 172.*

Dentaria &c. *Mentz. pug. tab. 9. f. 3. 4.*

Orobanche &c. *Morif. hist. 3. f. 12. tab. 16.*  
 f. penult.

Anonyma &c. *Col. ecphr. tab. 50.*

*In alpebus Italicis, Austriacis, Helveticis &c. lo-  
 cis asperis, humidis 24.*

Rad. squamosa. Caul. palmar. ramosus, succu-  
 lentus, albidus, pilosus, ad terram squamo-  
 sus. Fol. opposita, sessil. rotunda, dentata,  
 tenera, glabra, pallide viridia. Pedunc. axil-  
 lar. foliosi, 1-fl. Cor. lutea.

888. PEDICU- Cal. 5-fid. Cor. labiata. Galea fornicata, modice  
 LARIS. interdum incisa, etiam in quibusdam rostrata.

Barba 3-fida, segment. integris, medio mino-  
 re. Caps. ex ovato-conica, obliqua, 2-locul.  
 Sem. angulata.

\* *Caul. ramoso.*

1. *palustris*. P. caul. ramoso: calyc. cristatis, calloso-pun-  
 ctatis: cor. labio obliquo. *Syst. veg. ed. 14.*

*Fl. Dan. tab. 255. Riv. tab. 92.*

*In Europæ Septentr. paludibus ☉.*

Caul. ped-cubit. infra medium ramosus, angula-  
 tus, superne purpur. Fol. petiol. pinnato-terra-  
 ta, carinata: pinnæ longæ, semipinn. pinnulis  
 brevibus, dentatis. Fl. breviter peduncul. Cal.  
 maximus, rubens, 2-fid. Cor. tota purpur.  
 raro alba.

2. *sylvatica*. P. caul. ramoso: calyc. oblong. angulatis, læ-  
 vibus: cor. lab. cordato. *Syst. veg. ed. 14.*

*Fl. Dan. tab. 225.*

*Fistularia*. *Dod. pempt.* 556.

*In Europæ sylvis paludosis* ☉.

Caul. procumb. ramulis patulis. Fol. alterna, 2-pinnatif. Pinnæ latæ, cum nervo confluentes.

Fl. axill. solitar. breviter peduncul. Cor. pallide purpur. maculata, vel alba.

3. *rostrata*. P. caul. declinato, subramoso: cor. galea rostrato-acuminat. calyc. cristatis, subhirsutis. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. austr. 3. tab. 205. Hall. helv. tab. 8. f. 1.*

*Alectorolophus* &c. *Clus. hist. 2. p. 210.*

*In Alpibus* 24.

Rad. fere semper præmorsa, numquam tuberosa. Caul. raro ramosus, sæpe procumbens, vix 2-digit. modo altior, incurvatus, subvillos. purpur. Fol. radical. multa, longe petiol. petiolo sæpe purpurasc. pinnata, pinnis confluentibus, obverse dentat. dentibus reflexis. Fol. hæc quasi circinnata sunt, carnosa, innocue pungentia, retroversa. Fol. caulina opposita, vel alterna. Florum capitulum veluti rosula coinatur, magis retusum quam in *P. verticillata*. Fl. ut in *P. incarnata*; galea nigro-purpur. *Simil. P. tuberosæ.*

\*\* *Carl. simplicissimo.*

4. *Sceptrum*. P. caul. simpl. fl. terno-verticillatis: calyc. cristatis: cor. clausis: capsul. regularibus. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 26. Rudb. it. 1. tab. 1. Fl. lapp. tab. 4. f. 4.*

*In Sveciæ, Borussia, Rutheni spongiosis, sylvaticis* 24.

Caul. speciosus, 2-3-ped. dilute viridis. Fol. radical. 4-8. breviter petiol. medio sinuata, pinnul. æqualibus, ad costam usque sectis, atrovirent. sæpe maculis rufescentibus adspersa. Verticil. sæpe 2-fl. Fl. magni. Cor. clausa, lutea, ore sanguineo.

5. *verticillata*. P. caul. simplici: fol. quaternis. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. austr. 3. tab. 206. Hall. helv. ed. 2. tab. 9. ed. 1. tab. 17. f. 1.*

*Alectorolophos alpina* 2. *Clus. hist. 2. p. 210.*

*In Austria, Helvetia &c.* 24.

Rad. radiculata. Caul. multi, subdodrant. hirsuti, quandoq. solum caput de terra extollit.

Fol. petiol. pinnata, mollia, ferme glabra; radical. plura; caulina interdum gemina: pinnul. sessil. ovatae, obusae, vel oblongae, dentatae. Bract. parvae. Spica densa, lata. Cal. ovatus, inflatus, 10-striatus, albidus, striis virentibus, pilisq. violac. Cor. obtusa, rubens, vel candida.

6. *resupinata*. P. caul. simpl. fol. lanceol-acutis, ferratis, crenulat. fl. resupinatis. *Syst. veg. ed. 14. Gmel. Sib. 3. tab. 44.*

*In Sibiria.*

Caul. ped. laevis. Fol. subpetiol. alterna, indivisa, hirsuta. Fl. ex alis superior. solitar. sessil. magni. Cor. sature purpur. galea adunca, compressa: vexillo amplo, rotundato.

7. *recutita*. P. caul. simpl. fol. pinnatifid. ferratis: spica foliosa: calyc. coloratis: cor. obtusis. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. austr. 3. tab. 258. Hall. helv. tab. 8. f. 2.*

*In summis Helvetiae alpibus, in Austria &c. 24.*

Rad. ex uno, vel pl. tuberibus constans. Caul. crassus, glaber, quandoq. subpurpureo. inferne plerumq. nudus, valde foliosus; fol. subspecta multis, pedal-cubital. Fol. pinnatifid. serrata: radical. multa, longe petiol. caulina in medio caulis. Pinnae iuxta eminentem fol. nervum confluentes, carnosae, supra sature virides, subtus pallidiores, pinnarum paribus 13-16. Fl. ex alis superioribus solitar. dein in spicam densam congesti, subtus foliosi. Cal. coloratus. Cor. galea obsolete rubra, obtusa, nec rostrata. Pistil. longiss. ad angulum acutum satis deorsum flectens.

8. *tristis*. P. caul. simpl. cor. galeis margine villosis. *Syst. veg. ed. 14.*

*In Sibiria.*

Planta hirsutiss. Caul. spitham. Fol. alterna, pinnatifid. ferrulata. Fl. spicati. Cor. obtusae, ochroleucae; galea parum incurva.

9. *flammea*. P. caul. simplic. fol. pinnat. retro imbricatis. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Lapp. tab. 11. f. 2. Hall. helv. tab. 9. f. 1.*

*In alpibus Helvetiae, Lapponiae &c. 24.*

Caul. erectus, crassus. Fol. multa, glauca, pinnis congestis. Fl. praelongi. Cal. hirsutus. Cor. atro-purpur, praesertim apice.



478 DIDYNAMIA ANGIOSPERMIA:

10. *hirsuta*. P. caul. simplic. fol. dentato-pinnat. linearibus: calyc. hirsutis. *Syst. veg. ed. 14. All. Fl. Ped. tab. 3. f. 1. Fl. Lapp. tab. 4. f. 3. Allion. pedem. tab. 11. f. 1.?*

*In alpibus* 24.

Caul. vix digital. Cor. pallide incarnata; barba macula saturiore.

11. *rosea*. P. caul. simplici: fol. pinnatis: pinnis oblong. pinnatifid. calyc. hirsutis. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. rar. tab. 40. qui synonym. Allion. præcedens huc refert.*

*Habitat*

Fol. radical. multa. Frondes 2--pinn. lanceol. Pinnæ admodum angustæ, lineares, sessil. pinnatifido-denticul. planæ, utrimq. magnitudine decrescientes, nudæ, supra satore viridi sub- tus aquose virent. Fol. in caule unicum; duo minora. Caul. 1-2-3, erecti, ex tereti-suban- gulati, glabri, nitidi, superius albo-villosi in prima ætate. Spica terminal. brevis, compa- cta, fl. pedicellis brevibus, rubris, bracteatis. Cal. villis lanuginosis, albis, diaphanis. Cor. elegans, perforata, rubra, tubo ex rubro in album emoriente: galea recta, compressa, obtusiss. semiclausa, satore rubra, sub apice demum 2-fida. Lab. infer. 3-lob. lobis ro- tundatis, integris, medio nonnihil brevior.

12. *incarnata*. P. caul. simplici: fol. pinnatis, pinnis dentat. calyc. rotundatis, cor. galea uncinata, acuta. *Syst. veg. ed. 14. All. Fl. Ped. tab. 3. f. 2. tab. 4. f. 2. Jacq. austr. tab. 140. Allion. pe- dem. tab. 12. f. 2. sed calyc. villosi, acutio- res.*

*In Helvetia, Austria &c. pratis alpinis* 24.

Rad. tuberosa. Caul. pedal. & ultra, nitidus, superne purpurasc. Fol. alterna, petiol. gla- bra: radical. pedalia, pinnata, pinnis pinna- tific. Caulina pinnatifida fere ad basin, serrata. Spica longa, rara, aphylla. Bract. plerumq. profunde 3-fid. & lineares. Cal. semiglobosus, 5-dent. atro-purpur. Cor. incarnata; galea fal- cata, valde adunca.

13. *Lapponica*. P. caul. simplic. fol. pinnatifid. serratis; calyc. obtusis, 2-fid. *Syst. veg. ed. Fl. Dan. tab. 2. Fl. Lapp. tab. 4. f. 1.*

*In alpibus Lapponicis* 24.

Caul. suberect. spitham. teres, lævis. Fol. omnia æqualia; radical. vix ulla; caulina 7-8. alterna, basi in petiol. angustata, lanceol. acuta. Spica terminal. laxa, 4-gon. Fol. floralia inferiora fl. longiora. Fl. cernui. Cor. flava.

14. *comosa*. P. caul. simpl. spica foliosa; cor. galea acuta, emarginata; calyc. 5-dent. *Syst. veg. ed. 14. Allion. pedem. tab. 12. f. 1. & Fl. Ped. tab. 4. f. 1.*

b. P. *alpina* &c. *Allion. l. c. tab. 12. f. 2.*

*In alpinis Italicis, Pyrenæis* 24.

Tota planta villis albidis obsita. Caul. palmar. & ultra. Fol. duplicato-pinn. tenuia longe elliptic-acum. pinnis 20. & ultra, extremis confluentibus: prima fol. longe petiol. 2.a sessil. Longa fol. inter fl. spicam comosam efformant. Cal. tubulosus, 5-dent. parum pilosus. Cor. lutea, lab. super. acuto, sed emarginato; dentibus duobus acutis, nutantibus.

15. *foliosa*. P. caul. simpl. spica foliosa: cor. galea obtusiss. integra; calyc. 5-dent. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. austr. 2. tab. 139. Hall. helv. tab. 9. f. 2.*

P. *alpina* &c. *Bauh. hist. 3. p. 43. 438.*

*Alectorolophus alp. 1. Clus. hist. 2. p. 210.*

*In alpinis Helvetiæ, Austriæ &c. 24.*

Caul. pedal. & altior. Fol. bipinnatifid. caulina pauca, decursive pinnata, ut in *Tanaceto*, *Achillea* &c. Spica crassa. Cal. angulis, oreq. pilosis. Cor. ochroleuca; galea non rostrata, obtusiss. adunca.

16. *canadensis*. P. caul. simplic. spica subfoliosa: cor. galea setaceo--bidentata: calyc. deorsum truncatis. *Syst. veg. ed. 14.*

*In Americ. septentr. 24.*

Caul. erect. spitham. superne pubescens. Fol. alterna, pinnatifid. incisa, crenata, obtusa, lævia. Spica terminal. sessil. ovata. Cal. pubesc. Cor. alba; galea subfalcata, vix rostrata; barba 3-fid. obtusa.

17. *tuberosa*. P. caul. simplic. calyc. cristatis; cor. galea rostrato-adunca. *Syst. veg. ed. 14. Hall. helv. tab. 10.*

*Alectorolophus &c. Barr. ic. 466. Bocc. mus. tab. 8.*

*In alpinis Italicis, Helveticis &c. 24.*

Rad. *Asphodeli*. Caul. spitham. 1-2-fol. glaber, vel hirsutus. Fol. *Millefolii*, ad terram multa, longa, pinnis semipinnat; pinnaulis uno, alterove dente, pinnis latis, aut angustis. Fl. dense spicati. Cal. glaber, aut hirsutus. Cor. purpur.

---

*flava.*

*P. Pall. it. 3. tab. R. f. 1. A. B.*

*In Dauuria 24.*

Caul. pollic-spitham. subtomentosus, præsertim senior, angulis alternis a nervo fol. decurrente productis. Fol. alterna, lineari-pinnatif. succulenta, pinnis distantibus, pinnatifidodent. Spica oblong. imbricata, basi rariuscula, & fol. quasi dilatatis frondosa. Cal. tomentosus. Cor. magna, flava.

*striata.*

*P. Pall. it. 3. tab. R. f. 2. C.*

*In Dauuria 24.*

Tota planta glabra, sicca. Caul. ad summum dodrant. pl. simplic. Fol. alterna, pinnatifid. pinnis linearibus, paralellis, ferrulatis. Fl. spica terminal. imbricata, bract. trifurcis, & lanceolat. intermixta. Cor. calyce triplo longior, erecta, lutea, venis puniceis, vel obscure purpur. picta.

*miryophylla.*

*P. Pall. it. 3. tab. S. fig. 1. A.*

*In Dauuria.*

Caul. pedal. sæpe ramis ternis lateralibus, foliosus. Fol. crebra, verticillato-terna, pinnatifid. filiform. pinnis copiosis, distantibus, paralellis, dentato-ferratis. E verticillis caul. primarii mediis, sæpe ramuli totidem quot folia; fl. paucis terminalibus. Spicæ terminales, confertæ, intermixtæ bract. foliol. pinnatifid. similibus; petiolo in vaginam ovatam, concavam dilatato. Cal. ventricosus. Cor. erecta, flava.

*spicata.*

*P. Pall. it. 3. tab. S. fig. 2. B.*

*In Dauuria.*

Caul. plerumq. ulnares, simpl. recti, piloso-subclavari, præsertim ad verticillos remotissimos. Fol. verticillatim quaterna, lanceol. pinnatifid. pinnis distantibus, obtusis, crenulatis; inferioribus minoribus. E verticill. superioribus modo ramuli nudi, spica parva, termi-



terminati; vel fl. sessiles. Spica primaria terminal. cylindrica, bracteis confertim imbricata, basi involucreta, fol. quaternis, lanceolat. crenatis. Bract. inter fl. Cal. ovatus. Cor. parvula ad angulum rectum, ut in *P. verticillata*, exerta, nutans, purpur.

*acaulis.*

*P. Scop. Fl. Carn. ed. 2. tab. 31.*

*In Carniola.*

Fol. radical. 2-3-unc. pinnata; pinnis pinnat. segmentis dentatis; petiol. semicylindric. Pedunc. 4. linear. villosi. Cal. 5-gon. 5-fid. Cor. fere uncial. pallide rubra.

(*cristata.*)

*P. caul. simplic. fol. pinnatis, pinnulis obtuse dentat. galea rostrata. Hall. helv. n. 324.*

*In Helvetia.*

Caul. erectus, dodrante non altior, durus, hirsutus. Fol. concinna. Spica rarior, non foliosa. Cal. cristatus, glaber. Flos speciosus: galea longa, & acute rostrata, falcata.

889. GERAR-DIA. Cal. 5-fid. Cor. 2-lab. lab. infer. 3-part. lobis emarginatis; medio 2-part. Caps. basi dehiscentis, 3-locul.

1. *tuberosa.* *G. fol. subovat. tomentosis, repandis, longitudine caul. Syst. veg. ed. 14. Plum. gen. ic. 75 f. 2.*

*In Amer. calidiore.*

Radix tuberculosa. Fol. longis, crassis, hirtisq. petiol. innixa, undulata.

2. *japonica.* *G. fol. ovatis, inciso-pinnatifid. petiolat. caul. simpl. Syst. veg. ed. 14. Thumb. Jap.*

*In Japonia.*

Planta villosa. Fl. axill. peduncul. solitar. Cor. purpurasc. Differt a *G. pedicularia*, caule simplic. pedunculis fol. brevioribus & fol. inciso-pinnatifid. pinnis serratis.

3. *delphinifolia.* *G. fol. linear. pinnatifid. caule subramoso. Syst. veg. ed. 14.*

*In India orient. ☉.*

Caul. erect. pedal. lævis, ramis rarioribus, alternis. Fol. opposita, glabra. Fl. a medio caulis ad summum, axill. oppositi, secundi. Cor. oblonga, fauce hiant, limbo 5-fid. rotund. lacin. 2. superioribus brevioribus.

4. *scabra.* *G. hispida, scabra: fol. oblong. pinnatifid. Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*

*Habitat*

*Tom. III.*

H h

5. *purpurea*. G. fol. linearibus. *Syst. veg. ed.* 14.  
*Digitalis* &c. *Pluk. mant. tab.* 388. f. 1.  
*In Virginia, Canada* ☉.  
 Caul. pedal. filiform. simplic. aut brachiati, læves. Fol. opposita, sæpe & alterna, integerr. Fl. oppositi. Pedunc. filiform. 1-fl. Cal. parvus, campanulat. 5-dent. Cor. sature purpur. fig. varians, rotata, campanulata, tubulosa. *Conf. Pluk. phyt.* 12. f. 2.
6. *tubulosa*. G. lævis: fol. linear. integris, acutis; tubo calyce longiore. *Syst. veg. ed.* 14. *Lin. Suppl.*  
*Ad cap. b. Spei.*
7. *flava*. G. fol. lanceolat-pinnato-dent. caul. simpliciss. *Syst. veg. ed.* 14.  
*Digitalis* &c. *Pluk. mant. tab.* 368. *amalth. tab.* 389. f. 1.  
*In Virginia, Canada.*  
 Caul. pedal. & ultra. Fol. opposita, subpetiol. (*Lycopi, aut Jaceæ*) basi incisa pinnatim sinubus patulis. Spica terminal. laxa, ex fl. oppositis, magnis, flavis.
8. *pedicularia*. G. fol. oblongis, duplicato-ferrat. caul. paniculato: calyc. crenaris. *Syst. veg. ed.* 14.  
*In Virginia, Canada* ☿.  
 Fol. opposita, sublaciniata. Fl. pedunculis uncial. nixi, oppositi, ampli, lutei, odori. *Ad fin. Pediculari tristi.*
9. *glutinosa*. G. fol. ovatis, ferratis: bracteis linear. hispidis. *Syst. veg. ed.* 14. *Ofb. it. tab.* 9.  
*In China.*  
 Caul. erect. teretiuscul. ramis brevioribus. Fol. opposita, petiol. acuta, pollice latiora, profunde ferrata, subvillosa. Racem. terminal. solitar. ex fl. oppositis, brevissime pedunculat. Cal. acutus, 5-part. lacinia super. ma.
10. *nigrina*. G. scabra: fol. lanceolat. inferne ferratis: caule 4-gono. *Syst. veg. ed.* 14. *Lin. Suppl.*  
*Melasma scabrum. Berg. Cap. tab.* 3. f. 4.  
*Ad cap. b. Spei.*  
*Herba Lythri. Cal. Cucubali bacciferi. Cor. Lycopsidis pullæ.* Caul. erect. herbac. sesquiped. teretes, scabri, non articulati. Fol. opposita, sessilia, dente utrimq. unico, scabra. Fl. axill. solitar. penduli, peduncul. Bract. in medio pedunc. binæ, oppositæ, lanceol. fl. breviores.

890. CHELO- Cal. 5-part. Rudimentum filamenti 5.ti inter su-  
NE. prema stam. Caps. 2-locul.

1. *glabra*. C. fol. petiolat. lanceolat. ferratis; summis op-  
positis. *Syst. veg. ed. 14.*

*In Virginia, Canada 24.*

Radix reptatrix. Fol. opposita, longa, acumi-  
nata. Cor. alba.

2. *obliqua*. C. fol. petiolat. lanceolat. ferratis, oppositis.  
*Syst. veg. ed. 14. Mill. ic. tab. 93.*

*Digitalis &c. Pluk. man. tab. 348. f. 3.*

*In Virginia, Canada 24.*

*Differt a priore, rad. minus repente: fol. latio-  
ribus, profundius ferratis: fl. purpur.*

3. *hirsuta*. C. caul. foliisq. hirsutis. *Syst. veg. ed. 14.*

*In Virginia.*

*An variet. prioris? Caul. durus, nigricans. Fol.  
opposita, sessil. acumin. atro-virent. foetida.  
Fl. ampli, pallide coerul.*

4. *Penstemon*. C. fol. amplexicaulibus: panicula dichotoma.  
*Syst. veg. ed. 14. Arduin. Spec. tab. 5.*

*Dracocephalus &c. Moris. hist. 3. f. 11. tab.  
21. f. 2.*

*Digitalis &c. Moris. hist. 2. f. 5. tab. 8. f. 6.*

*b. Dracocephalus &c. Moris. hist. 3. f. 11. tab.  
21. f. 3.*

*In Virginia.*

Caul. erectus, teres, pubescens. Fol. infer.  
ovata, acumin. integerr. super. amplexicaul.  
lanceol. dentata. Cor. personata, albido-pur-  
purasc. Faux oblonga, ventricosa. Rictus al-  
bus. Lab. super. brevius, obtuse 2-part. re-  
flexum: lab. infer. 3-fid. rectum, obtusum,  
lateribus reflexis.

5. *Ruelloides*. C. fol. radicalibus petiolat. ovat. ferratis: cau-  
linis oppositis, amplexicaulibus peduncul. elon-  
gatis; calyc. ciliatis. *Syst. veg. ed. 14. Lin.  
Suppl.*

*In terra del Fuego 24.*

Fol. radical. bina, subtus cinerea, subnervosa.  
Caul. decumbens, fol. remotis. Pedunc. axill.  
oppositi. Cor. curva, purpur.

891. GESNE- Cal. 5-fid. germini insidens. Cor. incurva, re-  
RIA. curvaque. Caps. infera, 2-locul.

1. *humilis*. G. fol. lanceol. ferratis, sessilibus: peduncul.  
ramosis, multifi. *Syst. veg. ed. 14. Plum. ger.  
ic. 133. f. 2.*



*Digitalis* &c. *Sloan. Jam. hist. 1. tab. 104. f. 2.*  
*In Amer. australi* ♀.

Tota planta vehementem spirat odorem. Rad. diffusa. Caul. 2-ped. ramosi, inferne nudi, asperi. Fol. superne adgregata, decidua. Fl. luteo--virid. maculis obscuris intus præditi. Caps. subrotun.

2. *acaulis*. G. fol. lanceolat-ovatis, serratis, subpetiolat. terminali-confertis: pedunc. 3-fl. fol. brevioribus. *Syst. veg. ed. 14.*

*Ranunculo* &c. *Sloan. Jam. hist. 1. tab. 102. f. 1.*

*In Jamaica*.

Planta in rupibus terræ adpressa. Fol. palmar. scabra, subtus venosa. Pedunc. comm. ad basin fere divisi. Fl. conferti, breviss. pedunc. Cal. urceolat. Cor. coccinea.

3. *tomentosa*. G. fol. ovato-lanceol. crenatis, hirsutis: pedunc. lateralibus longiss. corymbiferis. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. amer. tab. 175. ed. 2. picta tab. 261. f. 47. Plum. gen. ic. 34.*

*Ad Amer. meridion. ripas* ♀

Caul. fruticosi, 2-4-ped. pl. erecti, raro ramosi, teretes, incurvi. Fol. 5-pollic. opposita, breviter petiol. t. rugosa, venosa, foetida, supra scabra, subtus tomentosa. Pedunc. semiped. villosi, sub 10-fl. Cor. extus sordide virens, intus sordide atro-purpur. foetida, viscosa. Caps. oblong.

892. ANTIR- Cal. 5-phyll. Cor. tubulosæ, ventricosæ basis  
 RHINUM. deorsum prominens, nectarifera. Caps. 2-locul. rotundata.

\* *Fol. angulatis*.

1. *Cymbalaria*. A. fol. cordatis, 5-7-lobis, alternis: caulibus procumbentibus. *Syst. veg. ed. 14.*

*Cymbalaria. Riv. monop. tab. 86. Cam. epit. 860.*

*In Europæ muris* ☉.

Caulicul. ramosiss. purpurascens. Petioli, pedunculiq. longiss. Fol. alterna, succulenta, subtus purpurasc. Fl. axillar. solitar. Cal. purpurasc. Cor. purpurasc. rictu pallido. Sem. rugosa, ut nuclei *Juglandis*. *Var. fl. albo.*

2. *pilosum*. A. fol. reniform. pilosiss. alternis: caulibus pro-

cumbentibus. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. Obs. 2. tab. 48.*

*In alpibus.*

*Statura, & filia prioris, sed tota pilosiss. Caul. dense sibi invicem intertexti. Fol. longe petiol. multa, parva, in 7-9-11. lobos, obtusos, crenulatos divisa. Pedunc. axillar. filiform. solitar. 1-fl. Cal. pilosus. Cor. minima.*

3. *Elatine.* A. fol. hastatis, alternis: caulibus procumbentibus. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 426. Black. tab. 170. Cam. epit. 754.*

*In Europæ arvis ☉.*

*Caul. multi, 2-ped. Fol. petiolata; ima ovata, dentata, ad ramos subhastata, & integra. Pedunc. axillar. penduli. Cor. palatum, & nectarium flavum; limbus purpur. Var. fl. cœrul.*

4. *spurium.* A. fol. ovatis, alternis: caulibus procumbentibus. *Syst. veg. ed. 14.*

*Elatine. Riv. tab. 86.*

*Veronica fœm. Dod. pempt. 42.*

*In Europæ arvis ☉.*

*Caul. ramosi, foliosi, admodum hirsuti. Fol. canescent. integerr. vel acutis dentibus ferrata, lanceol. ima opposita. Fl. axillar. solitar. longe peduncul. Cor. galea atro-purpurea; barba lutea.*

*Peloria & in hac Comm. Gott. 2. tab. 15. f. 4. A& helv. 2. tab. 4.*

5. *cirrhosum.* A. fol. hastatis, alternis: caulibus patulis, petiol. passim cirrhescentibus. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. hort. tab. 82.*

*Linaria &c. Till. pis. tab. 32. f. 2.*

*In Ægypto ☉.*

*Caul. filiform. diffusi, ramosiss. virgati, purpurasc. raro pubescent. Fol. petiol. subnitida, læte virid. Pedunc. lateral. axillar. capillar. fol. longiores, purpurasc. 1-fl. Fl. exigui. Cor. pallide cœrul. palato albido, purpur. punctis notato. Calcar cor. rectum, nec recurvatum, ut in sequenti.*

6. *ægyptiacum.* A. fol. hastatis, alternis: caul. erecto, ramosiss. peduncul. rigescentibus. *Syst. veg. ed. 14.*

*In Ægypto.*

*Simil. A. Elatines. Caul. virgati, vix pubescent.*

Cor. lutea, sed absque macula nigra, at palato purpurasc. punctato. Calcar recurvum, cœrulesc.

\*\* *Fol. oppositis.*

7. *triphylum*. A fol. (plerumq.) ternis, ovatis. *Syst. veg. ed.*

14. *Mont in Zann. tab. 34. f. 3.*

*Linaria hispanica Clus. hist. 1. p. 320. Pluk. phyt. tab. 96. f. 4.*

*Linaria sicula &c. Bocc. sic. tab. 22.*

*In Sicilia &c. montibus umbrosis ☉.*

Caul. semiped. fragilis, inferne rubescens. Fol. sessil. obtusa, integerr. superiora opposita, vel alterna. Fl. subspicati. Cor. lutea, galea pallide rubra; barba crocea. *Var. fol. binis.*

8. *triornithophorum*. A. fol. quaternis, lanceolat. caul. erecto, ramoso: fl. pedunculat. *Syst. veg. ed. 14.*

*Linaria &c. Herm. Lugd. tab. 377. Riv. mon. tab. 81.*

*In Lusitania, America.*

Altitudo humana. Fol. interdum terna-quina.

Cor. purpur., galea fornicata.

9. *purpureum*. A. fol. quaternis, lanceol-linearibus: caul. florifero erecto, spicato. *Syst. veg. ed. 14.*

*Linaria &c. Riv. mon. tab. 82. Bauh. hist. 3. p. 460. Dod. pempt. 183.*

*Ad radices Vesuvii 24.*

Caul. 2-ped. teres, lævis. Rami inferiores ex alis super. minores, florentes. Fol. alterna, infer. verticillata, patentia, lævia, subtus trinervia. Racemi terminal. erecti, longi, simplic. Cal. minimus. Cor. violac. extus pallidior. Calcar extrorsum curvatum. Anth. luteæ.

10. *versicolor*. A. fol. lineari-lanceol. inferioribus ternis: caul. erecto, spicato. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. ic. rar. tab. 31.*

*Habitat . . . .*

Caul. erectus, spitham. simpl. teres, viridis. Fol. sessil. acutiuscula, integerr. glabra. Fl. ad caulem erecti, ut in A. *Linaria*, cuius magnitudinem, & fig. referunt, inodori. Cor. lab. super. magnum, semi-2-fid. ex ochroleuco-pallidum: lab. infer. lacinia rotundata, in-



termedia minima, concolores. Palatum prominens, luteum. Caps. subdidyma, 2-locul.

11. *repens*. A. fol. confertis, linearibus, inferne quaternis: cal. capsulam æquantibus. *Syst. veg. ed. 14.*

*Linaria* &c. *Dill. elth. tab. 163. f. 197.*

*In Italia, Gallia* &c. ☉.

Rad. repens. Caul. 1-2-ped. erecti, vel humifusi. Fol. oblonga, angusta. Ramuli axillar. Fl. terminal. parvuli. Cor. albida, lineis cœrul. vel purpur. dein tota ex cœruleo-cinerea, inodora.

12. *monsperfulanum*. A. fol. linearibus, confertis: caul. paniculato, nitido: peduncul. spicatis, nitidis. *Syst. veg. ed. 14.*

*Linaria* &c. *Bauh. hist. 3. p. 459.*

*In Gallia* 24.

*Simil.* A. *sparteo*, & etiam ad fine priori. Flos paulo minor, & præter 2 lineas flavas, barbatus, quæ gulam percurrunt in lab. inferiori, habet ad originem barbæ maculas 2 flavas distinctas.

13. *sparteum*. A. fol. subulat. canaliculat. carnosis; inferior. ternis: caul. paniculato: corollisq. glaberrim. *Syst. veg. ed. 14.*

*In Hispania* ♂.

Rad. altero anno florida. Caul. erect. pedâl. glaberr. ramis virgatis. Fol. infer. oblonga. Cor. flava, palato glabro, cum tinctura rubicunda in retuso gibbo palati. *Differt a sequenti, fl. pedunculat. triplo ma: sicuti tota planta.*

14. *bipunctatum*. A. fol. linearibus, glabris; inferior. quaternis: caul. erecto, paniculato; fl. spicato-capitatis. *Syst. veg. ed. 14.*

*Linaria lutea* &c. *Bauh. hist. 3. p. 357.*

*In Hispania, Italiae arvis* ☉.

Caul. spitham. ramis ad angulum rectum exeuntib. Fol. sessil. plana, patentia, vix carnosâ, fere levia. Fl. subspicati, pauci, minimi, sessil. Cor. flava, punctis duobus fulvis in palato glabro versus lab. super.

15. *triste*. A. fol. linearibus, sparsis; inferior. oppositis: nectar. subulatis: fl. subsessilibus. *Syst. veg. ed. 14.*

*Linaria* &c. *Mart. dec. 35. f. 2. Dill. elth. tab. 264. f. 199. Mill. ic. tab. 166.*

*Habitat Gibraltariæ,*

Caul. pl. sæpius decumbent. Fol. subcarnosa, convexa, rore glauca. Capitulum ante anthesin simil. *A. arvensi*, cal. & bracteis folis pubescentibus. Cor. col. *Loti Jacobæi*, vel ciner. luteo, purpur. Caps. craniolaris.

16. *supinum*. *A.* fol. subquaternis, linearibus: caul. diffuso: fl. racemosis, calcari recto. *Syst. veg. ed. 14.*  
*Linaria hispanica* &c. *Clus. Hist. 1. p. 321.*

*In Gallia, Hispaniæ arenosis* ☉.

*Simil. priori, sed caul. non glaber.* Caul. palm-cubital. inferne purpuro-violac. superne glauco-virid. ramosus. Fol. fere filiform. ut in *A. sparteo*, conferta, carnosa; caulina alterna. Calyc. lacin. superior cæteris longior. Cor. flava, vel alba, variegata, aut purpur. rictu aureo.

17. *arvensis*. *A.* fol. sublinearibus: inferior. quaternis: calyc. piloso-viscidis. fl. spicatis: caul. erecto. *Syst. veg. ed. 14. Sabb. hort. 3. tab. 5.*

*Linaria* &c. *Dill. elth. tab. 263. f. 198.*

*b. Linaria tetraphylla* &c. *Col. ceph. 1. tab. 300. f. 1.*

*In Europæ arvis* ☉.

Caul. subped. glauco-virid. ramis alternis. Fol. sessil. glabra, glauco-virid., infer. opposita, super. alterna. Fl. parvi, bract. reflexa, calcare recurvo. Cor. cœrul. fauce albida, venis cœrul.

18. *pelisserianum*. *A.* fol. caulinis linearibus, alternis: radicalibus lanceolat. ternis: fl. corymbosis. *Syst. veg. ed. 14. Sabb. hort. 3. tab. 4.*

*Linaria* &c. *Barrel. ic. 1162. Lob. illus. 103. Bauh. hist. 3. p. 461.*

*In Italia, Gallia* ☉.

Caul. erect. spitham. teres, glaberr. subramosus. Fol. remotiss. subcarnosa, glabra. Fl. parvi. Cal. lacin. distantibus. Cor. violac. palato albo, venis violac. obsoletis, lab. super. longiore. Calcar rectum, cor. fere longior. *Var. cor. lutea, calcare albo.*

19. *saxatile*. *A.* fol. lanceol-linear. sparsis, villosis; inferioribus quaternis: caule decumbent. fl. spicatis. *Syst. veg. ed. 14.*

*In Hispania* ☉.

Caul. adscendent, superne ramosi, villosi. Fol.

pubescenti-viscida, apice patula. Cal. lanatus.  
Cor. flaviss. punctata.

20. *viscosum*. A. fol. caulinis linearibus, alternis; radicalibus lanceolat. quaternis; calyc. villosis, cauli adproximatis. *Syst. veg. ed. 14.*

*In Hispania* ☉.

*Planta erecta, statura A. pelisseriani, at fl. magnitudine Linariæ. Caul. steriles diffusi. Racemus simplex, longus, piloso-viscidus.*

21. *multicaule*. A. fol. subquinis, linearibus, obtusis, carnosis: fl. capitatis. *Syst. veg. ed. 14.*

*Linaria &c. Bocc. Sic. tab. 19. f. 1.*

*In Sicilia, Oriente* ☉.

*Caul. cubit. ramosi, iuncei, subrubent. Fol. unc. longa; infer. in orbem disposita; super. inordinata: Cor. lutea.*

22. *glaucum*. A. fol. quaternis, subulat. carnosis: caulibus erectis: fl. spicatis. *Syst. veg. ed. 14.*

*Linaria &c. Buxb. cent. 4. tab. 37.*

*In Europa australi, Oriente* ☉.

*Nimis adsine priori. Caul. subped. glauco-virid. Spica rarior. Calcar striis cœrul. Cal. glaber. Cor. flava, fauce fulva.*

23. *alpinum*. A. fol. subquaternis, lineari-lanceol. glaucis: caul. diffuso: fl. racemosis, calcare recto. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. austr. 1. tab. 58.*

*Linaria 3. Clus. hist. 1. p. 322.*

*In alpibus* ☉.

*Caul. multi, vix dodrant. Fol. opposita, summa solitaria, lanceol. verticillis remotis, crassa, avenia, glauca. Racemi densi. Fl. cœrul. palato luteo; aut rubri, vel purpur. rictu aureo.*

24. *bicorne*. A. fol. oppositis (inferior.), ovat-oblong. ferratis: caul. erecto: fl. racemosis: capsul. bicornibus. *Syst. veg. ed. 14. Burm. afr. tab. 75. f. 3.*

*Ad cap. b. Spei* ☉.

*Caul. sesquiped. 4-gonus, brachiatus. Fol. profunde, & remote ferrata, glabra, super. sessil. lanceol. Cor. cœrul. fauce lutea.*

25. *villosum*. A. fol. omnibus oppositis, ovatis, villosis: caulibus simplicibus: fl. lateralibus oppositis. *Syst. veg. ed. 14. Barr. ic. 597.*

*In Hispania* ☉.

*Tota planta, densissime pilosa. Fol. minuta, petiolis breviora. Cor. ampla, alba.*



490 DIDYNAMIA ANGYOSPERMIA.

26. *origanifolium*. A. fol. plerifq. oppositis, oblongis: fl. alternis. *Syst. veg. ed. 14. Pluk. ph. t. tab. 137. f. 1.*  
*A. saxatile* &c. *Barr. ic. 598 1102. 1103.*  
*Orontium* &c. *Barr. ic. 1313.*  
*In Pyrenæis* &c. ☉.  
*Planta polymorpha, varians fol. ovat. & lanceolat.*  
*Differt ab A. minore ramis lignosis: fol. caul-*  
*nis omnibus oppositis; floriferis tamen alternis;*  
*fl. duplo ma. Fl. axillar. racemosi, laxi, ru-*  
*belli.*
27. *pinnatum*. A. fol. oppositis, pinnatifid. caul. erecto: fl. racemosi. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*  
*Ad cap. b. Spei.*
- \*\*\* *Fol. alternis.*
28. *minus*. A. fol. plerifq. alternis, lanceol. obtusis: caul. diffuso, ramosiss. *Syst. veg. ea. 14. Fl. Dan. tab. 502.*  
*A. tertium. Cam. epit. 922.*  
*Linaria* &c. *Riv. mon. tab. 85.*  
*In Europæ ruderatis* &c. ☉.  
*Pareitate sua; fol. angustis, variis dispositis &*  
*reliquis differt. Planta mire varians; tota pin-*  
*guis, viscosa. Caul. dodrant. ramosus. Fol.*  
*ima per tria paria tantum opposita; super. al-*  
*terna, subtus sæpe purpurascens. Fl. axill.*  
*solitar. peduncul. exigui. Cor. tubus, & ga-*  
*lea violac., barba albida. Caps. ovalis, 2.*  
*foraminibus hians.*
29. *dalmaticum*. A. fol. alternis, cordat. amplexicaulibus. *Syst. veg. ed. 14. Mont. in Zann. tab. 106.*  
*Linaria maxima* &c. *Bauh. hist. 3. p. 458. Buxb. cent. 1. tab. 24.*  
*In Creta, Armenia* ☉.  
*Caul. 4-cubit. Fol. glabra, tenui polline adspersa.*  
*Fl. axill. solitar. peduncul. grandiusculi,*  
*flavi, odori.*
30. *hirtum*. A. fol. (caulinis) lanceolat. hirtis, alternis: fl. spicatis; folioso calycino supremo maximo. *Syst. veg. ed. 14.*  
*In Hispania* ☉.  
*Planta glutiniferis pilis hirta, odore Narcissi.*  
*Caul. aliquot, spitham. non ramosi. Fol. in-*  
*fer. quaterna, ovat-acuta. Fl. dense spicati,*  
*col. & magnitudine A. Linariæ. Cal. lacin.*

superior cæteris duplo maior. Caps. subrotunda.

31. *genistifolium*. A. fol. lanceol. acuminat. panicula virgata, flexuosa. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. austr. 3. tab. 224.*

*Linaria pannonica* 2. *Clus. hist. p. 321.*

*In Austria, Sibiria &c. 24.*

*Vix differt ab A. Linaria.* Planta glauca. Caul. subdecumbent. vel erectiusculi, 2-4-ped. toti foliosi, paniculati. Fol. alterna, sessil. glabra, omnino *Genistæ tinctoriæ*, carnosæ, longa, subtus trinervia. Racemi longi. Fl. distantes, alterni. Cor. lutea, magnitudine A. *Linariæ*.

32. *iunceum*. A. fol. linearibus, alternis: caul. paniculato, virgato: fl. racemosis. *Syst. veg. ed. 14.*

*In Hispania ☉.*

Caul. sesquiped. angulatus, ramis ramosiss. Fol. longa, subcarnosa, supra plana, subtus tertia. Cor. flava, palato fulvo. Calcar longum, flavum.

33. *Linaria*. A. fol. lanceolato-linear. confertis: caul. erecto: spicis terminalibus, sessilibus: fl. inbricat. *Syst. veg. ed. 14. Ludw. ed. 12. Blak. tab. 115. Riv. tab. 83. Knorr. del. hort. 2. tab. L. 6.*

*Osyris. Fuchsf. hist. 543. Camer. epit. 390.*

*In Europæ ruderatis 24.*

Caul. cubit. foliosiss. apice ramosus. Fol. glauca, glabra. Spicæ breves, & densæ. Cor. lutea, palato fulvo, villosa. *Var. fl. min.*

*Peloria Aman. acad. T. 3. Linariæ proles hybrida, cor. regulari &c.*

34. *linifolium*. A. fol. angusto-lanceol. alternis, trinerviis: fl. racemosis; peduncul. distantibus, bracteis brevioribus. *Syst. veg. ed. 14.*

*Linaria &c. Buxb. cent. 1. tab. 25. f. 3. mala.*

*In Italiæ maritimis 24.*

Caul. erecti, teretes, læves, ramis alternis. Fol. alterna, remota, lævia, obsolete trinervia, exquiritæ acumin. Racemus rectus, longus. Bract. lanceol. Cal. breves, acuti, Cor. lutea, palato interius villosa, calcari recto, longitud. floris.

35. *chalepense*. A. fol. linear-lanceol. alternis: fl. racemosis; calyc. cor. longioribus: caul. erecto. *Syst. veg. ed. 14.*

*Linaria* &c. *Riv. mon. tab.* 80. f. 2. *Morif. hist.* 3. f. 5. *tab.* 35. f. 9. *Triumpf. Obs. tab.* 87. f. 2. *In Italia, Monspelii* ☉.

Caul. 2-3-palm. initio decumbent. Fol. ima quaterna; super. alterna, rara. Fl. laxe racemosi, parvi. Cor. alba, lineis discoloribus. Calcar cor. longius.

36. *reflexum*. A. fol. ovatis, alternis, glabris: peduncul. axillaribus, fructiferis elongatis, recurvatis: caule procumb. *Syst. veg. ed.* 14. *Allion. Corf.* 205. f. 1.

*In Barbaria.*

Caul. spitham. filiform. Fol. primordialia opposita; caulina ternata-raro quaternata; ramea alterna: subpetiol. remota. Pedunc. solitar. 1-fl. Cal. acumin. Cor. pallida, rictu aureo. Cor. calcar longitudine fl. Caps. globosa.

37. *peduncula-tum*. A. fol. alternis, linearibus, remotis: fl. paniculatis; peduncul. fol. longioribus, strictis. *Syst. veg. ed.* 14.

*In Hispania.*

Caul. spitham. lignosi, ramosiss. Fol. lævia, facie *Polygoni avicularis*. Pedunc. stricti. Cal. lævis. Cor. lutea, extus cœrul. striata.

38. *lagopodioides*. A. fol. sparsis, mollibus, apice recurvis: spicis ovatis, villosis. *Syst. veg. ed.* 14. *Lin. suppl.*

*In Sibiria.*

Caul. erecti, herbacei, vix ped. pubescenti-molles, superne ramulis alternis. Fol. lanceol-linear. erecta, margine reflexo, pallida, fere tomentosa. Spicæ terminal. Calyc. conferti, *Lagopi*. Cor. parvæ, luteæ. Lab. super. pallide flavum. Palatum intus 2. punctis fulvis.

\*\*\*\* *Fol. nullis.*

39. *aphyllum*. A. scapo aphylo, capillari. *Syst. veg. ed.* 14. *Lin. Suppl.*

*Ad cap. b. Spei.*

Planta singularis *Splachnum* referens; vix hoc maior.

\*\*\*\*\* *Cor. hiantibus, aut ecaudatis.*

40. *maius*. A. cor. ecaudatis: fl. spicatis: calyc. rotunda-



tis. *Syst. veg. ed. 14. Kniph. cent. 1. tab. 7.*

*Riv. mon. tab. 82. Knorr. del. 1. tab. L. 12.*

*Ludw. eß. tab. 51.*

a. *A. latifol. pallido &c. Bocc. mus. 2. tab. 41.*

b. *A. Dod. pempt. 182. Lob. ic. 404.*

*In Europæ maceris &c. 24.*

Caul. sub 2-cubit. Fol. conferta, elliptica, obtusa. Cor. purpur. vel alba.

41. *Orontium*. *A. cor. ecaudatis: fl. subspicatis; calyc. digitatis, cor. longioribus. Syst. veg. ed. 14.*

*A. arvense &c. Riv. mon. tab. 82.*

*A. sylvestre. Dod. pempt. 212.*

*In Europæ agris, & arvis ☉.*

*Planta venenata. Caul. pedal. inferne ramosus.*

Fol. linear. angusta, elliptica, obtuse lanceol. deflexa, mollia, subtus glauca. Fl. pauci, laterales, sparsi, subsessil. Cor. dilute rosea, aut alba. Caps. dehiscens refert cranium Simiæ.

42. *papilionaceum*. *A. cor. ecaudatis: fl. axillaribus: calyc. papilionac. fol. carnosis. Syst. veg. ed. 14. Burm.*

*Ind. tab. 39. f. 2.*

*In Persia.*

Fol. alterna, breviter petiol. ovata, aut obovata, integerr. carnosa, magnitudine *Origani*.

Fl. solitar. breviter peduncul. Cal. 5-phyll. lacin. suprema ma. cordata; reliquis sublan-  
ceolat. Cor. lab. super. 2-fid. marginibus la-  
teralibus reflexis: lab. infer. latius, 3-fid.  
subæqual. *Differt a reliquis calyce peculiari.*

43. *Asarina*. *A. cor. ecaudatis: fol. oppositis, cordatis, profunde crenatis: caulibus procumbentibus. Syst. veg. ed. 14. Kniph. cent. 1. tab. 6. Lob. ic. 601.*

*In rupibus Genevæ &c. 24.*

Caul. prostrati, hispidi. Fol. longe petiol. pilosa. Fl. axill. solitar. albi, vel flavi, pedunculo brevi, & villoso. Cor. fauce punctis purpur. Stam. alba. Pistil. purpurasc.

44. *molle*. *A. cor. ecaudat. fol. oppositis, ovatis, tomentosis: caulibus procumbentibus. Syst. veg. ed. 14.*

*A. hispanicum &c. Burr. ic. 598. cui perperam calcar.*

*In Hispania 24.*

Caul. fragiles. Fol. caulina opposita, molliff. Pedunc. calyc. longiores. Cor. *Afarinæ*, villosa, alba, palato flavo: lab. super. rubro-friato.

45. *unilabiatum*. A. cor. ecaudat. callis duobus: fol. alternis, pinnatis: caul. paniculato. *Syst. veg. ed. 14.*  
*Lin. Suppl.*

*Ad cap. b. Spei.*

\*\*\*\*\* *Cor. hiantibus.*

46. *bellidifolium*. A. fol. radicalibus lingulat. dentatis, lineatis: caulinis partitis, integerr. *Syst. veg. ed. 14.*  
*Linaria &c. Bauh. prodr. tab. 106. Dod. pempt. 184.*

*Habitat Monspelii &c. ♂.*

Caul. erect. 3-ped. rigens. Rami e summitate pl. simplic. Caul. pl. breviores e radice. Fol. radical. semiamplexicaul. obtusa: caulina linearia. Spicæ terminal. rectæ, longæ. Bract. lineares, longiores, 1-fl. Fl. minuti, cœrulescent. nutantes, 5-fid.

47. *canadense*. A. fol. linearibus, alternis: cor. hiantibus: lab. infer. explanato. *Syst. veg. ed. 14.*

*In Virginia, Canada ☉.*

Rad. fibrosa. Caul. erect. ped. filiform. vix ramosus. Fol. remota, glabra. Racemus terminalis, rarior; fl. alternis, pedicellat. Cal. acut. 5-dent. Cor. lab. super. breve, reflexum: infer. magnum, patens, dependens. Calcar subulat.

*Halava.*

- A. fol. lineari--lanceol. alternis; infimis ternis: fl. racemoso-capitatis; galea 2-fid.; lab. 3-dent. *Forsk. Æg.*

*In Arabia ☉.*

Caul. multi, diffusi, basi declinati, dein surgentes, semispitham. glabri, ramul. axillariibus, erectis, floriferis; inferioribus minoribus. Fol. pollic. sessil.; obtusa, crassa, farina detergibili; infima raro quaterna. Fl. breviter pedicellati, bracteati. Cal. extus hispidus, lacin. superior. longioribus. Cor. pallide flava. Lab. superius reflexum, 7-fid.; inferius intus villosum, limbo extus obtuse 3-dentato. Calcar fl. longius.

*ærugineum*. A. fol. inferioribus quaternis, linearibus: fl. racemosis; suprema calyc. lacinia cæteris duplo longiore. *Gouan. Illustr.*

*Habitat*

*Habitus* A. *supini*, a quo, præter magnitudinem duplo maiorem, valde discrepat.

Cauliculi pl. palmar. erectiusculi, glaucescent. Racemus crassus, pedunc. longo, nudo, sub 30-fl. Cal. villoso-viscidus. Cor. lutea, duplo ma. A. *supini*, lab. ærugineis, seu violac-cœrul. Calcar striis violac. Capsf. globosa, duplo minor quam in A. *supino*.

*Corficum*. A. procumbens, ramosum; fol. alternis, ovatis, acuminat. fl. axillaribus, caudatis. *Misc. Taurin. T. 1. Fl. Corfic. ic. tab. 1.*

*S. Fiorenzo Corficæ.*

Fol. sessil. succosa, glabra, supremis angustioribus, elliptico-acuminat. Pedunc. 1-fl. Flos cyanæus, cum hiatu clauso. Calcar acutum. Capsf. rotunda.

893. CYMBARIA. Cal. 10-dentat. Capsf. cordata, 2-locul.

1. *daurica*. C. *Syst. veg. ed. 14. Amm. ruth. tab. 1. f. 2. In Dauriæ montanis apricis, saxosis.*

Planta proxima *Antirrhino*, tota incana. Caul. pl. subpalm. raro ramosi. Rami oppositi, steriles. Fol. cruciata, sessil. *Linariæ* æmula. Fl. lateral. aut terminal. 1-4. magni, speciosi, subsessil. odori. Cal. argenteus. Cor. ringens, lab. super. fornicato, apice 2-fido: lab. infer. æquali, 3-fido, palato gibbo; inferne flava, punctis rubris variegata, extus dilutior.

894. THUMB- Cal. duplex: exter. 2-phyll., interior. multipart. BERGIA. Capsf. globosa, rostrata, 2-locul.

1. *capensis*. T. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl. Añ. Lund. T. 1. tab. M.*

*Ad cap. b. Spei.*

Planta singularis, a *Barleria* diversa solo calyce duplici. Caul. diffusus, 4-gon. hirsutus. Fol. opposita, brevissime petiol. ovata, obtusa, integerr. 5-nervia, venosa, supra glabra, subtus hirsuta, erecta. Pedunc. solitar. 1-fl. Bract. 2. ovatæ, hirtæ. Cal. in fructum grandescens. Cor. lutea. Capsf. subulata, 2-part. glabra.



496 DYDINAMIA ANGYOSPERMIA.

895. CRA- Cal. duplex fl. periant. 4-phyll. spatha 1-phyll.  
NIOLARIA. Cor. tubus longissim. Caps. *Martinia*.

1, fruticosa. C. fol. lanceol. dentato--serratis. *Syst. veg. ed.*  
14.

Gesnera &c. *Plum. gen. tab.* 137.

*In Amer. calidior* H.

Arbor fol. lanceol. Pedunc. laterales longiss.  
multiflori. Cor. oblonga, interne punctata,  
margine ciliato.

2. annua. C. fol. cordatis, angulatis; calyc. exteriores 2-  
phyll. *Syst. veg. ed.* 14. *Jacq. hist. tab.* 110.  
*amer. ed.* 2. *picā tab.* 166.

*Martynia* &c. *Ehret. pict.* 1. f. 2.

*In Americis Carthageria* ☉.

*Simil. Martynia annua, sed tubus cor. longiss.*  
Planta 2-ped. villosa, viscosiss. ramis dichotom.  
basi procumbentibus. Fol. magna, opposita,  
petiol. semi 5-loba, lobis subovatis, repando--dentat.  
petiol. subrubello, piloso. Racemi laxi, sub 10-fl. Cal. ovatus,  
supra longitudinaliter dissectus, basi bracteis duabus.  
Cor. candida, fauce atro-purpur. Caps. flaves-  
cens. Nux nigra.

896. MAR- Cal. 5-fid. Cor. ringens. Caps. lignosa, corti-  
TYNIA. cata, rostro hamato, 2-valv. 5-locul.

1. perennis. M. caul. simplici: fol. serratis. *Syst. veg. ed.*  
14. *Hort. cliff. tab.* 18. *Ehret. pict. tab.* 9.  
f. 2.

*In America Carthageria* H.

Rad. *Dentariae*, moniliform. Caul. glaber, maculis  
linear. purpurascens. Fol. ovata, integra, nitida,  
glabra. Cal. simplex. Cor. cœrul.

2. annua. M. caule ramoso: fol. integerr. angulatis. *Syst.*  
*veg. ed.* 14. *Sabb. hort. 2. tab.* 91. *Mill. ic.*  
*tab.* 286. *Ehret. pict. tab.* 1. f. 1. *Mart. cent.*  
*tab.* 52.

Proboscidea. *Schmid. ic. tab.* 12.

*In Americis vera cruce* ☉.

Caul. diffusus, hispidus. Fol. longe petiol. cor-  
data. Cal. exter. 2-phyll. lanceolat. interior  
1-phyll. ovatus, sub 5-lobus, latere inferiore usque  
ad basin dehiscens. Cor. dilute rosea, vel albida,  
extus villosa. Caps. rostro incurvo, longo,  
uncinato, nigricans. Stigma tactu clauditur.

3. *longiflora*. M. caul. simplici: fol. orbiculatis, repandis.

*Syst. veg. ed. 14.*

*Ad cap. b. Spei ☉.*

Caul. erectus, 2-ped. scabriuscul. Fol. opposita, petiol. trinervia. Fl. axillar. solitar. breviter peduncul. Loco stipular. ad basin pedunculi glandula, seu cupula excipiens globum, quasi stylo brevi, & stigmate donatum. Cal. minim. Cor. tubus medio contractior, basi dorsali gibbus. Pericarp. vix rostratum, basi utrimq. denticulo crasso. Sem. parva.

897. TORE-NIA. Cal. 2-labiat. lab. super. tricuspide. Filam. inferior. ramulo sterili. Caps. 2-locul.

1. *asiatica*. T. *Syst. veg. ed. 14.*

Euphrasæ &c. *Pluk. amalt. tab. 373. f. 2.*

Kaka-pu. *Hort. mal. 9. tab. 53.*

*In India.*

Planta radicans, pusilla. Fol. parva, opposita, subsessil. ovata, acumin. crenata, tenuia, glabra, vel villosa. Fl. axillar. purpuro-rubrifusci, vel albo-rubri-dilute purpurasc. *Var. fl. ma. vel min.*

898. BESLERIA. Cal. 5-part. Bacca subglobosa, polysperma.

1. *melittifolia*. B. peduncul. ramosis: fol. ovatis. *Syst. veg. ed. 14. Plum. gen. 29. ic. 48.*

*In America h.*

Caul. lignosus, articulatus, glaber. Fol. opposita, petiolata, crenata, nervosa. Pedunc. axillar. ramosi.

2. *lutea*. B. peduncul. simplicibus, confertis: fol. lanceol. *Syst. veg. ed. 14. Plum. gen. ic. 49. f. 1.*

b. B. maior. *Plum. gen. 29.*

*In America h.*

Caul. lignosus, articulatus. Fol. opposita, vix petiol. ferrata, nervosa. Pedunc. axill. Cor. lutea.

3. *cristata*. B. peduncul. simplicibus, solitar. calyc. cristato-ferratis. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. amer. tab. 119. ed. 2. pict. tab. 150.*

*In America h.*

Rad. repens. Frutex radicans scandens. Fol. 2-pollic. opposita, petiol. ovata, ferrata, hirsuta. Pedunc. laterales, terminati involuc. 5-phyll. foliol. sessilibus, cordatis, dentat.

Cal. coccineus. Cor. flavescens, extus hirsuta.

4. *bivalvis*. B. calyc. bivalvibus, laceris. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*

*In Surinamo.*

Caul. herbac. longiss. repens, debilis, teres, hirsutus. Fol. palmaria, opposita, petiol. venosa, pilosa. Pedunc. laterales, oppositi, fol. breviores, ex singula ala bini, 1-fl. Bacca ovalis, 2-locul. nucleo osseo. Simil. in fol. & cal. *B. cristata*, sed fructu, & defectu periant. 5 phyll. diversa.

*violacea*. B. caul. scanlente: fol. ovatis, acutis, integerr. fl. spicatis. *Aubl. Guian. tab. 254.*

*In Guiana*  $\bar{h}$ .

Frutex caulibus ramosis, nodosis, sarmentosis, volubil. Fol. opposita, petiol. rigida, glabra, nervis purpurascen. Fl. racemulis 3-fl. Cal. cor. bacca col. purpur. Pulpa edulis.

*cærulea*. B. caul. scandente: fol. ovatis, acutis, integerr. fl. spicatis. *Aubl. Guian.*

*In Guiana.*

*coccinea*. B. caule scandente; fol. ovato-acumin. carnosus: involuc. communi 2-fol. calyc. proprio coccineo: fl. & fructu luteo. *Aubl. Guian. tab. 255.*

*In Caribæis*  $\bar{h}$ .

Frutex 7-8-ped. ramosus, sarmentosus, volubil. rufescens. Fol. opposita, petiolis incurvis, obsolete serrata, glabra, supra viridia, subtus venis rubris notata. Fl. corymbosi. Involucr. ruberrimum. Cal. phœniceus. Cor. & bacca lutea, obcordata, 2-valv. valvulis carnosis.

*incarnata*. B. fol. ovatis, crenatis, utrimq. tomentosis. *Aubl. Guian. tab. 256.*

*In Guiana*  $\bar{u}$ .

Caul. multi, 2-ped. ramosi, nodosi, 4-goni, tomentosi. Fol. opposita, petiol. acuta, subvirid. Fl. solitar. axillar. alterne peduncul. Cor. ventricosa, laciniis reflexis, inæqual. fimbriatis, subpurpur.

899. SCRO- Cal. 5-fid. Cor. subglobosa, resupinata. Caps.  
PHULARIA. 2-locul. subrotunda.



1. *mazilandica*. S. fol. cordatis, acutis, ferratis, basi rotundatis: caul. obtusangulo. *Syst. veg. ed. 14.*

*In Virginia.*

*Similis sequenti, duplo altior.* Petioli utrimq. connexi, barba minima. Fol. non trinervata, seu ad nervos usque excisa. Cor. obsolete purpur.

2. *nodosa*. S. fol. cordat. basi transversis, trinervatis: caul. & ramis spica nuda, paniculata terminatis.

S. fol. cordatis, trinervatis: caul. obtusangulo. *Syst. veg. ed. 14. Gunn. norv. tab. 4. f. 1. 3. Ludw. æt. tab. 72. Black. tab. 87. Cam. epit. 866. Riv. tab. 106.*

*In Europæ succulentis 24.*

Rad. nodosa, tuberculata. Caul. 2-4-ped. non alatus ut in seq. Fol. e viridi nigricant. trinervata, ut in *Lappa*, longiora quam in seq. Fl. ejusdem col. galea purpur. barba viridi. *Var. fol. ternis: fl. viridibus.*

3. *aquatica*. S. fol. cordatis, petiolat. decurrentibus, obtusis: caul. membranac. racemis terminalibus, nudis. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 507. Black. tab. 86. Sabb. hort. 2. tab. 89. Læfl. pruss. tab. 75. Cam. epit. 867.*

*In Europæ humidis 24.*

Rad. satis crassa. Caul. etiam 6-ped. Fol. priore latiora, dilute virid. Galea atro-purpur. barba viridis, spadicea, aut purpureo mixta.

4. *auriculata*. S. fol. cordatis, basi appendiculat. subtus tomentosis: racemis terminalibus. *Syst. veg. ed. 14.*

*Betonica &c. Lob. ic. 533.*

*In Hispania, Pedemontio, ad fossus 24.*

*Statura S. nodosæ.* Caul. 4-gon. minime pilosus, brachiatus. Fol. ima opposita, cordata, duplicato-ferrata, nuda, fere ternata; in minoribus ramis fol. simplicia. Cor. purpur. trifloriores; lab. revoluta, livido-virescente.

5. *Scorodonia*. S. fol. cordatis, duplicato-ferrat. racemo composito, fol. interstincto. *Syst. veg. ed. 14. Pluk. alm. tab. 59. f. 5. Moris. hist. 3. f. 5. tab. 36. f. 6.*

*In Lusitania, Sibiria &c. 24.*

*Simil. S. nodosæ.* Caulis pedal-cubit. valde pilosus, ad exortum purpurasc. Fol. alterna, petiol. obscure virid. quandoq. purpurasc.

6. *altaica*. S. fol. cordat. ovatis, duplicato-dentato-ferrat. dentibus basin respicientibus: racemo composito, aphylo. *Syst. veg. ed. 24. Murray. Comm. Gott. 1781. tab. 2.*

*Habitat* . . . . .

7. *Betonica*-*so-* S. fol. cordatis, oblongis, dentat. dentibus integerr. baseos. profundioribus. *Syst. veg. ed. 14.*

*In Lusitania &c. 24.*

Caul. erectus, 2-ped. 4-gonus, subpubescens, basi purpurasc. Fol. opposita, petiol. rugosa, subtus subpubescent. Panicula terminal. subfoliosa. Cor. triste purpurasc. labello virescente. Anth. flavissimæ.

8. *meridionalis*. S. fol. oblong-ovat. ferratis, glabris: pedunc. 1-fl. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*

*In nova Granada.*

Caul. herbac. 4-gonus, ramis oppositis. Fol. opposita, petiolat. Racemi terminal. solitar. Bract. foliaceæ, sed minores. Pedunc. aphylli. Cor. ovata, magnitudine S. *Sambucinae*.

9. *orientalis*. S. fol. lanceol. ferratis, petiolat. caulinis ternis-quaternis: rameis oppositis. *Syst. veg. ed. 24.*

*In Oriente 24.*

Racemus compositus e peduncul. 3-4. dichotomis.

10. *frutescens*. S. fol. subcarnosis, sessil. lævibus, apice recurvis. *Syst. veg. ed. 24.*

S. *peregrina* &c. *Herm. Lugd. tab. 547.*

*In Lusitania h.*

Caul. perennans, sesquicubit. inferne brachiat. 4-gon. acutangul. Fol. parva, opposita, ovata, dentata, lucida, glabra; infer. obovata, super. oblonga. Racemus terminal. foliatus; bracteis integerr. peduncul. 3-fid. Cor. parva, atropurpur. laciniis lateralibus albis, infima minuta.

11. *vernalis*. S. fol. cordatis, caulinis ternis: peduncul. axillaribus, solitar. 2-fid. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 441.*

S. fl. luteo. *Bauh. prod. tab. 112. Riv. tab. 107.*

S. *montana*. *Barrel. ic. 273. bonu.*

*Lamium pannonicum* &c. *Clus. hyl. 2. p. 18.*

*In Italia, Helvetia &c. ♂.*

*Odor fœtidus*. Caul. cubital. fistulosus, hispidus.  
Fol. duplicato-ferrata, hirta. Pedunc. 3-4-fl.  
Cor. ovata, fere clausa, flava.

12. *trifoliata*. S. fol. glabris; inferioribus ternato-pinnat. obtusis: superioribus simplicibus: pedunc. axillar. sub 3-fl. *Syst. veg. ed. 14.*

S. *Sambucifolia* &c. *Pluk. alm. tab. 313. f. 6.*

S. *subrotunda* &c. *Bocc. mus. 2. tab. 60.*

*In Africa, Corsica* ♂.

Fol. crassa, nigricantia. Cor. luteo-rubra, vel pallide lutea.

13. *sambucifolia*. S. fol. (plerumq.) interrupte pinnat. cordatis, inæqualibus: racemo terminali: peduncul. axillar. geminis, dichotomis. *Syst. veg. ed. 14. Alp. exot. tab. 202. Mill. dict. tab. 231. Moris. hist. 3. f. 5. tab. 8. f. 6.*

*In Hispania, Lusitania, Oriente* ♀.

*Odor Sambuci*. Caul. erectus, 3-cubit. & ultra, 4-gonus, e petiolis in angulos decurrentibus. Foliol. 5-7. præter alternas oppositiones minutas; ferrata, cordata, rugosa, supra glabra, impari ma. Fl. magni, purpurascens. lab. infer. virescente. *Var. fol. simplicibus, ovatis.*

14. *canina*. S. fol. pinnatifid. racemo terminali, nudo: pedunc. 2-fid. *Syst. veg. ed. 14. Sabb. hort. 2. tab. 90.*

*Ruta canina*. *Clus. hist. 2. p. 209. Lob. ic. 2. p. 55.*

*In Italia, Helvetia* &c. ☉ ♀.

Caul. ramosus. Fol. infer. incisa; super. tenuiter divisa, nervo nigro. Racemi alterni, 3-fid. Fl. sessiles; primo axillari; reliquis alternis. Calyc. margo albicans. Cor. obscure rubra, marginibus albidis.

15. *lucida*. S. fol. inferior. bipinnat. subcarnosis, glaberr. racemis 2-part. *Syst. veg. ed. 14.*

S. *saxatilis* &c. *Bocc. mus. 2. tab. 117.*

S. *glauco* &c. *Tourn. it. 1. tab. 85.*

*In Oriente, Creta, Neapoli* &c. ♀.

Caul. rectus, teres, viridis. Fol. ut in priore, sed subcarnosa. Racemus rectus, rigidus. Cor. pallida, lab. super. rubro.

16. *coccinea*. S. fol. quaternis, ovatis: fl. verticillat. spicatis. *Syst. veg. ed. 14.*

*In vera Cruce,*



Fol. caulem ambientia, Urticæ-form. Cor. coccinea.

17. *peregrina*. S. fol. cordatis, lineatis, lucidis: peduncul. axillaribus, (plerumq.) 2-fl. caul. multi-angul. Syst. veg. ed. 14. Cam. hort. tab. 43.

In Italia ☉.

Planta glaberr. Caul. atro-purpur. Fol. petiol. dentata, obscure virentia, venis purpur. Fol. floralia alterna, acutiora. Cor. purpur.

- auriculata*. S. fol. cordatis, subtus tomentosis, oblong. basi appendiculat. racemis terminalibus. Scop. Fl. Carn. tab. 32.

In Carniola ☿.

Differt a *S. auriculata*. Syst. veg. ed. 14. caulibus simplicibus pilosis: fol. non ternatis: fl. luteis, & non purpur. An sp. diversa?

900. *CELSIA*. Cal. 5-part. Cor. rotata. Filam. barbata. Caps. 2-locul.

1. *orientalis*. C. fol. 2-pinnatis. Syst. veg. ed. 14. Mont. in Zann. tab. 34. f. 1.

Blattaria &c. Buxb. cent. 1. tab. 20.

In Cappadocia, Armenia, circa Augustam Prætoriam ☉.

Caul. cubit. ramosus, subrubens. Fol. radical. sessil. pinnatifido-lacin. pinnul. alternis, imparima. subhirsuta; caulina alterna; floral. sessil. Fl. spicati, alterni, sessiles, flavi. Fructus conoideus, per maturitatem flavus.

Ad *Verbasci* genus spectat. All. Fl. Ped.

2. *Arcturus*. C. fol. radicalibus lyrato-pinnat. peduncul. fl. longioribus. Syst. veg. ed. 14. Jacq. hort. 2. tab. 117.

Verbascum &c. Colum. ecphr. 2. tab. 82. Alp. exot. tab. 122.

In Creta.

Caul. erectus, sesquiped. villosus, foliosus, initio simpl. tandem ex alis folior. super. ramosus. Fol. inæqualiter serrato-dent. venosa, rugosa, villosa; infima longe petiol. super. simplicia: floralia cordata, sessil. Racemus terminalis, longus. Cor. flava.

3. *cretica*. C. fol. inferior. lyratis; superior. ovatis, amplexicaulibus. Syst. veg. ed. 14.

Verbasculum &c. Mill. ic. tab. 273.

In Creta, & India ☿.

Caulis erectus, 2-ped. herbaceus, simplex, teres, pubesc. Fol. alterna, impari ma. cordato. Racem. terminal. erectus, pubesc. Fl. sessil. Bract. cordatæ. Cal. ferratus. Cor. magna, *Blattariæ* maior, flava, fundo superiore maculis 2. ferrugin.

901. HEMI-MERIS. Cal. 5-part. Cor. rotata: lacin. una ma. obcordata. Fossula laciniar. nectarifera.

1. *fabulosa*. H. diandra; fol. oppositis, pinnatifidis: caul. prostrato. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*

*Ad cap. b. Spei.*

2. *montana*. H. diandra: fol. oppositis, ovatis, ferratis: caul. erecto. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*

*Ad cap. b. Spei.*

3. *diffusa*. H. didynama: fol. alternis, oppositisq. pinnatif. caul. patulo. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*

*Forte var. H. fabulosa.*

902. DIGITALIS. Cal. 5-part. Cor. campanul. 5-fida, ventricosa, limbo 2-lab. Galea emarginata: barba 3-part. lacinia media maiore. Caps. ovata, 2-locul.

1. *purpurea*. D. calyc. foliol. ovatis, acutis: cor. obtusis; lab. super. integro. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 74. Black. tab. 16. Knorr. del. 1. tab. F. 10. Dod. pempt. 168. Riv. monop. tab. 104.*

*D. alba. Knorr. del. 1. tab. F. 9.*

*In Europa australiore ♂.*

Caul. 2-cubital. vix ramosus, pubescens, subru-ber. Fol. radical. longe petiol. caulina inor-dinata, ovato-longe-lanceol. serrata, subtus incana, pubescentia, rugosa. Fl. longe spica-ti, unilateral. nutantes. Petal. extus cocci-neæ, intus purpur. maculis ocellaribus prædi-ta. *Var. cor. alba.*

2. *minor*. D. cor. obtusis; lab. super. subbilobo: fol. læ-vibus. *Syst. veg. ed. 14.*

*In Hispania 24.*

Caul. lævis, priore dimidio brevior. Fol. sessil. lanceol. subintegerr. non rugosa, lævia. Fl. simil. priori magnitudine, figura, colore, sed puncta copiosiora palati, abque iride pallido.

3. *Thapsi*. D. fol. decurrentibus. *Syst. veg. ed. 14.*

*P. Verbasci &c. Barr. ic. 1185.*

*P. angusto &c. Bocc. mus. 2. tab. 85.*

*In Hispania &c. 24.*

Facies *P. purpur.* Fol. tomentosa, reflexa late-

ribus, venosa, ferrata; infer. lanceol. ovata; super. lato-lanceol. Racemus, & fl. purpur. Cor. purpur. fauce pallida, punctis sanguineis sparsis: limbo 4-fid. lobo super. indiviso; inferior. longiore, ciliato.

4. *lutea*.

D. calyc. foliol. lanceolat. cor. acutis; lab. super. 2-fid. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. hort. 2. tab. 105. Bauh. hist. 2. p. 814. Moris. hist. 3. f. 5. tab. 8. f. 5. Riv. tab. 105.*

*In Gallia, Italia nemoribus* 24.

Caul. cubit. simpl. striatus. Fol. conferta, sparsa, semiamplexic. oblong. lanceol. denticul. glabra, foetida. Fl. longe, & dense spicati, spica apice nutante. Bract. foliosæ, ovato-lanceol. concavæ. Cor. pallide lutea.

5. *ambigua*.

D. calyc. foliol. lanceol. cor. galea emarginata: fol. subtus pubescentibus. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. austr. 1. tab. 57.*

*In Austria, Helvetia &c.* 24.

*Differt a priore, cor. multo ma.*

6. *ferruginea*.

D. calyc. foliol. ovatis, obtusis, patentibus: cor. lab. infer. barbato. *Syst. veg. ed. 14. Sabb. hort. 2. tab. 86. Moris. hist. 3. f. 5. tab. 8. f. 2. 3.*

*b. D. angustifolia &c. Jacq. hort. tab. 17. Riv. mon. tab. 98.*

*In Italia &c.* 24.

Caul. 3-ped. strictus, lævis. Fol. sessil. lanceol. lineata, integerr. lævia. Racemus e singulis alis supremis, erectus. Fl. undiq. nati, non unilateral. Bract. lineari-lanceol. reflexæ. Pedicelli breviss. Cor. calyce paulo longior, pubescens, lurida, lutescens.

7. *obscura*.

D. fol. lineari-lanceol. integerr. glabris, basi adnatis. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. hort. 1. tab. 91.*

*D. angustifolia &c. Bocc. 2. tab. 98.*

*In Hispania* h.

Caul. suffruticos. lignosus, 1-2-ped. Rami pauci, oppositi. Fol. conferta, & alterna. Cal. foliol. patulis. Cor. cernua, obtusa, intus flavescens, fundo reticulato-rufa; extus pallide rufa, præsertim dorso. Lab. super. semi-2-fid. recurvum; infer. 3-part. media paulo longiore.



8. *canariensis*. D. calyc. foliol. lanceolat. cor. 2-labiat. acutis : caul. fruticoso. *Syst. veg. ed. 14. Mill. ic. tab. 120.*

D. *acanthoides* &c. *Comm. hort. 2. tab. 53.*

Digitali adfinis &c. *Pluk. alm. tab. 325. f. 2.*

In *Canariis* h.

Caul. 1-2-ped. ramosus, subruher, tomento-albicans. Fol. alterna, sessil. lanceol. serrata, leviter pilosa. Spica longa. Cor. aurea.

9. *Sceptrum*. D. fol. oblong. spatulat-serratis : spicis terminalibus, ovatis, pedunculat. coma bractear. terminatis : calycin. foliol. subulatis : cor. 4-fid. caul. fruticoso. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*

In *Madera sylvis umbrosis* h.

Planta speciosa. Rami hirti. Fol. subpedal. adproximata, sessil. in medio serrata, acuminata, supra glabra, subtus hirta, & albicantia.

953. BIGNONIA. Cal. cyathiform. 5-fid. Cor. fauce campanulata, 5-fid. subtus ventricosa. Siliqua 2-locul. Sem. membranaceo-alata.

1. *Catalpa*. B. fol. simplicibus, cordat. ternis : caul. erecto : fl. diandris. *Syst. veg. ed. 14.*

B. *americana* &c. *Dukam. arb. 1. tab. 41.*

B. *urucu* &c. *Catesb. car. 1. tab. 29.*

Kawara &c. *Kæmph. Jap. tab. 842.*

Cambulu *Hort. mal. 1. tab. 41.*

In *Japonia, Carolina* h.

Arb. 40-ped. erecta. Fol. opposita, vel ternata, petiolat. cordata, vel ovata, acuta, integerr. nitida. Racemi terminal. paniculati, sub 40-fl. Cor. albido-carnea, suaveolens. Siliquæ 2-ped. tenuissimæ. Cirrhi nulli.

2. *tomentosa*. B. fol. simplicibus ; inferior. cordatis, subtus tomentosis : fl. axillaribus, paniculatis. *Syst. veg. ed. 14. Thumb. Jap.*

Nippon Kiri. *Kæmph. am. exot. Fasc. V. f. 860.*

In *Japonia*.

Planta arborea. Fol. palmaria, & ultra, opposita, petiol. super. acuta, 5-nervia, integerr. Panicula primum trichotoma, dein dichotoma.

3. *sempervirens*. B. fol. simplicibus, lanceolat. caul. volubili. *Syst. veg. ed. 14.*

Gelseminum &c. *Catesb. car. 1. tab. 53. Seligm. au. tab. 6.*

Syringa &c. *Pluk. alm. tab. 112. f. 5.*

*In Virginia* h.

*Ad Lythanthi genus spectat, monente Vahl.*

Frutex ramosus. Fol. opposita, glabra. Fl. in extremis ramulis 3-4. flavi, odori. Siliquæ parvæ, simplic. cordatæ, paululum compressæ, flavæ.

4. *unguis*. B. fol. coniugatis: cirrho breviss. arcuato, 3-part. *Syst. veg. ed. 14.*

Gelseminum &c. *Sloan. Jam. hist. 1. p. 208.*

Clematis &c. *Plum. am. tab. 94. Pluk. alm. tab. 163. f. 2.*

*In Barbados, Domingo.*

Fol. ovato-acumin. Petiol. 4-phyll. Cor. lutea. Siliqua longissima.

5. *æquinoctialis*. B. fol. coniugat. cirrhosis: foliol. ovato-lanc. pedunculis 2-fl. siliquis linearibus. *Syst. veg. ed. 14. Sabb. hort. 2. tab. 85. Plum. sp. ic. 55. f. 1.*

*In Cayenna.*

Caul. scandens, volubil. Petioli oppositi. Fol. in singulo petiol. bina, petiolat. integerr. Fl. magni, expansi. Cor. croceo-rubens. Siliquæ longiss.

6. *paniculata*. B. fol. coniugat. cirrhosis: foliol. cordato-ovat. fl. racemosis; peduncul. trifl. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. amer. tab. 116. ed. 2. pict. tab. 175. Plum. sp. ic. 56. f. 1.*

*In Amer. calidiore* h.

Frutex 12-ped. scandens. Fol. varix magnitudinis, integerr. glabra; suprema opposita, ternata, sine cirrhis; intermed. opposita, cirrhosa. Racemi terminal. Cal. duplici limbo; exter. plano, albo, sub 5-fid., interiore erecto, angusto. Cor. purpur.

7. *crucigera*. B. fol. coniugat. cirrhosis: foliol. cordatis: caul. muricato. *Syst. veg. ed. 14. Plum. ic. tab. 58. Pseudo-Apocynum &c. Moris. hist. 3. f. 15. tab. 3. f. 16.*

*In Virginia, & Amer. australiore* u.

Caul. volubil. scaber, transversim dissectus, crucem referens. Fol. infima ternata, absque cirrhis: reliqua binata cum cirrhis. Fl. racemosi, magni, tubo longiss. Cor. atro-flava, subtus albicans. Fruct. capsulam ad utrum Tabaci refert.

8. *capreolata*. B. fol. coniugat. cirrhosis: foliol. cordato-lanceol. fol. imis simplicibus. *Syst. veg. ed. 14. Mont. in Zunn. tab. 33. - Brejn. ic. tab. 25. Duham. arbr. 1. tab. 40.*  
*Clematis &c. Dod. act. 4. tab. 263. Bocc. Sis. tab. 15. f. 31.*  
*In America 24.*  
 Planta sarmentosa. Petiol. 4-phyll. Pedunc. congesti, 3-4-fl. Cal. campanulat. integer. Cor. extus croceo-rubens, intus flava.
9. *pubescens*. B. fol. coniugat. cirrhosis: foliol. cordat-ovat. subtus pubescentibus. *Syst. veg. ed. 14.*  
*In Campechia h.*  
 Cor. lutea.
10. *triphylla*. B. fol. ternatis, glabris: foliol. ovatis, acuminat. caul. fruticoso, erecto. *Syst. veg. ed. 14.*  
*In vera Cruce h.*  
 Cor. alba.
11. *pentaphylla*. B. fol. digitat. foliol. obovat. integerr. *Syst. veg. ed. 14. Catesb. car. 1. tab. 37.*  
*Guari pariba. Marcgr. bras. tab. 118.*  
*In Jamaica, Caribais, agris humilioribus, & ad ripas.*  
 Arb. cortice albicante. Fol. petiol. Fl. pl. perampli. Cor. alba.
12. *Leucoxy-lon*. B. fol. (imis) digitat. foliol. ovat. acumin. integerr. *Syst. veg. ed. 14. Pluk. alm. tab. 200. f. 4.*  
*In America h.*  
 Arb. medioc. magnitud. ramis sparsis. Fol. opposita. Fl. terminal. corymboso-fasciculati.
13. *radiata*. B. fol. digitat. foliol. pinnatifid. *Syst. veg. ed. 14.*  
*Few. per. tab. 22.*  
*In Peru.*  
 Fol. radiata. Cor. lutea.
14. *radicans*. B. fol. impari-pinnat. foliol. incis: caul. geniculis radicatis. *Syst. veg. ed. 14. Mill. ic. tab. 65. Sabb. hort. 2. tab. 84.*  
*Pseudo-Apocynum &c. Moris. hist. 3. f. 15. tab. 3. f. 1.*  
*In America h.*  
 Frutex hederæ modo super muros in altum ascendens. Fl. corymbosi. Cal. coloratus, rubens. Cor. phoenicea.
15. *flans*. B. fol. impari-pinnat. foliol. serratis: caule ere-



Æto, firmo: fl. racemosis. *Syst. veg. ed. 14.*

*Jacq. amer. ed. 2. pict. tab. 176. Plum. ic. 54.*

*In America h.*

Arb. Petioli bini, oppositi. Foliol. utrimq. 3-4.  
vix petiol. lanceol-acum. profunde ferrata.

Cor. lutea. Siliquæ longæ, linear.

16. *grandiflora*. B. fol. pinnatis: foliol. ovatis, acuminat. serratis: caule volubili: calyce semi-5-fid. *Syst. veg. ed. 14. Thumb. Jup.*

Nobsjo. *Kæmph. am. exot. Fasc. 5. p. 856.*

*In Japonia h.*

*Differt a B. radicante caul. non radicante: fl. ma. calyc. semi-5-fid. Caul. fruticos. 4-gon. genicul. tumidiusculis. Foliol. pollicar. glabra. Fl. axillar. & terminal. folitar. peduncul. grandes. Cor. purpur. magnitudine Rosa.*

17. *Chelonoides*. B. fol. impari-pinnat. foliol. ovat. acumin. integerr. pubescentibus: cor. barbatis, semipentandris. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*

Padri. *Hort. mal. 6. tab. 26.*

*In Indiis h.*

Arb. magna, cortice cinereo, albicante. Fol. petiol. patentia, sub 5-iuga. Foliol. opposita, subpetiolul. Panícula terminal. Fl. ex dichotomia folitar. Cal. pubescenti-canus. Cor. limbus subfornicatus, hirtus, ruber, 5-fid. Laciniæ 2. super. 2-part. reflexæ, denticulato-crispæ, flavæ, punctis sanguineis adspersæ; infer. margine crispo, disco undulato, albo, venis rubris maculato, hirtæ. Siliqua linearis, plana, curva, striata.

18. *spathacea*. B. fol. impari-pinnat. foliol. ovatis, hirtis: calyce 1-phyll. spathaceo: cor. hypocraterifor. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*

Lignum equinum. *Rumph. Amb. 3. tab. 46. -- Hort. mal. 6. tab. 29.*

*In Java, Malabar &c.*

Arb. inter maiores. Fol. sparsa, sæpe opposita, 3-iuga. Foliol. subcordata, integerr. hirta. Fl. in axill. superioribus peduncul. Cal. 1-phyll. latere super. longitudinaliter dehiscens, subcoriac. oblong. glaber, caducus. Cor. alba, limbo plano, 5-plicato, repando, & inæqualiter dentato. Siliqua linearis, plana, curva, subtorulosa, striata.

19. *peruana*. B. fol. decompositis: foliol. incis: caule geniculis cirrhosis. *Syst. veg. ed. 24.*  
 Clematis &c. *Pluk. alm. tab. 162. f. 4?*  
*In Peru h.*  
 Planta scandens. Petioli 3-fid. Foliol. ovata. Cor. lutea.
20. *indica*. B. fol. 2-pinnat. foliol. ovatis, acuminat. integerr. *Syst. veg. ed. 14.*  
 Palega &c. *Hort. mal. 1. tab. 43. 6. tab. 45.*  
*In India h.*  
 Arb. procera. Fol. breviter petiol. 2-3-iuga, impari extremo, mollia, tenuia, sature virid. Fl. terminal. adgregati. Petal. crispa, ex albidio-subflava, striis rubescentibus, odore foetido. Siliquæ magnæ, 3-spitham. latitudine palmari.
21. *cærulea*. B. fol. 2-pinnat. foliol. lanceolat. integris. *Syst. veg. ed. 24.*  
 Arbor &c. *Catesb. car. 1. tab. 42.*  
*In Carolina h.*  
 Arb. medioc. magnitudinis. Foliol. parva, alterna. Fl. terminal. racemosi, parvi. Cor. cœrul.
- 
- Kerec.* B. scandens, trifolia, & bifolia, fl. luteo: fructu ovato, duro, compresso. *Aubl. Guian. tab. 260.*  
*In Guiana h.*  
 Frutex sarmentis longiss. nodosis, supra arbores late sparsis. Fol. opposita, petiol. Foliol. 2-3. ex eodem petiolo, ovata, acuta, integerr. glabra. Fl. alterne axillar. corymbosi. Cor. ampla. Caps. coriacea, rufescens. Sem. plana, margine albo.
- incarnata*. B. scandens: fol. amplis, ovatis, acuminat. inferioribus ternatis, superioribus binatis, cirrhosis: fl. roseo: fructu longo, plano. *Aubl. Guian. tab. 261.*  
*In Guiana h.*  
 Frutex sarmentis longiss. ramosis, supra arbores expansis. Fol. opposita, petiol. integerr. glabra. Fl. alterne axillar. corymbosi. Caps. longiss. angusta, plana, glabra. Sem. oblonga, bialata.
- echinata*. B. scandens: fructibus echinatis. *Aubl. Guian.*

*tab. 264. Jacq. amer. tab. 176. f. 52. ed. 2.  
piç. tab. 261. f. 51.*

*In Guiana h.*

Frutex sarmentis longiss. supra arbores excellas  
expansis. Fol. opposita, petiol. inferiora pe-  
tiolo dichotomo, ramulis singulis trifoliatis:  
foliol. ovata, acuta, integerr. glabra, cir-  
rhosa: fol. superiora opposita, trifoliata, aut  
biugata, cirrhosa. Fl. axillar. longe pedun-  
culati, corymbosi, incarnati. Caps. ovat-ob-  
lon. compressa, denticul. asperata, rufescens.  
Sem. plurima, compressa.

*Copala.*

B. fol. bipinnat. fructu subrotundo, compresso.  
*Aubl. Guian. tab. 265.*

*In Guiana h.*

Arb. 80-ped. superne ramosa, ramis erectis,  
sparsis. Fol. ampliss. opposita. Foliol. alter-  
na, & opposita, sessil. ovata, acuta, inte-  
gerr. glabra. Fl. terminal. paniculati. Cor.  
cœrul. Caps. ovata, coriacea, rufescens.

*alba.*

B. scandens: fructu lignoso, oblongo, rugoso.  
*Aubl. Guian. tab. 266.*

*In Guiana h.*

Frutex 10-ped. sarmentis longiss. supra arbores  
scandentibus. Fol: amplissima, opposita, pe-  
tiol. petiolo 3-part. ramis inferioribus oppo-  
sitis. Foliol. opposita, petiol. ovata, acuta,  
integerr. glabra. Fl. corymbosi in pedunc.  
axillar. dichot. Cor. alba. Caps. maxima.  
ovat-oblong. sulcata, cinerea. Sem. plurima,  
plana.

*fluvialis.*

B. arborescens, 5-phylla: fl. albo: fruct. ob-  
long. subcompresso, viridi. *Aubl. Guian. tab.  
267.*

*In Guiana h.*

Arb. 5-6-ped. superne ramosa, ramis undiq.  
sparsis. Fol. opposita, digitata, petiolata.  
Foliol. petiolul. ovat-oblon. acuta, integerr.  
glabra. Fl. corymbosi. Cor. alba: tubus stria-  
tus; limb. 4-fid. lacin. inæqualibus, subro-  
tund. superiore ampliore. Caps. incurva, ven-  
trifida. Sem. plana, alba.

*Citrifolia.*

B. scandens, fol. Citri, allium redolens. *Barr.  
Franc. Equinox. 23.*

*Habitat . . .*



*dichotoma*. B. fol. oppositis, cirrhosis: foliol. ovatis, in acumen obtusum desinentibus: fol. imis ternatis: fl. racemosis, pedunc. commun. dichotomis. *Jacq. amer. p.* 183.

*In Carthagenæ sylvaticis h.*

Caul. fruticosi, scandentes. Foliol. 3-pollic. integerr. glabra. Fl. mediocres, purpur. Siliquæ longiss. angustæ, compressæ, membruac.

*orbiculata*. B. caule scandente: fol. digitatis. *Jacq. amer. tab.* 180. f. 79. *ed. 2. picta tab.* 262. f. 77.

*In Carthagenæ sylvaticis h.*

Caul. fruticosi, teretes. Foliol. 5. petiolul. ovata, acumin. integerr. glabra; medio reliquis: cirrho longo, 2-3-fid. Racemi axillar. oppositi, simplic. sub 10-fl. Fl. oppositi, flavescences, limbo magis pallente. Siliquæ maximæ, orbicul. compresso-planæ, nitidæ, accedentes ad siliquas B. *cærul.*

904. CITHA- Cal. campanular. 5-dent. Cor. infundibulif-  
REXYLUM. ra, lacin. supra villosis, æqualibus. Bacca 2-sperm. Sem. 2-locul.

1. *cinereum*. C. ramis teretibus: calyc. dentat. *Syst. veg. ed.* 14. *Jacq. amer. tab.* 118. *ed. 2. picta tab.* 178. *Pluk. alm. tab.* 162. f. 1.

Jasminum &c. *Plum. ic.* 157. f. 1.

*In Amer. meridion. h.*

Arb. 20-ped. parasitica, scandens, ramosa. Fol. plerumq. opposita, vel alterna, non raro terna, plerumq. semipedal. petiolat. oblong. ovalia, integerr. nitida. Racemi terminal. longi, simplic. densi, penduli. Fl. plerumq. parvi. Cor. candida, odora. Baccæ subrotund. nitidæ, primo virid. dein rubentes, tandem nigræ.

2. *caudatum*. C. ramis teretibus: calyc. truncatis. *Syst. veg. ed.* 14. *Brown. Jam. tab.* 28. f. 2.

*In Jamaica h.*

Caul. fruticosus. Fol. obovata, petiolis pedatis. Spica terminalis.

3. *quadrangu-* C. ramis, 4-gonis. *Syst. veg. ed.* 14. *Jacq. hort.*  
*lare.* 1. *tab.* 22. *amer. tab.* 118. *ed. 2. picta p.* 92.

*In Martinica h.*

512 DIDYNAMIA ANGIOSPERMIA.

*Differt a C. cinereo, baccis maturis rubentibus :  
& ramis per costas 4. decurrentibus.*

905. HAL- Cal. 3-fid. Cor. 4-fid. Filam. cor. longiora.  
LERIA. Bacca infera, 2-locul.

1. *lucida*. II. *Syst. veg. ed. 14.*

*Lonicera &c. Berm. afric. tab. 89. f. 3. 6. 1.  
In Æthiopia h.*

*Arbustula. Fol. opposita, breviter petiol. ova-  
ta, acumin. tenuissime serrata, rigida, gla-  
bra. Rami oppositi, recti. Fl. axillar. pedun-  
cul. ruberrimi. Bacca rotunda.*

906. CRE- Cal. 2-part. æqual. Cor. gibba. Bacca pedicel-  
SCENTIA. lata, 1-locular. polysperm. Sem 2-locul.

1. *Cujete*. C. fol. cuneato-lanceol. *Syst. veg. ed. 14. Jacq.  
amer. ed. 2. pict. tab. 167. Plum. ic. 109.*

*Arb. americana &c. Comm. hort. 1. tab. 71. --  
Pluk. phyt. tab. 171. f. 1.*

*In Amer. calidiore h.*

*Arb. 20-ped. ramis longiss. simplicibus, hori-  
zontalibus. Fol. plura ex eodem tuberculo,  
4-5-pollic. breviter petiol. oblonga, acuta,  
basi adtenuata, integerr. nitida, venosa. Pe-  
dunc. sparsi, 1-fl. Flos magnus, ovatus. Cor.  
virid. vel ex purpuro-rubro-flava; dum mar-  
cescit, odore teterrimo. Fructus magnitudinis  
verius, a pollicari ad pedalem.*

2. *cucurbitina*. C. fol. lanceol-ovatis. *Syst. veg. ed. 14.*

*Cujete latifolia &c. Plum. ic. 109.*

*Cucurbitifera &c. Pluk. alm. tab. 171. f. 2.*

*In Amer. calidiore h.*

*Differt a priore fol. forma.*

907. GMELINA. Cal. sub 4-dent. Cor. campanulata, 4-fid.  
Anth. 2. bipart. 2. simplic. Drupa nucleo 2-  
locul.

1. *asiatica*. G. *Syst. veg. ed. 14.*

*Michelia &c. Amm. Ad. Petrop. 8. tab. 18.*

*Lycium &c. Pluk. alm. tab. 305. f. 3. & T.  
97. f. 2.*

*Jambusa sylv. Rumph. amb. 1. tab. 40.*

*In India h.*

*Arb. ramis teretibus, strictis. Fol. opposita,  
petiol. ovata, integerr. subtus tomentosa,  
sæpe utrimq. lobo laterali acutiore, brevi.  
Spinæ axillar. oppositæ, horizontal. apice pu-  
bescentes. Fl. ex apice ramulorum tenello-  
rum, racemosi, peduncul. lutei. coro-*

*coromandelica*. G. spinis oppositis, coniugatis, erectiuscul. *Burm. Ind. Sloan. Jam., tab. 207. f. 1.*

*In India utraque.*

Ramuli nostri fol. sunt bina opposita, nec plura, ut in fig. depingitur.

*indica*. G. spinis alternis: fol. longioribus. *Burm. Ind. In Java.*

Caul. flexuosus. Fol. solitar. breviter petiol. cordata, obtusiuscula, crenata. Spinæ sæpe axillar. vel intra fol.

908. PETREA. Cal. maximus, 5 part. coloratus. Cor. rotata. Caps. 2-locul. in fundo calyc. Sem. solitar.

1. *volubilis*. P. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. amer. tab. 114. ed. 2. pict. tab. 173.*

*In America h.*

Fruticosa, scandens, ad 20 ped. Fol. 3-4-pollic. opposita, petiol. ovata, aut lanceol. acuta, integerr. utrinq. scaberrima. Racemi terminal. simplic. laxi, secundi, penduli, sub 30-fl. Fl. longe peduncul. pulchri. Cal. patens, violac. Cor. cœrul. vel sature violac. Caps. obovata, apice plano.

909. PREMNA. Cal. 2-lobus. Cor. 4-fid. Bacca 4-locul. Sem. solitar.

1. *integrifolia*. P. fol. integerr. *Syst. veg. ed. 14.*

*Cornutia &c. Burm. Ind. tab. 41. f. 1.*

*Folium hirci. Rumph. amb. 3. tab. 134.*

*In India orientali h.*

Arbusc. sequenti simillima; an mera varietas? Fol. ovata, seu cordat-ovata, obtusa. *Var. fol. lanceol-ovatis, acutis.*

2. *ferratifolia*. P. fol. ferratis. *Syst. veg. ed. 14.*

*In India orient. h.*

Planta aromatica, odorata. Rami teretes, purpasc. Cicatrices a casu fol. truncatæ, marginatæ. Fol. opposita, petiol. ovata, obtusa, lævia, ad basin integerr. Stipul. sublaceol. deciduæ. Cymæ terminales, primum brachiatæ, dein dichotomæ. Bract. ad ramificat. oppositæ, lineares, minutæ. Fl. magnitudine *Viburni*.

910. LANTANA. Cal. obsolete 4-dent. Stigma uncinato-refractum. Drupa nucleo 2-locul.

1. *mixta*. L. fol. oppositis, ovato-acumin. fl. capitatis; *Tom. III. K k*



involuc. longitudine florum. *Syst. veg. ed.* 14.

Camara &c. *Dill. elth. tab.* 56. f. 64.

Viburnum &c. *Comm. hort. 2. tab.* 78.

*In America h.*

*Simil. L. aculeata.* Caul. 2-cubit. spinosus, cinereus, nodosus, ramis pilosis. Fol. petiol. subspera, supra læte virent. parum splendentia, subtus pallidiora. Pedunc. gemini ex alis supremis. Fl. in capitulum ab initio foliatum congesti, primum lutei, dein crocei, tandem rubelli, aut purpur. vel rosei, odore non gravi, maiores quam in *L. Camara*. Fl. de colore in col. transeunt, sed non sunt variegati.

2. *trifolia.* L. fol. (plerumq.) ternis: caul. inermi: spicis oblong. imbricatis. *Syst. veg. ed.* 14.

Camara &c. *Plum. ic.* 70.

*In Amer. calidiore.*

*An sequentis var.?* Caul. ped. lignosi, striati, glabri. Fol. breviter petiol. quandoq. bina, opposita, ovata, acumin. dentata, rugosa. Pedunc. solitar. oppositi, nudi. Cor. dilute carnea.

3. *annua.* L. fol. oppositis: caule herbac. inermi: spicis oblongis. *Syst. veg. ed.* 14.

Periclymenum &c. *Sloan. Jam. hist. 2. tab.* 195.

*In Amer. calidiore ☉.*

Caul. quasi lignosus, 4-gon. hispidus, striatus. Fol. petiol. cordata, scabra. Capitulum defloratum elongatur in spicam oblongam. Bract. breviores, lanceol. Cor. incarnata, fauce flav. non mutabilis. Baccæ purpurasc. *Var. fol. ternis.*

4. *Camara.* L. fol. oppositis: caule inermi, ramoso: fl. capitato-umbellatis, aphyllis. *Syst. veg. ed.* 14.

*Dill. elth. tab.* 56. f. 65. *Plum. ic.* 71. f. 1.

Viburnum &c. *Pluk. alm. tab.* 114. f. 4.

*In Amer. calidiore h.*

Caul. sesquiped. lignosus, ramosus, cinereus, ramis pilosis. Fol. *Melissæ*, sed minora, hirsuta. Pedunc. oppositi, ut in *L. mixta*, sed fl. color minus saturatio. Antequam capitula aperiantur ex croceo rubescunt, dein ubi explicantur simpliciter flavi; mox in croceum; tandem in puniceum col. transeunt.

5. *involucrata*. L. fol. oppositis, ternisq. cuneato-obovatis, obtusis, lineatis, tomentosis: capitulis squarrosis. *Syst. veg. ed. 14. Medic. in Ad. palat. vol. 3. physic. tab. 16.*

Camara &c. *Plum. ic. 71. f. 2.*

Viburnum &c. *Pluk. alm. tab. 114. f. 5.*

*An Zappania odoratissima. Scop. Delic. Insul. fasc. 1. tab. 15.?*

*In Amer. meridion. h.*

Tenerior priore. Ramuli longiores, & rotundiores. Fol. petiol. dentata, rugosiss. pallide virent. Bract. inter flosculos ovatae. Fl. axillar. longe peduncul. involuc. folioso cincti. Cor. crocea, fauce flava, mox in album col. mutatur.

6. *odorata*. L. fol. oppositis, ternisq. lanceol-ellipticis: caul. inermi. *Syst. veg. ed. 14.*

*Habitat*

Planta odore aromatico. Fol. subsess. rugosiss. subtomentosa. Bract. lanceol. Capitula conica, in umbellam coacta. Cor. alba.

7. *aculeata*. L. fol. oppositis: caule aculeato, ramoso: spicis hemisphaer. *Syst. veg. ed. 14.*

Viburnum &c. *Pluk. alm. tab. 233. f. 5.*

*In Amer. calidiore h.*

*Simil.* L. *mixta*. Frutex altus, hispidus, angulis aculeis breviss. reflexis, vagis. Fol. petiol. elliptica, scabra, obscuriora L. *Camara*. Spicae binae, oppositae, bract. parvis, deciduis mixtae. Fl. flavi; adultiores coccinei; qui color dein non mutatur.

8. *salvifolia*. L. fol. oppositis, subsessil. fl. racemosis. *Syst. veg. ed. 14.*

*In Aethiopia h.*

Stipul. 2. subovatae. Fol. lanceol. rugosa, tomentosa, venosa. Thyrsus terminal. Cor. tomentosa, intus sanguinea, limbo brevissimo.

9. *africana*. L. fol. alternis, sessil. fl. solitar. *Syst. veg. ed. 14. Pluk. phyt. tab. 408. f. 6.*

Jasminum &c. *Comm. rar. tab. 6.*

*In Aethiopia.*

*Cal. 5-part. lacin. subulatis, persistens. Cor. Jasmini. Drupa globosa, subacumin. sulco 2-part. Nucleus globosus, 2-locul. An ideo alterius generis? Altitudo humana, & ultra. Caul. ra-*

916 DYDINAMIA ANGIOSPERMIA.

mosus, scaber, fuscus. Fol. multa, lata, acumin. ferrata, hirsuta, rigida. Flos axillar. albus, odoratus. Bacca nigra.

*Ad hoc genus pertinet Charachera. Forsk. Æg. monenit Vahl.*

911. CORNU-TIA. Cal. 5-dentat. Stam. cor. longiora. Styl. longiss. Bacca 1-sperm.

1. *pyramidata. C. Syst. veg. ed. 14. Plum. ic. 106. f. 1.*

*In Caribæis, Campechia h.*

Caul. lignosus, subsimpl. scaber. Rami 4-quetri, angulis acutis. Fol. opposita, breviter petiol. elliptico-ovata, integerr. incana, decidua; in nonnullis regionibus ferrata, scabra, virentia, foetidiss. vix petiol. Recemus pyramidal. constans ex corymbis oppositis. Cor. cœruleæ labium super. 3-part. infer. obtusum. Bacca subrotunda.

912. LÆSE-LIA. Cal. 4-fid. Cor. laciniis omnibus secundis. Stamina petalo adversa. Caps. 3-locul.

1. *ciliata. L. Syst. veg. ed. 14.*

*In vera Cruce.*

Caul. rectus, brachiatus, obsolete 4-gonus. Fol. opposita, lanceol-ovata, acute ferrata. Rami oppositi: ramuli ultimi imbricati; foliol. amplexicaul. subcordat. ferratis, ciliatis; inferioribus mi. superioribus magis confertis, & sensim maioribus, usque dum ramulus in capitulum floriferum terminatur. Cor. lutea.

913. CAPRA-RIA. Cal. 5-part. Cor. campanulata, 5-fid. acuta. Caps. 2-valv. 2-locul. polysper.

1. *biflora. C. fol. alternis: fl. (plerumq.) geminis. Syst. veg. ed. 14. Jacq. am. tab. 115. ed. 2. pict. tab. 174. Herm. par. tab. 110. An Fevv. per. 1. tab. 84.*

*Gratiolæ &c. Comm. hort. 1. tab. 40.*

*Lyfimachiæ &c. Pluk. alm. tab. 95. f. 4.*

*In Curassao, & Græcia h.*

Caul. fruticosus, 4-ped. ramis longis, quandoq. subhirsutis. Fol. alterna, sessil. ovali-lanceol. superne ferrata. Pedunc. axillar. breves. Cor. alba. Caps. utrimq. sulcata.

2. *durantifolia. C. fol. ternis, dentatis: fl. solitar. ramis subalternis. Syst. veg. ed. 14.*

*Veronica &c. Sloan. Jam. hist. 1. tab. 14. f. 2.*

*In Jamaicæ inundatis.*



Caul. pedat. Fol. opposita, sessil. lanceol. Fl. axillar. solitar. Caps. ovata, acuta.

3. *crustacea*. C. repens; fol. oppositis, ovatis, subpetiolat. crenatis. *Syst. veg. ed. 14.*

Caranasi &c. *Rumph. amb. 5. tab. 170. f. 3.*  
In Amboina, China.

Simil. *Lindernia pyxidaria*, sed fol. magis ovata, & petiolata; & calyc. laciniae latiores. *An Lindernia spec.?*

4. *lanceolata*. C. fol. oppositis, lanceolat. corymbo terminali, composito. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*

*Ad cap. b. Spei.*

5. *undulata*. C. fol. alternis, ovatis, undulatis: racemis secundis. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*

*Ad cap. b. Spei.*

*uniflora*. C. fol. oppositis, cordatis: fl. solitar. *Burm. Ind. tab. 19. f. 3.*

In India.

914. LINDERNIA. Cal. 5-phyll. Cor. ringens, lab. super. breviss. integro; infer. 3-part. Stam. 2. infer. dente terminali, antheraque sublaterali. Caps. 1-locul. 2-valv. polysper.

1. *pyxidaria*. L. fol. ovalibus, sessil. integerr. peduncul. solitar. *Syst. veg. ed. 14. Allion. Stirp. aliquot. tab. 5.*

*Pyxidaria* &c. *Lindern. Alf. tab. 1. 2.*

In Virginia, Alsatia &c. paludibus inundatis ☉.

Caul. vix spitham. ad radicem duos ramos oppositos gerens. Fol. opposita, sessili-semiamplexicaul. oblong-ovata, forma *Centaurii min.* sed succosa. Peduc. 1-fl. Cor. dilute purpur.

2. *japonica*. L. fol. obovat. dentat. infimis petiolat. *Syst. veg. ed. 14. Thumb. Jap.*

In Japonia ☉.

Caul. herbac. debilis, ramis alternis, erectiuscul. pollic-spitham. subvillosis. Fol. unguicular. radicalia plurima; caulina pauca, sessil. Petioli in folium adtenuati. Fl. terminal. racemosi, aphylli. Cor. rufescens.

915. SELAGO. Cal. 5-fid. Cor. tubus capillaris; limbus subæqual. Sem. 1-2.

1. *corymbosa*. S. corymbo multiplici: fl. distinctis: fol. fascicular. filiformibus. *Syst. veg. ed. 14. - Pluk. phyt. tab. 377. f. 2.*

# 318 DIDYNAMIA ANGIOSPERMIA.

Camphorata &c. *Comm. hort. 2. tab. 40.*

*In Æthiopia 24.*

Caul. pl. pedal. Fol. sessilia, patentiss. pubescent. Bract. solitar. lineares, ciliatæ. Corymbus amplus, fastigiatus. Fl. parvi. Cal. fuscus. Fruct. 2-sperm.

2. *polystachia*. S. corymbo spicis fasciculat. fol. aggregatis, filiformibus. *Syst. veg. ed. 24.*

*Valeriana &c. Comm. hort. 2. tab. 222.*

*In cap. b. Spei campis arenosis h.*

Caul. erectus, fruticosus, semipedal. lævis, ramosus. Fol. ad singulas gemmas, plura, duplo crassiora, & dimidio breviora priore. Corymb. terminal. Cal. parvus, hispidus. Cor. alba. Fruct. ovatus, bipartibil. in 2. sem.

3. *rapunculoides*. S. spicis corymbosis: fol. dentatis. *Syst. veg. ed. 14.*

*Rapunculus &c. Burm. Afr. tab. 42. f. 1.*

*In Æthiopia h.*

Caul. 2-ped. lignosi, simplic. scabri. Fol. inferne creberr. sessil. angustiss. Fl. umbellati. Cor. lacin. 2. maiores.

4. *spuria*. S. spicis corymbosis: fol. linear. denticulat. *Syst. veg. ed. 14.*

*Melampyrum &c. Burm. Afr. tab. 42. f. 3.*

*In Æthiopia h.*

Caul. suffruticosus. Fol. (*Hebenstreitia dentata*) alterna, conferta. Spica ovato-oblong. obtusa, arcte imbricata; bract. oblong. membranaceis. Cor. 5-fid. violac. Stam. didyma, duobus eminentibus. Caps. 6-valv.

5. *fasciculata*. S. corymbo multiplici: fol. obovat. ferratis, glabris. *Syst. veg. ed. 14.*

*In capitis b. Spei montibus 24.*

Caul. erectus, 2-ped. simpl. lævis. Fol. alterna, levissime decurrent. oblong. lævia, basi integerr. Corymb. terminalis, densus. Cal. dentibus 5. subulat. Cor. purpur. statura S. corymbosæ.

6. *coccinea*. S. spicis corymbosis: fol. inferior. linearibus, integerr. superior. lanceol-subulatis, subdent. *Syst. veg. ed. 14.*

*Ad cap. b. Spei.*

*Simil. S. rapunculoidi, sed fol. crassiora, glabra; inferiora minime dentata.*

Caul. pl. pedal. simplic. Fl. sature purpur. extrema cor. lacinia ma.

7. *capitata*. S. capitulo terminali: fol. fasciculat. linear. car-  
nolis, glabris. *Syst. veg. ed. 14.*  
*Ad cap. b. Spei* h.  
Caul. erectus, suffruticosus, pubescens. Fol.  
obtusa, glabra (S. *corymbosæ*, sed crassiora).  
Spica subovata, densa, folitaria, imbricata  
bracteis, floribusq. Bract. rhombeæ, scariosæ,  
longitudine fl.
8. *fruticosa*. S. capitul. terminalibus, subrotundis: fol. spar-  
sis, linear. obtusis, integerr. caul. fruticoso.  
*Syst. veg. ed. 14.*  
*Ad cap. b. Spei* h.  
Frutex altus, ramis inæqualibus. Fol. parva,  
inæqual. conferta, nuda. Capitula sessil. Caps.  
subrotunda.
9. *divaricata*. S. capitul. terminalibus: fol. filiformi-linear.  
fasciculat. glabris. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*  
*Ad cap. b. Spei*.
10. *canescens*. S. spicis terminalibus: fol. filiform. fasciculat.  
glabris. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*  
*Ad cap. b. Spei*.
11. *geniculata*. S. spicis terminalibus: fol. linear. fasciculat.  
glabris, margine reflexo. *Syst. veg. ed. 14.*  
*Lin. Suppl.*  
*Ad cap. b. Spei*.  
Rami in hac magis patuli, & divaricati.
12. *triquetra*. S. spicis terminalibus fol. triquetris, imbricatis,  
recurvato-reflexis, glabris. *Syst. veg. ed. 14.*  
*Lin. Suppl.*  
*Ad cap. b. Spei*.
13. *hispida*. S. spicis terminalibus: fol. linear. sparsis, reflex-  
is, hispidis. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*  
*Ad cap. b. Spei*.
14. *polygaloides*. S. spicis terminalibus: bracteis, calycibusq. car-  
rinatis: fol. linear. glabris, margine reflexo.  
*Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*  
*Ad cap. b. Spei*.  
Habitus *Polygalæ*.
15. *cinerea*. S. corymbo composito: fol. linear. fasciculat.  
glabris; margine reflexo. *Syst. veg. ed. 14.*  
*Lin. Suppl.*  
*Ad cap. b. Spei*.  
Simil. S. *corymbosæ*, forte var.
16. *rotundifolia*. S. corymbo composito: fol. ovatis, obtusis, gla-  
bris. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*  
*Ad cap. b. Spei*. K k iv



17. *ciliata*. S. fl. spicatis: fol. ovatis, acutis, ciliatis. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*  
*Ad cap. b. Spei.*
18. *verbenaca*. S. spicis fasciculat. fol. oblong. glabris: caul. 4-gono. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*  
*Ad cap. b. Spei.*
19. *hirta*. S. hirta: spicis longiss. fol. obovatis. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*  
*Ad cap. b. Spei.*
- 
- strida*. S. spicis subrotund. paniculat. fol. fasciculat. filiform. hirsutis. *Berg. Fl. Capens.*  
*Ad cap. b. Spei h.*  
 Caul. fruticosus, subtorulosus. Rami sparsi, longiss. hirsuti. Fol. semiunguicul. patentia, fasciculis sparsis. Bract. lanceol. Cal. hirsutus. Cor. rubra, glabra.
- ferrata*. S. spicis corymbosis: fol. oppositis, cuneiform. obtusis, ferratis, glabris, decurrentibus. *Fl. Capens.*  
*Ad cap. b. Spei 24.*  
 Caul. herbaceus, simpl. Fol. frequentia, unguicular. erecto-patent. Spicæ plurimæ, dense corymbosæ, parviusculæ. Bract. flores distinguentes lanceol. Cor. lacin. obtusæ, nervosæ, patentes.
916. MANU-LEA. Cal. 5-part. Cor. limbo 5-part. subulato; lacin. superioribus 4. magis connexis. Caps. 2-locul. polysperm.
1. *Cheiranthus*. M. fol. nudis: caulibus subaphyll., pedicellis alternis, 1-fl. *Syst. veg. ed. 14.*  
*Cheiranthus &c. Comm. hort. 2. tab. 42.*  
*Ad cap. b. Spei ☉.*  
*Statura Euphrasæ.* Caul. palmar. a basi ad medium ramosus. Fol. alterna, sessilia, obovato-oblonga, ferrata, in ramis superioribus parva. Racemi terminal. erecti, planta longiores. Bract. linear. Cor. sature lutea.
2. *tomentosa*. M. fol. tomentosis: caulibus foliosis: peduncul. multifl. *Syst. veg. ed. 14.*  
 Planta. *Pluk. phyt. 319. f. 2.*  
*Ad cap. b. Spei ☉.*  
 Caul. pl. adscendent. teretes, ramosi, villosi, ramis alternis. Fol. opposita, subpetiol. obovata, seu lanceol. obtuse serrata, dense utrimq.

tomentosa. Thyrsus terminal. oblongus. Bract.  
linear. inter fl. sessiles simul. Cor. flava.

3. *microphylla*. M. fol. fasciculatis, ovatis, integris, glabris.  
*Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*

*Ad cap. b. Spei.*

4. *integrifolia*. M. fol. sparsis, ovatis, integris, glabris. *Syst.*  
*veg. ed. 14. Lin. Suppl.*

*Ad cap. b. Spei.*

5. *heterophylla*. M. fol. sparsis, linearibus, integris, dentatisve,  
villosis. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*

*Ad cap. b. Spei.*

6. *cœrulea*. M. fol. oppositis, linear. dentatis, tomentosis:  
fl. racemosis. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*

*Ad cap. b. Spei.*

7. *cuneifolia*. M. fol. elliptico ovatis, dentatis, glabris: spi-  
cis oblong. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*

*Ad cap. b. Spei.*

8. *capillaris*. M. fol. caulinis obovatis, dentatis, glabris: ra-  
mis linearibus: spicis ovatis. *Syst. veg. ed. 14.*  
*Lin. Suppl.*

*Ad cap. b. Spei.*

9. *Plantaginis*. M. fol. ovatis, subdentatis, integrisq. glabris:  
capitulis ovatis: ramis diffusis. *Syst. veg. ed.*  
*14. Lin. Suppl.*

*Ad cap. b. Spei.*

*Refert Plantaginem.*

10. *capitata*. M. fol. ovatis, serratis, villosis: capitulis glo-  
bosis: ramis diffusis. *Syst. veg. ed. 14. Lin.*  
*Suppl.*

*Ad cap. b. Spei.*

11. *Antirrhinoi- M. fol. ovatis, dentatis, glabris: fl. alternis.*  
*noides. Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*

*Ad cap. b. Spei.*

*Refert Antirrhinum.*

12. *thyrsiflora*. M. fol. obovatis, dentatis, tomentosis: corym-  
bo terminali elongato, composito. *Syst. veg.*  
*ed. 14. Lin. Suppl.*

*Ad cap. b. Spei.*

13. *corymbosa*. M. fol. oblong. dentatis, glabris: corymbo-  
fastigiato. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*

*Ad cap. b. Spei.*

Caul. nudus.

14. *altissima*. M. fol. lanceol. subdent. villosis: spica ovata.  
*Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*

*Ad cap. b. Spei.*

Fol. solum radicalia.

522 DIDYNAMIA ANGIOSPERMIA.

15. *rubra*. M. fol. lanceol. serratis, villosis: fl. racemosis, remotis. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*  
*Nemia rubra Fl. capens.*  
*Ad cap. b. Spei.*
16. *argentea*. M. fol. obovat.-cuneiform. serratis, argenteo-punctat. fl. axillaribus. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*  
*Ad cap. b. Spei.*
17. *pinnatifida*. M. fol. ovatis, inciso-pinnatifid. pinnis dentatis. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*  
*Ad cap. b. Spei.*
917. **HEBEN-STREITIA**. Cal. 2-emarginat. subtus fissus. Cor. 1-labiata, lab. ascendente, 4-fid. Capsl. 2-sperm. Stam. margini limbi cor. inserta.
1. *dentata*. H. fol. linear. dentat. spicis lævibus. *Syst. veg. ed. 14. Burm. Afric. tab. 42. f. 1.*  
*Valerianella &c. Comm. hort. 2. tab. 109.*  
*Pedicularis &c. Burm. Afric. tab. 42. f. 2.*  
*In Æthiopia.*  
 Caul. erectus, ped. ad radicem, & sub spica ramis simplic. ascendentibus. Fol. quaterno-verticillata. semiunguicul. & ultra, sessil. erecta, subhispida; ex singulis alis copiosis foliol. subramescens. Spica terminal. sessilis, oblonga, bracteata, constata ex verticill. 5-fl. sed alternis. Cor. alba, fauce dorsali rubra. Fl. mane inodori: meridie foetidi, nauseosi: vespere ambrosiaci; uti fl. *Hyacint. orient.*
2. *integrifolia*. H. fol. linearibus, integerr. *Syst. veg. ed. 14.*  
*In Æthiopia.*  
*Nimis adfinis priori.* Fol. nunc opposita, nunc stellata. Fl. spicae laxae; fl. oppositis, bracteis ovatis, tubo longiss. instructis.
3. *cordata*. H. fol. cordatis, subcarnosis, sessilibus. *Syst. veg. ed. 14.*  
*Habitat . . .*  
 Snffrutex erectus, albidus, lævis, parce, superneque ramosus. Fol. alterna, seu opposita, obrusa, vix crenata, subtus gibba. Spica terminal. sessilis. Cor. alba, fauce incarnata. Anth. compressae, luteae, ut in *H. dentata*.
4. *Erinoides*. H. fol. oblong. serratis, pilosis: bracteis integris, hispidis. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*  
*Ad cap. b. Spei.*
5. *fruticosa*. H. fol. lanceol. dentatis, glabris: bracteis inte-



gris: caul. fruticoso. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*

*Ad cap. b. Spei.*

918. ERINUS. Cal. 5-phyll. Cor. limbus 5-fidus, æqualis, lobis emarginatis, lab. super. breviss. reflexo. Caps. 2 locul. 4-valv. polysperma.

1. *alpinus*. E. fl. racemosis: fol. spathulatis. *Syst. veg. ed. 14.*

*Ageratum purpureum. Dalech. hist. 2184.*

b. *Ageratum &c. Barr. rar. tab. 2192.*

*In alpinis Helveticis &c. 24.*

Fol. radicalia in cespitem congesta, linearia, pubescent. apice utrimq. ferraturis aliquot. Caul. pl. palmar. simplic. erecti, teretes, pubescent. fol. alternis, remotis: laterales caul. steriles, decumbentes. Racemus terminal. erectus, simpl. longitudine caul. Fl. alterni, distincti fol. similibus, minoribus. Cal. campanulat. Cor. infundibulif. purpur. vel alba, tubo reflexo, limbo æquali, æstivatione irregulari. *Var. villosa.*

2. *africanus*. E. fl. lateralibus, sessilibus: fol. lanceol. subdent. *Syst. veg. ed. 14.*

*Lychnidea &c. Burm. Afr. tab. 50. f. 1.*

*In Æthiopia.*

Caul. pl. lignosi, pedal. ramosi. Fol. alterna, oblonga, sensim latiora, & obtusa. Rami compositi. Fl. solitar. tubo longo, angusto; purpurei.

3. *peruvianus*. E. fol. lanceolat-ovatis, ferratis. *Syst. veg. ed. 14. Few. peruv. p. 36. f. 3.*

*In Peru, & cap. b. Spei 5.*

Caul. 9-pollic. subtomentosus. Fol. opposita, 13 lineas longa, 5. lata, acuta, nervosa, albivirentia. Fl. racemosi, coccinei.

4. *maritimus*. E. fol. lanceol. integerr. glabris, limbi laciniis semibifid. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*

*Ad cap. b. Spei.*

5. *Lychnidea*. E. fol. lanceol. ferratis; limbi laciniis semibifid. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl. - Burm. Afr. tab. 49. f. 4.*

*Ad cap. b. Spei.*

Caul. herbac. erectus, 7-pedal. simplex, pubescens. Fol. vix 2-pollic. alterna, infer. opposita, remota, sessilia. Spica oblong. imbrica-

ta. Bract. foliaceæ, linear. Cor. flava, odoratiff.

6. *tristis*. E. fol. oblongis, incisfis, dentatis: limbi laciniis emarginat. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*

*Ad cap. b. Spei.*

Fl. colore tristi, suaveolentes.

7. *laciniatus*. E. fol. laciniatis. *Syst. veg. ed. 14.*

*Lychnidea &c. Few. Peruv. p. 35. tab. 25.*

*In Peru.*

919. *BUCHNERA*. Cal. obsolete 5-part. Cor. limb. 5--fid. æqualis; lobis cordatis. Caps. 2-locul.

1. *americana*. B. fol. lanceol. dentatis, trinerviis. *Syst. veg. ed. 14.*

*In Virginia, Canada.*

Caul. vix ramosus. Fol. opposita, oblongo-acum. rugosa, villosa. Spica fl. remotis. Cor. violac. *Herba exsiccatione atra evadit.*

2. *cernua*. B. fol. cuneatis, 5-dent. glabris: fl. spicatis, caul. fruticoso. *Syst. veg. ed. 14.*

*In cap. b. Spei montibus h.*

Caul. fruticosus, semiped. determinate ramosus, cicatricibus fol. subarticulat. purpurasc. Fol. opposita, sæpe terna, sessil. Spicæ solitar. oblong. Fl. sessil. erecti. Bract. linearis, acuta. Cal. tubulosus. Cor. alba, tubo filiform. recurvato, limbo plano.

3. *cuneifolia*. B. fol. cuneiform. glabris, apice 7-dent. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*

*Ad cap. b. Spei.*

4. *cordifolia*. B. caul. 4-gono: fol. oppositis, cordatis, serratis, trinerviis: racemis terminalibus, subspicatis. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*

*In Tanschaur.*

*Habitu similis Verbenæ.*

5. *grandiflora*. B. scabra: fol. oppositis, sessilibus, oblong. integris: peduncul. axillar. 1-fl. 2-phyll. calyc. infundibulif. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*

*In Amer. meridon.*

*Gerardiis non adeo dissimilis. Planta pulcherrima.*

Caul. erectus, simpl. glaber. Fol. 5-nervia.

Pedunc. in apice caulis, medio bracteati. Cal.

longus. Cor. tubus palmar. limbus magnus, planus, lobis rotundatis.

6. *æthiopica*. B. fol. (plerumq.) 3--dentat. fl. pedunculat. caule fruticoso. *Syst. veg. ed. 14.*

*In cap. b. Spei campis arenosis h.*

Caul. fruticulof. femiped. ramosiff. ramis vix manifeſte pubeſcentibus. Fol. magnitudine *Polygoni avicularis*, oppoſita, ſeſſil. lanceol. Fl. verſus apicem ramorum, laterales, oppoſiti, pedunculati. Cal. ſubhiſpidus. Cor. lutea.

*B. capenſis* differt caul. pubeſcente, viſcido, ſuperne etiam ramoſo; fol. utrimq. dentibus 2. remotis; radice annua.

7. *capenſis*. B. fol. linear. alternis, dentatis; calyc. pubeſcentibus. *Syſt. veg. ed. 14.*

*Lychnidea* &c. *Burm. Afr. tab. 50. f. 2.*

*Ad cap. b. Spei* ☉.

Caul. palmar. hiriſutus, ſuperne ramoſus. Fol. ſeſſilia, hiriſuta. Fl. ſpicati, longe peduncul. Cor. purpur. *Adſinis Rhinantho africano.*

8. *aſiatica*. B. fol. linearibus, integerr. calyc. icabris. *Syſt. veg. ed. 14. Pluk. phyt. tab. 118. f. 3. & tab. 177. f. 6.*

*In Zeylona, China.*

Cor. limbo 2-fido; lacinia alterna erectiuscula, 3-fid. altera patente, late cordata.

9. *pinnatifida*. B. fol. pinnatifid. glabris. *Syſt. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*

*Ad cap. b. Spei.*

*coccinea*. B. fol. oblongis, crenatis, villoſis. *Scop. Delic. Inſub. Faſc. 2. tab. 5.*

*Habitat . . . 24.*

Rad. dentata. Caul. ſemipedal. diffuſi, ramoſi, villoſuli, fuſco-rubri. Fol. oppoſita, breviter petiol. acumin. non raro ternata, ſubtus pallidiora, nerviſq. rubellis prædita. Cal. rubellus, villoſus. Cor. coccinea, limbo 5-fid. ſegment. integris, ſubhæmiſphær. duobus paulo ma. Faux in infer. loco flavescens; punctis ibi rubris variegata. Stam. alba. *Media inter Columneam, & Buchneriam.*

920. *BROWALLIA*. Cal. 5-dent. Cor. limbus 5-fid. æqualis, patens; umbilico clauſo anth. 2. maioribus. Capſ. 1-locul.

1. *deſiſſa*. B. peduncul. 1-fl. *Syſt. veg. ed. 14. Hort. Cliff. tab. 17. Sabb. hort. 2. tab. 100.*

*In America aſtrali* ☉.

Caul. 1-ſeſquiped. tenuis, ramoſus. Fol. pollicar. alterna, petiolata, ovata, acuta, integerr. Cor. cyanæa.



526 DIDYNAMIA ANGIOSPERMIA.

2. *clata*. B. peduncul. 2-fl. multiflorisq. *Syst. veg. ed. 14. In Peru* ☉.

Simil. priori, sed caul. duplo ma. rigidus, quasi fruticosus. Rami inferior. longitudine fere ipsius caul. quod non in priore. Fol. floral. huic fere glabra. Cor. sature cœrul-violac., nec dilute violacea.

3. *alienata*? B. fol. superior. oppositis: stamin. duobus longitudine cor. *Syst. veg. ed. 14. Mill. ic. 68.*

*Habitat*

Caul. ramosus. Fol. petiolata, longa, lanceol.

*humifusa*. B. hispida, prostrata: fl. axillar. sessil. albis. *Forsk. Æg.*

*In Arabia.*

Caul. filiform. ramosi, ita prostrati, ut inter alias herbas lateant, fl. tantum emergentibus. Fol. opposita, sessil. oblonga, basi adtenuata. Pedunc. axillar. solitar. breviss. Cor. alba, sicca nigrescens, tubo semipollic. angusto; limbo patente, lobis obovatis; quarto duplo latiore, emarginato (*hoc solo abit a charactere Generis*). Caps. compressa.

921. LIN- Cal. duplex: fructus 2-phyll. floris 5-parr. su-  
NÆA. perus. Cor. campanul. Bacca sicca, 3-locul.

1. *borealis*. L. fl. geminatis. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 3. Fl. Lapp. tab. 12. f. 4. Fl. Svec. tab. 1. Black. tab. 596. Ludw. ed. tab. 142. Ad. Nidrosf. 4. tab. 4. f. 6.*

*Serpyllifolia. Buxb. ad. 2. tab. 21.*

*Campanulata &c. Ad. Ups. 1720. tab. 1.*

*Nummularia &c. Kyll. Ad. Dan. 2. f. C.*

*In Sveciæ, Sibiria, Helvetiæ, Russia, Canada sylvis antiquis, muscosis, umbrosis* U.

Caulicul. vix 3-unc. oppositionibus fol. 2-3. cæterum nudi, apice 2-floro. Fol. petiol. inferior. oppositionis minora, orbiculata, cætera maiora, ovata, ferrulata. Cor. pendula, ex cœruleo-rubens, seu extus alba, intus purpur. Fructus albis pilis hirsutulus. Sem. gemina.

922. SIBTHORPIA. Cal. 5-part. Cor. 5-part. æqual. Stam. paribus remotis. Caps. orbicular. compressa, 2-locul. dissepimento transverso.

- 1. europæa.** S. fol. reniformi-subpeltatis, crenatis. *Syst. veg. ed. 14.*  
*Chrysosplenium* &c. *Pet. herb. tab. 6. f. 11.*  
*Alfine* &c. *Pluk. alm. tab. 7. f. 9.*  
*In Cornubiæ, Lusitaniæ &c. udis aggeribus, ad*  
*margines rivulorum* 24.  
 Planta parvula, & tenella, habitu *Hydrocotiles*,  
*Hederæ terrestris* modo serpens. Caul. nume-  
 rosi, decumbent. ped. sæpe radicanter iuxta  
 petiolos, filiform. laxi, pilosi. Fol. *Chryso-*  
*splenii*, alterna, petiol. horizontalia, 7-loba;  
 lobis lateralibus minoribus; obtusa, adspersa  
 setulis hyalinis. Petioli breves, ascendentes.  
 Pedunc. axillar. erecti, solitar. deflorati nu-  
 tantes. Cal. hirsutus. Cor. parva, purpurasc.  
 fundo purpur.
- 2. evolvulacea.** S. fol. uniformibus, integerr. *Syst. veg. ed. 14.*  
*Lin. Suppl.*  
*In nova Granada.*  
 Facies *Convolvuli min.* Caul. herbac. prostrati,  
 repentes, teretes. Fol. alterna, petiol. emar-  
 ginata, subtus tomentosa. Fl. axillar. fig. &  
 magnitudinæ prioris.
923. **LIMO- SELLA.** Cal. 5-fid. Cor. 5-fid. æqualis. Stam. per paria  
 adproximata. Caps. 2-valv. 1-locul. poly-  
 sperm.
- 1. aquatica.** L. fol. lanceolatis. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan.*  
*tab. 69. Lind. alf. tab. 5.*  
*Plantaginella. Hall. Jen. tab. 6. f. 2. Moris.*  
*hist. 3. f. 15. tab. 2. f. 1.*  
*Spergula &c. Læst. pruss. tab. 81.*  
*Alfine &c. Pluk. alm. tab. 74. f. 4. Menz. pug.*  
*tab. 7. f. 6.*  
*In Europæ septent. inundatis* ☉ 24.  
 Plantula cespitosa. Scapi erecti, 1-fl. fol. bre-  
 viores. Fol. longe petiol. elliptica, tenera,  
 glabra, parum carnosæ. Fl. exigui. Cal. ma-  
 culis purpur. pictus. Peral. ovata, acuta, al-  
 ba, intus ad tubum subrubra.
- 2. diandra.** L. fol. sublinearibus. *Syst. veg. ed. 14.*  
*In cap. b. Spei litoribus.*  
 Habitus prioris, sed quadruplo minor, inter mi-  
 nimas plantas numeranda. Stolones repentes,  
 breves. Fol. radicalia, obtusa. Scapi capil-  
 lar. 1-fl.

*calycina*. L. calyc. exteriore parvo, 2-phylllo; interiore 5-phylllo: cor. campanulata, subæquali. *Forsk. Æg.*

*In Arabia.*

Caul. repentes. Fol. fere *Portulacæ*. Stam. remota.

914. VAN- Cal. sub 4-fid. Cor. ringens. Filam. 2. exte-  
DELLIA. riora e disco lab. cor. Anth. connexæ. Caps.  
1-loc. polysperm.

1. *diffusa*. V. *Syst. veg. ed. 14.*

*In Insula S. Thomæ.*

Caul. herbac. 4-gon. brachiat. Fol. sessil. ovata, obtusiuscul. crenata. Fl. axillar. oppositi, solitar. *Habitus Veronicæ serpyllifoliæ.*

925. STEMODIA. Cal. 5-part. Cor. bilabiata. Stam. 4. filamentis singulis bifid. diantheris. Caps. 2-locul.

1. *maritima*. S. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. amer. tab. 174. f. 66. ed. 2. pict. tab. 261. f. 48.*

Stemodiaca &c. *Brown. Jam. tab. 22. f. 2.*

Scordium &c. *Sloan. Jam. hist. 1. tab. 110. f. 2.*

*In Jamaica.*

Caul. 2-3-ped. hirsuti. Fol. alterna, vel opposita, sessilia, subsemipollic. subhastata, acumin. ferrata, hirsuta, viscosa, odorata. Stipul. sub quolibet fl. geminæ, ovatæ, integræ. Fl. axillar. parvi, solitar. sessil. Cor. cœrul. caduca.

926. OBO- Cal. 2-fid. Cor. campanulata, 4-fid. Stam. ex  
LARIA. divisuris cor. Caps. 2-valv. 1-locul. polysper.

1. *virginica*. O. *Syst. veg. ed. 14.*

Orobanchæ &c. *Morif. hist. 3. f. 12. tab. 16. f. 23. Pluk. alm. tab. 209. f. 6.*

*In Virginia.*

*Orobanchis adfensis*. Radix fibris crassiuscul. Corallii instar constat. Caul. erectus, sesquipalm. simplex. Fol. exigua, acuta, suprema ex angusta basi subrotunda, extus purpur. Fl. axillar. pallide rubent.

927. ORO- Cal. 4-5-fid. Cor. ringens, lab. super. emargi-  
BANCHE. nato; inferiore 3-fido. Glandula sub basi germinis. Caps. 2-valv. 1-locul. polysperma.

1. *lavis*. O. caul. simpliciss. lævi: stamin. extertis. *Syst. veg. ed. 14. Morif. hist. 3. f. 12. tab. 16. f. 2. Bauh. hist. 2. p. 782.*

*In Helvetia, Germania &c.*

Habi-



Habitus sequenti altior, cæterum similis, aphyllus. Fl. ma. rariores, subcœrul.

2. maior. O. caul. simpliciss. pubescente, stamin. subexsertis. *Syst. veg. ed. 14. Sabb. hort. 3. tab. 1.*

Orobanche 1. *Clus. hist. 1. p. 270. Riv. irreg. mon. tab. 88.*

Rapum &c. *Lob. ic. 2. p. 89.*

*In Europæ agris, pratis siccis* ☉.

*Parasitica præcipue radicum Diadelphicæ.* Habitus aphyllus. Radix squamosa. Caul. carnosus, ex luteo-fuscus, fistulosus. Fl. spica homomalla. Cor. segmenta subrotunda, denticulata, venosa, hirsuta, col. obsolete pallido, vel cœrul. vel albo.

3. americana. O. caul. simpliciss. fol. imbricato: cor. recurvatis: stamin. exsertis. *Syst. veg. ed. 14.*

*In Carolina ad rad. arborum, & fruticum.*

Caul. spitham. teretes, colorati, succulenti, toti imbricati fol. ovato-lanceol. sessil. acuminat. erectis, coloratis, marcescentibus. Spica terminal. sessil. longitudine caul. imbricata fructificationibus. Bract. solitar. lanceol. Fl. subsessil. Cal. ventricosus. Tota planta cum fructificatione lutea.

4. cernua. O. caul. simpliciss. cor. recurvatis: bracteis ovatis, cor. brevioribus: caul. nudiusculo. *Syst. veg. ed. 14.*

*In Hispania, Sibiria.*

Caul. erect. spitham. glaber. Squamæ oblong. vagæ. Fl. spicati, sessil. rariusculi. Cor. albidopallida.

5. purpurea. O. caul. simplici, ramosoq. cor. 4-fid. stamin. calcaratis. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*

*Ad cap. b. Spei.*

Planta purpuro-rubra, fl. magnis. *Siccata nigrescit.*

6. ramosa. O. caule ramoso: cor. 5-fid. *Syst. veg. ed. 14. Camer. epit. 311. Guett. mem. de 1746. tab.*

9.

*In Europæ siccis.*

Caul. palmar. flavescent. Bract. purpurasc. Fl. min. Cor. purpurasc. cœrul. vel alba.

7. virginiana. O. caul. ramoso: cor. 4-dentat. *Syst. veg. ed. 14. Moris. hist. 3. f. 12. tab. 16. f. 9.*

*Tom. III.*

LI

*In Virginia.*

Caul. pl. 7-8. dodrant. lignosi, duri, squamosi.

Flos sub squama, obsolete luteus.

8. *uniflora*. O. caul. 1-fl. calyc. nudo. *Syst. veg. ed.* 14.

*Gentiana &c. Pluk. mant. tab. 348. f. 3.*

*In Virginia.*

*Tota planta col. sordide luteo.* Caul. pl. palmar.

& ultra, simpl. Flos terminal. amplus, deflexus, pallide cœrul. Vagina spathacea.

9. *Æginetia*. O. caul. 1-fl. flore subspathaceo. *Syst. veg. ed.* 24.

*Tsiam-Cumuli. Hort. mal. 22. tab. 47.*

*In Malubaria.*

Caul. teretes, stricti, simplic. albo--purpurasc. lineis tribus. Fol. nulla. Fl. purpur.

*tindoria*. O. *Forsk. Æg.*

*In Arabia.*

Planta parasitica, succulenta. Caul. pedal. simpl. imbricatus; bractæ sub fl. pollicar. erectæ, lanceol. obtusæ. Fl. spiral. Cor. flava, limbo 5-fid. patente, æquali, obtuso.

*crenata*. O. *Forsk. Æg.*

*In Arabia.*

Caul. pedal. simpl. villosus. Cor. 5-denticulato-crenata, alba. Stam. in ipsa fauce inclusa.

928. *HYO-BANCHE*. Cal. 7-phyll. Cor. ringens, lab. infer. nullo. Caps. 2-locul. polysper.

1. *sanguinea*. H. *Syst. veg. ed.* 14.

*Orobanche &c. Pet. gaz. tab. 37. f. 4.*

*Ad cap. b. Spei.*

Planta parasitica radicum: statura refert *Orobanchen*, sed sanguinea. Caul. semipedal. lignosus, simplex, fol. imbricatus. Folia squamæ ovatæ, dense inbricata, obtusæ, extus convexæ, glabræ. Spica terminal. villosa, imbricata bracteis, & fl. Bract. ovat-oblongæ, extus hirsutæ. Fl. solitar. sessil. purpur.

929. *DODARTIA*. Cal. 5-dent. Cor. lab. inferius duplo longius. Caps. globosa, 2-locul.

1. *orientalis*. D. fol. linear. integerrim. glabris. *Syst. veg. ed.* 14. *Mill. ic. tab. 27. Tourn. it. tab. 208.*

*In monte Ararat, Tataria 24.*

Rad. repens. Caul. sesquipedal. ramosus. Fol. alterna, sessil. Fl. alterni, racemosi, subsessil. atropurpur.

2. *indica*. D. fol. ovatis, ferratis, villosis. *Syst. veg. ed.* 14.

*In India*.

Caul. teretiusculi, villosi, subramosi. Fol. pollicis extimo latiora, petiol. Racemus terminalis, fol. minoribus. Fl. subsessil. oppositi, secundi. Cal. villosus. Cor. flava, lab. exteriore recto, brevi.

930. *LIPPIA*. Cal. erectus, subrotundus, 4-dent. compresso-membranac. Caps. 2-valv. 1-locul. 2-sperm. recta. Sem. 1. 2-locul.

1. *americana*. L. capitulis pyramidalis. *Syst. veg. ed.* 14.

*In vera Cruce* h.

Frutex caulibus teretibus, ad genicula compressis, pallidis. Fol. opposita, petiol. lanceol. ovat. extra medium ferrata, scabra. Pedunc. axillar. oppositi, breviss. capitati. Capitula retrorsum imbricata squamis innumeris, 4-gona, ovata, magnitudine pisi; floscul. inter singulam squamam.

2. *hemisphærica*. L. capitulis hemisphæricis. *Syst. veg. ed.* 14. *Jacq. amer. tab.* 179. f. 100. *ed.* 2. *piet. tab.* 168.

*In Amer. meridon.* h.

Frutex 10-ped. odore aromatico. Fol. 2-3-pollic. opposita, petiol. ovali-lanceol. acumin. subintegra. Pedunc. axillar. oppositi. Capitul. imbricatum. Fl. parvi. Cor. alba. Caps. connate.

3. *ovata*. L. capitul. ovatis: fol. linear. integerr. *Syst. veg. ed.* 14.

*Ad cap. b. Spei* h.

Frutex prostratus, ped. adpersus passim nodulis pisiformibus: ramis teretibus. Fol. sparsa, subsucculenta, lævia, foliol. axillar. minoribus. Capitula imbricata. Bract. scariosæ, ovatæ, glabræ, apice reflexæ. Cor. atroviolet.

4. *hirsuta*. L. hirsuta; fol. oblongis, ferratis, satis rugosis, subrus tomentosis: panicul. axillaribus: capitul. ovatis. *Syst. veg. ed.* 14. *Lin. Suppl.*

*In America*.



Caul. 4-gonus, hirsutie canus. Fol. opposita, petiol. longa, supra pilosa. Fl. minuti. Cor. alba.

931. SESAMUM. Cal. 5-part. Cor. campanul. 5-fid. lobo infimo ma. Rudimentum filamenti 5.ti Stigm. lanceolat. Caps. 4-locul.

1. *orientale*. S. fol. ovat-oblong. integris. *Syst. veg. ed. 24.* Digitalis &c. *Burm. Zeyl. tab. 38. f. 1.*

Schitelu. *Hort. mal. 9. tab. 54.*

In *Zeylonia, Malabaria* ☉.

Caul. erectus, teres, pilosus, ramis paucis, inferne locatis. Fol. opposita, petiol. venosa, pilis parvis adspersa. Fl. axill. solitar. pedunculis breviss. ad cuius basin bract. 2. breves, linear. & intra singulam glandula lutea, perforata. Cal. dehiscens. Cor. *Digitalis*, alba, obsolete 5-loba, obtusa, infima productiore, rotundata.

2. *indicum*. S. fol. inferioribus 3-fid. *Syst. veg. ed. 24. Rumph. amb. 5. tab. 76. f. 1.*

S. *alternum* &c. *Pluk. alm. tab. 109. f. 4.*

In *India* ☉.

Cor. alba.

*javanicum*. S. fol. lanceol. ferratis, sessilibus. *Burm. Ind. - Hort. mal. 9. tab. 37.*

In *India*.

Caul. angulatus, sulcatus. Fol. subtomentosa. Fl. spicati, breviter pedicellati.

*prostratum*. S. caul. diffusio, depresso: fol. orbiculat. crenatis, hispidis. *Retz. Obs. fasc. 4. Pluk. amalt. tab. 373. f. 2.*

*Circa Madrassam* 24.

Caul. lignosi, hispidi, ramis oppositis, & alternis. Fol. fig. *Hermannia alnifolia*, opposita, petiolata; ramorum alterna. Fl. solitar. erectiusculi. Cal. hispidus. Cor. campanulata, laeviter 5-fida, lobo infimo longiore, extus pilis densis canescens, intus sanguineo col. super fundum flavum pulcherrime picta, & punctata. Caps. dura, lignosa, ovata, basi sub 4-gon. apice compressa, mucronata, retusa, utrimq. sulcata. Sem. nigra. Sapor lubricis. *Malabaris medicinalis*.

DIDYNAMIA ANGIOSPERMIA. 533

932. MIMULUS. Cal. prismaticus, 4--dent. Cor. ringens, lab. super. lateribus plicato. Caps. 2-locul. polysper.

1. *ringens*. M. erectus: fol. oblong-lanceol. sessilibus. Syst. veg. ed. 14. Hort. Ups. tab. 2.

Euphrasia &c. Pluk. amalth. tab. 393. f. 3.

Digitalis &c. Moris. hist. 3. f. 5. tab. 8. f. 6.

In Virginia, Canada &c.

Facies *Lythri*. Rad. stolonifera. Caul. 2-ped. 4-gon. lævis. Fol. opposita, subserrata. Ex alis inferioribus rami: ex superioribus fl. solitar. Cor. pallide coerul.

2. *luteus*. M. repens; fol. ovatis. Syst. veg. ed. 14.

Gratiola &c. Fewill. per. 2. tab. 34.

In Peru.

Caul. rotundus, glaber, nodis elongatis. Fol. sesquipoll. longa, pollicem lata, opposita, amplexicaul. acuta, nervosa, integerr. glabra, pulchre virentia. Rami axillar. Fl. terminal. solitar. luteus.

933. RUELLIA. Cal. 5-part. Cor. subcampanul. Stam. paria adproximata. Caps. dentibus elasticis diffiliens.

1. *Blechnum*. R. fol. ovat-oblong. integerr. spicis ovatis; bracteis interioribus geminis: fl. binis, sessilibus. Syst. veg. ed. 14.

Barleria &c. Plum. ic. 42. f. 3.

Brunella &c. Sloan. Jam. hist. 1. tab. 109. f. 1.

In Amer. meridion. &c.

Caul. prostrati, dichotomi, læves, sub 4-goni. Fol. opposita, denticulis obsolete, vix pubescentia. Petioli ciliati. Spicæ laxæ, 4-gonæ, conflatae ex fol. floralibus, cordatis: intra singula magnitudine, & figura *Humuli* bract. binæ lanceol. breves: intra has fl. albi.

2. *strepens*. R. fol. petiolat. peduncul. 3-fl. brevibus. Syst. veg. ed. 14. Dill. elth. tab. 249. & 321. Sabb. hort. 2. tab. 92.

In Virginia, Carolina &c.

Caul. dodrant-pedal. obscure purpur. 4-goni, angulis viridibus. Fol. lanceol-ovata, obtusissime serrata, venosiss. basi remora, levissimeq. ciliata. Pedunc. lateral. oppositi. Bract. 2. oppositæ, etiam 2 sub singulo fl. laterali. Cor. pallida, palato coerulescente.

534 DIDYNAMIA ANGIOSPERMIA.

3. *patula*. R. fruticosa, villosa, viscosa: fol. ovatis, integerr. fl. axillaribus, aggregatis. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. ic. rar. tab. 41.*

*Habitat* . . .

Caul. erectus, ped. & ultra, ramis oppositis, decussatis, ad angulum acutum patulis. Fol. opposita, petiolat. rotundat--ovata, obtusa, crassula; floralia lanceol. acutiuscula. Fl. subsessil. Pet. sordide carnea. Caps. cuneiform. acuta, compressa, fusca.

4. *clandestina*. R. fol. petiolat. peduncul. longis, subdivisis, nudis. *Syst. veg. ed. 14. Dill. elth. tab. 248. f. 320.*

*In Barbados.*

Caul. 1-2-palm. & ultra geniculati, pilosi. Fol. sensim ampliata, undata, subhirsuta; radicalia in orbem posita. Fl. axill. solitar. Cor. cœrul. Caps. teres.

5. *paniculata*. R. fol. integerr. peduncul. lateralibus dichotomis: calyc. sessilibus: lacinia suprema maiore. *Syst. veg. ed. 14.*

*Speculum &c. Sloan. Jam. hist. 1. tab. 110. f. 2.*

*In Jamaica 24.*

Planta 3-pedal. ramis erectis, nec patulis. Fol. opposita, ovata, scabriuscula; caulina, quæ decidunt dum floret, maiora: rameis relinquunt basin petioli truncatam, spinescentem. Pedunc. oppositi. Bract. lanceol. Cor. purpureo. non campanul. sed bilabiata; lab. super. 2-lob. infer. 3-lob. æquali.

6. *tuberosa*. R. fol. ovatis, crenatis: pedunc. 1-fl. *Syst. veg. ed. 14.*

*Gentianella &c. Sloan. Jam. hist. 1. tab. 95. f. 1.*

*In Jamaica 24.*

Rad. *Asphodeli*. Cor. cœrul. Caps. angulosa.

7. *tentaculata*. R. fol. obovatis: verticillis obvallatis spinis inermibus, bifurcatis. *Syst. veg. ed. 14. Burm. Ind. tab. 40. f. 1.*

*Euphrasia &c. Pluk. phyt. 279. f. 7.*

*In India.*

Caul. herbac. 4-gon. pubescens. Fol. subacuta, tenuia.



8. *ciliaris*. R. fol. dentatis, ciliatis: fl. oppositis. *Syst. veg. ed. 41. Burm. Ind. tab. 42. f. 1.*  
*In India.*  
 Caul. brevis, pubescens. Fol. opposita, sæpe subquaterna, subsessil. lanceol. dentibus utrimq. 2-3. acuminatis, exsertis. Fl. axillar. sessil. Cal. angulis ciliatis, dentibus brevibus.
9. *biflora*. R. fl. geminis, subsessilibus. *Syst. veg. ed. 14.*  
*In Carolina.*  
 Fol. parva, parum hirsuta. Fl. minores.
10. *crispa*. R. fol. subcrenatis, lanceol-ovatis: capitulis ovatis, foliosis, hispidis: caul. repente. *Syst. veg. ed. 14.*  
*Adhatoda &c. Pet. gaz. tab. 73. f. 6?*  
*In India 24.*  
 Rad. lignosa, repens. Caul. digital. simplic. articulati, teretiusculi. Fol. subpetiol. pilis adspersa, margine reflexo, undulato crispa. Capitula ad genicula lateralialia, solitar. Cor. flava.
11. *repanda*. R. fol. lanceolat. petiolat. obtuse dentatis: caule repente. *Syst. veg. ed. 14. Burm. Ind. tab. 40. f. 2.*  
*Prunella &c. Rumph. amb. 6. tab. 13. f. B.*  
*In Java.*  
 Caul. herbac. filiform. articulati, læves. Fol. opposita, obtusa, glabra. Spicæ axillar. pendunculatæ. Fl. oppositi. Bract. breviores, lineares. Cal. aristato-pilosus. Cor. alba.
12. *ringens*. R. fol. oblong. integerr. fl. solitar. sessilibus: caule procumbente. *Syst. veg. ed. 14.*  
*Upudali. Hort. mal. 9. tab. 64.*  
*In India.*  
 Caul. spitham. simplex, articulatus. Fol. opposita, petiol. obrufiuscula, subrepanda, subcarinosa, glabra. Bract. 2. sessil. calyc. breviores. Fl. axillar. Cor. dilute cœrul.
13. *antipoda*. R. fol. mucronato-serratis: caul. repente; fl. terminalibus, subspicatis, quinis, ternisve. *Syst. veg. ed. 14.*  
*Gentianella &c. Pluk. mant. tab. 186. f. 2.*  
*Crusta ollæ. Rumph. amb. 5. tab. 170 f. 2.*  
*Peetiaŋga-pulpani. Hort. mal. 9. tab. 59.*  
*In Indiis ☉.*  
 Habitus *Veronicæ maris* Offic. sed longe minor,

seu *Verbenæ nodifloræ*. Fol. opposita, ovalia, acuta, & profunde ferrata, præsertim apice. Spica ex fl. oppositis, pedunculatis. Cal. 4-fid. Cor. 4-loba, inæqualis, albo--purpureo--flavescens. Caps. 2-valv. 2-locul. Sem. plura, oblonga.

14. *repens*. R. fol. lanceol. acumin. integerr. fl. sessilibus: bracteis petiolat. calyce longioribus: caul. repente. *Syst. veg. ed. 24. Burm. Ind. tab. 41. f. 1.*

*In India.*

Caul. herbac. palmar. Fol. petiol. Fl. lateral. solitar. Bract. 2. ellipticæ.

15. *littoralis*. R. fruticosa, cana: fol. cuneiform. retusis, serratis, glabris: fl. axillar. solitar. subsessilibus. *Syst. veg. ed. 24. Lin. Suppl.*

*Habitat prope Sadraff. h.*

Ramosiss. depressa. Rami 4-gon. articulati, albicantes. Fol. fasciculata, per propagines, parva, breviter petiol. rigida, subcarnosa, punctata, farina canescente conspersa. Cor. limbus laciniis 5. inæqualibus, venosis. Caps. lineari-oblonga.

16. *difformis*. R. diffusa, hirsuta: fol. linear. dentato-sinuat. integris: fl. axillar. verticillatis. *Syst. veg. ed. 24. Lin. Suppl.*

*Nil-Schulli. Hort. mal. 2. tab. 46. forte huius varietas.*

*In India.*

*Fol. alia ferrata.*

17. *balsamica*. R. erecta, glabra: fol. petiolat. lanceolat. serratis: verticill. sessilibus. *Syst. veg. ed. 24. Lin. Suppl.*

*In India.*

Caul. erecti, 4-goni, articulati, carnosii, glabri, colorati. Fol. patula, tenuissime serrata, glutinosa. Bract. integerr. sæpe ciliatæ. Cor. lacinia quinta superior latior. Cor. ringens, lutea. *Planta in Ind. odorem fortem Terebinthinaceum spirat.*

18. *uliginosa*. R. diffusa, hirsuta: fol. sessil. oblong. integris: spicis terminalibus 4-gon. *Syst. veg. ed. 24. Lin. Suppl.*

*In Tranquebar.*

*Planta parva.*

19. *pilosa*. R. fol. oppositis, ovatis, integris, ciliatis: fl. terminalibus, solitar. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*

*Ad cap. b. Spei.*

20. *depressa*. R. fol. oppositis, petiolat. obovat. integris: caule arcte depresso. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*

*Ad cap. b. Spei.*

21. *japonica*. R. fol. ellipticis: fl. spicatis, bracteis oblong. obtusis. *Syst. veg. ed. 14. Thumb. Jap.*

*In Japonia.*

Caul. herbac. erectus, 4-gon. fuscus. Fol. opposita, subpetiol. obtusiuscula, integerr. venosa, glabra, patula, unguicular. Spicæ pl. terminal. alternæ, glabræ, digitales. Cor. limbo æquali, lutea.

*R. longiflora Vahl. est Camellia grandiflora. Forsk. Æg.*

*rubra*. R. fol. ovat-oblong. acutis: peduncul. axillar. longis, multifi. *Aubl. Guian. tab. 270.*

*In Guiana 24.*

Caul. pl. 4-5-ped. ramosi, 4-gon. nodosi. Fol. opposita, sessil. sinuata, glabra. Fl. alterne axillar. corymbosi. Cal. 3. bract. munitus. Cor. rubra. Caps. ovat-oblong. acuta, compressa.

*violacea*. R. fl. solitar. alterne axillaribus, longo pedunc. insidentibus: fol. ovat--oblong. tomentosis. *Aubl. Guian. tab. 271.*

*In Guiana 24.*

Radix tuberculosa. Caul. pl. recti, pedal. ramosi, 4-goni, villosi. Fol. opposita, breviter petiol. leviter sinuata. Cal. 2. bract. munitus. Cor. incurva, cœrul. Caps. ovat--oblonga, compressa, in medio sinuata.

*imbricata*. R. fl. in alis superioribus congestis, sessilibus, secundis: bract. obliqua subrotunda. *Forsk. Æg.*

*In Arabia 24.*

Caul. debiles, 4-goni, brachiati, articulati, villosi. Fol. opposita, lanceol. scabra. Axillæ floriferæ fol. minus; vacuæ parvum: omnia



538 DIDYNAMIA ANGIOSPERMIA.

disticha. Fl. 3-5. in una axilla, bractea duplici. Cor. alba. Caps. linear-acuta.

*intrusa.*

R. cor. lacinia infima intrusa, forniculata. *Forsk. Æg.*

*In Arabia.*

Caul. decumbens. Rami erecti, 4-goni, dichotomi, articulati, basi incrassati, villosi. Fol. sesquipollic. opposita, petiol. cordat-ovata, acuta, integra, villosa. Pedunc. axillar. & terminal. racemosi, 4-goni, villosi; parte nuda florifera, articulata. Fl. erecti. Cor. tubus supra violaceus, subtus albus: limbus albus, subtus violac. lacinia intrusa cum macula violac.

*guttata.*

R. fol. ovat-lanceol. fl. albo, guttato. *Forsk. Æg.*

*In Arabia. h.*

Caul. fruticosus, diffusus: rami erecti, sulcati, pubescentes. Fol. 1-pollic. opposita, petiol. subdenticul. scabriuscula, pubescentia. Spicæ terminal. imbricatæ. Bract. ternæ, ciliatæ, exteriore longiore. Fl. subpollic. albi, guttis pallide viridibus, laciniis infimis intrusis. Flos sesquimajor priore.

*adhærens.*

R. *Forsk. Æg.*

*In Arabia.*

Fol. 2-pollic. petiol. ovat-acuta, profunde crenata, scabra, & præcipue subtus.

*Anagallis.*

R. fol. lanceol. serratis: caul. procumbente: fl. axillaribus, solitar. *Burm. Ind. Rumph. amb. 5. tab. 170. f. 2.*

*In Java, & Amboina.*

*Simil. R. antipodæ, sed maior. Differt fl. axillaribus, semper solitariis.*

*alternata.*

R. fol. oblong. cordatis, crenatis, petiolat. spicis alternis, foliosis: bract. crenatis. *Burm. Ind. Rumph. amb. 6. tab. 13. f. 2. 3.*

*In Java.*

*erecta.*

R. fol. ovalibus, integerr. fl. axillar. sessilibus: caule erectiusculo. *Burm. Ind. tab. 41. f. 3.*

*In India.*

*fasciculata.*

R. decumb. fol. lanceol. petiolat. dentatis, oppositis, alterno min. fl. fasciculat. *Retz. Obs. fasc. 4.*

*In nemoribus Zeylonæ &c.*

*Mulia habet communia cum Prunella Molucca.*  
*Rumph. 6. tab. 13. f. 3. sed min. sunt fol.*  
*lanceol. & longe petiol. nec cordata.*

Caul. 4-gon. tenuis. Fasciculi fl. terminal. Bract.  
 ovatæ, integræ, trinerviæ, pilosæ,

934. BARLE- Cal. 4-part. Stam. 2. longe min. Capsl. 4-angul.  
 RIA. 2-valv. 2-locul.? elastica, absq. unguibus.  
 Sem. 2.

1. *longifolia*. B. spinis verticillar. senis: fol. longiss. ensifor-  
 mibus, scabris. *Syst. veg. ed. 14. Moris. hist.*  
*3. f. 11. tab. 27. f. 5.*

*Anchusa &c. Pluk. alm. tab. 133. f. 4.*

*In India.*

Caul. erectus, obsolete 4-gonus, hispidus. Fol.  
 opposita, integerr. Fl. axillar. utrimq. septi  
 spinis 3. crassis, fulvis.

2. *Solanifolia*. B. spinis axillaribus: fol. lanceol. subdenticulat.  
*Syst. veg. ed. 14. Plum. ic. 43. f. 2.*

*In Amer. australi.*

Caul. ramosus, articulatus. Fol. opposita, sub-  
 sessil. venosa. Fl. verticillati, parvi, sessiles,  
 solitarii. Cor. cœrul.

3. *Hystrix*. B. spinis axillar. geminis, simplicibus: fol. lan-  
 ceol-ovatis, integerr. *Syst. veg. ed. 14. Rumph.*  
*amb. 7. tab. 13.*

*Lycium &c. Seb. mus. 1. tab. 13. f. 1.*

*Melampyro &c. Pluk. alm. tab. 119. f. 5.*

*In India B.*

*Differt a sequenti, caul. virgato, nec firmo: ra-*  
*mis subtetragonis, nec terciibus: fol. utrimq.*  
*glabris, nec subtus pubescentibus: spinis axillar.*  
*geminis, simplicibus, horizontalibus, nec creâis,*  
*composito-quaternis, pedatis.*

4. *Prionitis*. B. spinis axillar. pedatis, quaternis: fol. lan-  
 ceol-ovatis, integerr. *Syst. veg. ed. 14.*

*Coletta-Veetla. Hort. mal. 9. tab. 41.*

*In India B.*

Caul. teres, 3-4-pedal. Fol. subtus pubescent.  
 Fl. terni-quaterni. Cor. lutea.

5. *buxifolia*. B. spinis axillar. opposit. solitar. fol. subrotund.  
 integerr. *Syst. veg. ed. 14.*

*Caraschulli. H. mal. 2. tab. 47.*

*In Indiis.*

Caul. lignosi, nodosi, pilosi. Fol. parva, op-

- posita, sessilia, crassiuscula, nervosa, pilosa, præsertim subtus. Fl. axillar. breviter pedunculati. Cor. cœrul. subtus dilutior.
6. *nodiflora*. B. spinis axillar. fol. lanceol. cuspidat. integerr. bract. ovatis, scariosis; tubo elongato. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*  
*In Tanschaur.*  
 Bract. glabræ. Fl. cœrul. simil. priori, sed longiores. *Floret nocte.*
7. *cristata*. B. fol. oblong. integerr. calyc. laciniis 2. latioribus, ciliatis; 2. linearibus, acutis. *Syst. veg. ed. 14. Obs. it. tab. 8.*  
*Melampyro &c. Moris. hist. 3. f. 11. tab. 23. f. 7.*  
*In India h.*  
 Caul. teres. Fol. utrimq. acuta. Fl. axillar. sessil. Cor. erecta, cœrul. patens, 5-fid. lacin. ovatis, subæqualibus: quinta profundius divisa.
8. *coccinea*. B. inermis: fol. ovat-acumin. denticulat. petiolat. *Syst. veg. ed. 14.*  
*B. Solani &c. Plum. ic. 43. f. 1.*  
*In Amer. merid.*  
 Caul. ramosus, articulatus. Fol. opposita. Fl. axillar. oppositi, sessil. coccinei.
9. *pungens*. B. inermis: fol. ovatis, acutis, pungentibus: bract. ciliatis. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*  
*Ad cap. b. Spec.*
10. *longiflora*. B. inermis: fol. ovatis, sericeis: bract. cordatis, scariosis: cor. longiss. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*  
*In Malabar h.*  
 Caul. suffruticos. ramis sæpius oppositis, sericeis. Fol. opposita, petiol. integerr. Fl. terminal. Bract. 2. magnitudine fere folior. Cor. tubus filiform. limbus 5-fid. patens.
- 
- hirsuta*. B. inermis: fol. lanceol-ovat. integerr. caul. hirsuto. *Jacq. Obs. P. II. tab. 32. amer. ed. 2. pict. tab. 172.*  
*In America h.*  
 Planta fruticosa, 4-ped. erecta, ramosa. Fol. semipedal. opposita, breviter petiol. supra gla-



bra, subtus hirsuta. Racemi terminal. semipedal. spicati, recti, fl. adregatis, inodori. Cor. candida, lab. infer. punctis rubris variegato.

*nitida*. B. inermis : fol. ovatis, acuminat. integerr. utrimq. nitidis. Jacq. amer.

*In America*.

Frutex totus nitidiss. fol. crassioribus; cæterum priori similis, ut potius var.

935. DURANTA. Cal. 5-fid. superus. Bacca 4-sperm. Sem. 2-locul.

1. *Plumieri*. D. calyc. frutescentibus contortis. Syst. veg. ed. 14. Jacq. amer. tab. 176. f. 76. ed. 2. pict. tab. 261. f. 53. quoad fructum.

Castorea &c. Plum. ic. 79.

*In Amer. merid. h.*

Arbosc. 15-ped. Spinæ axillar. oppositæ, subulatae, sæpe absentes. Fol. opposita, breviter petiol. 2-pollic. subovata, acuta, supra medium obtusa, & inæqualiter ferrata, glabra. Racemi axillar. & terminal. ampli, laxi, reclinati. Cor. cœrul. Fruct. flavi, sicuti & calyx.

2. *Ellisia*. D. calyc. frutescentibus erectis. Syst. veg. ed. 14. Jacq. hort. 3. tab. 99. amer. tab. 176. f. 77. ed. 2. pict. tab. 179. Brown. Jam. hist. tab. 29. f. 1.

*In Jamaica h.*

Differt a priore in calyce, cuius summa pars in fructu non contorquetur, sed connivet, & erecta manet.

3. *Mutisii*. D. fol. ellipticis, integerr. Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.

*In Amer. merid. h.*

Differt a prioribus folis foliis.

936. OVIEDA. Cal. 5-fid. Cor. tubus subcylindric. superus, longiss. limbo 3-lobo. Bacca globosa, 2-sperm.

1. *spinosa*. O. fol. ovalibus, dentatis. Syst. veg. ed. 14. Valdia &c. Plum. ic. 256.

*In Amer. merid. h.*

Caul. erectus, herbac. simplex. Fol. opposita, petiol. Fl. terminal. corymbosi. Cal. ingens. Stam. extra corol. Bacca subcœrul. glabra.

2. *mitis*. O. fol. lanceol. subrepandis. Syst. veg. ed. 14. Burn. Ind. tab. 43. f. 1.

*In Java h.*

Frutex. Fol. opposita, petiol. longiss. glabra.  
Corymb. dichotomi. Cor. tubus longiss.

937. MILLIN-GTONIA. Calyc. margo 5-dent. reflexus. Cor. longiss.  
limbo 4-fid. Anth. 2-part. vaginantes. Fructus Siliqua?

1. *hortensis*. M. Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.

*Colitur in hortis Tanschaur h.*

Arb. grandis, & speciosiss. Fol. 2-pinnat. pinnæ inferior. elongatæ, impari-pinn. Pinnul. ovat-acumin. integerr. venosæ, utrimque glabræ. Panicula terminal. magna, glabra; fl. oppositis. Cor. longiss. alba, odorata. Fig. cor. *Oviedam refert.*

938. VOLKAMERIA. Cal. 5-fid. Cor. lacin. secundis. Bacca 2-sperm. Sem. 2-locular.

1. *aculeata*. V. spinis petiolorum rudimentis. Syst. veg. ed. 14. Jacq. amer. tab. 117. ed. 2. pict. tab. 177.

Clerodendrum &c. Brown. Jam. tab. 20. f. 2.

Ligustrum &c. Plum. ic. 164. f. 1.

Paliuro &c. Sloan. Jam. hist. 2. tab. 166. f. 2. 3.

Pluck. phytol. 352. f. 2.

*In Jamaica, Barbados h.*

Frutex 6-ped. ramosus, totus onustus fl. albis.  
Fol. opposita, ovat-lanceol. integerr. glabra, petiolis breviss. basi horizontalibus, patentibus. Pedunc. dichotomi, superius 3-part. Baccæ subrotundæ, fuscæ.

2. *inermis*. V. ramis inermibus. Syst. veg. ed. 14.

Jasminum &c. Rumph. amb. 5. tab. 46.

Jasmini &c. Pet. gaz. tab. 42. f. 7.

Peryclimeni &c. Pluk. alm. tab. 211. f. 4. mala.

Nir-notsud. Hort. mal. 5. tab. 49.

*In India h.*

Arbusecula. Fol. opposita, petiolata, ovata, obtusiuscula, integerr. Pedunc. ex alis summis oppositi, solitar. 3-raro 1-fl. Cor. tubus longus, filiform. limbo 5-fid. dilute rubro.

3. *ferrata*. V. fol. lato-lanceolat. ferratis, subsessilibus. Syst. veg. ed. 14.

*In India h.*

Rami teretiusculi. Fol. fere petiol. utrimq. nuda. Panicula brachiata. Baccæ e 4. compositæ. Cal. campanul. indivisus, vix dentatus.

4. *scandens*. V. fol. petiolat. cordatis, ovatis, integerr. pa-

nicula terminali corymbosa; ramulis dichotomis. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*

*In vastis sylvis Zeylonæ h.*

Arb. scandens ramis longioribus, flexuosis, 4-gonis, apice tomentosis. Fol. magna, opposita, obtusa, glaberr. Panicula tomentosa. Fl. non longi, ut in *V. inermi*. Cal. tomentosus. Cor. nivea. Caps. oblonga, conica.

5. *japonica*. *V. inermis*: fol. cordatis, ovatis, acutis, dentatis: racemis secundis. *Syst. veg. ed. 14. Thumb. Jap.*

Riuke Giri. *Kamp. am. exot. Fasc. V. p. 861. In Japonia h.*

Arb. excelsa, vasta, ramosa, glabra. Rami apice paniculati. Fol. pedalia, spithamam lata, alterna, petiol. venosa, glabra, subtus pallidiora. Racemi terminales, bracteati. Cal. rufescens. Cor. purpur.

939. CLERO-DENDRUM. Cal. campanul. 5-fid. Cor. tubo filiform. limbo 5-part. æquali. Stam. longiss. intra lacinias maxime hiantes. Bacca 1-sperm.

1. *infortunatum*. C. fol. cordatis, tomentosis. *Syst. veg. ed. 14. Petasites &c. Rumph. amb. 4. tab. 49.*

Peragu. *Hort. mal. 2. tab. 25.*

b. C. folio &c. *Burm. Zeyl. tab. 29.*

*In India h.*

Frutex 3-ped. ramis subtomentosis. Fol. magna, opposita, petiol. acuta, integerr. venosa, scabriuscula. Panicula terminalis, dichotoma. Cal. amplus. Cor. tubus longus; limbus brevis, lacin. obverse ovatis, duabus remotioribus. Fl. candidi, male olentes.

2. *fortunatum*. C. fol. lanceol. integerr. *Syst. veg. ed. 14. Osb. it. tab. 11.*

*In India.*

Frutex incanus. Fol. opposita, petiol. subdecurrent. multinerv. glabra. Pedunc. axillar. dichot. fol. breviores, multifi. Cal. patens. Cor. perlata.

3. *Phlomidis*. C. fol. ovatis, ferratis, canis. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*

*In India h.*

Frutex canus. Fol. parva, opposita, petiol. medio ferrata. Paniculæ in apice ramorum,



axillar. folitar. oppositæ, dichotomæ, paucifloræ coniunctim magnam paniculam efformant. Bract. binæ. Cal. ad medium fissus, laciniis campanulatis, subulatis, patulis. Tubus gracilis, albus.

4. *calamitosum*. C. fol. ovalibus, subdentat. nudis. *Syst. veg. ed. 14.*

Volkameria &c. *Burm. Ind. tab. 44.*

*In Java* h.

Rami simplic. glabri, cortice albicante. Fol. petiol. Panicula brachiata, peduncul. longiss. Fl. congeneribus paulo minor.

5. *paniculatum*. C. fol. lobatis, ferratis: panicula ampliss. *Syst. veg. ed. 14.*

Volkameria &c. *Burm. Ind. tab. 45. f. 1.*

*In India* h.

*Differt a priore ramis tenerioribus; fol. oppositis; pedunc. axillar. multipl. Caul. quadrifariam sulcatus. Fol. opposita, cordata. Panicul. ramis bis dichotomis, dein ramosis.*

6. *trichotomum*. C. fol. lobatis, indivisib. lato-ovat. integris: panicula trichotoma. *Syst. veg. ed. 14. Thumb. Jap.*

Kusaggi. *Kæmph. am. exot. Fasc. V. p. 867.*

*In Japonia* h.

*Odor folior. virosus Mandragoræ. Caul. frutesc. ramis 4-gon. 4-sulc. glabris. Fol. palmaria, opposita, petiol. acumin. glabra, supra satore viridia, subtus pallida, nervosa. Panicula ampliss. nuda. Cal. inflatus. Cor. alba.*

940. VITEX. Cal. 5-dent. Cor. ringens, 2-labiata; lab. super. emarginato; inferiore 3-fido. Bacca (plerumq.) 4-sperm.

1. *ovata*. V. fol. simplic. ovatis. *Syst. veg. ed. 14. Thumb. Jap.*

*Vitex rotundifolius. Lin. Suppl.*

*In Japonia* h.

Caul. repens. Rami ped. 4-goni, erecti, incano-subtomentosi. Fol. pollic. decussata, petiol. patula, obtusa, integerr. supra virid. mollia, albo-tomentosa. Fl. in apice ramorum, primum axill. tandem terminales, paniculati. Panicula breviss. pedunculata, subtrichotoma, bracteata. Cal. albo-tomentosus.

Cor.

Cor. extus albo-tomentosa, intus purpur. Bacca virescens, magnitudine *Piperis albi*. Arbor facie, & col. similis *Agnæ castæ*, exceptis foliis.

2. *altissima*. V. fol. ternatis, integerr. panicula verticillata: bacca trisperm. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*  
In vastis sylvis Zeylonæ h.

Foliol. ovata, utrimq. acumin. supra glabra, subtus pubescent.

3. *agnus castus*. V. fol. digitatis, ferratis: spicis verticillatis. *Syst. veg. ed. 14. Ludw. ed. tab. 28. Black. tab. 139.*

V. fol. ferratis. *Bauh. hist. 1. p. 205.*

In Sicilia, & Neapolis paludosis h.

Arbor ramis, foliisq. subrus incanis. Foliol. 5-7. lanceol. glaberr. Cor. albo-purpur. vel tota alba.

4. *Leucoxylon*. V. fol. digitat. quinatis: foliol. petiolat. oblong. integerr. paniculis dichotomis: bacca 1-sperm. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*

In vastis sylvis Zeylonæ h.

Simil. V. trifolia, sed differt fol. utrimq. glaberr. panicula dichotoma a prima divisione.

5. *trifolia*. V. fol. ternatis, quinatisq. foliol. ovatis, acutis, integerr. subtus canescentibus panicula rachi recta; pedicellis dichotomis. *Syst. veg. ed. 14. Burm. Zeyl. tab. 109. Pluk. alm. tab. 206. f. 5.*

Logondium &c. *Rumph. amb. 4. tab. 18.*

Caranosi. *Hort. mal. 2. tab. 10.*

In India h.

Frutex ramis pendulis, odore *Absinthii*. Fol. ramorum simplicia. Foliol. ovata, acuta, subtus tomentosa. Fol. 2. petiolo proxima, min. Fl. racemosi. Cor. cœrul.

6. *Negundo*. V. fol. quinatis, ternatisq., ferratis: fl. racemoso-paniculatis. *Syst. veg. ed. 14. Mill. ic. 275. f. 1. 2. Bauh. hist. 1. p. 189.*

Logondium &c. *Rumph. amb. 4. tab. 19.*

Bemnosi. *Hort. mal. 2. tab. 11.*

In India h.

Frutex sesquihominis magnitudine. Foliol. ovato-lanceol. sinuato-ferrata, subtus nuda, venosa, supra obsuro virore nitentia, subtus dilutiora, odore *Lavandulæ*; foliol. impari maiore. Cor. purpureo-cœrul.

546 DYDINAMIA ANGIOSPERMIA.

7. *pinnata*. V. fol. pinnatis, integerr. panicula trichotoma;  
Syst. veg. ed. 14. Burm. Ind. tab. 45. f. 2.  
In Zeylona h.

Frutex. Fol. Pistaciæ similia, sæpe ex 5. foliol.  
ovalibus, obtusis, plicatis, glabris.

941. BONTIA. Cal. 5-part. Cor. 2-labiat: lab. infer. 3-part.  
revoluto. Drupa ovata, 1-sperm. apice obli-  
quo. Sem. 1.

1. *daphnoides*. B. fol. alternis: peduncul. 1-fl. Syst. veg. ed. 14.  
Dill. elth. tab. 49. f. 57.

Olea &c. Pluk. alm. tab. 209. f. 3. Jacq. amer.  
piet. tab. 161. f. 57. quoad florem, & fructum.

In Antillis h.

Frutex. Fol. crebra, palmum longa, unciam la-  
ta, acumin. crassiuscula, subrigida, lævia,  
utrimq. virid. sempervirent. Laureolæ fœm.  
æmula, minoribus intermixtis. Fl. axill. foli-  
tar. Cor. sublutea, linea pilosa obscure pur-  
pur.

942. AVICEN- Cal. 5-part. Cor. bilabiat. lab. super. quadrato.  
NIA. Caps. coriacea, rhomboidea, 1-sperm.

1. *tomentosa*. A. fol. cordat-ovatis, subtus tomentosis. Syst.  
veg. ed. 14. Jacq. amer. tab. 112. f. 2. ed. 2.  
piet. quoad folium tab. 261. f. 46. - Pluk. phyt.  
tab. 370. f. 5.

Opata. Hort. mal. 4. tab. 45.

Sceura. Forsk. Æg. monente Vahl.

In Indiis h.

Arb. 20-ped. Fol. petiolis crassis innixa, ovato-  
oblong. obtusa, supra virent. & glabra, sub-  
tus tomento denso, & incano obsita. Fl. ra-  
cemosi, albi.

2. *nitida*. A. fol. lanceol. utrimq. nitidis. Syst. veg. ed. 14.  
Jacq. amer. tab. 112. f. 1. ed. 2. piet. tab.  
169.

In Martinicæ litoribus maritimis h.

Arb. 40-ped. Fol. 3-pollic. opposita, breviter  
petiol. lanceol-acuta, integra. Turiones semi-  
pedal. Pedunc. terminal. racemosi. Fl. sessi-  
les. Cor. alba.

943. COLUM- Cal. 5-part. Cor. lab. super. fornicato, integro,  
NEA. supra basin gibba. Anth. connexæ. Caps. 2-  
locul.

1. *scandens*. C. Cor. hirsutiss. Syst. veg. ed. 14. Jacq. hort. 3.



tab. 48. amer. ed. 2. pict. tab. 170. Plum. ic. 89. f. 1.

In *Martinica sylvis* h.

*Caul. fol. & cor. villosa*. Caul. fruticosus, truncis arborum vicinarum adhærens, inordinate ramosus. Fol. opposita, breviter petiol. ovata, obtusa, vel acutiuscula, integerr. vel obsolete crenata, utrimq. villosula. Pedunc. axillar. solitar. 1-fl. raro oppositi. Flos speciosus, inodorus. Cal. villosus. Cor. phœnic. galea longa.

2. *longifolia*. C. fol. lanceol. longiss. subserratis, glabris. *Syst. veg. ed. 14.*

*Babel-Tsiuli. Hort. mal. 9. tab. 87.*

In *India*.

Caul. herbac. Fol. opposita, sessil. Racemi terminal. elongati, recti, fl. oppositis. Cal. ovatus. Cor. lab. super. magis oblongo; infer. 3-fid. Stam. didyma.

944. ACANTHUS. Cal. 2-fol-2-fid. Cor. 1-lab. deflexa, 3-fid. Capf. 2-locul.

1. *mollis*. A. fol. sinuatis, inermibus. *Syst. veg. ed. 14. Ludw. ect. tab. 126. Sabb. hort. 3. tab. 13. Black. tab. 89.*

*Carduus &c. Bauh. hist. 3. p. 75.*

In *Italia &c. humentibus* 24.

*Habitus Cardui*. Planta succo glutinoso. Fol. magna, nitida, pulchre virent. Fl. spicati, magni, albi, vel subrubentes.

2. *Carduifolius*. A. fol. sinuato-dent. spinosis: spica fl. radicali. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*

*Ad cap. b. Spei.*

Planta palmar. Caul. breviss. ut fere nullus. Fol. plura, subradical. sinuata, more *Cardui*. Spicæ oblong. imbricat. bracteis nervosis, rigidis, 6-spinosis. Cal. muticus, membranac.

3. *spinosus*. A. fol. pinnatis, spinosis. *Syst. veg. ed. 14. Sabb. hort. tab. 14.*

*A. sylvestris. Dod. pempt. 719.*

In *Italia humentibus* 24.

4. *Dioscoridis*. A. fol. lanceol. integerr. margine spinosis. *Syst. veg. ed. 14.*

In *Libano*.

Fol. longa, & angusta. Fl. eodem modo, quo cæteri.

5. *ilicifolius*. A. fol. repandis, dentato-spinosis: caule fruticoso, aculeato. *Syst. veg. ed. 14.*

A. *malabaricus* &c. *Pet. gaz. tab. 94. f. 15.*

Frutex &c. *Pluk. phyt. 261. f. 4.*

Aquifolium. *Rumph. amb. 6. tab. 71.*

Paina Schylli. *Hort. mal. 2. tab. 48.*

In India cœnosis, falsis, maritimis 24.

Frutex spinis 4. transversis. Fol. ex spinarum origine binata, petiolat. densa, rigida, flavo-virid. nitentia. Fl. terminal. binati, cœrul-subpurpur. interne pilis albicantibus.

6. *integrifolius*. A. fol. oblong. integris: caul. herbaceo, procumbente. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*

Ad cap. b. *Spei.*

7. *procumbens*. A. fol. oblongis, ferrato-ciliatis: caule procumb. fruticoso. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*

Ad cap. b. *Spei.*

8. *furcatus*. A. fol. oblongis, dentato-spinosis: caule fruticoso: bracteis spina trifurcata terminatis. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*

Ad cap. b. *Spei.*

9. *capensis*. A. fol. oblongis, dentat. spinosis: caul. erecto, fruticoso: bracteis spina simpl. terminatis. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*

Ad cap. b. *Spei* h.

Rami fruticosi, oppositi, teretes, cinerescunt. Fol. opposita, sessil. semipollic. rigida: axillar. longiora, petiolat. molliora, etiam spinosa. Spinæ terminal. solitar. sessil. Bractea fol. similis, sed pl. utrimq. spinis.

10. *maderasp. tensis*. A. fol. quaternis: fl. axillaribus: calyc. ciliatis. *Syst. veg. ed. 14.*

A. *ciliaris*. *Burm. Ind. tab. 42. f. 2.*

Melampyro &c. *Pluk. phyt. tab. 69. f. 3.*

In India.

Caul. herbac. dichotom. Fol. elliptica, mutica. Cal. exterior imbricatus: interior 4-phyll. foliol. 2. exterioribus lanceolat. reliquis longioribus. Caps. rubra.

arbores.

A. caul. arboreo: fol. sinuato-dentat. spinosis. *Forsk. Æg.*

In Arabia h.

Frutex magnus, 4-cubit. Fol. spitham. opposita, lineari-lanceol. undata. Bract. lanceol. ciliatæ; spicis longis, semipollic. filiformibus. Fl. rubri.

*edulis.* A. fol. lanceol. sub-dentat. spic. bracteis spinosis. *Forsk. Ægyp.*

*In Arabia.*

Fol. quaterna, in ramis sterilibus, obtusa, spinulosa. Spicæ 2-pollic. imbricatæ, dense 4-fariam bracteis fol. superantibus, ovat-lanceol. nervosis, margine spinosiss. Fl. pallide cœrulescent. *Fol. edulia, cruda sapida.*

945. PEDALIMUM. Cal. 5-part. Cor. subringens, limbo 5-fido. Nux. tuberosa, 4-gona, angulis spinosa, 2-locul. Sem. bina.

*1. murex.* P. *Syst. veg. ed. 14. Burm. Ind. tab. 45. f. 2. Kaku-tali. Hort. mal. 10. tab. 72.*

*In Zeylona, Malabaria ☉.*

Caul. simpl. Fol. opposita, petiolis utrimq. glandulosis, obovata, obtusa, dentata, truncata, nuda. Fl. axillar. solitar. parvi, dilute flavi, odore moschi acuto. Fructus nutans.

946. AMA-SONIA. Cal. campanulat. semi-5-fid. Cor. tubulosa, limbo parvo, 5-fid. Nux. ovata, 1-locul.

*1. erecta.* A. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*

*In Surinamo.*

Caul. herbac. 3-ped. simplex, teres. Fol. alterna, petiolat. remota, elliptico-lanceol. subferrata, scabra. Racemus terminal. ped. simplex, pedicellis sub 3-fl. Bract. sessil. ovatæ. Fl. secundi, nutantes, lutei.

947. MELIANTHUS. Cal. 5-phyll. coloratus, foliolo infer. gibbo. Petal. 4. nectario infra infima. Caps. 4-locul.

*1. maior.* M. stipulis solitar. petiolo adnatis. *Syst. veg. ed. 14.*

*M. africanus. Herm. Lugd. tab. 415.*

*In Æthiopia succulentis 24.*

Caul. orgyal. & ultra, ad radicem lignosus, in progressu puniceus. Fol. alterna, semivaginantia, impari-pinn. Foliola sessil. profunde ferrata, nervosa, glauco-virid. odore narcotico. Filam. 2. breviora. *Succussa stillat pluviæ nectariferam florens.*



2. *minor*. M. stipulis geminis distinctis. *Syst. veg. ed. 14.*  
*Comm. rar. 4. tab. 4.*

*In Æthiopia 24.*

Planta min. priore. Caul. 3-4-ped. ramosus, e  
 viridi-pallens, subhirsutus. Fol. alterna, pin-  
 nata. Foliol. 7-9-11. subæqual. lanceol. acu-  
 te dentata, subtus albicantia. Fl. axillar. ra-  
 cemosi, foliosi, crocei.

## NOVA GENERA.

### GYMNOSPERMIA.

#### PLECTRANTHUS.

**C**al. lacinia summa maiore. Cor. resupinata,  
 ringens. Nectar. calcaratum, supinum. Stam.  
 4. quorum 2 breviora, cor. inserta. Recep-  
 tac. deorsum productum, ambiens germen 4-  
 part.

*Differt ab Ocymo, cui adfinis, calyc. non scutel-*  
*lato, sed tantum inæqualiter diviso, cum laci-*  
*nia supera ma. calcare nectarifero tubi cor. fi-*  
*lamentisq. simplicibus. In utrisq. cor. perfecte*  
*resupinata, nec tubus contortus, ut in Hyssopo,*  
*aliisq. ut resupinatus evadat limbus.*

*fruticosus.* P. nectar. calcarato: racemis compositis; pe-  
 dunc. 3-part. caul. fruticoso, lævigato. *Herit.*  
*Stirp. nov. fasc. 4. tab. 41.*

*Ad promontorium b. Spei h.*

Suffrutex ramosiss. habitu *Urticæ*, speciosus,  
 fragrans. Rad. cinerea. Caul. pl. erecti, ra-  
 mosiss. brachiati, medullosi, cinerei. Rami op-  
 positi, patentes, lævigati, obsolete lineati.  
 Turiones 4-gon. virides, pubescentes. Fol.  
 opposita, petiolata, late ovata, seu excepta  
 basi productiore, nec emarginata, cordiform.  
 acuta, duplicato-ferrata, ferraturis æqualibus,  
 obtusiusculis, undulatis; rugosa, nervosa, ve-  
 nola, subtus nervis elevatis, villosa, paten-

tia, fragrantia, 4 pollic. longa, 3-4. poll. lata. Petioli patentes, dimidio fol. longiores, supra unifulci, pubescentes, quandoq. dilute purpurasc. Racemi terminales, erecti, 4-goni, brachiati, villosi, 3-6. pollic. longi. Pedunc. horizontal. oppositi, teretes, villosi, 3-fl. Fl. pedicellati, cœrul. 5. lin. lati. Bract. sub pedunc. patens, adpressâ, subseffil. ovata, acuta, villosa.

## ANGIOSPERMIA.

### SIMBULETA.

**Cal.** **P**erian. 1-phyll. campanif. 5-fid. persistens, lacin. linearibus, æqualibus.

**Cor.** monop. ringens: tubus campaniform. calyce longior: limbi lab. super. reflexum, 2-fid. inferius longius, 3-lobum, rectum, lobo medio inflexo.

**Stam.** Filam. 4. duo longiora. Anth. nigræ, connatæ in laminam 4-gonam, compressam.

**Pistil.** Germ. ovatum. Styl. filiform. Stigm. capitatum, globoso-ovat. obliquum. *Fructus.*

*simbulæta.*

*Forsk. Æg.*

*In Arabia* **U**.

**Caul.** erectus, pedal. simpl. angulatus. Fol. sparsa, propinqua, linear. filiform., super. simplicia, semipollic., inferior. 2-part. pollic. acuminata, glabra. Racemus terminal. 4-pollic. fl. brevibus, pedicellat. nutantibus. Bract. filiform. Cor. alba. *Habitus Resedæ, vel Polygalæ.*

### RUSSELLIA.

**Cal.** 5-phyll. persistens; segmentis parvis, erectis, ovatis, concavis, in acumen setaceum desinentibus.

*Cor.* Tubus erectus, longiss. cylindraceus, compressiuscul. Lab. super. subrotund. planum, emarginatum, patens, apice reflexum: inferius 3-fid. lacin. oblong. obtusis, planis, persistentiss.

*Stam.* Filam. 4. erecta, filiform. Anth. ovatae, geminae, dependent.

*Pistil.* Germ. ovatum. Stylus erectus, filiform. Stigm. globosum.

*Peric.* Caps. subrotund. acumin. 1-locul. 2-valv.

*farmentosa.* *R. Jacq. amer. tab. 113. ed. 2. pict. tab. 171.*  
*In Havana h.*

*Caul.* farmentosi, fruticosi, 3-4-ped. Fol. pollic. opposita, breviter petiol. ad 2. plerumq. pollicum distantiam posita, ovata, acuta, serrata, supra, & margine subhirsuta, subtus glabra. Pedunc. utrimq. axill. 2-3-fl. stipulis ad basin lanceolat. Fl. ferme pollicar. pulchre rubelli.

## TALIGALEA.

*Cal.* Perian. 1-phyll. concavum, 4-5-dent. persistens.

*Cor.* monop. infundibulif. Tubus longus, 5-angular. sensim ampliatus: limbus 5-part. lacin. inæqual. oblong. acutis, incurvatis.

*Stam.* Filam. 4. duo longiora. Anth. oblong. basi 2-fid. 2-locul. 2. extra tubum prominent.

*Pistil.* Germ. sphæricum. Styl. longus, filiform. Stigm. 2. setacea.

*Peric.* Bacca 1-locul.

*Sem.* Officula 2. hemisph. 1-sperm.

*campestris.* *T. Aubl. Guian. tab. 252.*

*In Guiana, & Caienna h.*

*Caul.* 2-3-ped. simplex. Fol. alterna, petiol. ovata, acuta, dentata, subvillosa, infima maiora: floral. parva, ex rubro, & luteo variegata. Fl. axillar. spicati, solitarii, vel in corymbum 3-5-fl. Cor. lutea. Bacca sphærica, nigra, glabra. *Var. fol. latioribus, & glabris.*



PIRIPEA.

*Cal.* Perian. 1-phyll. tubulosum, 5-part. lacin. inæqual. oblong. acutis.

*Cor.* monopet. hypocraterif. Tubus longus, incurvus: limb. 5-part. lacin. inæqual. subrotund. crenatis.

*Stam.* Filam. 4. duo longiora. Anth. oblong. 2-locul.

*Pistil.* Germ. oblong. 4-gon. Styl. brevis. Stigm. crassiuscul. acutum.

*Peric.* Caps. oblong. 2-locul. 2-valv.

*Sem.* plurima, minutiss. placentæ adfixa.

*I. palustris.* P. Aubl. Guian. tab. 253.

In Guiana.

Caul. pedal. striatus. Fol. pollicar. alterna, argute denticul. Fl. spicati, remoti, alterni, sessil. purpurasc.

MONTIRA.

*Cal.* Perian. 1-phyll. 5-part. lacin. oblong. acutis.

*Cor.* monopet. tubulosa: tubus oblong. ventricosus, incurvus: limbus patens, 5-lobus, lobis subrotundis, acutis.

*Stam.* Filam. 4. duo longiora. Anth. oblong. 2-locul.

*Pistil.* Germ. subrotund. didymum, disco insidens: styl. longus: stigm. crassiuscul. sulcatum.

*Peric.* Capsula biventricosa, 2-locul. 4-valv.

*Sem.* plurima, minutiss.

*Guianensis.* M. Aubl. Guian. tab. 257.

In Guiana ☉.

Caul. semiped. 4-gon. marginatus. Fol. opposita. sessil. ovat-oblonga, acuta, glauca. Fl. 3. in bifurcatione ramorum, aut intra fol. terminalia: infimus sessilis; alter breviter, tertius longe pedunculat, omnes albid.

## C O N O B E A .

*Cal.* Perian. 1-phyll. 5-dent. denticul. acutis, intra 2 fol. opposita.

*Cor.* monopet. ringens: tubus oblongus sensim ampliatus: limbus 2-labiat. lab. superiore erecto, emarginato; inferiore 3-fido, lacinia intermedia latiore, concava, lateralibus brevioribus.

*Stam.* Filam. 4. duo longiora. Anth. sagittatæ, 2-locul.

*Pistil.* Germ. subrotund. Stylus tenuis, hirsutus. Stigm. 2-lobum.

*Peric.* Caps. subrotund. 1-locul. 4-valv. apice dehiscens.

*Sem.* plura, minuta, oblonga, striata, placentæ adfixa.

*aquatica.*

*C. Aubl. Guian. tab. 258.*

*In Guiana* ☿.

Caul. procumbent. ramosi, nodosi, marginibus alatis. Fol. opposita, sessil. reniform. undulata. Fl. axillar. solitar-bini, Oppositi, pedunculati. Cor. cœrul.

## M A T O U R E A .

*Cal.* Perian. 1-phyll. 4-part. lacin. oblong. acutis, villosis.

*Cor.* monopet. 2-lab. Tubus longus, incurvus: faux patens. Lab. super. erectum, 2-fid. inferius deflexum, 3-fid. lacinia intermedia paulo longiore, obtusa.

*Stam.* Filam. 4. duo longiora. Anth. oblong. 2-locul.

*Pistil.* Germen. conicum: styl. longus: stigma bilamellatum.

*Peric.* Caps. oblon. 1-locul. 2-valv.

*Sem.* numerosa, minutiss. placentæ adfixa.

*I. pratensis.* *M. Aubl. Guian. tab. 259.*

*In Guiana* ☉.

Caul. pedal. ramosus. Fol. opposita, subpetiol. ovat-oblong. ferrata, leviter villosa. Fl. axillar. sæpe solitar. cœrulescent.

G A L I P E A .

*Cal.* Perian. 1-phyll. tubulosum, 4--5--angulat.  
4-5-dent. denticul. acutis.

*Cor.* monopet. Tubus brevis, disco insertus: limb.  
4--5--fid. laciniis oblong. acutis, inæqualibus.

*Stam.* Filam. 4. duo longiora fertilia; 2 bre-  
viora sterilia, tubo cor. inserta. Anth. ob-  
long. obtusæ, 2-locul.

*Pistil.* Germ. subrotund. 4-5-gonum. Styl. lon-  
gus. Stigm. obtusum: crassiuscul. 4-part.

*Peric.* . . . .

*Sem.* . . . .

*trifoliata.* *G. Aubl. Guian. tab. 269.*

*In Guiana* H.

Frutex 6-ped. Caul. pl. ramosi. Fol. alterna;  
trifoliata. Foliol. longe petiolat., petiol. utrimq.  
marginato, lanceolata, integerr. glabra; in-  
termedio longiore, & latiore. Fl. axillar. &  
terminal. corymbosi, exigui, longe peduncul.  
virides.

R A P U T I A .

*Cal.* Periant. 1-phyll. 5-dent. dentibus subro-  
tund. acutis.

*Cor.* monopet. tubulosa, incurva, bilab. lab.  
super. 3--fid. lacin. intermedia longiore; infer.  
2--fid.

*Stam.* Filam. 5-3. brevia, sterilia, villosa.

*Pistil.* Germ. subrotund. 5-gon. disco caroso cir-  
cumdatum. Styl. longus. Stigm. crassiuscul.  
3-lobum.

*Peric.* Caps. 5. coalitæ, subrotund. angulatæ,  
2-valv. 1-locul. introrsum dehiscentes.

*Sem.* 1. ovatum.

*1. aromatica.* *R. Aubl. Guian. tab. 272.*

*In Guiana* H.

Frutex 2-ped. ramis erectis, oppositis, undiq.  
sparsis. Fol. opposita, ternata. Foliol. longe  
petiol. ovat-oblong. acumin. integerr. glabra,  
quasi perforata. Fl. axillar. & supra ramos:  
pedicellus spicæ infra convexus, superne ca-



nalieulatus. Fl. dispositi ad utrumq. marginem canaliculi. Cor. viridis. *Cortex trunci, & sem. aromaticum.*

## D O M B E Y A.

*Cal.* Perian. 1-phyll. tubulosum, bilabiat. erectum, ante explicationem coccineum, sub anthesi viride, lacinia superiore oblon. infer. duplo latiore, superne ampliata, præmorfa; persistens, 5. lin. longum.

*Cor.* monopetala, calyce longior, villosa, superne ampliata, & elongata, marginibus lateralibus revolutis. Lab. inferius nullum.

*Stam.* Filam. 4. quorum 2 vix longiora. Anth. bilobæ, didymæ.

*Pistil.* Germ. superum, oblong. sub 4-gon. tuberculis reflexis, fuscis asperatum. Styl. longitudine, situ, & flexura cuculli. Stigm. parvum, acutum, 2-fid.

*Peric.* Caps. coriacea, oblonga, acuta, sub 4-loba, inæqualiter spinosa, 2-valv. apice dehiscentis, 4-locul. dissepimento tetraptero, rufa, 15-18. lin. long. 6. lin. lara.

*Sem.* 4-6. in singulo loculo, suborbiculata, plana, cincta crusta membranacea, crenulata, basi emarginata.

*Charaæter essentialis.*

*Cal.* 2-lab. *Cor.* 1-lab. labio superiore concaemerato. *Stam.* 4. quorum 2 breviora. *Caps.* turgida, 4-locul. *Sem.* pauca, imbricata, marginata.

*I. lappacea.* D. Herit. Stirp. Fasc. 2. tab. 17.

Tourrettia. Domb. per. Mff.

In Perua ☉.

Planta cirrhosa, scandens. Cotyledones 2. subrotund. emarginatæ. Caul. herbaceus, diffusus, 2-cubit. fistulosus, debilis, cirrhis subflementatus, 4-gonus, articulatus, nodosus, viridis, basi coloris straminei. Rami ramulosi. Nodi iuxta terram radicantes, uticulis operculo membranaceo, ciliato circumcinctis. Fol. universalia opposita, ternato-decomposita, constantia. Petioli communes horizontales, am-

plexicaul. ciliati. Fol. partialia opposita, petiolata, pedata, 5-phylla. Foliol. petiolulata, ovata, acumin. serrata, reclinata, nervosa, rugosa, pilis adspersa, lacte virid. subtus pallidiora, impari simplici, ma. lateralibus oppositis, binatis, infero dimidio minore, 2 poll. lata. Cirrhi extimæ lacinia locum occupantes, ramosiss. basi foliol. opposita, ternata, minora quandoq. gestientes, apicibus 2-cornibus, hamatis, acutis. Fol. primordialia ternata, lateralibus 2-part. ad sequentem nodum duplicato--ternata, absque cirrho: demum ad summos nodos decomposita fol. pedatis, ternatis nonnullis quandoq. adiectis, desinentia in cirrhum ramificatum. Spicæ terminal. erectæ, pedunculat. bracteata, villoso--glandulosæ, apice rubræ, 2-3-poll. longæ. Fl. breviter pedicellati, patuli, 6. lin. longi. Cor. e violac-fuscescens. Bract. sub pedicello angustiss. acuta, patens.



















